

Analiza 1

Luka Horjak (luka.horjak@student.fmf.uni-lj.si)

12. maj 2021

Kazalo

Uvod	4
1 Števila	5
1.1 Množice števil	5
1.2 Aksiomi realnih števil	6
1.3 Decimalni zapis realnih števil	15
1.4 Iracionalna števila	16
1.5 Peanovi aksiomi	17
1.6 Obstoj korenov, potenc in logaritmov	18
1.7 Kompleksna števila	20
2 Številska zaporedja	21
2.1 Množice in preslikave	21
2.2 Preslikave med množicami	21
2.3 Stekališča in limite	24
2.4 Monotona zaporedja	26
2.5 Računanje z limitami	27
2.6 Posplošene limite	28
2.7 Zaporedja kompleksnih števil	29
3 Realne funkcije realne spremenljivke	30
3.1 Funkcije, grafi in operacije	30
3.2 Zveznost	31
3.3 Monotone funkcije	32
3.4 Enakomerna zveznost	33
3.5 Osnovne lastnosti zveznih funkcij na zaprtih omejenih intervalih	34
3.6 Limite funkcij	36
4 Odvod	38
4.1 Definicija	38
4.2 Pravila za odvajanje	40
4.3 Višji odvodi	43
4.4 Rolleov in Lagrangev izrek	44
4.5 Konveksnost in konkavnost	45
4.6 L'Hôpitalovi izreki	47
4.7 Uporaba odvoda v geometriji	49
5 Integral	50
5.1 Nedoločeni integral	50
5.2 Določeni integral	52
5.3 Posplošeni Riemannov integral	59
5.4 Uporaba integrala v geometriji	62
6 Vrste	65
6.1 Številske vrste	65
6.2 Preureditev vrste	70
6.3 Dvojne vrste	71

6.4	Produkt vrst	73
6.5	Funkcijska zaporedja in vrste	74
6.6	Integriranje in odvajanje funkcijskih zaporedij in vrst	76
6.7	Potenčne vrste	77
6.8	Taylorjeva vrsta	79
7	Metrični prostori	82
7.1	Definicija	82
	Stvarno kazalo	83

Uvod

V tem dokumentu so zbrani moji zapiski s predavanj predmeta Analiza 1 v letu 2020/21. Predavatelj v tem letu je bil prof. dr. Miran Černe.

Zapiski niso popolni. Manjka večina zgledov, ki pomagajo pri razumevanju definicij in izrekov. Poleg tega nisem dokazoval čisto vsakega izreka, pogosto sem ga označil kot očitnega ali pa le nakazal pomembnejše korake v dokazu.

Zelo verjetno se mi je pri pregledu zapiskov izmuznila kakšna napaka – popravki so vselej dobrodošli.

1 Števila

1.1 Množice števil

Definicija 1.1.1. *Naravna števila* (\mathbb{N}) so števila, s katerimi štejemo:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Na njih sta definirani dve operaciji, $+$ in \cdot . Zaradi nepopolnosti sistema (ne znamo na primer rešiti enačbe $x + 5 = 3$), jih razširimo.

Definicija 1.1.2. *Cela števila* (\mathbb{Z}) so števila, ki jih dobimo tako, da naravnim dodamo 0 in njihova nasprotna števila:

$$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$$

Tudi na njih sta definirani prejšnji dve operaciji. Operacija $-$ je pravzaprav prištevanje nasprotnega elementa, zato je ni potrebno posebej definirati.

Tudi ta sistem ni popoln, saj operacija \cdot nima inverzov (ne znamo rešiti na primer $2x - 1 = 0$).

Definicija 1.1.3. *Racionalna števila* (\mathbb{Q}) zapisujemo z ulomki oblike $\frac{p}{q}$, kjer velja $p, q \in \mathbb{Z}$ in $q \neq 0$. Dva ulomka, $\frac{a}{b}$ in $\frac{c}{d}$, sta enaka natanko tedaj, ko velja enakost $ad = bc$. Ulomek je okrajšan, če velja $(p, q) = 1$. Tudi na racionalnih številih lahko definiramo zgornji operaciji.

1.2 Aksiomi realnih števil

1.2.1 Seštevanje

Definicija 1.2.1. Aksiomi seštevanja:

A1: Asociativnost: $\forall a, b, c: (a + b) + c = a + (b + c)$

A2: Komutativnost: $\forall a, b: a + b = b + a$

A3: Obstoj nevtralnega elementa: $\exists 0 \forall a: a + 0 = a$

A4: Obstoj nasprotnega elementa: $\forall a \exists -a: a + (-a) = 0$

Množica z binarno operacijo s prvimi štirimi lastnostmi je *Abelova grupa* (grupa je Abelova, če je komutativna). Primeri:

- $(\mathbb{C}, +)$
- $(\mathbb{Z}, +)$
- $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$

Opomba 1.2.1.1. Za dani a je nasprotni element enoličen.

Dokaz. Obstoj zagotavlja 4. aksiom. Naj bosta a' in a'' nasprotna elementa a . Potem velja

$$(i) \quad a + a' = 0 \text{ in}$$

$$(ii) \quad a + a'' = 0.$$

Sledi, da je

$$a' = a' + 0 = a' + (a + a'') = (a' + a) + a'' = 0 + a'' = a'' + 0 = a''. \quad \square$$

Opomba 1.2.1.2. Pravilo krajšanja: $\forall a, x, y$ velja

$$a + x = a + y \implies x = y.$$

Dokaz.

$$x = ((-a) + a) + x = (-a) + (a + x) = (-a) + (a + y) = ((-a) + a) + y = (a + (-a)) + y = y. \quad \square$$

Posledica 1.2.1.3. $-0 = 0$

Dokaz. Vemo, da je

$$0 + (-0) = 0 = 0 + 0,$$

kar s pravilom krajšanja zaključimo dokaz. \square

Definicija 1.2.2. Razlika števil a in b je definirana kot

$$a - b := a + (-b).$$

Posledica 1.2.2.1. Število $a - b$ je edina rešitev enačbe

$$x + b = a.$$

Dokaz. Denimo, da x reši enačbo $x + b = a$. Sledi, da je

$$x = x + (b + (-b)) = (x + b) + (-b) = a - b.$$

Tak x res reši enačbo, saj je

$$(a - b) + b = (a + (-b)) + b = a + ((-b) + b) = a + (b + (-b)) = a. \quad \square$$

1.2.2 Množenje

Definicija 1.2.3. Aksiomi množenja:

A5: Asociativnost: $\forall a, b, c: (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

A6: Komutativnost: $\forall a, b: a \cdot b = b \cdot a$

A7: Obstoj nevtralnega elementa: $\exists 1 \forall a: a \cdot 1 = a$

A8: Obstoj recipročnega števila: $\forall a \neq 0 \exists a^{-1}: a \cdot a^{-1} = 1$

A9: $1 \neq 0$

A10: Distributivnost: $\forall a, b, c: a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Opomba 1.2.3.1. Za $a \neq 0$ je recipročno število enolično.

Dokaz. Dokaz je enak kot pri opombi 1.2.1.1. □

Opomba 1.2.3.2. Pravilo krajšanja: $\forall a, x, y, a \neq 0$ velja

$$a \cdot x = a \cdot y \implies x = y.$$

Dokaz. Dokaz je enak kot pri opombi 1.2.1.2. □

Posledica 1.2.3.3. $1^{-1} = 1$.

Dokaz.

$$1 \cdot 1^{-1} = 1 = 1 \cdot 1,$$

kar zaključimo dokaz s pravilom krajšanja. □

Posledica 1.2.3.4. $\forall a$ je $a \cdot 0 = 0$.

Dokaz.

$$a + 0 = a = a \cdot 1 = a(1 + 0) = a \cdot 1 + a \cdot 0 = a + a \cdot 0,$$

kar zaključimo dokaz s pravilom krajšanja. □

Posledica 1.2.3.5. $(-a) \cdot b = -a \cdot b$

Dokaz.

$$a \cdot b + (-a \cdot b) = 0 = 0 \cdot b = (a + (-a)) \cdot b = a \cdot b + (-a) \cdot b,$$

kar zaključimo dokaz s pravilom krajšanja. □

Definicija 1.2.4. Količnik števil a in $b \neq 0$ je definiran kot

$$a : b := a \cdot b^{-1}.$$

Posledica 1.2.4.1. Število $a : b$ je edina rešitev enačbe

$$x \cdot b = a.$$

Dokaz. Dokaz je enak kot pri posledici 1.2.2.1. □

Definicija 1.2.5. Množica, na kateri sta definirani operaciji $+$ in \cdot in zadošča zgornjim aksiomom, je *polje* ali *komutativni obseg*. Če veljata še aksioma iz naslednjega podpodglavja, je obseg *urejen*. Če zadošča vsem prvim desetim, razen osmemu, je to *kolobar*.

1.2.3 Urejenost

Definicija 1.2.6. Aksioma urejenosti:

A11: Če je $a \neq 0$, je natanko eno od števil a in $-a$ pozitivno, drugo pa negativno.

A12: Usklajenost operacij z urejenostjo: Če sta a in b pozitivni števili, sta tudi $a + b$ in $a \cdot b$ pozitivni.

Definicija 1.2.7. Za števili a in b je a večji od b ($a > b$), če je razlika $a - b$ pozitivno število. Podobno je a manjši od b ($a < b$), če je razlika $a - b$ negativno število.

Opomba 1.2.7.1. Ker je $a - 0 = a$, dobimo

$$a > 0 \iff a \text{ je pozitiven in}$$

$$a < 0 \iff a \text{ je negativen.}$$

Posledica 1.2.7.2. Za vsaki dve števili a in b velja natanko ena od treh možnosti:

$$\bullet \ a < b \qquad \bullet \ a = b \qquad \bullet \ a > b$$

Taka urejenost je *linearna urejenost*.

Posledica 1.2.7.3. 1 je pozitivno število.

Dokaz. V nasprotnem primeru je $(-1) \cdot (-1) = 1$ pozitivno. □

Opomba 1.2.7.4. Transitivnost: Iz $a > b$ in $b > c$ sledi $a > c$.

Dokaz. Vemo, da je $a - b > 0$ in $b - c > 0$, zato je tudi njuna vsota pozitivna, kar pomeni $a > c$. □

Opomba 1.2.7.5. Če je $a > b$, je $a + c > b + c$.

Dokaz.

$$(a + c) - (b + c) = a - b > 0. \qquad \qquad \qquad \square$$

Opomba 1.2.7.6. Če je $a > b$ in $c > 0$, je $ac > bc$.

Dokaz. $(a - b) \cdot c$ je pozitivno, saj sta $a - b$ in c pozitivni. □

Definicija 1.2.8. $a \geq b$ natanko tedaj, ko je $a > b$ ali $a = b$. Simetrično velja za \leq .

1.2.4 Dedekindov aksiom

Trditev 1.2.9. Enačba $x^2 = 2$ ni rešljiva v \mathbb{Q} , oziroma $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Dokaz. Če je $x = \frac{p}{q}$ okrajšan ulomek, je $p^2 = 2q^2$. Od tod sledi, da je p sod, oziroma $p = 2r$. Sledi, da je $2r^2 = q^2$, torej je tudi q sod, zato ulomek ni bil okrajšan. \square

Definicija 1.2.10. S naj bo neprazna množica z linearno urejenostjo. Neprazna podmnožica $A \subseteq S$ je *navzgor omejena*, če obstaja $M \in S$, da $\forall a \in A$ velja $a \leq M$. Vsak tak M se imenuje zgornja meja za A . Simetrično definiramo *navzdol omejene* množice. Množica je *omejena*, če je navzgor in navzdol omejena.

Opomba 1.2.10.1. Če je $A \subseteq S$ ($S \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$) navzgor omejena, ima zgornjo mejo M . Vsako število M' , večje od M , je prav tako zgornja meja za A . Največja zgornja meja ne obstaja.

Definicija 1.2.11. Naj bo A navzgor omejena neprazna podmnožica S ($S \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$). Število $b \in S$ je *natančna zgornja meja* ali *najmanjša zgornja meja* ali *supremum* množice A ($b = \sup A$), če velja

(i) $\forall a \in A$ je $a \leq b$ in

(ii) $\forall b' < b \exists a' \in A$, da je $b' < a'$.

Opomba 1.2.11.1. Druga točka je ekvivalentna $\forall \varepsilon > 0 \exists a' \in A$, da je $b - \varepsilon < a'$.

Opomba 1.2.11.2. Naj bo za $r \in \mathbb{Q}$

$$r* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < r\}.$$

Potem je $r = \sup r*$.

Dokaz. Vidimo, da je r očitno zgornja meja, za poljuben $x < r$ pa je $\frac{x+r}{2} < r$ element $r*$. \square

Opomba 1.2.11.3. Obstoj supremuma v \mathbb{Q} ni zagotovljena z omejenostjo navzgor.

Dokaz. Za protiprimer vzamemo

$$A = \{a \in \mathbb{Q} \mid a \geq 0 \text{ in } a^2 < 2\}.$$

Vidimo, da je A neprazna ($1 \in A$). Ker $\forall x > 2$ velja $x^2 > 4$, je 2 zgornja meja za A in je A navzgor omejena. Zdaj predpostavimo, da je $b = \sup A$. Potem velja natanko ena izmed možnosti $b^2 = 2$, $b^2 < 2$ ali $b^2 > 2$.

Prva možnost ne velja zaradi opombe 1.2.9.

Če je $b^2 < 2$, lahko najdemo tak $1 > h > 0$, da je $b + h \in A$. Ker je

$$(b + h)^2 = b^2 + 2bh + h^2 < b^2 + 2bh + h,$$

si lahko izberemo kar $h = \frac{2-b^2}{2b+1}$, s tem pa bodo vsi pogoji zadoščeni, saj je $b \geq 1$ in $b^2 < 2$.

Če je $b^2 > 2$, lahko najdemo tak $h > 0$, da je $(b - h)^2 > 2$. Ker je

$$(b - h)^2 = b^2 - 2bh + h^2 > b^2 - 2bh,$$

si lahko izberemo kar $h = \frac{b^2-2}{2b}$, s tem pa bodo zadoščeni vsi pogoji, saj je $b^2 > 2$. \square

Definicija 1.2.12. Dedekindov aksiom:

A13: Vsaka neprazna navzgor omejena množica ima supremum.

Opomba 1.2.12.1. \mathbb{Q} zadošča le prvim 12 aksiomom.

Izrek 1.2.13 (Obstoj realnih števil \mathbb{R}). Obstaja urejen obseg števil \mathbb{R} , ki izpolnjuje tudi Dedekindov aksiom in vsebuje \mathbb{Q} kot urejen podobseg. Operaciji $+$, \cdot v \mathbb{Q} sovpadata z operacijami v \mathbb{R} , urejenost na \mathbb{Q} pa se ujema s tisto na \mathbb{R} .

Opomba 1.2.13.1. Tak urejen obseg je natanko določen do izomorfizma natančno.

Definicija 1.2.14. Rez je taka neprazna podmnožica $A \subset \mathbb{Q}$, da velja:

- 1) Če je $a \in A$ in $a' < a$, je tudi $a' \in A$
- 2) Če je $a \in A$ obstaja $a' > a$, za katerega je $a' \in A$

\mathbb{R} je množica vseh rezov.

Zgled 1.2.14.1. Za $r \in \mathbb{Q}$ je $r* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < r\}$ rez, ki mu ga lahko priredimo. Tako je $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Opomba 1.2.14.1. Za rez A velja $A > 0* \iff 0 \in A$, torej vsebuje tudi kakšno pozitivno število.

Definicija 1.2.15. Na \mathbb{R} vpeljemo operaciji $+$, \cdot in relacijo $<$, za katere velja vseh 13 aksiomov:

- Operacija $+$ Vsota rezov A, B je definirana kot $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$
- Operacija \cdot Produkt rezov A, B je definiran kot
 - a) $A, B > 0$ $A \cdot B = \{a \cdot b \mid a \in A, a \geq 0, b \in B, b \geq 0\} \cup 0*$
 - b) $A > 0, B < 0$ $A \cdot B = -(A \cdot (-B))$
 - c) $A < 0$ $A \cdot B = -((-A) \cdot B)$
- Relacija $<$ Za reza A, B je $A < B \iff A \subset B$

Opomba 1.2.15.1. $A + B$ in $A \cdot B$ sta reza, \mathbb{R} pa ima linearno urejenost.

Izrek 1.2.16. Za urejen obseg rezov z operacijama $+$, \cdot in ureditvijo $<$ velja aksiom A13.

Dokaz. Naj bo \mathcal{A} neprazna navzgor omejena množica rezov. Naj bo $C = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$.

- 1) C je rez. Očitno je $C \neq \emptyset$ in $C \neq \mathbb{Q}$, saj je \mathcal{A} navzgor omejena. Prav tako vidimo, da za vsak $c \in C$ in $c' < c$ velja $c' \in C$ in obstaja $c'' > c$, ki je element C , saj je c element nekega reza v \mathcal{A} .
- 2) C je zgornja meja, saj za vsak rez A iz \mathcal{A} velja $A \subseteq C$.
- 3) C je najmanjša zgornja meja, saj za vsak $C' < C$ obstaja nek $x \in C$ in $x \notin C'$, kar pomeni, da je x element nekega reza A iz \mathcal{A} . Sledi $C' < A$, kar pomeni, da C' ni zgornja meja. \square

Posledica 1.2.16.1. Množica \mathbb{N} ni navzgor omejena v \mathbb{R} .

Trditev 1.2.17 (Arhimedova lastnost). $\forall a, b > 0 \exists n \in \mathbb{N}: an > b$.

Definicija 1.2.18. Naj bo A neprazna navzdol omejena množica realnih števil. m je *infimum* A , če velja

- 1) $\forall a \in A$ je $a \geq m$ in
- 2) $\forall m' > m \exists a \in A$, da je $m' > a$.

Definicija 1.2.19. Naj bo $A \subseteq \mathbb{R}$ neprazna množica. Definiramo množico

$$A^- = \{-a \mid a \in A\}.$$

Trditev 1.2.20. Če je A navzdol omejena, je A^- navzgor omejena in velja

$$\inf A = -\sup(A^-).$$

Posledica 1.2.20.1. Vsaka navzdol omejena množica realnih števil ima infimum.

Definicija 1.2.21. Naj bo A neprazna navzgor omejena množica. Če je $\sup A \in A$, rečemo, da je $\sup A$ *maksimum* množice A . V nasprotnem primeru množica A nima maksimuma. Simetrično definiramo *minimum*.

Posledica 1.2.21.1. $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$, da je

$$0 < \frac{1}{n_0} < \varepsilon.$$

Trditev 1.2.22. Racionalna števila so povsod gosta v \mathbb{R} .

Dokaz. Naj bosta $x < y$ realni števili. Potem obstaja tak $q \in \mathbb{N}$, da je $\frac{1}{q} < y - x$, zato obstaja tak $p \in \mathbb{Z}$, da je $x < \frac{p}{q} < y$, na primer $p = \lfloor xq + 1 \rfloor$. Potem je očitno $\frac{p}{q} > x$ in

$$\frac{p}{q} \leq \frac{xq + 1}{q} < y. \quad \square$$

Trditev 1.2.23. Vsaka navzgor omejena množica celih števil ima maksimum.

Definicija 1.2.24. Naj bosta $a < b$ realni števili. Potem definiramo naslednje množice:

- *Odprta interval*: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- *Zaprta interval*: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- *Polodprta interval*: $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ ali $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- *Odprta poltraka*: $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$ ali $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$
- *Zaprta poltraka* podobno kot zgoraj

Definicija 1.2.25. Za vsako realno število x je njegova *absolutna vrednost* definirana kot

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Ekvivalentno je

$$|x| = \max(x, -x).$$

Posledica 1.2.25.1. Za poljubna $x, y \in \mathbb{R}$ veljajo naslednje lastnosti:

1. $|x| \geq 0$
2. $|x| = 0 \iff x = 0$
3. $|x| = |-x|$
4. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
5. $|x| + |y| \geq |x + y|$

Zgled 1.2.25.1. Kaj so rešitve neenačbe $|x - a| < r$ za $a \in \mathbb{R}$, $r > 0$?

Rešitve so vsi x , za katere je $-r < x - a < r$, oziroma $x \in (a - r, a + r)$.

Opomba 1.2.25.2. Za vse realne x, y velja tudi

$$|x - y| \geq ||x| - |y||.$$

1.3 Decimalni zapis realnih števil

Definicija 1.3.1. *Celi del* števila x je največje celo število, ki ni večje od x . To število označimo z $[x]$.

Konstruiramo niz števil $x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x$, za katere je

$$0 \leq x - x_n < \frac{1}{10^n}.$$

To dosežemo tako, da vzamemo

$$x_i = x_{i-1} + \frac{n_i}{10^i} \leq x < x_i + \frac{1}{10^i},$$

kjer je $n_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ in $x_0 = [x]$.

Trditev 1.3.2. Velja

$$x = \sup \{x_0, x_1, x_2, \dots\}.$$

Dokaz. Očitno je x zgornja meja množice, zato je dovolj dokazati, da je najmanjša. Predpostavimo, da je $y < x$ supremum množice. Potem obstaja tak $k \in \mathbb{N}$,¹ da je

$$\frac{1}{10^k} < x - y,$$

od koder sledi

$$\frac{1}{10^k} < x - y < x - x_k,$$

kar je protislovje. □

Zgled 1.3.2.1. Velja

$$1,0000\dots = 0,9999\dots$$

Z zgornjo konstrukcijo smo vsakemu številu, ki bi lahko imel dva možna decimalna zapisa, priredili tisto, ki se končajo z neskončno mnogo ničlami. Zapisov, ki se končajo z neskončno mnogo deveticami, ne dobimo.

¹ Množica $\{10^k \mid k \in \mathbb{N}\}$ ni navzgor omejena. V nasprotnem primeru bi za njen supremum M veljalo $M < 10^{n'} + 1 < 10^{n'+1} \leq M$, kar je seveda protislovje.

1.4 Iracionalna števila

Zapis racionalnega števila je od neke točke dalje periodičen. To je posledica cikličnega ponavljanja ostankov pri deljenju.

Definicija 1.4.1. Realno število r je *algebraično*, če obstaja tak $P \in \mathbb{Z}[x]$, $\deg P > 0$, da je $P(r) = 0$. V nasprotnem primeru je r *transcendentno* število.

Posledica 1.4.1.1. Vsa racionalna števila so algebraična, saj so ničle linearnih polinomov. Tudi vsi koreni racionalnih števil so algebraična števila.

1.5 Peanovi aksiomi

Definicija 1.5.1. Peanovi aksiomi naravnih števil:

- P1. 1 je naravno število
- P2. Vsakemu naravnemu številu n sledi natanko določeno naravno število n^+ , ki ga imenujemo naslednik števila n
- P3. Iz $n \neq m$ sledi $n^+ \neq m^+$
- P4. Število 1 ni naslednik nobenega naravnega števila
- P5. Vsaka podmnožica naravnih števil, ki vsebuje 1 in je v njej s številom n vedno tudi n^+ , vsebuje vsa naravna števila.

Opomba 1.5.1.1. Kako definirati operaciji $(+, \cdot)$ na \mathbb{N} s Peanovimi aksiomi?

Operacija $+$: Induktivno definiramo

- $p + 1 = p^+$
- $p + k^+ = (p + k)^+$

Operacija \cdot : Induktivno definiramo

- $p \cdot 1 = p$
- $p \cdot k^+ = p \cdot k + p$

1.6 Obstoje korenov, potenc in logaritmov

Izrek 1.6.1 (Obstoje n -tega korena). Za vsako pozitivno realno število x in naravno število n obstaja natanko eno število $y > 0$, ki zadošča enačbi $y^n = x$. Označimo $y = \sqrt[n]{x}$.

Dokaz. Če sta taki števili dve, je eno večje. Potem je tudi n -ta potenca tega števila večja, torej ne moreta biti enaki. Če rešitev obstaja, to pomeni, da je enolična.

Če je $x = 1$, dobimo rešitev $y = 1$. Če je $x > 1$, vzamemo $E = \{t \in \mathbb{R}_0^+ \mid t^n \leq x\}$. Seveda je E neprazna in navzgor omejena. To pomeni, da ima supremum y . Predpostavimo, da je $y^n \neq x$.

Če je $y^n < x$, obstaja $0 < h < 1$, da je $(y + h)^n < x$. Ker je

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} y^i h^{n-i} < y^n + h \left(\sum_{i=1}^n y^i \right),$$

lahko namreč preprosto izberemo

$$h = \frac{x - y^n}{k \cdot \sum_{i=1}^n y^i},$$

kjer je k tako naravno število, da je $h < 1$.

Če je $y^n > x$, obstaja $0 < h < 1$, da je $(y - h)^n > x$. Ker je

$$\sum_{i=0}^n y^{n-i} (-h)^i > y^n - h \cdot \left(\binom{n}{1} y^{n-1} + \binom{n}{3} y^{n-3} + \dots \right),$$

lahko preprosto izberemo

$$h = \frac{y^n - x}{k \cdot \left(\binom{n}{1} y^{n-1} + \binom{n}{3} y^{n-3} + \dots \right)},$$

kjer je k tako naravno število, da je $h < 1$ in $h < y$.

Za $x < 1$ obstaja koren inverza, katerega inverz je koren x . □

Opomba 1.6.1.1. Za lihe n izrek velja tudi za $x < 0$, pri čemer je $y < 0$.

Definicija 1.6.2. Za $b > 0$ in $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ je $b^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{b^p}$.

Izkaže se, da za tako definirane potence veljajo osnovna pravila potenciranja:

- 1) $b^r \cdot b^s = b^{r+s}$
- 2) $(b^r)^s = b^{rs}$
- 3) $(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r$

Definicija 1.6.3. Za $b > 0$ in $x \in \mathbb{R}$ naj bo

$$b^x = \begin{cases} 1, & b = 1 \\ \sup \{b^r \mid r \in \mathbb{Q} \wedge r \leq x\}, & b > 1 \\ \left(\frac{1}{b}\right)^{-x}, & b < 1 \end{cases}$$

Preverimo lahko, da s to definicijo še vedno veljajo prej naštete lastnosti.

Izrek 1.6.4 (Obstoj logaritma). Naj bo $b > 0$ in $b \neq 1$. Za vsak pozitiven x obstaja enolično določen realen y , da velja

$$b^y = x.$$

Pišemo $y = \log_b x$.

Dokaz. Dovolj je izrek dokazati za $b > 1$.

Množica $\{b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ni navzgor omejena (v nasprotnem primeru obstaja supremum, kar hitro privede do protislovja). Posledično $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}$, da je $0 < b^{-n} < \varepsilon$. Zdaj naj bo $E = \{t \in \mathbb{R} \mid b^t \leq x\}$. Množica ni prazna in je navzgor omejena. Supremum te množice je iskan logaritem, kar dokažemo s case-workom, kjer upoštevamo, da b^n ni navzgor omejen. \square

Opomba 1.6.4.1. \mathbb{Q} lahko razširimo na več načinov, na primer $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$

1.7 Kompleksna števila

Enačba $x^2 = -1$ zaradi urejenosti v \mathbb{R} ni rešljiva, zato jih razširimo na *kompleksna števila* $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i]$, kjer je i ena izmed rešitev enačbe $z^2 = -1$. Ekvivalentno je

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

\mathbb{C} je neurejen komutativen obseg. Definiramo $\operatorname{Re}(z) = a$ in $\operatorname{Im}(z) = b$ za $z = a + bi$, kjer sta a in b realni števili. Za tak z je $\bar{z} = a - bi$. *Absolutna vrednost* števila z je definirana kot $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$. Definiramo lahko

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Lastnosti absolutne vrednosti:

- 1) $|z| \geq 0 \quad \forall z$
- 2) $|z| = 0 \iff z = 0$
- 3) $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- 4) $|z + w| \leq |z| + |w|$

1.7.1 Kompleksna ravnina

Kompleksna števila lahko predstavimo v ravnini. Vse zgoraj definirane operacije imajo tudi geometrijsko interpretacijo.

Kompleksna števila lahko zapišemo v obliki $z = |z| \cdot (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = |z| \cdot e^{i\varphi}$. Velja $|z|e^{i\varphi} \cdot |w|e^{i\psi} = |zw|e^{i(\varphi+\psi)}$. Velja tudi

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \cdot \left(\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) \right).$$

Koreni so v ravnini oglišča pravilnega n -kotnika s središčem v 0.

Izrek 1.7.1 (Osnovni izrek algebre). Obseg \mathbb{C} je algebraično zaprt obseg. Vsak nekonstanten polinom s kompleksnimi koeficienti ima kompleksno ničlo.

Posledica 1.7.1.1. Vsak polinom P stopnje n s kompleksnimi koeficienti ima n ničel. P lahko razcepimo na produkt n linearnih faktorjev.

2 Številska zaporedja

2.1 Množice in preslikave

Uporabljamo sistem aksiomov ZFC.

Definicija 2.1.1. Osnovni pojmi teorije množic:

- \mathcal{U} je univerzalna množica
- $A \subseteq B$ pomeni, da $\forall a \in A: a \in B$
- $\emptyset = \{\}$ je prazna množica
- $A \cup B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \vee x \in B\}$ je unija množic
- $A \cap B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \wedge x \in B\}$ je presek množic
- $A^c = \{x \in \mathcal{U} \mid x \notin A\}$ je komplement množice
- $A \cup A^c = \mathcal{U}$
- $A \cap A^c = \emptyset$
- Množice so disjunktne, če je njihov presek prazen
- $A \setminus B = A \cap B^c$
- $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$ je potenčna množica

2.2 Preslikave med množicami

Definicija 2.2.1. Preslikava množice X v množico Y je pravilo, ki vsakemu elementu $x \in X$ priredi natanko določen element Y . Označimo $f: X \rightarrow Y$. Elementu $x \in X$ f priredi element $f(x) \in Y$.

Definicija 2.2.2. Če je Y množica števil, preslikavi pravimo *funkcija*.

Pogosto opazujemo preslikave, ki niso definirane na celotni množici X , ampak le na podmnožici $D \subseteq X$. Tak D je *domena* preslikave f , ki jo označimo z D_f . Množico Y pravimo *kodomena* preslikave f .

Definicija 2.2.3. Zaloga vrednosti f je množica Z_f , definirana kot

$$Z_f = \{f(x) \mid x \in D_f\}.$$

Definicija 2.2.4. Naj bo $f: X \rightarrow Y$ preslikava. f je

- *injektivna*, če iz $x_1, x_2 \in X$ in $x_1 \neq x_2$ sledi $f(x_1) \neq f(x_2)$
- *surjektivna*, če je $Z_f = Y$
- *bijektivna*, če je injektivna in surjektivna

Definicija 2.2.5. Kompozitum ali kompozicija preslikav $f \circ g$ je preslikava, definirana kot $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Definicija 2.2.6. Če je $f: X \rightarrow Y$ bijektivna, obstaja *inverzna preslikava* $f^{-1}: Y \rightarrow X$, za katero je $f^{-1} \circ f \equiv \text{id}_X$ in $f \circ f^{-1} \equiv \text{id}_Y$, kjer je id *identiteta* oziroma *identična preslikava*, ki vsakemu elementu priredi samega sebe.

Definicija 2.2.7. Moč množice A je »število elementov« v A . Označimo jo z $|A|$.

Definicija 2.2.8. Za množici A in B je $|A| = |B|$, če obstaja bijekcija $f: A \rightarrow B$. Pravimo, da sta množici *ekvipolentni*.

Opomba 2.2.8.1. Velja

- 1) $|A| = |A|$, saj je id bijekcija
- 2) $|A| = |B| \iff |B| = |A|$, saj lahko izberemo inverzno preslikavo
- 3) če je $|A| = |B|$ in $|B| = |C|$, je tudi $|A| = |C|$, saj lahko izberemo kompozitum.

Definicija 2.2.9. Množica A je *končna*, če je ekvipolentna množici $\{1, 2, \dots, n\}$ za nek $n \in \mathbb{N}$. Takrat je $|A| = n$.

Definicija 2.2.10. Množica A je *števna*, če je končna, ali pa je ekvipolentna množici \mathbb{N} . Elemente množice A lahko v tem primeru razvrstimo v zaporedje.

Definicija 2.2.11. Množica A je *kontinuum*, če je ekvipolentna množici \mathbb{R} .

Definicija 2.2.12. $|A| \leq |B|$ natanko tedaj, ko obstaja injektivna preslikava $f: A \rightarrow B$.

Opomba 2.2.12.1. Za poljubni množici A in B velja $|A| \leq |B|$ ali $|B| \leq |A|$.

Izrek 2.2.13. \mathbb{Q} je števna.

Dokaz. Vsa racionalna števila lahko razvrstimo v tabelo, nato pa se po njej sprehodimo po diagonalah ali čem podobnem. \square

Izrek 2.2.14. Naj bo A_n za vsak $n \in \mathbb{N}$ množica A_n števno neskončna. Potem je

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

števno neskončna.

Dokaz. Enak prejšnjemu. \square

Definicija 2.2.15. *Kartezični produkt* množic A in B je množica

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Trditev 2.2.16. Kartezični produkt končno mnogo števnih množic je števna množica.

Dokaz. Dovolj je trditev dokazati za dve množici, kar pa je ravno dokaz števnosti \mathbb{Q} . \square

Posledica 2.2.16.1. Množica algebrائيh števil je števno neskončna.

Dokaz. Polinomov s celimi koeficienti je števno. Ker imajo končno mnogo ničel, je njihova unija števna. \square

Trditev 2.2.17. Vsaka podmnožica \mathbb{N} je bodisi končna bodisi števno neskončna.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Izrek 2.2.18. $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$.

Dokaz. Očitno velja $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$. Predpostavimo, da sta enaki. To pomeni, da lahko vse elemente \mathbb{R} zapišemo v neko zaporedje, torej lahko tudi $[0, 1)$ zapišemo v neko zaporedje. Potem lahko z diagonalnim argumentom najdemo število, ki ga še ni na seznamu. \square

Izrek 2.2.19. Za vsako množico X je $|X| < |\mathcal{P}(X)|$.

Dokaz. Definiramo karakteristično funkcijo množice $A \subseteq X$:

$$f_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

Naj bo $\mathcal{F} = \{f_a \mid A \subseteq X\}$. Dokazali bomo, da je $|X| < |\mathcal{F}|$.

- 1) $|X| \leq |\mathcal{F}|$: $x \mapsto f_{\{x\}}$ je injektivna preslikava.
- 2) Predpostavimo, da je $\Phi : X \rightarrow \mathcal{F}$ bijekcija. Definiramo

$$\Psi(x) = \begin{cases} 1, & \text{če je } (\Phi(x))(x) = 0 \\ 0, & \text{če je } (\Phi(x))(x) = 1 \end{cases}$$

Velja $\Psi \neq \Phi(x)$ za vse x , kar je protislovje, saj sledi $\Psi \notin \mathcal{F}$. \square

Opomba 2.2.19.1. Velja $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$.

2.3 Stekališča in limite

Definicija 2.3.1. Naj bo $A \neq \emptyset$. Zaporedje v A je preslikava $a: \mathbb{N} \rightarrow A$. n -ti člen zaporedja označimo z $a_n = a(n)$.

Definicija 2.3.2. Naj bo $n_1 < n_2 < \dots$ strogo naraščajoče zaporedje naravnih števil. Potem je $(a_{n_j})_{j=1}^{\infty}$ podzaporedje zaporedja a_1, a_2, \dots .

Definicija 2.3.3. Naj bo $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ zaporedje števil. $a \in \mathbb{R}$ je *stekališče* tega zaporedja, če za vsak $\varepsilon > 0$ in vsaj $n_0 \in \mathbb{N}$ obstaja tako naravno število $n > n_0$, da je

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Definicija 2.3.4. Naj bo A množica in $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ realna funkcija. f je *navzgor omejena*, če je Z_f navzgor omejena. Simetrično definiramo *navzdol omejene* funkcije. f je *omejena*, če je navzgor in navzdol omejena.

Izrek 2.3.5 (Bolzano–Weierstrass). Če je zaporedje omejeno, ima stekališče.

Dokaz. Naj bo $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ omejeno zaporedje. Naj bo

$$E = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{neenakost } a_n < x \text{ ne velja za neskončno mnogo členov zaporedja}\}.$$

Vidimo, da je E zaradi omejenosti neprazna in navzgor omejena, zato ima supremum α . Tak α je stekališče – za vse $\varepsilon > 0$ namreč $\alpha - \varepsilon$ ni zgornja meja za E , kar pomeni, da je na intervalu $(\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)$ neskončno števil. \square

Opomba 2.3.5.1. Iz konstrukcije α vidimo, da je to najmanjše stekališče zaporedja, oziroma *limes inferior*. Označimo

$$\alpha = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Simetrično obstaja tudi največje stekališče *limes superior*

$$\beta = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Definicija 2.3.6. Število $a \in \mathbb{R}$ je *limita zaporedja* $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, če $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$, da za vsak $n > n_0$ velja

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Definicija 2.3.7. Če ima $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ limito, pravimo, da je *konvergentno* in konvergira k limiti

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Trditev 2.3.8. Zaporedje $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ je konvergentno natanko tedaj, ko je omejeno in ima natanko eno stekališče. To stekališče je limita zaporedja.

Dokaz. Če ima zaporedje limito, je očitno omejeno in ima natanko eno stekališče (vzajemno dovolj majhen ε). Naj bo

$$a = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Po prej dokazanem vemo, da za je za vse ε izven intervala $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ kvečjemu končno mnogo členov zaporedja. To pomeni, da je a limita zaporedja. \square

Izrek 2.3.9. Za zaporedje $(a_n)_{n=1}^\infty$ sta naslednji izjavi ekvivalentni:

- (1) Število a je stekališče zaporedja
- (2) Obstaja podzaporedje $(a_{n_j})_{j=1}^\infty$, ki konvergira k a

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Posledica 2.3.9.1. Vsako omejeno zaporedje realnih števil ima konvergentno podzaporedje.

2.4 Monotona zaporedja

Definicija 2.4.1. Naj bo $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ zaporedje realnih števil.

- 1) To zaporedje je *naraščajoče*, če je $a_n \leq a_{n+1}$ za vse n .
- 2) To zaporedje je *padajoče*, če je $a_n \geq a_{n+1}$ za vse n .
- 3) Zaporedje je *monotono*, če je naraščajoče ali padajoče.

Izrek 2.4.2. Če je zaporedje $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ monotono in omejeno, ima limito.

- 1) Če je zaporedje naraščajoče in navzgor omejeno, je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_n a_n.$$

- 2) Če je zaporedje padajoče in navzdol omejeno, je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_n a_n.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Izrek 2.4.3 (O sendviču). Naj bodo $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ in $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ zaporedja realnih števil, za katere velja

- 1) $a_n \leq b_n \leq c_n$ za vse n
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$

Potem je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

2.5 Računanje z limitami

Izrek 2.5.1. Naj bosta $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ in $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ konvergentni zaporedji z limitama a in b . Potem so konvergentna zaporedja

$$(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}, \quad (a_n - b_n)_{n=1}^{\infty}, \quad (a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty} \quad \text{in} \quad \left(\frac{a_n}{b_n}\right)_{n=1}^{\infty}.$$

(Pri zadnji imamo dodaten pogoj $b_n \neq 0$ in $b \neq 0$). Limite teh zaporedij so zaporedoma $a + b$, $a - b$, $a \cdot b$ in $\frac{a}{b}$.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Posledica 2.5.1.1. Naj bo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

1) Naj bo $k \in \mathbb{Z}$, pri čemer je $k > 0$ ali $a_n \neq 0$ in $a \neq 0$. Potem je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^k = a^k.$$

2) Če je $a_n > 0$, je za vsak naravni k

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{a}.$$

3) Če je $a_n > 0$, je za vsak realni r

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^r = a^r.$$

Posledica 2.5.1.2. Veljajo naslednje lastnosti:

1) Če je $|x| < 1$, je $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$.

2) Za $s > 0$ in $a_n = n^{-s}$ je $a = 0$.

3) Za $x > 0$ je $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1$.

4) Za $s \in \mathbb{R}$ in $a > 1$ je $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^s}{a^n} = 0$.

5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

Izrek 2.5.2 (Cauchyjev pogoj). Zaporedje $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ je konvergentno natanko tedaj, ko za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $n_0 \in \mathbb{N}$, da je za vse $n, m \geq n_0$

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Dokaz. Če je konvergentno z limito a , si izberemo n_0 , za katerega za vse $n \geq n_0$ velja $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Če je zaporedje Cauchyjevo, je očitno omejeno. To pomeni, da ima stekališče. Če sta stekališči vsaj dve, recimo α in β , za vse ε obstaja neskončno m in n , da je $|a_m - \alpha| < \varepsilon$ in $|a_n - \beta| < \varepsilon$ in $|a_n - a_m| < \varepsilon$. To pomeni, da je $|a_m - a_n| > |\alpha - \beta| - 2\varepsilon$, kar je za $\varepsilon = \frac{|\alpha - \beta|}{3}$ protislovje, saj dobimo $\varepsilon > |a_n - a_m| > \varepsilon$. To pomeni, da je stekališče samo eno, torej mora biti limita. □

2.6 Posplošene limite

Definicija 2.6.1. Naj bo $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ zaporedje.

- 1) Pravimo, da to zaporedje *konvergira k* $+\infty$, če za vsak $M \in \mathbb{R}$ obstaja tak $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vsak $n \geq n_0$ velja

$$M < a_n.$$

- 2) Pravimo, da to zaporedje *konvergira k* $-\infty$, če za vsak $m \in \mathbb{R}$ obstaja tak $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vsak $n \geq n_0$ velja

$$m > a_n.$$

Opomba 2.6.1.1. Z $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ označimo *razširjen sistem realnih števil*.

Definicija 2.6.2. Naj bo $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ zaporedje in E množica vseh stekališč tega zaporedja.

- 1) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, če zaporedje ni navzgor omejeno.

- 2) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, če zaporedje ni navzdol omejeno.

- 3) Če je zaporedje navzgor omejeno, je

(i) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup E$, če je $E \neq \emptyset$.

(ii) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, če je $E = \emptyset$.

- 4) Če je zaporedje navzdol omejeno, je

(i) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf E$, če je $E \neq \emptyset$.

(ii) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, če je $E = \emptyset$.

2.7 Zaporedja kompleksnih števil

Definicija 2.7.1. Zaporedje $(z_n)_{n=1}^{\infty}$ kompleksnih števil konvergira k $\alpha \in \mathbb{C}$, če za vsak $\varepsilon > 0$ in $n_0 \in \mathbb{N}$ obstaja tak $n \geq n_0$, da je $|\alpha - a_n| < \varepsilon$.

Izrek 2.7.2. Naj bo $(z_n = a_n + ib_n)_{n=1}^{\infty}$ zaporedje kompleksnih števil, kjer so a_n in b_n realna števila. Tedaj $(z_n)_{n=1}^{\infty}$ konvergira k $\alpha = a + ib$, kjer sta $a, b \in \mathbb{R}$, natanko tedaj, ko

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \text{in} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Posledica 2.7.2.1. Naj bosta $(z_n)_{n=1}^{\infty}$ in $(w_n)_{n=1}^{\infty}$ konvergentni zaporedji kompleksnih števil z limitama z in w . Potem so konvergentna naslednja zaporedja z limitami

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n + w_n) = z + w$
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n - w_n) = z - w$
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n \cdot w_n) = z \cdot w$
- 4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{z}{w}$, če je $w \neq 0$

Izrek 2.7.3. Zaporedje $(z_n)_{n=1}^{\infty}$ kompleksnih števil je konvergentno natanko tedaj, ko je Cauchyjevo.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

3 Realne funkcije realne spremenljivke

3.1 Funkcije, grafi in operacije

Definicija 3.1.1. Funkcija $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ je *realna funkcija*. Če je $X \subseteq \mathbb{R}$, je f *funkcija realne spremenljivke*.

Definicija 3.1.2. Funkcija je *omejena navzgor (navzdol)*, če je njena zaloga vrednosti omejena navzgor (navzdol).

Definicija 3.1.3. Graf funkcije f je množica $G(f) \subset \mathbb{R}^2$, za katero je

$$G(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in D_f\}.$$

Definicija 3.1.4. Projekciji na osi sta funkciji $\pi_x, \pi_y: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definirani s predpisom $\pi_x(x, y) = x$ in $\pi_y(x, y) = y$.

Trditev 3.1.5. $\emptyset \neq \Gamma \subseteq \mathbb{R}^2$ je graf neke funkcije f natanko tedaj, ko je π_x na Γ injektivna. Velja $D_f = \pi_x(\Gamma)$ in $f(x) = \pi_y(\pi_x^{-1}(x))$.

Trditev 3.1.6. Funkcija f je injektivna natanko tedaj, ko je π_y na $G(f)$ injektivna.

Trditev 3.1.7. Naj bo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ injektivna funkcija in $B = f(D)$. $f: D \rightarrow B$ je po definiciji bijekcija in ima inverz.

Definicija 3.1.8. Naj bo $\tau: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ preslikava, definirana s predpisom $(x, y) \mapsto (y, x)$. τ je *zrcaljenje preko simetrane lihih kvadrantov*.

Trditev 3.1.9. Velja $G(f^{-1}) = \tau(G(f))$.

Definicija 3.1.10. Naj bosta $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ funkciji. Potem definiramo naslednje funkcije:

- 1) $(f + g)(x) \equiv f(x) + g(x)$
- 2) $(f - g)(x) \equiv f(x) - g(x)$
- 3) $(f \cdot g)(x) \equiv f(x) \cdot g(x)$
- 4) $\frac{f}{g}(x) \equiv \frac{f(x)}{g(x)}$ za $g(x) \neq 0$ ($D_{\frac{f}{g}} = \{x \in D \mid g(x) \neq 0\}$)

Definicija 3.1.11. Naj bo f navzgor omejena. Potem obstaja $\sup f = \sup Z_f$. Če obstaja $\max Z_f$, definiramo $\max f = \max Z_f$. Simetrično definiramo $\inf f$ in $\min f$.

3.2 Zveznost

Definicija 3.2.1. Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija in naj bo $a \in D$. Funkcija f je *zvezna* v točki a , če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da za vsak $x \in D$, ki zadošča $|x - a| < \delta$, velja

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Izrek 3.2.2. Funkcija $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ je zvezna v točki x natanko tedaj, ko za vsako zaporedje $(x_n)_{n=1}^\infty$ iz D , za katerega velja

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x,$$

velja tudi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Definicija 3.2.3. Funkcija $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ je *zvezna*, če je zvezna v vsaki točki $a \in D$.

Izrek 3.2.4. Naj bosta $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ funkciji, zvezni v točki $a \in D$. Potem so v a zvezne tudi funkcije

$$f + g, \quad f - g, \quad f \cdot g, \quad \frac{f}{g}, \quad \text{če } g(a) \neq 0.$$

Dokaz. Uporabimo izrek 3.2.2 in že prej izpeljane rezultate o limitah. □

Izrek 3.2.5. Kompozitum zveznih funkcij je zvezna funkcija.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Opomba 3.2.5.1. Eksponentna funkcija je zvezna.

Dokaz. Dovolj je dokazati zveznost v 0, ki je očitna, saj je $\lim_{n \rightarrow \infty} b^{\frac{1}{n}} = 1$. □

Trditev 3.2.6. Trigonometrične funkcije so zvezne.

Dokaz. Dovolj je dokazati zveznost \sin , kar lahko z adicijskimi izreki pretvorimo na zveznost v 0, ki je posledica $|\sin x| \leq |x|$. □

3.3 Monotone funkcije

Definicija 3.3.1. Funkcija $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ je

- 1) *naraščajoča*, če je za vse $x_1, x_2 \in D$, za katere je $x_1 \leq x_2$, velja $f(x_1) \leq f(x_2)$
- 2) *padajoča*, če je za vse $x_1, x_2 \in D$, za katere je $x_1 \leq x_2$, velja $f(x_1) \geq f(x_2)$
- 3) *strogo naraščajoča*, če je za vse $x_1, x_2 \in D$, za katere je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) < f(x_2)$
- 4) *strogo padajoča*, če je za vse $x_1, x_2 \in D$, za katere je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) > f(x_2)$
- 5) *(strogo) monotona*, če je (strogo) naraščajoča ali (strogo) padajoča

Posledica 3.3.1.1. Vse strogo monotone funkcije so injektivne.

Posledica 3.3.1.2. Zvezna funkcija je strogo monotona natanko tedaj, ko je injektivna.

Izrek 3.3.2. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna strogo monotona funkcija na intervalu I . Potem je $f^{-1}: Z_f \rightarrow I$ zvezna.

Dokaz. Naj bo $a \in I$ in $b = f(a)$. Dokazujemo, da $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, da za vse $|x - b| < \delta$ velja $|f^{-1}(x) - a| < \varepsilon$. Vzamemo lahko kar $\delta = \min \{|b - f(a - \varepsilon)|, |f(a + \varepsilon) - b|\}$. \square

Posledica 3.3.2.1. Za vse $r \in \mathbb{Q}$ je $x \mapsto x^r$ zvezna na $(0, \infty)$.

Posledica 3.3.2.2. Ciklometrične funkcije so zvezne.

Definicija 3.3.3. *Hiperbolični funkciji* \sinh in \cosh definiramo kot

$$\sinh = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{in} \quad \cosh = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Njuni inverzni funkciji sta

$$\sinh^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad \text{in} \quad \cosh^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

Podobno kot pri kotnih funkcijah definiramo

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

z inverzom

$$\tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

Posledica 3.3.3.1. \sinh , \cosh in \tanh so zvezne.

3.4 Enakomerna zveznost

Definicija 3.4.1. Funkcija $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ je *enakomerno zvezna* na D , če za vse $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da za vse $x, x' \in D$, ki zadoščata $|x - x'| < \delta$, velja

$$|f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Trditev 3.4.2. Naj bo D omejen interval. Naj bo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ enakomerno zvezna. Tedaj je f omejena na D .

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

3.5 Osnovne lastnosti zveznih funkcij na zaprtih omejenih intervalih

Izrek 3.5.1. Naj bo $D = [a, b]$ zaprt omejen interval in $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Potem je f enakomerno zvezna na D .

Dokaz. Predpostavimo nasprotno in fiksiramo »slab« ε . Naj bosta $x_n, x'_n \in D$ taki števili, da je $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$ in $|f(x_n) - f(x'_n)| > \varepsilon$. Vzemimo podzaporedje $(x_{n_j})_{j=1}^{\infty}$, ki konvergira k α . Potem obstaja podzaporedje

$$(x'_{n_{j_k}})_{j=1}^{\infty},$$

ki konvergira k β .

Tudi $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_{j_k}} = \alpha$, ker pa je $\lim_{k \rightarrow \infty} |x_{n_{j_k}} - x'_{n_{j_k}}| = 0$, je $\alpha = \beta$. Vemo pa, da je

$$|f(x_{n_{j_k}}) - f(x'_{n_{j_k}})| \geq \varepsilon,$$

kar pomeni, da f ni zvezna v α . □

Izrek 3.5.2. Naj bo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija, kjer je D zaprt omejen interval. Potem je f omejena na D in obstajata točki $x_m, x_M \in D$, da je

$$f(x_m) = \inf_D f = \min_D f \quad \text{in} \quad f(x_M) = \sup_D f = \max_D f.$$

Dokaz. Prvi del smo že dokazali z enakomerno zveznostjo. Predpostavimo nasprotno in definiramo $g(x) = \frac{1}{M-f(x)}$, ki je po predpostavki dobro definirana. Sledi, da je g omejena, kar je očitno protislovje. □

Izrek 3.5.3 (O obstoju ničle). Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Denimo, da je $f(a) \cdot f(b) < 0$. Potem obstaja tak $c \in (a, b)$, da je $f(c) = 0$.

Dokaz. Naj bo $D_0 = [a, b]$. Induktivno definiramo

$$D_{i+1} = \begin{cases} \left[a_i, \frac{a_i + b_i}{2} \right], & \text{če } f(a_i) \cdot f\left(\frac{a_i + b_i}{2}\right) < 0 \\ \left[\frac{a_i + b_i}{2}, b_i \right], & \text{če } f(b_i) \cdot f\left(\frac{a_i + b_i}{2}\right) < 0 \end{cases}$$

kjer sta a_i in b_i krajišči intervala D_i . Če je $f\left(\frac{a_i + b_i}{2}\right) = 0$ za nek i , lahko preprosto vzamemo $c = \frac{a_i + b_i}{2}$. V nasprotnem primeru je $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$. Vidimo tudi, da imajo vsi $f(a_i)$ ter vsi $f(b_i)$ enak predznak. To pomeni, da je

$$0 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0$$

ali

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \leq 0.$$

V obeh primerih je $c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ iskana ničla. □

Posledica 3.5.3.1. Naj bo f zvezna na zaprtem intervalu $D = [a, b]$. Potem f zavzame vse vrednosti med $\min_D f$ in $\max_D f$.

Posledica 3.5.3.2. Naj bo I interval. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna injektivna funkcija. Tedaj je f strogo monotona na I .

Dokaz. V nasprotnem primeru lahko najdemo $a < b < c$, za katere $f(a)$, $f(b)$ in $f(c)$ niso urejene po velikosti, zato na (a, b) in (b, c) obstajata števili z enako sliko. \square

3.6 Limite funkcij

Definicija 3.6.1. Naj bo $f: (a - r, a + r) \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$,^a kjer je $a \in \mathbb{R}$ in $r > 0$. Število $A \in \mathbb{R}$ je limita funkcije f v točki a , če $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, da iz $0 < |x - a| < \delta$ sledi

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

Označimo $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

^a $(a - r, a + r) \setminus \{a\}$ je prebodena ali punktirana okolica točke a .

Posledica 3.6.1.1. Očitno velja naslednje:

- 1) če je f definirana na $(a - r, a + r)$ in zvezna v a , je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- 2) če je $A = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, je funkcija

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq a \\ A, & x = a \end{cases}$$

zvezna v a .

Izrek 3.6.2. Naslednji trditvi sta ekvivalentni za funkcijo $f: (a - r, a + r) \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$:

- 1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$
- 2) za vsako zaporedje $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ iz $(a - r, a + r) \setminus \{a\}$, za katerega velja, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, velja $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

Trditev 3.6.3. Naj bosta f, g definirani na $(a - r, a + r) \setminus \{a\}$. Če obstajata limiti

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \text{in} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

velja

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x), & \lim_{x \rightarrow a} (f - g)(x) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) & \lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g}(x) &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}, \end{aligned}$$

pri čemer imamo pri 4. limiti še dodaten pogoj, da $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$.

Definicija 3.6.4. Naj bo $f: (a - r, a) \rightarrow \mathbb{R}$, kjer je $a \in \mathbb{R}$ in $r > 0$. Funkcija f ima v točki a *levo limito* A , če je $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, da je za vse $x \in (a - \delta, a)$

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

Označimo $\lim_{x \uparrow a} f(x) = A$. Simetrično definiramo *desno limito* $\lim_{x \downarrow a} f(x) = A$.

Trditev 3.6.5. Naj bo $f: (a - r, a + r) \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija. f ima v a limito natanko tedaj, ko ima levo in desno limito in sta enaki.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Opomba 3.6.5.1. Če je f definirana na $(a - r, a + r) \setminus \{a\}$ in obstajata leva ter desna limita, a nista enaki, pravimo, da ima f v a *skok*.

Izrek 3.6.6. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ monotona funkcija na intervalu I . Potem ima f v vsaki notranji točki intervala I levo in desno limito.

Dokaz. Predpostavimo, da je f naraščajoča. Naj bo $A = \sup \{f(x) \mid x \in I \wedge x < a\}$ (ta obstaja, saj je $f(x) \leq f(a)$). Potem je očitno $A = \lim_{x \uparrow a} f(x)$. Simetrično lahko dokažemo obstoj desne limite. \square

Posledica 3.6.6.1. Monotona funkcija ima na intervalu I največ števno mnogo skokov.

Dokaz. Vsak skok vsebuje racionalno število. \square

Definicija 3.6.7. Pravimo, da f *konvergira* $k + \infty$ ko gre x proti a , če za $\forall M \in \mathbb{R}$ obstaja $\delta > 0$, da iz $0 < x < \delta$ sledi $|x - a| < \delta \wedge f(x) > M$. Pišemo

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$$

Podobno definiramo konvergentnost k $-\infty$ in posplošene enostranske limite.

Definicija 3.6.8. Naj bo f definirana na (a, ∞) , $a \in \mathbb{R}$. Število $A \in \mathbb{R}$ je limita funkcije f , ko gre $x \rightarrow +\infty$, če za vsak $\forall \varepsilon > 0$ obstaja $M > a$, da je za vse $x > M$

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

Podobno definiramo limito v $-\infty$ in konvergentnost k $\pm\infty$.

Opomba 3.6.8.1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ natanko tedaj, ko za vsako zaporedje $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, za katerega velja $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, sledi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

Trditev 3.6.9. Velja

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Dokaz. Trditev bomo dokazali le za $x \rightarrow \infty$. Za $n \leq x < n + 1$ je

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Obe strani konvergirata k e , ker pa imamo poljubno velike x , smo končali. \square

4 Odvod

Odvod predstavlja hitrost spreminjanja funkcije glede na neodvisno spremenljivko.

4.1 Definicija

Definicija 4.1.1. Naj bo f definirana v okolici točke a . Funkcija f je *odvedljiva* v točki a , če obstaja limita

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a).$$

$f'(a)$ je *odvod* funkcije f v točki a .

Opomba 4.1.1.1. Izrazu $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ pravimo *diferenčni kvocient*.

Opomba 4.1.1.2. Podobno kot pri limitah lahko definiramo tudi levi in desni odvod. f je v a odvedljiva, če sta levi in desni odvod v a enaka.

Trditev 4.1.2. Smerni koeficient tangente na graf f v točki $(a, f(a))$ je $f'(a)$. Njen predpis je

$$t(x) = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Definicija 4.1.3. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija na intervalu I . Rečemo, da je f *odvedljiva na I* , če je odvedljiva v vsaki notranji točki I , v krajših intervala, če pripadajo I , pa ustrezno enostransko odvedljiva.

Definicija 4.1.4. f je *zvezno odvedljiva* na I , če njen odvod obstaja in je zvezen na I .

Trditev 4.1.5. Če je f odvedljiva v a , je f zvezna v a .

Dokaz. Velja

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h),$$

kjer je $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} = 0$. □

Definicija 4.1.6. Funkcija f , definirana v okolici točke a , je *diferenciabilna* v a , če obstaja taka linearna funkcija $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, da je

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - Lh}{h} = 0.$$

L imenujemo *diferencial* v točki a ; $L = df_a$.

Opomba 4.1.6.1. Če tak L obstaja, je natanko en.

Trditev 4.1.7. Funkcija f , definirana v okolici točke a , je v a diferenciabilna natanko tedaj, ko je v a odvedljiva. Tedaj je $df_a(h) = f'(a) \cdot h$.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Opomba 4.1.7.1. Naj bo f diferenciable v a . Potem je

$$df_a(h) = f'(a) \cdot h = f'(a) d\operatorname{id}_a(h).$$

Od tod dobimo notacijo

$$f'(a) = \frac{df}{dx}(a).$$

4.2 Pravila za odvajanje

Izrek 4.2.1. Naj bosta f, g definirani v okolici točke a . Naj bosta f in g odvedljivi v a . Potem so v a odvedljive tudi funkcije

$$f + g, \quad f - g, \quad f \cdot g, \quad \text{in} \quad \frac{f}{g},$$

pri čemer imamo pri 4. limiti še dodaten pogoj, da $g(a) \neq 0$. Odvode izračunamo kot

$$(f + g)' = f' + g', \quad (f - g)' = f' - g', \quad (f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \quad \text{in} \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}.$$

Dokaz. Prvi dve točki sta trivialni. Velja pa

$$\begin{aligned} (f \cdot g)'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a+h) + f(a)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} \\ &= f'(a)g(a) + f(a)g'(a) \end{aligned}$$

in

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(a+h)}{g(a+h)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a) - f(a)g(a) + f(a)g(a) - f(a)g(a+h)}{hg(a+h)g(a)} \\ &= \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}. \end{aligned} \quad \square$$

Posledica 4.2.1.1. Naj bodo f_1, \dots, f_n definirane na $(a-r, a+r)$ in odvedljive v a . Naj bo $F = f_1 \cdot f_2 \cdots f_n$. Potem je

$$F'(a) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{F}{f_i} \cdot f_i' \right) (a).$$

Posledica 4.2.1.2. Naj bo $f \equiv \ln$. Potem je

$$f'(x) = \frac{1}{x}.$$

Dokaz. Odvajamo po definiciji. Velja

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{1}{h}} \\ &= \ln \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{1}{h}} \\ &= \ln \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{tx} \right)^t \\ &= \ln \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{tx} \right)^{\frac{tx}{x}} \\ &= \ln e^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{x}. \end{aligned} \quad \square$$

Izrek 4.2.2 (Odvod kompozituma funkcij). Naj bo f definirana v okolici a in odvedljiva v a . Naj bo g definirana v okolici $f(a)$ in odvedljiva v $f(a)$. Potem je $g \circ f$ odvedljiva v a in je

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

Dokaz. Ker je f odvedljiva v a , je

$$f(a+h) = f(a) + f'(a) \cdot h + h \cdot \eta_f(h)$$

kjer je $\lim_{h \rightarrow 0} \eta_f(h) = 0$. Podobno velja za g . Potem je

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a+h) &= g(f(a+h)) \\ &= g(f(a) + f'(a)h + h\eta_f(h)) \\ &= g(f(a) + k(h)) \\ &= g(f(a)) + g'(f(a))k(h) + k(h)\eta_g(k(h)) \\ &= g(f(a)) + g'(f(a))(f'(a)h + h\eta_f(h)) + k(h)\eta_g(k(h)) \\ &= g(f(a)) + g'(f(a)) \cdot f'(a) \cdot h + o(h). \end{aligned}$$

Dovolj je tako dokazati, da je

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} = 0.$$

Velja pa

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g'(f(a)) \cdot h\eta_f(h) + (f'(a)h + h\eta_f(a))\eta_g(k(h))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (g'(f(a)) \cdot \eta_f(h) + (f'(a) + \eta_f(a))\eta_g(k(h))) \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

Izrek 4.2.3. Naj bo $f: I \rightarrow J$ strogo monotona zvezna bijekcija na intervalih I in J . Če je f v $a \in I$ odvedljiva in je $f'(a) \neq 0$, je inverzna funkcija odvedljiva v točki $f(a)$ in velja

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Dokaz. Ker sta f in f^{-1} zvezni, je $x \rightarrow a$ ekvivalentno $y \rightarrow f(a)$, kjer je $y = f(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow f(a)} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(f(a))}{y - f(a)} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)} \\ &= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}} \\ &= \frac{1}{f'(a)}. \end{aligned}$$

□

Posledica 4.2.3.1. $(e^x)' = e^x$, $\sinh'(x) = \cosh(x)$ in $\cosh'(x) = \sinh(x)$.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned.

□

Posledica 4.2.3.2. Naj bo $r \in \mathbb{R}$ in $f(x) = x^r$. Potem je $f'(x) = r \cdot x^{r-1}$.

Dokaz.

$$f'(x) = (e^{r \ln x})' = x^r \cdot r \cdot \frac{1}{x} = rx^{r-1}. \quad \square$$

Trditev 4.2.4. Odvodi ciklometričnih funkcij so po vrsti

$$(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{in} \quad (\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Posledica 4.2.4.1. $(\operatorname{arsh}(x))' = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, $(\operatorname{arch}(x))' = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$ in $(\operatorname{arth}(x))' = \frac{1}{1-x^2}$.

4.3 Višji odvodi

Definicija 4.3.1. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija, kjer je I interval. Denimo, da je f na I odvedljiva. Naj bo $f': I \rightarrow \mathbb{R}$ odvod funkcije f na intervalu I . Če je f' tudi odvedljiva na I , obstaja njen odvod $(f')' = f''$, ki mu pravimo *drugi odvod funkcije f na I* .

Višji odvodi so definirani rekurzivno:

$$f^{(n+1)} = \left(f^{(n)}\right)'.$$

Definicija 4.3.2. $C^n(I)$ je množica vseh funkcij $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, ki so n -krat zvezno odvedljive na I .²

Definicija 4.3.3. Elementom množice

$$C^\infty(I) = \bigcap_{n=0}^{\infty} C^n(I)$$

pravimo *gladke funkcije*.

Odvod je linearen operator:

$$D: C^{n+1}(I) \rightarrow C^n(I), \quad f \mapsto Df = f'.$$

² Posebej definiramo $C(I) = C^0(I)$, kar označuje zvezne funkcije na I .

4.4 Rolleov in Lagrangev izrek

Izrek 4.4.1 (Rolle). Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija, ki je na (a, b) odvedljiva. Naj bo $f(a) = f(b) = 0$. Potem obstaja tak $c \in (a, b)$, da je $f'(c) = 0$.

Dokaz. f je zvezna na $[a, b]$, zato na tem intervalu zavzame maksimum in minimum. Če sta oba 0, je funkcija konstantna in je njen odvod povsod 0. V nasprotnem primeru pa imamo ekstrem, različen od a in b , zato je odvod v tisti točki enak 0. \square

Izrek 4.4.2 (Lagrange). Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija, ki je na (a, b) odvedljiva. Potem obstaja $c \in (a, b)$, da je

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Dokaz. Izrek je ekvivalenten Rolleovem izreku za

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a) - f(a). \quad \square$$

Posledica 4.4.2.1. Naj bo $f \in C([a, b])$ odvedljiva na (a, b) .

- 1) Če je $f'(x) = 0$ na (a, b) , je f konstantna funkcija
- 2) f je naraščajoča na $[a, b]$ natanko tedaj, ko je $f' \geq 0$ na (a, b)
- 3) f je padajoča na $[a, b]$ natanko tedaj, ko je $f' \leq 0$ na (a, b)
- 4) Če je $f' > 0$ na (a, b) , je f strogo naraščajoča na $[a, b]$
- 5) Če je $f' < 0$ na (a, b) , je f strogo padajoča na $[a, b]$

Posledica 4.4.2.2. Naj bo $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ odvedljiva funkcija in naj bo $c \in (a, b)$ izolirana ničla odvoda f' .

- 1) Če odvod pri prehodu točke $x = c$ od leve proti desni spremeni predznak iz $+$ v $-$, ima f v c lokalni maksimum.
- 2) Če odvod pri prehodu točke $x = c$ od leve proti desni spremeni predznak iz $-$ v $+$, ima f v c lokalni minimum.
- 3) Če odvod pri prehodu točke $x = c$ ne spremeni predznaka, c ni lokalni ekstrem.

Opomba 4.4.2.3. Naj bo $f \in C([a, b])$ odvedljiva na (a, b) .

- 1) Če je na $(a, a + \delta)$ $f' < 0$, ima f v a lokalni maksimum.
- 2) Če je na $(a, a + \delta)$ $f' > 0$, ima f v a lokalni minimum.
- 3) Če je na $(b, b - \delta)$ $f' > 0$, ima f v b lokalni maksimum.
- 4) Če je na $(b, b - \delta)$ $f' < 0$, ima f v b lokalni minimum.

4.5 Konveksnost in konkavnost

Definicija 4.5.1. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, kjer je I interval. f je *konveksna* na I , če za vsako trojico števil $a < x < b$ z intervala velja neenakost

$$f(x) \leq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Ekvivalentno

$$f((1 - t)a + tb) \leq (1 - t)f(a) + tf(b)$$

za $t \in [0, 1]$.

Definicija 4.5.2. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, kjer je I interval. f je *konkavna* na I , če za vsako trojico števil $a < x < b$ z intervala velja neenakost

$$f(x) \geq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Ekvivalentno

$$f((1 - t)a + tb) \geq (1 - t)f(a) + tf(b)$$

za $t \in [0, 1]$.

Opomba 4.5.2.1. Množica $K \subseteq \mathbb{R}^n$ je konveksna, če za vse $\vec{a}, \vec{b} \in K$ velja, da je

$$\{(1 - t)\vec{a} + t\vec{b} \mid t \in [0, 1]\} \subseteq K.$$

Opomba 4.5.2.2. f je konveksna na I natanko tedaj, ko je

$$\{(x, y) \mid x \in I \wedge y \geq f(x)\}$$

konveksna.

Izrek 4.5.3. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija, odvedljiva na I . Potem je f konveksna na I natanko tedaj, ko za vse $a, x \in I$ velja

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

Dokaz. Predpostavimo, da je f konveksna na I . Naj bosta $a, x \in I$. Brez škode za splošnost vzemimo $x > a$. Za $y \in (a, x)$ velja neenakost

$$f(y) \leq f(a) + \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(y - a).$$

Tako dobimo

$$\frac{f(y) - f(a)}{y - a}(x - a) \leq f(x) - f(a).$$

Sledi

$$f'(a)(x - a) = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y) - f(a)}{y - a}(x - a) \leq f(x) - f(a).$$

Druga implikacija sledi direktno iz

$$(1 - t)f(a) + tf(b) \geq (1 - t)g(a) + tg(b) = g(x) = f(x),$$

kjer je $x = (1 - t)a + tb$ in g tangenta v x . □

Izrek 4.5.4. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija, odvedljiva na I . Potem je f konveksna na I natanko tedaj, ko je f' naraščajoča na I .

Dokaz. Naj bo f konveksna na I in naj bosta $a, b \in I$ ter $a < b$. Naj bo $k = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Potem je za vse $x \in (a, b)$

$$f(x) \leq f(a) + k(x - a) = f(b) + k(x - b).$$

Potem je

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq k \leq \frac{f(x) - f(b)}{x - b},$$

iz česar s pravimi limitami sledi

$$f'(a) \leq k \leq f'(b).$$

Zdaj predpostavimo, da je odvod naraščajoča funkcija in $a, x \in I$. Privzemimo, da je $a < b$. Po Lagrangu obstaja tak $c \in (a, x)$, da je

$$f'(a) \leq f'(c) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

To pomeni, da je

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

Simetrično velja, če je $x < a$. □

Posledica 4.5.4.1. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija, odvedljiva na I . Potem je f konkavna na I natanko tedaj, ko je f' padajoča na I .

Posledica 4.5.4.2. Naj bo $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dvakrat odvedljiva.

- i) f je konveksna na I natanko tedaj, ko je $f'' \geq 0$ na I .
- ii) f je konkavna na I natanko tedaj, ko je $f'' \leq 0$ na I .

Definicija 4.5.5. Dvakrat odvedljiva funkcija f na intervalu I je *strogo konveksna*, če je $f'' > 0$ na I . Simetrično je *strogo konkavna*, če je $f'' < 0$ na I .

Definicija 4.5.6. *Prevoj* je točka na grafu funkcije f , kjer f preide iz konveksnosti v konkavnost ali obratno.

Posledica 4.5.6.1. Naj bo $f \in C^2(I)$. Če ima graf f prevoj v $(a, f(a))$, je $f''(a) = 0$.

Dokaz. V nasprotnem primeru je f v okolici a konveksna ali konkavna. □

Posledica 4.5.6.2. Naj bo F dvakrat odvedljiva v okolici točke $c \in \mathbb{R}$. Naj bo c stacionarna točka za f .

- (i) Če je $f''(c) > 0$, ima f v c strogi lokalni minimum.
- (ii) Če je $f''(c) < 0$, ima f v c strogi lokalni maksimum.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

4.6 L'Hôpitalovi izreki

Izrek 4.6.1 (Posplošeni Lagrangev). Naj bosta $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezni funkciji, odvedljivi na (a, b) . Naj velja $g'(x) \neq 0$ na (a, b) . Tedaj obstaja tak $c \in (a, b)$, da je

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Dokaz. Naj bo

$$F(x) = f(x) - f(a) - k(g(x) - g(a)),$$

kjer je $k = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ (po Rollu namreč $g(a) \neq g(b)$). Potem je F odvedljiva na (a, b) in $F(a) = F(b) = 0$, zato lahko uporabimo Rollov izrek, s čemer dobimo ravno želeni c . \square

Izrek 4.6.2 (L'Hôpital). Naj bosta f in g odvedljivi funkciji na intervalu (a, b) . Naj velja

$$1) \quad g(x) \neq 0 \text{ in } g'(x) \neq 0 \text{ na } (a, b)$$

$$2) \quad \lim_{x \downarrow a} f(x) = \lim_{x \downarrow a} g(x) = 0$$

Če obstaja limita

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = B,$$

potem obstaja tudi limita

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

in je $A = B$.

Dokaz. Naj bo $f(a) = g(a) = 0$. Potem sta f in g zvezni na $[a, b]$. Za $x \in (a, b)$ so na $[a, x]$ izpolnjeni pogoji posplošenega Lagrangevega izreka, zato obstaja $c_x \in (a, x)$, da je

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}.$$

Po predpostavki obstaja

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

zato obstaja tudi

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{f(x)}{g(x)},$$

ki je enaka prejšnji. \square

Izrek 4.6.3. Naj bosta f in g odvedljivi na (a, b) in naj bo $g(x) \neq 0$ in $g'(x) \neq 0$ za vse $x \in (a, b)$. Denimo, da je $\lim_{x \downarrow a} g(x) = \pm\infty$. Če obstaja limita

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = B,$$

potem obstaja tudi limita

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

in je $A = B$.

Dokaz. Naj bo

$$\lim_{x \downarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = B.$$

Naj bo $\varepsilon > 0$. Potem $\exists \delta > 0$, da je za vse $x \in (a, a + \delta)$

$$B - \varepsilon < \frac{f'(x)}{g'(x)} < B + \varepsilon.$$

Potem je po posplošenem Lagrangevem izreku

$$\frac{f(x) - f(a + \delta)}{g(x) - g(a + \delta)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$$

za nek $c_x \in (x, a + \delta)$. To pomeni, da je

$$B - \varepsilon < \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a+\delta)}{g(a+\delta)}}{1 - \frac{g(a+\delta)}{g(x)}} < B + \varepsilon.$$

Zdaj obstaja tak $\delta_1 \leq \delta$, da je $\left| \frac{g(a+\delta)}{g(x)} \right| < 1$. Tako je

$$(B - \varepsilon) \left(1 - \frac{g(a + \delta)}{g(x)} \right) + \frac{f(a + \delta)}{g(x)} < \frac{f(x)}{g(x)} < (B + \varepsilon) \left(1 - \frac{g(a + \delta)}{g(x)} \right) + \frac{f(a + \delta)}{g(x)},$$

zato obstaja tak $\delta_2 \leq \delta_1$, da je

$$B - 2\varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < B + 2\varepsilon. \quad \square$$

Opomba 4.6.3.1. Podobni izreki veljajo za leve in dvostranske limite.

Trditev 4.6.4. Naj bosta f in g odvedljivi funkciji na (A, ∞) , $g(x) \neq 0$ in $g'(x) \neq 0$ za $A < x < \infty$. Naj bo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \quad \text{in} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$$

ali

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \quad \text{in} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty.$$

Če obstaja limita

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = B,$$

potem obstaja tudi limita

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

in je $A = B$.

Dokaz. Naredimo substitucijo $t = \frac{1}{x}$. □

4.7 Uporaba odvoda v geometriji

4.7.1 Krivulje v ravnini

Definicija 4.7.1. Pot v \mathbb{R}^2 je zvezna preslikava

$$\vec{r}: t \in I \mapsto \vec{r}(t) = (x(t), y(t)).$$

Definicija 4.7.2. Tir ali sled poti je množica točk

$$\Gamma = \vec{r}(I) = \{\vec{r}(t) \mid t \in I\}.$$

Definicija 4.7.3. Pot $\vec{r} = (x, y)$ je zvezna (odvedljiva), če sta x in y zvezni (odvedljivi).

Definicija 4.7.4. Če je $\dot{\vec{r}}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t)) \neq \vec{0}$, je \vec{r} regularna parametrizacija gladke krivulje $\Gamma = \vec{r}(I)$.

Opomba 4.7.4.1. Če je $\dot{\vec{r}}(t_0) = \vec{0}$, ima tir te poti lahko v točki $\vec{r}(t_0)$ nekakšno singularnost oziroma negladnost.

Definicija 4.7.5. Vektor $\dot{\vec{r}}(t)$ je tangentni vektor na krivuljo $\Gamma = \vec{r}(I)$. Vektorska enačba tangente na Γ v $\vec{r}(t_0)$ je enaka $T(\lambda) = \vec{r}(0) + \lambda \dot{\vec{r}}(t_0)$. Smerni koeficient tangente dobimo kot

$$k_T = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)},$$

če je $\dot{x}(t) \neq 0$, če je $\dot{x}(t) = 0$, pa je tangenta navpična.

Definicija 4.7.6. Točke, v katerih je kateri izmed odvodov komponent enak 0, so stacionarne točke. V takih točkah imata lahko x in y lokalne ekstreme.

Definicija 4.7.7. Vektor $\vec{n} = (-\dot{y}, \dot{x})$ je normalni vektor na krivuljo $\Gamma = \vec{r}(I)$. Vektorska enačba normale na Γ v $\vec{r}(t_0)$ je enaka $N(\lambda) = \vec{r}(0) + \lambda \vec{n}(t_0)$.

Izrek 4.7.8. Naj bo $\vec{r}(t) = (X(t), Y(t))$ zvezno odvedljiva pot v \mathbb{R}^2 $\vec{r}: I \rightarrow \mathbb{R}^2$. Naj bo $t_0 \in I$ notranja točka I in naj bo $\dot{\vec{r}}(t_0) \neq \vec{0}$. Potem obstaja okolica $U \subseteq I$ točke t_0 , da lahko množico $\vec{r}(U) \subseteq \mathbb{R}^2$ predstavimo kot graf neke C^1 funkcije f na x osi ali kot graf neke C^1 funkcije g na y osi.³

Dokaz. Naj bo $\dot{X}(t_0) \neq 0$. Brez škode za splošnost vzamemo, da je $\dot{x}(t) > 0$ v okolici U , saj je odvod zvezen. Sledi, da je X strogo naraščajoča, zato je X bijekcija iz U v $J_x = X(U)$. Sledi, da je tudi inverz τ zvezno odvedljiv. Sledi, da je

$$\vec{r}(U) = \{(x, Y(\tau(x))) \mid x \in J_x\}.$$

Ker sta Y in τ zvezno odvedljivi, je tudi njun kompozitum zvezno odvedljiv. \square

³ Če je $\dot{x}(t_0) \neq 0$, je $\vec{r}(U) = \{(x, f(x)) \mid x \in J_x\}$, če je $\dot{y}(t_0) \neq 0$, pa je $\vec{r}(U) = \{(g(y), y) \mid y \in J_y\}$.

5 Integral

5.1 Nedoločeni integral

Definicija 5.1.1. Naj bo $I \subseteq \mathbb{R}$ interval in $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija. Funkcija $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ je *nedoločeni integral* ali *primitivna funkcija* funkcije f , če je F na I odvedljiva in velja

$$F' \equiv f.$$

Trditev 5.1.2. Naj bo F nedoločeni integral funkcije f na intervalu $I \subseteq \mathbb{R}$. Potem je vsak nedoločeni integral G funkcije f na I oblike

$$G \equiv F + c$$

za neko konstanto $c \in \mathbb{R}$.

Dokaz. Velja

$$(F - G)' \equiv f - f \equiv 0,$$

zato je $F - G$ konstantna po posledici 4.4.2.1. □

Namesto $F' \equiv f$ pišemo

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Opomba 5.1.2.1. V splošnem nedoločeni integral ne obstaja. Primer za funkcijo, ki nima integrala, je

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$f(x)$	$\int f(x) dx$
$x^n, n \neq -1$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + c$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + c$
e^x	$e^x + c$
$\sin x$	$-\cos x + c$
$\cos x$	$\sin x + c$
$\frac{1}{\cos(x)^2}$	$\tan x + c$
$\frac{1}{\sin(x)^2}$	$-\cot x + c$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + c$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + c$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+a}}$	$\ln(x + \sqrt{x^2+a}) + c$

Tabela 1: Tabela osnovnih nedoločenih integralov

Trditev 5.1.3. Naj bosta $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ funkciji z nedoločenima integraloma in $\lambda \in \mathbb{R}$. Potem velja

$$\begin{aligned}\int (f + g)(x) \, dx &= \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx \\ \int (\lambda f)(x) \, dx &= \lambda \int f(x) \, dx\end{aligned}$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Trditev 5.1.4 (Integriranje po delih – Per partes). Naj bosta $u, v: I \rightarrow \mathbb{R}$ odvedljivi funkciji. Potem je

$$\int u(x)v'(x) \, dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) \, dx.$$

Dokaz. Integriramo $(u \cdot v)' = u'v + uv'$. \square

Trditev 5.1.5 (Vpeljava nove spremenljivke). Naj bo $\varphi: J_t \rightarrow I_x$ odvedljiva, strogo monotona funkcija in $\varphi'(t) \neq 0$. Naj bo

$$G(t) = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt.$$

Potem je

$$\int f(x) \, dx = G(\varphi^{-1}(x)).$$

Dokaz. Odvajamo obe strani. \square

Opomba 5.1.5.1. Vsaka racionalna funkcija ima elementaren nedoločen integral. Velja namreč

$$\int \frac{A}{(x - \alpha)^m} \, dx = \begin{cases} A \ln |x - \alpha| + C, & m = 1 \\ -\frac{1}{m-1} \cdot \frac{A}{(x-\alpha)^{m-1}}, & m > 1 \end{cases}$$

in

$$\int \frac{Ax + B}{(x^2 + ax + b)^2} \, dx = \begin{cases} E \ln(x^2 + ax + b) + F \arctan\left(\frac{2x+a}{\sqrt{4b-a^2}}\right) + c, & m = 1 \\ \frac{r(x)}{(x^2+ax+b)^{m-1}} + F \arctan\left(\frac{2x+a}{\sqrt{4b-a^2}}\right) + c, & m > 1 \end{cases}$$

kjer je $\deg(r) = 2m - 3$.

5.2 Določeni integral

Definicija 5.2.1. *Delitev* intervala $[a, b]$ je izbor končno mnogo točk

$$D = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subseteq [a, b],$$

za katere je

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Intervale $[x_{j-1}, x_j]$ imenujemo *podintervali delitve*, množico $\mathcal{T} = \{t_1, t_2, \dots, t_n\} \subseteq [a, b]$, kjer je $t_j \in [x_{j-1}, x_j]$, pa *izbor točk*.

Definicija 5.2.2. *Riemannova vsota* funkcije f pri delitvi D in izboru točk \mathcal{T} je vsota

$$R(f, D, \mathcal{T}) = \sum_{j=1}^n f(t_j)(x_j - x_{j-1}) = \sum_{j=1}^n f(t_j)\Delta x_j.$$

Definicija 5.2.3. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. f je *integrabilna po Riemannu* na $[a, b]$, če obstaja tako število I , da za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da za vsako delitev D intervala $[a, b]$, ki zadošča pogoju $\max_j \Delta x_j < \delta$ in za poljuben izbor \mathcal{T} velja

$$|R(f, D, \mathcal{T}) - I| < \varepsilon.$$

To označimo kot

$$\lim_{\max \Delta x_j \rightarrow 0} R(f, d, \mathcal{T}) = I.$$

Številu I pravimo *Riemannov oziroma določeni integral* funkcije f na intervalu $[a, b]$ in ga označimo kot

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Opomba 5.2.3.1. Če je f Riemannovo integrabilna, je omejena.

Definicija 5.2.4. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ omejena in D delitev intervala $[a, b]$. Naj bo

$$m_j = \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f(x) \quad \text{in} \quad M_j = \sum_{[x_{j-1}, x_j]} f(x).$$

Podobno naj bo

$$m = \inf_{[a, b]} f(x) \quad \text{in} \quad M = \sum_{[a, b]} f(x).$$

Spodnja Darbouxjeva vsota funkcije f za delitev D je

$$s(D) = \sum_{j=1}^n m_j \Delta x_j.$$

Simetrično definiramo *zgornjo Darbouxjevo vsoto* $S(D)$.

Definicija 5.2.5. Delitev D' je *nadaljevanje* delitve D (D' je *finejša* od delitve D), če je $D \subseteq D'$.

Trditev 5.2.6. Če je $D \subseteq D'$, je

$$s(D) \leq s(D') \leq S(D') \leq S(D).$$

Dokaz. Po vrsti dodajamo točke. □

Posledica 5.2.6.1. Če sta D_1 in D_2 delitvi, je

$$s(D_1) < S(D_2).$$

Dokaz. Uporabimo zgornjo trditev na njuni uniji. □

Definicija 5.2.7. *Spodnji Darbouxjev integral* je supremum

$$s = \sup_D s(D).$$

Simetrično je *zgornji Darbouxjev integral*

$$S = \inf_D S(D).$$

Definicija 5.2.8. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ omejena funkcija. f je na $[a, b]$ *integrabilna po Darbouxu*, če je $S = s$. To število je njen *Darbouxjev integral*.

Trditev 5.2.9. Omejena funkcija $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je integrabilna po Darbouxju natanko tedaj, ko za vse $\varepsilon > 0$ obstaja delitev D , da je

$$S(D) - s(D) < \varepsilon.$$

Dokaz. Če a vse ε obstaja taka delitev, je

$$S - s \leq S(D) - s(D) < \varepsilon,$$

zato je $S = s$. Če je f integrabilna, pa obstajata taki delitvi D_1 in D_2 , da je

$$s - \frac{\varepsilon}{2} < s(D_1) \leq s = S \leq S(D_2) < S + \frac{\varepsilon}{2},$$

zato njuna unija zadošča pogoju. □

Izrek 5.2.10. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ omejena. Funkcija f je na $[a, b]$ Riemannovo integrabilna, natanko tedaj, ko je integrabilna po Darbouxju in sta integrala enaka.

Dokaz. Predpostavimo, da je f integrabilna po Riemannu z integralom I_R . Naj bo $\varepsilon > 0$. Potem obstaja $\delta > 0$, da za vsak D , za katerega je $\max \Delta x_j < \delta$ velja

$$|R(f, D, \mathcal{T}) - I_R| < \frac{\varepsilon}{3}$$

za vsak \mathcal{T} . Zdaj izberemo tak \mathcal{T} , da je $f(t_j)$ poljubno blizu M_j . Sledi

$$|S(D) - I_R| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Podobno sledi za spodnjo Darbouxjevo vsoto, zato je

$$S(D) - s(d) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

Sledi, da je f integrabilna po Darbouxju z enakim integralom.

Predpostavimo, da je f integrabilna po Darbouxju. Naj bo $\varepsilon > 0$. Obstaja delitev D_0 , da je $S(D_0) - s(D_0) < \frac{\varepsilon}{2}$.

Lema. Naj bo D_0 delitev $[a, b]$. Naj bo $\varepsilon_0 > 0$. Potem obstaja tak $\delta > 0$, da je za vsako delitev D , za katero je $\max \Delta x_j < \delta$, vsota dolžin delilnih intervalov D , ki niso vsebovani v nobenem delilnem intervalu D_0 , pod ε_0 .

Dokaz. Teh intervalov je največ $|D_0|$, zato je skupna dolžina navzgor omejena z $\delta |D_0|$, zato lahko vzamemo $\delta = \frac{\varepsilon_0}{|D_0|}$. \square

Uporabimo zgornjo lemo za $\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{2(M-m)}$. Naj bo D taka delitev, da je $\max \Delta x_j < \delta$. Potem je

$$S(D) - s(D) \leq S(D_0) - s(D_0) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sledi

$$R(f, D, \mathcal{T}) - s(D) < \varepsilon \quad \text{in} \quad S(D) - R(f, D, \mathcal{T}) < \varepsilon.$$

Sledi, da je f integrabilna tudi po Riemannu, integrala pa sta enaka. \square

Izrek 5.2.11. Vsaka zvezna funkcija $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je integrabilna.

Dokaz. Ker je funkcija zvezna na zaprtem intervalu, je enakomerno zvezna. Za $\varepsilon > 0$ obstaja tak δ , da za vse x, y , za katere je $|x - y| < \delta$, velja

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Naj bo D delitev, za katero je $\max \Delta x_j < \delta$. Potem je

$$S(D) - s(D) < (b - a) \cdot \frac{\varepsilon}{b - a} = \varepsilon. \quad \square$$

Trditev 5.2.12. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ omejena in zvezna na (a, b) . Potem je f integrabilna na $[a, b]$.

Dokaz. Naj bo $\varepsilon > 0$, $a' = a + \frac{\varepsilon}{3(M-m)}$ in $b' = b - \frac{\varepsilon}{3(M-m)}$, pri čemer je $a' < b'$. Potem obstaja delitev D' intervala $[a', b']$, da je $S(D') - s(D') < \frac{\varepsilon}{3}$. Naj bo $D = D' \cup \{a, b\}$. Potem je

$$S(D) - s(D) \leq S(D') - s(D') + 2(M - m) \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon. \quad \square$$

Izrek 5.2.13. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monotona. Potem je f integrabilna na $[a, b]$.

Dokaz. Naj bo f nekonstantna naraščajoča funkcija, D pa delitev intervala $[a, b]$. Potem je $M_j = f(x_j)$ in $m_j = f(x_{j-1})$. Velja

$$S(D) - s(D) < \delta(f(b) - f(a)),$$

kjer je $\max_j \Delta x_j < \delta$, zato lahko preprosto izberemo $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$. \square

Trditev 5.2.14. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ omejena in $c \in (a, b)$. f je integrabilna na $[a, b]$ natanko tedaj, ko je f integrabilna na $[a, c]$ in $[c, b]$ in je

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Dokaz. Naj bo f integrabilna na $[a, b]$ in $\varepsilon > 0$. Potem obstaja taka delitev D , da je $S(D) - s(D) < \varepsilon$. Brez škode za splošnost je $c \in D$. Potem je

$$S(D_1) - s(D_1) \leq S(D_1) - s(D_1) + S(D_2) - s(D_2) = S(D) - s(D) < \varepsilon,$$

kjer je $D_1 = D \cap [a, c]$ in $D_2 = D \cap [c, b]$. Simetrično velja za D_2 .

Naj bo f integrabilna na $[a, c]$ in $[c, b]$ in $\varepsilon > 0$. Potem obstajata delitvi D_1 in D_2 intervalov $[a, c]$ in $[c, b]$, za kateri je

$$S(D_1) - s(D_1) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{in} \quad S(D_2) - s(D_2) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sledi, da za delitev $D = D_1 \cup D_2$ intervala $[a, b]$ velja

$$S(D) - s(D) = S(D_1) - s(D_1) + S(D_2) - s(D_2) < \varepsilon.$$

Za enakost integralov je dovolj opaziti

$$R(f, D, \mathcal{T}) = R(f, D_1, \mathcal{T}_1) + R(f, D_2, \mathcal{T}_2). \quad \square$$

Posledica 5.2.14.1. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ omejena. Naj obstajajo točke $a < c_1 < \dots < c_k < b$, da je f zvezna na intervalih (a, c_1) , (c_1, c_2) , ..., (c_k, b) .⁴ Potem je f integrabilna na $[a, b]$.

Definicija 5.2.15. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilna funkcija. Potem definiramo

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

Posledica 5.2.15.1. Naj bodo $a, b, c \in \mathbb{R}$ in f funkcija, ki je na $[\min(a, b, c), \max(a, b, c)]$ integrabilna. Potem je

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Trditev 5.2.16. Integrabilne funkcije na $[a, b]$ tvorijo vektorski prostor nar \mathbb{R} , določeni integral pa je linearen funkcional na tem prostoru.

⁴ Taki funkciji pravimo *odsekoma zvezna* funkcija.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Trditev 5.2.17. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilna. Potem je integrabilna tudi $|f|$ in velja

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

Dokaz. Naj bo D delitev $[a, b]$ in

$$\begin{aligned} \overline{M}_j &= \sup_{[x_{j-1}, x_j]} |f(x)|, & M_j &= \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f(x), \\ \overline{m}_j &= \inf_{[x_{j-1}, x_j]} |f(x)|, & m_j &= \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f(x). \end{aligned}$$

Za poljubna $x, y \in [x_{j-1}, x_j]$ velja

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)| \leq M_j - m_j.$$

Sledi

$$\overline{M}_j - \overline{m}_j \leq M_j - m_j,$$

zato je

$$S(|f|, D) - s(|f|, D) \leq S(f, D) - s(f, D),$$

zato je $|f|$ integrabilna.

Neenakost sledi iz trikotniške neenakosti na Riemannovi vsoti. \square

Trditev 5.2.18. Če sta f in g integrabilni na $[a, b]$ in je

$$f(x) \leq g(x)$$

na intervalu $[a, b]$, je

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Posledica 5.2.18.1. Naj bo f integrabilna na $[a, b]$. Naj bo

$$m = \inf_{[a, b]} f(x) \quad \text{in} \quad M = \sup_{[a, b]} f(x).$$

Potem je

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a).$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Definicija 5.2.19. Povprečna vrednost funkcije f na $[a, b]$ je definirana kot

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

Izrek 5.2.20 (O povprečni vrednosti). Naj bo f zvezna na $[a, b]$. Potem obstaja tak $c \in [a, b]$, da je

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Dokaz. Velja

$$M \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \geq m. \quad \square$$

Izrek 5.2.21 (Osnovni izrek analize). Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilna funkcija z nedoločenim integralom F . Potem je

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b.$$

Dokaz. Naj bo D delitev $[a, b]$. Potem je po Lagrangevem izreku

$$F(b) - F(a) = F(x_n) - F(x_{n-1}) + \cdots + F(x_1) - F(x_0) = f(t_n)\Delta x_n + \cdots + f(t_1)\Delta x_1,$$

kar je ravno Riemannova vsota za delitev D . \square

Izrek 5.2.22. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilna funkcija. Naj bo

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Tedaj je F zvezna na $[a, b]$. Če je f zvezna v $x \in [a, b]$, je F odvedljiva v x in je $F'(x) = f(x)$.

Dokaz. Ker je f integrabilna, je omejena. Naj bo M število, za katero je $|f(x)| \leq M$ za vse $x \in [a, b]$. Naj bo $x \in [a, b]$. Potem je

$$|F(x+h) - F(x)| = \left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^{x+h} |f(t)| dt \right| \leq M \cdot |h|.$$

Sledi, da je F zvezna.

Naj bo f zvezna v $x \in [a, b]$. Potem je

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_x^{x+h} f(t) dt \\ &= \int_x^{x+h} (f(x) + (f(t) - f(x))) dt \\ &= f(x) \cdot h + \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt. \end{aligned}$$

Sledi, da je

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt.$$

Za vse $|h| < \delta$ iz definicije zveznosti za nek $\varepsilon > 0$ pa je

$$\left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt \right| \leq \frac{1}{|h|} \left| \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt \right| \leq \varepsilon. \quad \square$$

Posledica 5.2.22.1. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna. Potem je

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

njen nedoločeni integral.

Trditev 5.2.23 (Integriranje po delih – Per partes). Naj bosta $u, v: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezno odvedljivi. Potem velja

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x)|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x) dx.$$

Dokaz. Vse funkcije so integrabilne na $[a, b]$. Ker je

$$(uv)' = uv' + u'v,$$

je

$$uv|_a^b = \int_a^b u(x)v'(x) dx + \int_a^b u'(x)v(x) dx. \quad \square$$

Trditev 5.2.24 (Vpeljava nove spremenljivke). Naj bo $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [m, M]$ zvezno odvedljiva funkcija in $f: [m, M] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna. Potem je

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Dokaz. Velja

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)).$$

Velja pa

$$(F(\varphi(t)))' = f(\varphi(t))\varphi'(t),$$

zato je

$$F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt. \quad \square$$

Izrek 5.2.25. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna in naj bo $g: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ zvezno odvedljiva, padajoča funkcija. Potem obstaja tak $c \in [a, b]$, da je

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^c f(x) dx.$$

Dokaz. Naj bo

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Če je $g \equiv 0$, trditev očitno velja. V nasprotnem primeru pa iščemo tak $c \in [a, b]$, da je

$$F(c) = \frac{1}{g(a)} \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Naj bosta m in M ekstrema F na $[a, b]$. Velja $F' \equiv f$ in $F(a) = 0$. Sledi, da je

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = F(x)g(x)|_a^b - \int_a^b F(x)g'(x) dx = F(b)g(b) + \int_a^b F(x)(-g'(x)) dx.$$

Velja pa

$$mg(b) \leq F(b)g(b) \leq Mg(b) \quad \text{in} \quad m(-g'(x)) \leq F(x)(-g'(x)) \leq M(-g'(x)).$$

Sledi, da je

$$m \int_a^b -g'(x) dx \leq \int_a^b F(x)(-g'(x)) dx \leq M \int_a^b -g'(x) dx.$$

Sledi, da je

$$mg(a) \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq Mg(a). \quad \square$$

5.3 Posplošeni Riemannov integral

Definicija 5.3.1. Naj bo $f: (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija z lastnostjo, da je za vse $a' \in (a, b)$ integrabilna na $[a', b]$. *Posplošeni integral* f po $[a, b]$ je

$$\lim_{a' \downarrow a} \int_{a'}^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx,$$

če limita obstaja. Simetrično definiramo posplošeni integral za $f: [a, b)$.

Definicija 5.3.2. Naj bo $f: [a, b] \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija, ki je za vse $c' \in (a, c)$ in $c'' \in (c, b)$ integrabilna na $[a, c']$ in $[c'', b]$. Potem je

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Opomba 5.3.2.1. Podobno je definirana *Cauchyjeva glavna vrednost*. Za $f: [a, b] \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$ je definirana kot

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right).$$

Definicija 5.3.3. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilna na $[a, b]$ za vse $b > a$. Posplošeni integral f po $[a, \infty)$ je

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx,$$

če limita obstaja. Simetrično definiramo posplošeni integral na $(-\infty, b]$.

Definicija 5.3.4. Naj bo $f: (-\infty, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Posplošeni integral f po realni osi je definiran kot

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^\infty f(x) dx,$$

če oba integrala obstajata.

Trditev 5.3.5. Naj bosta $f, g: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ funkciji, ki sta za vse $b' \in (a, b)$ integrabilni na $[a, b']$. Denimo, da je $f \leq g$. Če obstaja

$$\int_a^b g(x) dx,$$

obstaja tudi

$$\int_a^b f(x) dx$$

in velja

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Trditev 5.3.6. Naj bo $g: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ zvezna in naj bo $g(a) > 0$. Potem

$$\int_a^b \frac{g(x)}{(x-a)^s} dx$$

obstaja natanko tedaj, ko je $s < 1$.

Trditev 5.3.7 (Cauchyjev pogoj). Naj bo $f: (b-r, b) \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija. Limita $\lim_{x \uparrow b} f(x)$ obstaja natanko tedaj, ko za vse $\varepsilon > 0$ obstaja tak $\delta > 0$, da za vse $x, y \in (b-\delta, b)$ velja

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Dokaz. Iz obstoja limite očitno sledi Cauchyjev pogoj. Naj bo $(x_n)_{n=1}^\infty$ poljubno zaporedje, ki konvergira k b . Sledi, da je x_i Cauchyjevo, zato je tudi $f(x_i)$ Cauchyjevo in ima limito. Limiti poljubnih dveh zaporedij pa sta enaki, saj tudi njuna »kombinacija« konvergira k b , zato ima limito. \square

Trditev 5.3.8. Naj bo $f: (a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija. Limita $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ obstaja natanko tedaj, ko za vse $\varepsilon > 0$ obstaja tak $M > 0$, da za vse $x, y > M$ velja

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Trditev 5.3.9. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ taka funkcija, da za vse $b' \in (a, b)$ integrabilna na $[a, b']$. Če obstaja

$$\int_a^b |f(x)| dx,$$

obstaja tudi

$$\int_a^b f(x) dx$$

in velja

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Enako velja za funkcije in njihove integrale na poltraku.

Dokaz. Naj bosta

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{in} \quad \tilde{F}(x) = \int_a^x |f(t)| dt.$$

Za $x, y \in [a, b]$ velja

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_x^y f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^y |f(t)| dt \right| = |\tilde{F}(y) - \tilde{F}(x)|,$$

torej F zadošča Cauchyjevemu pogoju. \square

Opomba 5.3.9.1. Za funkcije, za katere obstaja integral

$$\int_a^\infty |f(x)| \, dx,$$

pravimo, da so *absolutno integrabilne*.

Trditev 5.3.10. Naj bo $g: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ taka zvezna funkcija, da obstajajo $0 < a \leq b$ in $0 < m \leq M$, da za vse $x \geq b$ velja

$$m \leq g(x) \leq M.$$

Tedaj

$$\int_a^\infty \frac{g(x)}{x^s} \, dx$$

obstaja natanko tedaj, ko je $s > 1$.

Dokaz. Najprej opazimo, da je

$$\int \frac{g(x)}{x^s} \, dx = \int_a^b \frac{g(x)}{x^s} \, dx + \int_b^\infty \frac{g(x)}{x^s} \, dx.$$

Prvi integral na desni strani vedno obstaja, zato je obstoj začetnega integrala ekvivalenten obstoju integrala

$$\int_a^\infty \frac{g(x)}{x^s} \, dx.$$

Za $x \geq b$ velja

$$\frac{m}{x^s} \leq \frac{g(x)}{x^s} \leq \frac{M}{x^s}.$$

Sledi, da integral

$$\int_a^\infty \frac{g(x)}{x^s} \, dx$$

obstaja natanko tedaj, ko obstaja integral

$$\int_b^\infty \frac{dx}{x^s},$$

ta pa obstaja natanko tedaj, ko je $s > 1$. □

5.4 Uporaba integrala v geometriji

5.4.1 Ploščina ravninskega lika

Ploščino množice

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b] \wedge 0 \leq y \leq f(x)\},$$

kjer je f nenegativna funkcija, lahko izračunamo kot

$$\int_a^b f(x) \, dx.$$

Trditev 5.4.1. Naj bosta $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilni funkciji in naj bo $g \leq f$ na $[a, b]$. Potem je ploščina množice

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b] \wedge g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

enaka

$$\int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx.$$

Trditev 5.4.2. Naj bo $r: [\alpha, \beta] \rightarrow [0, \infty)$. Ploščino izseka, podanega z r , izračunamo kot

$$P = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r(\varphi)^2 \, d\varphi.$$

5.4.2 Dolžina poti

Naj bo $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ C^1 pot in naj bo Γ njen tir.

Definicija 5.4.3. Naj bo D delitev intervala $[a, b]$. *Dolžina poligonske krivulje*, definirane s točkami $\{\vec{r}(x) \mid x \in D\}$, je enaka

$$\lambda(D) = \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|.$$

Opomba 5.4.3.1. Če je $D \subseteq D'$, po trikotniški neenakosti velja

$$\lambda(D) \leq \lambda(D').$$

Definicija 5.4.4. *Dolžina poti* Γ je

$$\lambda(\Gamma) = \sup \{\lambda(D) \mid D \text{ je delitev intervala } [a, b]\}.$$

Opomba 5.4.4.1. Če je $\lambda(\Gamma) \in \mathbb{R}$, pravimo, da je pot *izmerljiva* ali *rektifikabilna*.

Izrek 5.4.5. Naj bosta $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ in $\vec{\rho}: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^2$ regularni parametrizaciji poti Γ . Potem je

$$\int_a^b |\dot{\vec{r}}(t)| \, dt = \int_{\alpha}^{\beta} |\dot{\vec{\rho}}(t)| \, dt$$

Dokaz. Naj bo $h: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ bijekcija. Velja

$$\begin{aligned}\lambda_{\vec{p}}(\Gamma) &= \int_{\alpha}^{\beta} |\dot{\vec{p}}(\tau)| \, d\tau \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} |\dot{\vec{r}}(h(\tau))| |h'(\tau)| \, d\tau \\ &= \int_a^b |\dot{\vec{r}}(t)| \, dt \\ &= \lambda_{\vec{r}}(\Gamma).\end{aligned}$$

□

Izrek 5.4.6. Če je \vec{r} zvezno odvedljiva pot v \mathbb{R}^2 , je

$$\lambda(\Gamma) = \int_a^b |\dot{\vec{r}}(t)| \, dt = \int_a^b \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} \, dt.$$

Dokaz. Naj bo D delitev intervala $[a, b]$. Potem je po Lagrangevem izreku

$$\begin{aligned}\lambda(D) &= \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{\dot{x}(\tau_i)^2 + \dot{y}(\tau_i)^2} \Delta t_i,\end{aligned}$$

kjer $\tau_i, \tilde{\tau}_i \in (t_{i-1}, t_i)$. Vidimo, da je zadnja vsota omejena med Riemannovi vsoti za delitvi

$$p_i = \begin{cases} \tau_i, & |\dot{\vec{r}}(\tau_i)| \geq |\dot{\vec{r}}(\tilde{\tau}_i)| \\ \tilde{\tau}_i, & |\dot{\vec{r}}(\tau_i)| < |\dot{\vec{r}}(\tilde{\tau}_i)| \end{cases} \quad \text{in} \quad q_i = \begin{cases} \tilde{\tau}_i, & |\dot{\vec{r}}(\tau_i)| \geq |\dot{\vec{r}}(\tilde{\tau}_i)| \\ \tau_i, & |\dot{\vec{r}}(\tau_i)| < |\dot{\vec{r}}(\tilde{\tau}_i)| \end{cases} \quad \square$$

Posledica 5.4.6.1. Dolžino grafa funkcije $f \in C^1([a, b])$ izračunamo kot

$$\lambda = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx.$$

Posledica 5.4.6.2. Naj bo $r: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ krivulja v polarnem zapisu. Njeno dolžino lahko izračunamo kot

$$\lambda = \int_a^b \sqrt{r'(t)^2 + r^2(t)} \, dt.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

5.4.3 Prostornina in površina vrtenine

Trditev 5.4.7. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$. Volumen vrtenine, ki jo dobimo, ko graf f zavrtimo okoli x -osi, izračunamo kot

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 \, dx.$$

Trditev 5.4.8. Naj bo $f: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$. Površina plašča vrtenine, ki jo dobimo, ko graf f zavrtimo okoli x -osi, izračunamo kot

$$2\pi \int_a^b f(x) \, ds = 2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx.$$

5.4.4 Težišče homogene plošče

Trditev 5.4.9. Koordinate težišča T plošče D , omejene s funkcijama f in g na $[a, b]$, dobimo kot

$$\frac{1}{P(D)} \left(\int_a^b x (f(x) - g(x)) \, dx, \frac{1}{2} \int_a^b (f(x)^2 - g(x)^2) \, dx \right),$$

kjer je $P(D)$ površina plošče.

6 Vrste

»A lahk sam vprašam kaj nam to
sploh pomaga da damo to pod koren?«
—Jan Kamnikar

6.1 Številske vrste

Definicija 6.1.1. Dano je zaporedje števil $(a_n)_{n=1}^\infty$. *Številska vrsta* zaporedja je vsota

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n,$$

kjer so

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

delne vsote zaporedja.

Definicija 6.1.2. Vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *konvergira*, če konvergira zaporedje delnih vsot.

Izrek 6.1.3 (Cauchyjev pogoj). Vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

konvergira natanko tedaj, ko za vse $\varepsilon > 0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, da za vse $n \geq n_0$ in $k \in \mathbb{N}$ velja

$$\left| \sum_{i=1}^k a_{n+i} \right| < \varepsilon.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Posledica 6.1.3.1. Če vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira, je $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Opomba 6.1.3.2. Vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira natanko tedaj, ko konvergira njen *ostanek* oziroma *rep*

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n.$$

Trditev 6.1.4. Naj vrsti $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ in $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Tedaj konvergirajo vrste

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n), \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \quad \text{in} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (ca_n)$$

z vsotami

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad \text{in} \quad c \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Trditev 6.1.5. Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vrsta s pozitivnimi členi. Potem vrsta konvergira natanko tedaj, ko je navzgor omejena.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Trditev 6.1.6. Naj bo $0 \leq a_n \leq b_n$. Če konvergira vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, konvergira tudi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. \square

Opomba 6.1.6.1. Vrsti $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ pravimo *minoranta*, vrsti $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ pa *majoranta*.

Izrek 6.1.7 (D'Alembertov kvocientni kriterij). Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vrsta s pozitivnimi členi in naj bo

$$q_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

1) Če obstajata taka $q < 1$ in $n_0 \in \mathbb{N}$, da je za vse $n \geq n_0$

$$q_n \leq q,$$

potem vrsta konvergira.

2) Če obstaja tak n_0 , da je za vse $n \geq n_0$

$$q_n \geq 1,$$

potem vrsta divergira.

Dokaz. Primerjava z geometrijsko vrsto. \square

Posledica 6.1.7.1. Če je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, vrsta konvergira.

Posledica 6.1.7.2. Če je $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, vrsta divergira.

Izrek 6.1.8 (Cauhcyjev korenski kriterij). Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ z nenegativnimi členi in naj bo

$$q_n = \sqrt[n]{a_n}.$$

1) Če obstajata taka $q < 1$ in $n_0 \in \mathbb{N}$, da je za vse $n \geq n_0$

$$q_n \leq q,$$

potem vrsta konvergira.

2) Če obstaja podzaporedje $(a_{n_j})_{j=1}^{\infty}$, da za vse j velja

$$q_{n_j} \geq 1,$$

potem vrsta divergira.

Dokaz. Prva točka je ekvivalentna $a_n \leq q^n$. Pri drugi je dovolj dokazati, da vrsta podzaporedja divergira, kar je očitno. \square

Posledica 6.1.8.1. Če je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, vrsta konvergira.

Posledica 6.1.8.2. Če je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, vrsta divergira.

Izrek 6.1.9 (Cauhyjev integralski kriterij). Naj bo $f: [1, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ zvezna padajoča funkcija. Tedaj

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$$

konvergira natanko tedaj, ko obstaja splošeni integral

$$\int_1^{\infty} f(x) dx.$$

Dokaz. Vidimo, da je $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ zgornja, $\sum_{n=2}^{\infty} f(n)$ pa spodnja Darbouxjeva vsota. Sledi, da je

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \leq \int_1^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=2}^{\infty} f(n). \quad \square$$

Izrek 6.1.10 (Raabejev kriterij). Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ s pozitivnimi členi in naj bo

$$R_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right).$$

1) Če obstajata taka $r > 1$ in $n_0 \in \mathbb{N}$, da je za vse $n \geq n_0$

$$1 < r \leq R_n,$$

potem vrsta konvergira.

2) Če obstaja tak $n_0 \in \mathbb{N}$, da je za vse $n \geq n_0$

$$R_n \leq 1,$$

potem vrsta divergira.

Dokaz. Najprej dokažimo naslednjo lemo:

Lema. Naj bo $r > 1$ in $s \in \mathbb{Q}$, in $1 < s < r$. Potem obstaja tak $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vse $n \geq n_0$ velja

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^s < 1 + \frac{r}{n}.$$

Dokaz. Neenakost je ekvivalentna

$$n \left(\left(1 + \frac{r}{n} \right)^q - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^p \right) > 0,$$

kjer je $s = \frac{p}{q}$. To lahko razpišemo kot

$$n \cdot \left(1 + q \frac{r}{n} + \dots - 1 - \frac{p}{n} - \dots \right) > 0,$$

oziroma

$$(qr - p) + \frac{1}{n}(\dots) > 0,$$

kar očitno velja za dovolj velike n . □

Privzemimo, da za $n \geq n_0$ velja $R_n \geq r > 1$. S pomočjo leme dobimo

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{r}{n} > \left(1 + \frac{1}{n} \right)^s$$

za vse $n \geq N$. Sledi

$$a_{n+1} \leq \frac{1}{(n+1)^s} n^s a_n,$$

oziroma

$$a_n \leq \frac{c}{n^s},$$

kjer je $a_N = \frac{N}{c^N}$, zato vrsta konvergira.

Drugi pogoj je ekvivalenten

$$\frac{n}{n+1} a_n \leq a_{n+1}.$$

Naj bo $a_{n_0} = \frac{c}{n_0}$. Potem je za vse $n \geq n_0$

$$a_n \geq \frac{c}{n},$$

zato vrsta divergira. □

Posledica 6.1.10.1. Če je $\liminf_{n \rightarrow \infty} R_n > 1$, vrsta konvergira.

Posledica 6.1.10.2. Če je $\limsup_{n \rightarrow \infty} R_n < 1$, vrsta divergira.

Definicija 6.1.11. Vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira *absolutno*, če konvergira vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

Trditev 6.1.12. Če vrsta konvergira absolutno, potem konvergira.

Dokaz. Uporabimo Cauchyjev kriterij in trikotniško neenakost. □

Definicija 6.1.13. Vrsta konvergira *pogojno*, če konvergira, a ne konvergira absolutno.

Izrek 6.1.14 (Leibnizev kriterij). Naj bo $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ padajoče zaporedje nenegativnih števil z limito 0. Potem vrsta

$$\sum_{i=1}^n (-1)^n a_n$$

konvergira.

Dokaz. Zaporedje s_{2n} je padajoče, s_{2n-1} pa naraščajoče. Ker je $s_{2n} \geq s_{2n-1}$, sta obe omejeni, torej imata limiti, ki sta očitno enaki. \square

6.2 Preureditev vrste

Definicija 6.2.1. Naj bo $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ vrsta in $\pi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bijekcija. Vrsti

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_{\pi(i)}$$

pravimo *preureditev* vrste.

Izrek 6.2.2. Naj bo $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ absolutno konvergentna vrsta. Potem konvergira tudi vsaka njena preureditev, vsota vrste pa je neodvisna od bijekcije π .

Dokaz. Z s_n označimo delno vsoto vrste. Naj bo $\varepsilon > 0$. Potem obstaja tak n_0 , da velja

$$\sum_{i=n_0+1}^{\infty} |a_i| < \varepsilon.$$

Naj bo n_1 tako naravno število, da je

$$\{1, 2, \dots, n_0\} \subseteq \{\pi(1), \dots, \pi(n_1)\}.$$

Potem po trikotniški neenakosti za vse $N \geq n_1$ velja

$$\left| s - \sum_{i=1}^N \pi(i) \right| < \varepsilon. \quad \square$$

Izrek 6.2.3 (Riemannov o vrstah). Če je vrsta $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ pogojno konvergentna, potem za vsak $A \in \mathbb{R}$ obstaja taka bijekcija $\pi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, da je

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_{\pi(i)} = A.$$

Dokaz. Naj bodo p_1, p_2, \dots nenegativni členi, q_1, q_2, \dots pa negativni členi zaporedja a_n v istem vrstnem redu, kot se pojavijo v zaporedju

Če katera izmed vrst zgornjih zaporedij konvergira, konvergira tudi druga, saj je njuna vsota konvergentna vrsta. Sledilo bi, da je začetna vrsta absolutno konvergentna, kar po predpostavki ni res, zato sta obe divergentni.

Rekurzivno definiramo bijekcijo π :

$$\pi(n) = \begin{cases} k(n), & \text{če je } \sum_{i=1}^{n-1} a_{\pi(i)} \leq A \\ m(n), & \text{če je } \sum_{i=1}^{n-1} a_{\pi(i)} > A \end{cases}$$

kjer je $k(n)$ indeks prvega še neporabljenega nenegativnega člena zaporedja, $m(n)$ pa prvega negativnega člena zaporedja. Ni težko videti, da je π bijekcija in

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_{\pi(i)} = A. \quad \square$$

6.3 Dvojne vrste

Izrek 6.3.1 (Fubini). Naj bo

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} |a_{i,j}| \right) < \infty.$$

Potem konvergirata tudi vrsti

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{i,j} \right) \quad \text{in} \quad \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{i,j} \right)$$

in sta enaki.

Dokaz. Najprej pogledjmo primer, ko so členi vrste nenegativni. Velja

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{i,j} \right) < \infty.$$

Očitno pa je

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} \right) \leq A,$$

zato je v limiti

$$B = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{i,j} \right) \leq A.$$

Simetrično lahko dobimo $B \geq A$, s čemer je trditev dokazana.

Naj bo zdaj

$$b_{i,j} = \max\{a_{i,j}, 0\} \quad \text{in} \quad c_{i,j} = \max\{-a_{i,j}, 0\}.$$

Potem je

$$\infty > \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} (b_{i,j} + c_{i,j}) \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} b_{i,j} \right) + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} c_{i,j} \right).$$

Sledi, da konvergirata obe vrsti, torej konvergira tudi njuna razlika. Ker velja $b_{i,j}, c_{i,j} \geq 0$, je tako

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{i,j} \right) &= \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} (b_{i,j} - c_{i,j}) \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} b_{i,j} \right) - \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} c_{i,j} \right) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} b_{i,j} \right) - \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} c_{i,j} \right) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{i,j} \right). \end{aligned}$$

□

Izrek 6.3.2. Naj bo $\pi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ bijekcija. Če katera od vrst

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} |a_{i,j}| \right), \quad \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |a_{i,j}| \right), \quad \sum_{i=1}^{\infty} |a_{\pi(i)}|$$

konvergira, konvergirajo vse in velja, da vrste

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{i,j} \right), \quad \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{i,j} \right), \quad \text{in} \quad \sum_{i=1}^{\infty} a_{\pi(i)}$$

konvergirajo in so enake.

6.4 Produkt vrst

Izrek 6.4.1. Naj bosta $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ in $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$ absolutno konvergentni vrsti. Tedaj je tudi

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_i b_j \right)$$

absolutno konvergentna in je enaka produktu vrst.

Dokaz. Velja

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} |a_i| \cdot |b_j| \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(|a_i| \cdot \sum_{j=1}^{\infty} |b_j| \right) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |a_i| \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{\infty} |b_j| \right).$$

S podobnim izračunom dobimo, da je

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_i b_j \right) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{\infty} b_j \right).$$

□

Opomba 6.4.1.1. V zgornjem izreku vrstni red seštevanja členov $a_i b_j$ ni pomembna.

6.5 Funkcijska zaporedja in vrste

Definicija 6.5.1. *Funkcijsko zaporedje* je zaporedje, katerega elementi so funkcije, definirane na isti množici.

Definicija 6.5.2. Funkcijsko zaporedje $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ funkcij na D *konvergira po točkah* k funkciji $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, če za vsak $x \in D$ velja

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

Definicija 6.5.3. Funkcijsko zaporedje $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ funkcij na D *konvergira enakomerno* na D k funkciji $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vse $n > n_0$ in $x \in D$ velja

$$|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

Posledica 6.5.3.1. Če funkcijsko zaporedje enakomerno konvergira proti f , potem konvergira k f tudi po točkah.

Definicija 6.5.4. *Funkcijska vrsta* je limita delnih vsot funkcijskega zaporedja, oziroma

$$\sum_{i=1}^{\infty} f_i(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x),$$

kjer je

$$s_n(x) = \left(\sum_{i=1}^n f_i \right) (x).$$

Definicija 6.5.5. Funkcijska vrsta *konvergira po točkah* k f , če zaporedje njenih delnih vsot konvergira po točkah k f .

Definicija 6.5.6. Funkcijska vrsta *konvergira enakomerno* na D k f , če zaporedje njenih delnih vsot na D enakomerno konvergira k f .

Izrek 6.5.7. Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}$ in naj zaporedje $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ konvergira enakomerno na D k f , pri čemer $f_n: D \rightarrow \mathbb{R}$ za vse n . Naj bo $a \in D$. Če so vse funkcije f_n zvezne v a , je tudi f zvezna v a .

Dokaz. Naj bo $\varepsilon > 0$. Potem za vsak n obstaja $\delta > 0$, da za vse $x \in (a - \delta, a + \delta)$ velja

$$|f_n(x) - f_n(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Ker funkcijsko zaporedje konvergira enakomerno, je za dovolj velik $n \in \mathbb{N}$

$$|f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{in} \quad |f(a) - f_n(a)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Po trikotniški neenakosti sledi, da je

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon. \quad \square$$

Posledica 6.5.7.1. Če funkcijska vrsta zveznih funkcij konvergira enakomerno na D , je vsota vrste zvezna funkcija na D .

Izrek 6.5.8 (Cauchyjev pogoj). Zaporedje $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ funkcij na D konvergira enakomerno na D natanko tedaj, ko za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vse $m, n \geq n_0$ in $x \in D$ velja

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Dokaz. Če zaporedje enakomerno konvergira, je očitno Cauchyjevo. Če je zaporedje Cauchyjevo, očitno konvergira po točkah. Ker pa za dovolj velike m in n velja

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

je

$$|f_n(x) - f(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \quad \square$$

Posledica 6.5.8.1. Funkcijska vrsta $\sum_{i=1}^n f_n$ funkcij na D konvergira enakomerno na D natanko tedaj, ko za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vse $m \geq n_0$, $k \in \mathbb{N}$ in $x \in D$ velja

$$\left| \sum_{i=m+1}^{m+k} f_i(x) \right| < \varepsilon.$$

Izrek 6.5.9 (Weierstrassov majorantni test). Naj bo $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ zaporedje funkcij na D . Če obstajajo taka števila $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, da za vsak $n \in \mathbb{N}$ in $x \in D$ velja

$$|f_n(x)| \leq a_n \quad \text{in} \quad \sum_{i=1}^{\infty} a_i \text{ konvergira,}$$

potem $\sum_{i=1}^{\infty} f_i$ konvergira enakomerno na D .

Dokaz. Za dovolj velike m je po trikotniški neenakosti

$$\left| \sum_{i=m+1}^{m+k} f_i(x) \right| \leq \sum_{i=m+1}^{m+k} a_i < \varepsilon,$$

po Cauchyjevem pogoju za konvergenco vrste. \square

6.6 Integriranje in odvajanje funkcijskih zaporedij in vrst

Izrek 6.6.1. Naj bodo $(f_n)_{n=1}^\infty$ zvezne funkcije na $[a, b]$, ki na tem intervalu enakomerno konvergirajo. Potem je

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Dokaz. Naj bo f limita zaporedja in $\varepsilon > 0$. Potem obstaja tak $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vse $n \in n_0$ in $x \in [a, b]$ velja

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Sledi, da je

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \varepsilon. \quad \square$$

Posledica 6.6.1.1. Naj bodo $(f_n)_{n=1}^\infty$ zvezne funkcije na $[a, b]$ in naj njihova funkcijska vrsta konvergira enakomerno na $[a, b]$. Potem je

$$\int_a^b \sum_{n=1}^\infty f_n(x) dx = \sum_{n=1}^\infty \int_a^b f_n(x) dx.$$

Izrek 6.6.2. Naj bo $(f_n)_{n=1}^\infty$ funkcijsko zaporedje zvezno odvedljivih funkcij na $[a, b]$, ki po točkah konvergira k funkciji f in naj zaporedje odvodov konvergira enakomerno na $[a, b]$. Potem je f zvezno odvedljiva na $[a, b]$ in velja

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n = f'.$$

Dokaz. Naj bo $(f_n)_{n=1}^\infty$ po točkah konvergira k f , $(f'_n)_{n=1}^\infty$ pa k g . Sledi, da je g zvezna. Za $x \in [a, b]$ po prejšnjem izreku velja

$$\int_a^x g(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f'_n(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x) - f_n(a)) = f(x) - f(a).$$

Z odvajanjem dobimo iskano enačbo. \square

Posledica 6.6.2.1. Naj bodo $(f_n)_{n=1}^\infty$ zvezno odvedljive funkcije na $[a, b]$. Naj funkcijska vrsta $\sum_{n=1}^\infty f_n$ konvergira po točkah in naj vrsta $\sum_{n=1}^\infty f'_n$ konvergira enakomerno na $[a, b]$. Potem je vsota vrste zvezno odvedljiva in velja

$$\left(\sum_{n=1}^\infty f_n \right)' = \sum_{n=1}^\infty f'_n.$$

6.7 Potenčne vrste

Definicija 6.7.1. *Potenčna vrsta s središčem v a je funkcijska vrsta oblike*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n.$$

Izrek 6.7.2 (O konvergenčnem polmeru). Naj bo $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$ potenčna vrsta. Potem obstaja tak $R \in [0, \infty]$,⁵ da vrsta absolutno konvergira za vsak x , kjer je $|x - a| < R$ in divergira za vsak x , za katerega je $|x - a| > R$. Za vsak $0 \leq r < R$ vrsta konvergira enakomerno na $[a - r, a + r]$.

Dokaz. Brez škode za splošnost vzemimo $a = 0$. Denimo, da vrsta konvergira za $x_0 \neq 0$ in naj bo $0 \leq r < |x_0|$.

Obstaja tak M , da za vse n velja $|a_n x_0^n| \leq M$. Naj bo $x \in [-r, r]$. Potem je

$$|a_n x^n| \leq |a_n \cdot x_0^n| \cdot \left(\frac{r}{|x_0|} \right)^n \leq M \cdot \left(\frac{r}{|x_0|} \right)^n.$$

Sledi, da je vrsta

$$\sum_{n=0}^{\infty} M \cdot \left(\frac{r}{|x_0|} \right)^n$$

majoranta za začetno vrsto na $[-r, r]$, zato vrsta na tem intervalu konvergira absolutno in enakomerno.

Zdaj lahko preprosto izberemo

$$R = \sup \left\{ |x_0| \mid \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ konvergira v } x_0 \right\}. \quad \square$$

Posledica 6.7.2.1. Vsota potenčne vrste s konvergenčnim polmerom $R > 0$ je zvezna funkcija na intervalu $(a - R, a + R)$.

Izrek 6.7.3 (Cauchy-Hadamardova formula). Naj bo $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$ potenčna vrsta. Tedaj je

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$

kjer je R konvergenčni polmer vrste.

Dokaz. Brez škode za splošnost vzemimo $a = 0$. Uporabimo korenski kriterij. Vrsta konvergira, ko je

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x|^n < 1,$$

kar velja za vse $x \in (-R, R)$. Vrsta pa divergira, ko je

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x|^n > 1,$$

kar pa velja za $x \notin [-R, R]$. □

⁵ Takemu R pravimo *konvergenčni polmer* te potenčne vrste.

Trditev 6.7.4. Naj bodo $a_n \neq 0$ za vse $n \in \mathbb{N}_0$. Za konvergenčni polmer potenčne vrste $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ velja

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|},$$

če obstaja splošena limita.

Dokaz. Brez škode za splošnost vzemimo $a = 0$. Uporabimo kvocientni kriterij. Velja

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}| \cdot |x|^{n+1}}{|a_n| \cdot |x|^n} = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}.$$

Zaključimo s podobnim sklepom kot pri prejšnjem izreku. □

Trditev 6.7.5. Naj bo R konvergenčni polmer vrste $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$. Tedaj je R tudi konvergenčni polmer vrst

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot a_n(x-a)^{n-1} \quad \text{in} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}(x-a)^{n+1}.$$

Dokaz. Velja

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n-1]{n \cdot |a_n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Podobno je

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{\frac{|a_n|}{n+1}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}. \quad \square$$

Posledica 6.7.5.1. Naj bo R konvergenčni polmer vrste $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$. Tedaj za $|x-a| < R$ velja

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n \cdot (x-a)^{n-1}$$

in

$$\int_a^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(t-a)^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-a)^{n+1}.$$

Posledica 6.7.5.2. Potenčna vrsta s konvergenčnim polmerom R je gladka na $(a-R, a+R)$.

6.8 Taylorjeva vrsta

Definicija 6.8.1. Naj bo funkcija f , definirana v okolici točke a , v točki a n -krat odvedljiva. Polinom

$$T_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!}$$

imenujemo n -ti *Taylorjev polinom*.

Izrek 6.8.2 (Taylor). Naj bo f $(N+1)$ -krat odvedljiva funkcija na odprtem intervalu I . Naj bo $a \in I$. Tedaj za vse $n \in \{0, 1, \dots, N\}$, $x \in I$ in $p \in \mathbb{N}$ obstaja taka točka ξ med a in x , da velja

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{p \cdot n!} (x-a)^p (x-\xi)^{n-p+1},$$

kjer je $R_n = f - T_n$.

Dokaz. Naj bo $b \in I$ in

$$F(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x)}{i!} (b-x) + \left(\frac{b-x}{b-a} \right)^p R_n(b).$$

Vidimo, da je F odvedljiva na I . Ker je $F(b) = f(b)$ in

$$F(a) = T_n(b) + R_n(b) = f(b),$$

po Lagrangevem izreku obstaja tak ξ med a in b , da je $F'(\xi) = 0$. Velja pa

$$F'(x) = \frac{f^{(n+1)}(x)}{n!} (b-x)^n - p \frac{(b-x)^{p-1}}{(b-a)^p} R_n(b),$$

zato je

$$R_n(b) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{p \cdot n!} (b-a)^p (b-\xi)^{n-p+1}.$$

□

Definicija 6.8.3. Naj bo $f \in C^\infty$ v okolici točke a . Vrsto

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

imenujemo *Taylorjeva vrsta* funkcije f v okolici točke a .

Opomba 6.8.3.1 (Borelov izrek). Za vsako zaporedje realnih števil $(a_n)_{n=1}^\infty$ obstaja taka funkcija $f \in C^\infty$, da za vsak n velja

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

Trditev 6.8.4. Za vsak x velja

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Dokaz. Velja

$$R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} < \frac{\max(1, e^x)}{(n+1)!} x^{n+1},$$

kar konvergira k 0, saj fakulteta narašča bistveno hitreje kot eksponentna funkcija. \square

Posledica 6.8.4.1. Za vsak x velja

$$\sinh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{in} \quad \cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Posledica 6.8.4.2. Število e je iracionalno.

Dokaz. Predpostavimo, da je $e = \frac{p}{q}$. Potem je

$$x = q! \cdot \left(e - \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} \right) = p \cdot (q-1)! - \sum_{n=0}^q \frac{q!}{n!} \in \mathbb{Z}.$$

Velja pa

$$x = q! \cdot R_q(1) = q! \cdot \frac{e^\xi}{(q+1)!} < \frac{3}{q+1} \leq 1,$$

kar je seveda protislovje, saj je očitno $x > 0$. \square

Trditev 6.8.5. Za vsak x velja

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{in} \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Dokaz. Za sin velja

$$R_n(x) \leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot |x|^{n+1},$$

kar konvergira k 0. Podobna ocena velja za cos. \square

Posledica 6.8.5.1 (Eulerjeva formula). Velja

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Opomba 6.8.5.2. Velja

$$\sinh(ix) = i \sin(x), \quad \sin(ix) = i \sinh(x), \quad \cosh(ix) = \cos(x) \quad \text{in} \quad \cos(ix) = \cosh(x).$$

Trditev 6.8.6. Za $x \in (-1, 1]$ velja

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}.$$

Dokaz. Velja

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^n = \frac{(-1)^n}{n+1} \cdot \frac{1}{(1+\theta x)^{n+1}} x^n,$$

kar za $0 < x \leq 1$ konvergira k 0, saj je $1 + \theta x > 1$. Za $x < 0$ pa pri $p = 1$ dobimo

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{n!} (1 - \theta)^n x^{n+1} = \frac{(-1)^n}{(1 + \theta x)^{n+1}} (1 - \theta)^n x^{n+1},$$

kar je po absolutni vrednosti manjše od

$$\frac{|x|^{n+1}}{1+x},$$

kar prav tako konvergira proti 0. □

Opomba 6.8.6.1. Gladke funkcije, ki so v okolici vsake točke, kjer so definirane, enake vsoti konvergentnih potenčnih vrst, imenujemo *analitične* funkcije.

Trditev 6.8.7. Velja

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n,$$

kjer je

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{1}{k!} \cdot \prod_{i=0}^{k-1} (\alpha - i).$$

Dokaz. Za $0 \leq x < 1$ pri $p = n + 1$ velja

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1} = \binom{\alpha}{n+1} (1 + \theta x)^{\alpha-n-1} x^{n+1},$$

kar je po absolutni vrednosti manjše od

$$\max \{1, 2^\alpha\} \cdot \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| \cdot x^{n+1},$$

kar pa konvergira k 0, saj je $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\alpha - k + 1|}{k} = 1$. Za $-1 < x < 0$ pa pri $p = 1$ dobimo

$$R_n(x) = (n+1) \binom{\alpha}{n+1} (1 + \theta x)^{\alpha-n-1} (1-\theta)^n x^{n+1},$$

kar je po absolutni vrednosti manjše od

$$(n+1) \max \{1, (1+x)^\alpha\} \cdot \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| \cdot \frac{|x|^{n+1}}{1+x},$$

kar prav tako konvergira k 0. □

7 Metrični prostori

7.1 Definicija

Definicija 7.1.1. Naj bo $M \neq \emptyset$. *Metrični prostor* je urejeni par (M, d) , kjer je $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija z naslednjimi lastnostmi:

1. Pozitivna definitnost:
 - $\forall x, y \in M: d(x, y) \geq 0$
 - $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. Simetričnost: $\forall x, y \in M: d(x, y) = d(y, x)$
3. Trikotniška neenakost: $\forall x, y, z \in M: d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

Opomba 7.1.1.1. Za vse $x, y, z \in M$ velja

$$d(x, y) \geq |d(x, z) - d(z, y)|.$$

Opomba 7.1.1.2. Če je (M, d) metrični prostor in $N \subseteq M$ neprazna podmnožica, je tudi (N, d) metrični prostor.

Opomba 7.1.1.3. Primer metrike na vektorskem prostoru je norma razlike vektorjev x in y .⁶

Definicija 7.1.2. Naj bo (M, d) metrični prostor. Naj bo $a \in M$ in $r > 0$. *Odprta krogla* s središčem v a in polmerom r je množica

$$\mathcal{K}(a, r) = \{x \in M \mid d(x, a) < r\}.$$

Podobno definiramo *zaprto kroglo* kot

$$\bar{\mathcal{K}}(a, r) = \{x \in M \mid d(x, a) \leq r\}.$$

Definicija 7.1.3. *Okolica* točke a je vsaka množica U , za katero obstaja tak $r > 0$, da je $\mathcal{K}(a, r) \subseteq U$.

Definicija 7.1.4. Naj bo $A \subseteq M$, kjer je (M, d) metrični prostor.

- i) točka a je *notranja* točka množice A , če obstaja tak $r > 0$, da je $\mathcal{K}(a, r) \subseteq A$. *Notranjost* množice označimo z $\text{Int}(A)$.
- ii) točka a je *zunanja* točka množice A , če obstaja tak $r > 0$, da je $\mathcal{K}(a, r) \cap A = \emptyset$.
- iii) točka a je *robna* točka množice A , če za vsak $r > 0$ velja $\mathcal{K}(a, r) \cap A \neq \emptyset$ in $\mathcal{K}(a, r) \cap A^c \neq \emptyset$. Vse robne točke tvorijo *rob* ali *mejo* množice A , ki jo označimo z ∂A .

Opomba 7.1.4.1. Velja $\text{Int}(A) \cup \partial A \cup \text{Int}(A^c) = M$. Te množice so paroma disjunktne.

Opomba 7.1.4.2. Velja $\partial(A^c) = \partial A$.

⁶ Glej zapiske Algebre 1.

Stvarno kazalo

A

Absolutna vrednost, 13, 20
Arhimedova lastnost, 13

C

Celi del, 15

D

Diferencial, 38
Diferenčni kvocient, 38
Dolžina
 Poligonske krivulje, 62
 Poti, 62

F

Funkcija, 21
 Analitična, 81
 Diferenciabilna, 38
 Domena in kodomena, 21
 Enakomerno zvezna, 33
 Gladka, 43
 Graf, 30
 Identiteta, 22
 Injektivna, surjektivna, bijektivna, 21
 Inverzna, 22
 Kompozitum, 21
 Konveksna, konkavna, 45
 Maksimum, minimum, 30
 Monotona, 32
 Odvedljiva, 38
 Omejena, 24, 30
 Realna, 30
 Realne spremenljivke, 30
 Skok, 37
 Supremum, infimum, 30
 Zaloga vrednosti, 21
 Zvezna, 31

G

Grupa, 6

H

Hiperbolične funkcije, 32

I

Infimum, 13
Integral
 Absolutna integrabilnost, 61
 Darbouxjev, 53

Darbouxjeva vsota, 52

Integrabilnost po Darbouxu, 53

Integrabilnost po Riemannu, 52

Nedoločeni, 50

Posplošeni, 59

Riemannov, 52

Riemannova vsota, 52

Interval, 13

Delitev, 52

Izrek

Bolzano–Weierstrass, 24

Borelov, 79

Cauchy–Hadamarnova formul, 77

Cauchyjev integralski kriterij, 67

Cauchyjev korenski kriterij, 66

Cauchyjev pogoj konvergence

 Funkcije, 60

 Funkcijskega zaporedja, 75

 Vrste, 65

 Zaporedja, 27

D'Alembertov kvocientni kriterij, 66

Eulerjeva formula, 80

Fubini, 71

Lagrange, 44

Leibnizev kriterij, 69

L'Hôpital, 47

O konvergenčnem polmeru, 77

O povprečni vrednosti, 57

O sendviču, 26

Osnovni izrek algebre, 20

Osnovni izrek analize, 57

Posplošeni Lagrangev, 47

Raabejev kriterij, 67

Riemannov o vrstah, 70

Rolle, 44

Taylor, 79

Weierstrassov majorantni test, 75

K

Kolobar, 9

Koren, 18

L

Linearna urejenost, 10

Logaritem, 19

M

Maksimum, 13

Metrični prostor, 82

Krogla, 82

Okolica, 82

Minimum, 13

Množica

Ekvipolentnost, 22

Kartezični produkt, 22

Končna, 22

Kontinuum, 22

Moč, 22

Omejena, 11

Števna, 22

O

Odvod, 38

P

Polje, 9

Pot, 49

Izmerljiva ali rektifikabilna, 62

Preslikava, 21

Prevoj, 46

R

Razširjen sistem realnih števil, 28

Regularna parametrizacija, 49

Rez, 12

S

Supremum, 11

Š

Števila

Algebraična, 16

Cela, 5

Kompleksna, 20

Naravna, 5

Racionalna, 5

Realna, 12

Transcendentna, 16

T

Taylorjev polinom, 79

Tir, 49

V

Vrsta

Absolutna konvergenca, 68

Funkcijska, 74

Enakomerna konvergenca, 74

Konvergenca po točkah, 74

Konvergentna, 65

Minoranta, majoranta, 66

Pogojna konvergenca, 68

Potenčna, 77

Konvergenčni polmer, 77

Preureditev, 70

Rep, 65

Številska, 65

Taylorjeva, 79

Z

Zaporedje, 24

Funkcijsko, 74

Enakomerna konvergenca, 74

Konvergenca po točkah, 74

Konvergentno, 24

Limes inferior/superior, 24

Limita, 24

Monotono, 26

Stekališče, 24