# Diskretna matematika 1

Luka Horjak (lukahorjak@student.uni-lj.si)

 $14.\ \mathrm{marec}\ 2022$ 

Kazalo Luka Horjak

# Kazalo

Uvod								
1	Kor	nbinatorika	4					
	1.1	Osnovna načela kombinatorike	4					
	1.2	Binomski koeficienti in binomski izrek	6					
	1.3	Izbori	7					
	1.4	Permutacije in permutacije s ponavljanjem	8					
	1.5	Kompozicije in razčlenitve	9					
	1.6	Stirlingova števila	10					
	1.7	Dvanajstera pot						
	1.8	Načelo vključitev in izključitev						
2	Dodatek							
	A	Število izborov z omejitvami	14					
	В	Stirlingova števila prve vrste	14					
	C	Stirlingova števila druge vrste	14					
St	varn	o kazalo	15					

Uvod Luka Horjak

## Uvod

V tem dokumentu so zbrani moji zapiski s predavanj predmeta Diskretna matematika 1 v letu 2021/22. Predavatelj v tem letu je bil prof. dr. Sandi Klavžar.

Zapiski niso popolni. Manjka večina zgledov, ki pomagajo pri razumevanju definicij in izrekov. Poleg tega nisem dokazoval čisto vsakega izreka, pogosto sem kakšnega označil kot očitnega ali pa le nakazal pomembnejše korake v dokazu.

Zelo verjetno se mi je pri pregledu zapiskov izmuznila kakšna napaka – popravki so vselej dobrodošli.

#### 1 Kombinatorika

#### 1.1 Osnovna načela kombinatorike

**Trditev 1.1.1** (Načelo produkta). Naj bodo  $A_1, \ldots, A_n$  končne množice. Tedaj je

$$\left| \prod_{i=1}^{n} A_i \right| = \prod_{i=1}^{n} |A_i|.$$

**Trditev 1.1.2** (Načelo vsote). Naj bodo  $A_1, \ldots, A_n$  končne, paroma disjunktne množice. Tedaj je

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i|.$$

**Trditev 1.1.3** (Načelo enakosti). Če obstaja bijekcija med končnima množicama A in B, je

$$|A| = |B|$$
.

Definicija 1.1.4. Označimo

$$[n] = \{ i \in \mathbb{N} \mid i \le n \}.$$

Trditev 1.1.5. Za Eulerjev fi

$$\varphi(n) = |\{i \in [n] \mid (i, n) = 1\}|$$

velja rekurzivna formula

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Dokaz. Na dva načina izračunamo moč množice

$$\left\{ \frac{i}{n} \mid i \in [n] \right\}.$$

**Izrek 1.1.6** (Dirichletovo načelo). Če je n > m, potem ne obstaja injektivna preslikava  $f: [n] \to [m]$ .

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned.

Trditev 1.1.7 (Načelo dvojnega preštevanja). Če dva izraza predstavljata število elementov iste množice, sta enaka.

**Definicija 1.1.8.** Definiramo padajočo in naraščajočo potenco

$$k^{\underline{n}} = \prod_{i=0}^{n-1} (k-i)$$
 in  $k^{\overline{n}} = \prod_{i=0}^{n-1} (k+i)$ .

**Trditev 1.1.9.** Za množico N z n elementi in množico K s k elementi velja

$$i) |K^N| = k^n$$

- ii)  $|\{f\colon N\to K\mid f$ je injektivna $\}|=k^{\underline{n}}$
- iii) Število bijekcij med N in K je n!, če je n=k, sicer pa 0.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned.

**Opomba 1.1.9.1.** Če imata končni množici enako moč, je bijektivnost preslikave med njima ekvivalentna tako injektivnosti kot surjektivnosti.

#### 1.2 Binomski koeficienti in binomski izrek

**Definicija 1.2.1.** Naj bo  $x \in \mathbb{C}$  in  $k \in \mathbb{N}_0$ . Binomski koeficient števil x in k je število

$$\begin{pmatrix} x \\ k \end{pmatrix} = \frac{x^{\underline{k}}}{k!}.$$

**Trditev 1.2.2.** Če je  $n \in \mathbb{N}_0$  in  $k \leq n$ , potem je

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned.

**Definicija 1.2.3.** Naj bo X končna množica. Označimo

$$\begin{pmatrix} X \\ k \end{pmatrix} = \{ A \subseteq X \mid |A| = k \} .$$

**Trditev 1.2.4.** Za končno množico X velja

$$\left| \begin{pmatrix} X \\ k \end{pmatrix} \right| = \begin{pmatrix} |X| \\ k \end{pmatrix}.$$

Dokaz. Na dva načina preštejemo število urejenih k-teric. Dobimo, da je

$$k! \cdot \left| {X \choose k} \right| = |X|^{\underline{k}}.$$

Trditev 1.2.5. Če je  $1 \le k \le n$ , je

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Dokaz. Preštejmo število k-elementnih podmnožic [n] na dva načina. Za število 1 imamo dve možnosti – lahko je v podmnožico ali ne. Sedaj preštejemo načine, na katere lahko izmed preostalih n-1 elementov izberemo ustrezno število. V prvem primeru dobimo  $\binom{n-1}{k-1}$  podmnožic, v drugem pa  $\binom{n-1}{k}$ .

Posledica 1.2.5.1. Binomski koeficienti so ravno števila v Pascalovem trikotniku:

**Izrek 1.2.6** (Binomski). Za vse  $n \in \mathbb{N}_0$  za  $a, b \in K$ , kjer je K komutativen kolobar, velja

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Dokaz. Uporabimo distributivnost in preštejemo število pojavitev vsakega monoma.  $\Box$ 

#### 1.3 Izbori

**Definicija 1.3.1.** Naj bo N množica z n elementi.

- i)  $Urejen\ izbor\ s\ ponavljanjem$  je vsaka urejena k-terica elementov N.
- ii)  $Urejen\ izbor\ brez\ ponavljanja$  je vsaka k-terica paroma različnih elementov N.
- iii)  $Neurejen\ izbor\ brez\ ponavljanja$  je vsaka podmnožica k elementov množice N.
- iv) Neurejen izbor s ponavljanjem je vsaka multimnožica s k elementi iz N.

**Opomba 1.3.1.1.** Urejenim izborom pravimo tudi *variacije*, neurejenim pa *kombinacije*.

Trditev 1.3.2. Število neurejenih izborov s ponavljanjem je enako

$$\binom{n+k-1}{k}$$
.

Dokaz. Uporabimo strategijo pik in pregrad. Naj  $x_k$  označuje število pojavitev elementa k v multimnožici. Tedaj lahko vsak izbor predstavimo kot

$$\underbrace{\bullet \bullet \cdots \bullet}_{x_1} \mid \underbrace{\bullet \bullet \cdots \bullet}_{x_2} \mid \cdots \mid \underbrace{\bullet \bullet \cdots \bullet}_{x_n}.$$

Vsak izbor natanko ustreza enemu zapisu s pikami in pregradami, teh pa je ravno  $\binom{n+k-1}{k}$ . Izmed n+k-1 elementov moramo namreč izbrati k pik, preostalih n-1 mest pa zasedejo pregrade.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Definicija v naslednjem razdelku.

#### 1.4 Permutacije in permutacije s ponavljanjem

**Definicija 1.4.1.** Permutacija množice A je bijekcija  $f: A \to A$ . Označimo

$$S_A = \{ f \colon A \to A \mid f \text{ je bijekcija} \},$$

v posebnem primeru

$$S_n = S_{[n]}.$$

**Definicija 1.4.2.** *Multimnožica* je urejen par  $(U, \mu)$ , kjer je U množica in  $\mu: U \to \mathbb{N}_0$ .

**Definicija 1.4.3.** Permutacija multimnožice  $M=(U,\mu)$  je vsako zaporedje elementov  $(x_1,\ldots,x_n)$ , kjer so vsi  $x_i\in U$  in se vsak element  $x\in U$  v zaporedju pojavi  $\mu(x)$  krat.

**Trditev 1.4.4.** Število permutacij multimnožice  $\{1^{\alpha_1}, \dots, k^{\alpha_k}\}$ , kjer je  $\alpha_1 + \dots + \alpha_k = n$ , je natanko

$$\frac{n!}{\alpha_1!\cdots\alpha_k!}.$$

Dokaz. Velja

$$\prod_{i=1}^{n} \binom{n - \alpha_1 - \dots - \alpha_{i-1}}{\alpha_i} = \frac{n!}{\alpha_1! \dots \alpha_k!}.$$

**Opomba 1.4.4.1.** Zgornjemu številu pravimo *multinomski koeficient* in ga označimo z

$$\frac{n!}{\alpha_1! \dots \alpha_k!} = \binom{n}{\alpha_1, \dots, \alpha_k}.$$

Izrek 1.4.5 (Multinomski). Za  $n \ge 0$  velja

$$\left(\sum_{i=1}^k x_i\right)^n = \sum_{\alpha_1 + \dots + \alpha_k = n} \binom{n}{\alpha_1, \dots, \alpha_k} \prod_{i=1}^k x_i^{\alpha_i}.$$

Dokaz. Enak kot pri binomskem.

#### 1.5 Kompozicije in razčlenitve

**Definicija 1.5.1.** Kompozicija naravnega števila n je zaporedje  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_l)$ , kjer so  $\lambda_i \in \mathbb{N}$  in velja

$$\sum_{i=1}^{l} \lambda_i = n.$$

**Trditev 1.5.2.** Število kompozicij števila n je  $2^{n-1}$ . Število kompozicij dolžine k je  $\binom{n-1}{k-1}$ .

Dokaz. Pike in pregrade.

**Definicija 1.5.3.**  $\check{S}ibka\ kompozicija$  naravnega števila n je kompozicija, v kateri dovolimo, da so nekateri členi enaki 0.

**Trditev 1.5.4.** Število šibkih kompozicij števila n dolžine k je  $\binom{n+k-1}{k-1}$ .

Dokaz. Pike in pregrade.

**Definicija 1.5.5.** Razčlenitev števila  $n \in \mathbb{N}$  je vsaka padajoča kompozicija števila n. Število razčlenitev dolžine k označimo z  $p_k(n)$ , število razčlenitev dolžine največ k pa z  $\overline{p}_k(n)$ .

Trditev 1.5.6. Veljajo naslednje zveze:

- i)  $p_k(n) = \overline{p}_k(n-k)$
- ii)  $\overline{p}_k(n) = \overline{p}_{k-1}(n) + \overline{p}_k(n-k)$
- iii)  $p_k(n) = p_{k-1}(n-1) + p_k(n-k)$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned.

Luka Horjak

Kombinatorika

### 1.6 Stirlingova števila

**Definicija 1.6.1.** Za  $1 \le k \le n$  je *Stirlingovo število 1. vrste* c(n,k) število permutacij  $S_n$ , ki jih lahko zapišemo kot produkt k ciklov. Posebej naj bo c(n,0) = 0 za  $n \ge 1$  in c(0,0) = 1.

Trditev 1.6.2. Velja rekurzivna formula

$$c(n,k) = c(n-1,k-1) + (n-1) \cdot c(n-1,k).$$

Dokaz. Permutacij, v katerih je x fiksna točka, je c(n-1,k-1), drugače pa na n-1 načinov izberemo element, v katerega se preslika x, nato pa jih razporedimo v k ciklov.  $\square$ 

Izrek 1.6.3. Velja

$$x^{\overline{n}} = \sum_{k} c(n, k) x^{k}.$$

Dokaz. Indukcija po n.

**Definicija 1.6.4.** Družina nepraznih množic  $\{X_i\}_{i\in I}$  je razdelitev, če za vse različne  $i,j\in I$  velja  $X_i\cap X_j=\emptyset$  in

$$\bigcup_{i \in I} X_i = X.$$

Množicam  $X_i$  pravimo blok razdelitve

**Definicija 1.6.5.** Za  $1 \le k \le n$  je *Stirlingovo število 2. vrste S*(n, k) število razdelitev n-množice v k blokov.

Trditev 1.6.6. Velja rekurzivna zveza

$$S(n,k) = S(n-1,k-1) + k \cdot S(n-1,k).$$

Dokaz. Če je element x v nekem bloku sam, imamo S(n-1,k-1) možnosti, drugače pa na k načinov izberemo blok, v katerega ga dodamo.

Izrek 1.6.7. Velja

$$x^n = \sum_{k} S(n, k) \cdot x^{\underline{k}}.$$

Dokaz. Dovolj je izrek dokazati za naravna števila. Naj bo  $A=[x]^n$ . Velja  $|A|=x^n$ . Po drugi strani pa lahko A razdelimo glede na število različnih elementov k, teh pa je  $S(n,k)\cdot x^{\underline{k}}$ .

Trditev 1.6.8. Število surjekcij  $f \in K^N$  je

$$k! \cdot S(n,k)$$
.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned.

**Definicija 1.6.9.** Bellovo število B(n) je število vseh razdelitev množice z n elementi v bloke, oziroma

$$B(n) = \sum_{k} S(n, k).$$

7. marec 2022

Trditev 1.6.10. Velja rekurzivna formula

$$B(n+1) = \sum_{k} \binom{n}{k} B(k).$$

Dokaz. Naj bo x v bloku velikosti k+1. Tedaj je razdelitev natanko

$$\binom{n}{k} \cdot B(n-k).$$

**Definicija 1.6.11.** Za  $1 \le k \le n$  je *Lahova števila L*(n, k) število razdelitev n-množice v k linearno urejenih blokov.

Trditev 1.6.12. Velja rekurzivna zveza

$$L(n,k) = L(n-1,k-1) + (n+k-1) \cdot L(n-1,k).$$

Dokaz. Podobno kot prejšnji.

Izrek 1.6.13. Velja

$$L(n,k) = \frac{(n-1)!}{(k-1)!} \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!} \binom{n-1}{k-1}.$$

Dokaz. Elemente uredimo na n! načinov, nato pa izberemo k-1 elementov, ki so prvi v svojem bloku. Pri tem smo vsako razdelitev šteli k!-krat.

**Izrek 1.6.14.** Velja

$$x^{\overline{n}} = \sum_{k} L(n, k) x^{\underline{k}}.$$

## 1.7 Dvanajstera pot

 $\bf Izrek~1.7.1.$  Tabela al neki idk, idgaf, this is bs

Tabela 1: Kill me pls

$f \colon N \to K$	Poljubna	Injektivna	Surjektivna
Ločimo elemente $N$ in $K$	$k^n$	$k^{\underline{n}}$	$k! \cdot S(n,k)$
Ločimo elemnete $K$ $\binom{n+k-1}{n}$		$\binom{k}{n}$	$\binom{n-1}{k-1}$
Ločimo elemente $N$	$\sum_{i=1}^{k} S(n,i)$	$ \begin{cases} 1, & n \le k \\ 0, & n > k \end{cases} $	S(n,k)
Ne ločimo elementov	$\overline{p}_k(n)$	$\begin{cases} 1, & n \le k \\ 0, & n > k \end{cases}$	$p_k(n)$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned.

### 1.8 Načelo vključitev in izključitev

Izrek 1.8.1 (Načelo vključitev in izključitev). Velja

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_{\substack{X \in \mathcal{P}([n]) \\ X \neq \emptyset}} (-1)^{|X|+1} \cdot \left| \bigcap_{i \in X} A_i \right|.$$

Dokaz. Vsak element štejemo natanko

$$\sum_{i=1}^{k} (-1)^{i+1} \binom{k}{i} = 1$$

krat.  $\Box$ 

Izrek 1.8.2. Velja

$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned.  $\Box$ 

Dodatek Luka Horjak

## 2 Dodatek

## A Število izborov z omejitvami

Tabela 2: Število izborov kelementov iz množice z $\boldsymbol{n}$ elementi

	S ponavljanjem	Brez ponavljanja
Urejen izbor	$n^k$	$n^{\underline{k}}$
Neurejen izbor	$ \left  \begin{array}{c} \binom{n+k-1}{k} \end{array} \right  $	$\binom{n}{k}$

### B Stirlingova števila prve vrste

Tabela 3: Stirlingova števila prve vrste

n $k$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	0	1		1 6 35 225			
2	0	1	1				
3	0	2	3	1			
4	0	6	11	6	1		
5	0	24	50	35	10	1	
6	0	120	274	225	85	15	1

## C Stirlingova števila druge vrste

Tabela 4: Stirlingova števila druge vrste

n	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	0	1					
2	0	1	1				
3	0	1	3	1 6 25 90			
4	0	1	7	6	1		
5	0	1	15	25	10	1	
6	0	1	31	90	65	15	1

# Stvarno kazalo

<b>B</b> Bellovo število, 10 Binomski koeficient, 6
E Eulerjev fi, 4
I Izbor, 7 Izrek Binomski, 6 Dirichletovo načelo, 4 Multinomski, 8 Načelo vključitev in izključitev, 13
<b>K</b> Kompozicija, 9 Šibka, 9
L Lahovo število, 11
M Množica Razdelitev, 10 Multimnožica, 8 Permutacija, 8 Multinomski koeficient, 8
<b>N</b> Načelo dvojnega preštevanja, 4 Načelo produkta, vsote, enakosti, 4
P Pascalov trikotnik, 6 Permutacija, 8
R Razčlenitev, 9
S Stirlingovo število 1. vrste, 10 Stirlingovo število 2. vrste, 10