

Analiza 2b

Luka Horjak (lukahorjak@student.uni-lj.si)

6. marec 2022

Kazalo

Uvod	3
1 Podmnogoterosti v \mathbb{R}^n	4
1.1 Definicija	4
1.2 Tangentni prostor	6
1.3 Krivulje v \mathbb{R}^3	8
1.4 Ploskve v \mathbb{R}^3	11
2 Vektorska analiza	14
2.1 Skalarna in vektorska polja	14
Stvarno kazalo	16

Uvod

V tem dokumentu so zbrani moji zapiski s predavanj predmeta Analiza 2b v letu 2021/22. Predavatelj v tem letu je bil prof. dr. Miran Černe.

Zapiski niso popolni. Manjka večina zgledov, ki pomagajo pri razumevanju definicij in izrekov. Poleg tega nisem dokazoval čisto vsakega izreka, pogosto sem kakšnega označil kot očitnega ali pa le nakazal pomembnejše korake v dokazu.

Zelo verjetno se mi je pri pregledu zapiskov izmuznila kakšna napaka – popravki so vselej dobrodošli.

1 Podmnogoterosti v \mathbb{R}^n

1.1 Definicija

Definicija 1.1.1. Neprazna podmnožica $M \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ je *gladka podmnogoterost* dimenzije n in kodimenzijske m , če za vsako točko $a \in M$ obstaja odprta okolica U točke a v \mathbb{R}^{n+m} in take funkcije

$$F_1, \dots, F_m \in \mathcal{C}^1(U),$$

da ima preslikava $F = (F_1, \dots, F_m)$ rang m na U in velja

$$M \cap U = \{x \in U \mid F(x) = 0\}.$$

Opomba 1.1.1.1. Preslikavi F pravimo *definijska funkcija*.

Opomba 1.1.1.2. Dovolj je že, da ima F rang m v točki a .

Trditev 1.1.2. Neprazna podmnožica $M \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ je podmnogoterost dimenzije n natanko tedaj, ko za vsako točko $a \in M$ obstaja njena odprta okolica U v \mathbb{R}^{n+m} in taka permutacija σ njenih koordinat, da je $M \cap U$ graf neke \mathcal{C}^1 preslikave $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, kjer je $D \subseteq \mathbb{R}^n$ odprta, oziroma

$$M \cap U = \left\{ x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}, \varphi(x_{\sigma(n+1)}, \dots, x_{\sigma(n+m)}) \mid (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) \in D \right\}.$$

Dokaz. Če je M podmnogoterost, preprosto uporabimo izrek o implicitni preslikavi. Če velja predpostavka iz trditve, pa definiramo

$$F_j(x_1, \dots, x_{n+m}) = x_{n+j} - \varphi_j(x_1, \dots, x_n).$$

Sledi, da velja

$$F = 0 \iff (x_1, \dots, x_{n+m}) = (x_1, \dots, x_n, \varphi(x_1, \dots, x_n))$$

in

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_{n+j}} = \delta_{i,j},$$

zato je rang $DF = m$. □

Trditev 1.1.3. Naj bo $M \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ podmnogoterost dimenzije n . Potem za vsak $a \in M$ obstaja okolica U točke a v \mathbb{R}^{n+m} in preslikava $\Phi \in \mathcal{C}^1(D)$ ranga n , kjer je $D \subseteq \mathbb{R}^n$ odprta, da je $\Phi(D) = M \cap U$.

Dokaz. Vzamemo

$$\Phi = (x_1, \dots, x_n, \varphi(x_1, \dots, x_n)).$$

□

Trditev 1.1.4. Naj bo $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ \mathcal{C}^1 preslikava ranga n . Potem za vsak $t_0 \in D$ obstaja njegova okolica V , da je $\Phi(V)$ podmnogoterost dimenzije n v \mathbb{R}^{n+m} .

Dokaz. Obstaja $n \times n$ poddeterminanta $D\Phi(t_0)$, različna od 0. Sledi, da lahko s permutacijo koordinat zapišemo $\Phi = (\Phi_1, \Phi_2)$, kjer je $\Phi_1: V \rightarrow \Phi(V)$ difeomorfizem. Sedaj si oglejmo preslikavo

$$(x_1, \dots, x_n) \in \Phi(V) \mapsto \Phi \circ \Phi_1^{-1}.$$

Opazimo, da za $\varphi = \Phi_2 \circ \Phi_1^{-1}$ velja

$$\Phi(V) = (\Phi \circ \Phi_1^{-1})(x_1, \dots, x_n) = \{x_1, \dots, x_n, \varphi(x_1, \dots, x_n) \mid (x_1, \dots, x_n) \in \Phi(V)\}. \quad \square$$

Trditev 1.1.5. Naj bo $M \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ podmnogoterost dimenzije n . Potem za vsako točko $a \in M$ obstaja njena okolica $U \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ in difeomorfizem $\Phi: U \rightarrow V$, za katera je¹

$$\Phi(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^n \times \{0\}^m).$$

Dokaz. Lokalno je M graf nad enim izmed n dimenzionalnih podprostorov. Za

$$\Phi(x, y) = (x, y - \varphi(x))$$

je tako

$$\Phi^{-1}(x, z) = (x, z + \varphi(x)),$$

ki je diferennciabilna. Sledi, da je

$$\Phi(M \cap U) = D \times \{0\}^m. \quad \square$$

¹ M lahko »izravnamo«.

1.2 Tangentni prostor

Definicija 1.2.1. Naj bo $M \subseteq \mathbb{R}^n$ podmnogoterost in $a \in M$. *Tangentni prostor* na M v točki a je množica

$$T_a M = \left\{ \dot{\gamma}(t_0) \mid \gamma: (\alpha, \beta) \rightarrow M \wedge \gamma \in \mathcal{C}^1 \wedge t_0 \in (\alpha, \beta) \wedge \gamma(t_0) = a \right\}.$$

Trditev 1.2.2. Naj bo $M \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ n -dimenzionalna podmnogoterost in $a \in M$. Potem je $T_a M$ n -dimenzionalni vektorski podprostor prostora \mathbb{R}^{n+m} .

Dokaz. Obstaja okolica U točke a , za katero je $M \cap U$ graf nad enim izmed n -dimenzionalnih koordinatnih podprostorov. Vsaka krivulja na $M \cap U$ je oblike

$$t \mapsto (x(t), \varphi(x(t))).$$

Naj bo pri tem $x(t_0) = x_0$ in $a = (x_0, \varphi(x_0))$.

Odvod zgornje preslikave je enak

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ D\varphi(x(t)) \cdot \dot{x}(t) \end{bmatrix},$$

kar je v a enako

$$\begin{bmatrix} I \\ D\varphi(x_0) \end{bmatrix} \cdot \dot{x}(t_0).$$

Ker pa je $\dot{x}(t_0)$ poljuben² vektor v \mathbb{R}^n , je tangentni prostor kar

$$\text{Im} \begin{bmatrix} I \\ D\varphi(x_0) \end{bmatrix}.$$

□

Opomba 1.2.2.1. Običajno si tangentni prostor predstavljamo kot afin podprostor $a + T_a M$.

Posledica 1.2.2.2. Naj bo $M \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ podmnogoterost, v okolici U točke $a \in M$ podana z definicijskimi funkcijami F_i . Tedaj je

$$T_a M = \ker(DF)(a).$$

Dokaz. Lokalno je $M \cap U$ graf oblike

$$M \cap U = \{(x, \varphi(x)) \mid x \in D \subseteq \mathbb{R}^n \wedge \varphi: D \rightarrow \mathbb{R}^m\}.$$

Vemo, da je

$$T_a M = \text{Im} \begin{bmatrix} I \\ D\varphi(x_0) \end{bmatrix}$$

² Vzamemo $t \mapsto x_0 + t \cdot v$.

in

$$F(x, \varphi(x)) = 0$$

na D . Sedaj z odvajanjem dobimo

$$F_x \cdot I + F_y \cdot D\varphi = 0,$$

oziroma

$$(DF)(a) \cdot \begin{bmatrix} I \\ D\varphi \end{bmatrix},$$

torej

$$T_a M \leq \ker(DF)(a).$$

Ker sta dimenziji enaki, sta to enaka podprostora. \square

Opomba 1.2.2.3. Gradienti definicijskih funkcij so pravokotni na $T_a M$.

Posledica 1.2.2.4. Naj bo $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$, kjer je $D \subseteq \mathbb{R}^n$, \mathcal{C}^1 preslikava ranga n . Naj bo $t_0 \in D$ in $M \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ podmnogoterost, za katera je

$$M \cap U = \Phi(V),$$

kjer je V okolica t_0 in U okolica $\Phi(t_0)$. Tedaj je

$$T_{\Phi(t_0)} M = \text{Im}(D\Phi)(t_0).$$

Dokaz. Lokalno v oklici $a = \Phi(t_0)$ je $M \cap U = F^{-1}(\{0\})$, kjer je $\text{rang}(DF)(a) = m$. Velja, da je

$$T_a M = \ker(DF)(a) \quad \text{in} \quad F(\Phi(t)) = 0.$$

Sledi, da je

$$DF(a) \cdot D\Phi(t_0) = 0,$$

oziroma

$$\text{Im}(D\Phi)(t_0) \leq \ker(DF)(a).$$

S primerjanjem dimenzij vidimo, da sta podprostora enaka. \square

Opomba 1.2.2.5. Podmnogoterostim, katerim dodamo robne točke, pravimo *mnogoterosti z robom*.

1.3 Krivulje v \mathbb{R}^3

1.3.1 Definicija

Definicija 1.3.1. *Krivulja* je enodimenzionalna podmnogoterost v \mathbb{R}^3 .

Trditev 1.3.2. Povezane krivulje lahko parametriziramo globalno.

Opomba 1.3.2.1. Vsaka krivulja ima neskončno mnogo regularnih parametrizacij. Velja

$$\vec{\rho}' = \dot{\vec{r}}(h) \cdot h'.$$

Definicija 1.3.3. Naj bo Γ krivulja v \mathbb{R}^3 in $\vec{r}: [\alpha, \beta] \rightarrow \Gamma$ njena regularna parametrizacija. Naj bo D delitev intervala $[\alpha, \beta]$. Naj bo

$$\ell(D) = \sum_{i=1}^n d(\vec{r}(t_{i-1}), \vec{r}(t_i)).$$

Dolžina krivulje je limita

$$\lim_{\max \Delta t \rightarrow 0} \ell(D).$$

Trditev 1.3.4. Naj bosta $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ in $\vec{\rho}: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^3$ regularni parametrizaciji poti Γ . Potem je

$$\int_a^b \|\dot{\vec{r}}(t)\| dt = \int_\alpha^\beta \|\dot{\vec{\rho}}(t)\| dt$$

Dokaz. Uporabimo izrek o vpeljavi nove spremenljivke. □

Trditev 1.3.5. Naj bo $\vec{r} \in \mathcal{C}^1([\alpha, \beta])$. Tedaj je dolžina krivulje enaka

$$\int_\alpha^\beta \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt = \int_\alpha^\beta \|\dot{\vec{r}}(t)\| dt.$$

Dokaz. Dokaz je enak dokazu izreka 5.4.6. v zapiskih Analize 1 prvega letnika. □

Definicija 1.3.6. Naj bo $\vec{r}: [\alpha, \beta] \rightarrow \Gamma$ regularna parametrizacija krivulje Γ . Naj bo

$$S(t) = \int_\alpha^t \|\dot{\vec{r}}(\tau)\| d\tau.$$

Za inverzno preslikavo³ $T = S^{-1}$ parametrizacijo

$$s \mapsto \vec{r}(T(s))$$

imenujemo *naravna parametrizacija*.

Trditev 1.3.7. Odvod naravne parametrizacije je normiran.

Dokaz. Velja

$$\frac{d}{ds} (\vec{r}(T(s))) = \dot{\vec{r}}(T(s)) \cdot T'(s) = \frac{\dot{\vec{r}}(T(s))}{\dot{S}(T(s))} = \frac{\dot{\vec{r}}(T(s))}{\|\dot{\vec{r}}(T(s))\|}. \quad \square$$

³ Ta obstaja, saj je $S' > 0$.

1.3.2 Spremljajoči trieder

Definicija 1.3.8. Normalna ravnina krivulje \vec{r} v točki t je ravnina skozi $\vec{r}(t)$ in normalo $\dot{\vec{r}}(t)$.

Definicija 1.3.9. Naj bo \vec{r} naravna \mathcal{C}^2 parametrizacija. Spremljajoči trieder v točki t so vektorji⁴

$$\vec{T} = \dot{\vec{r}}(t), \quad \vec{N} = \frac{\vec{T}'}{\|\vec{T}'\|} \quad \text{in} \quad \vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}.$$

Opomba 1.3.9.1. Vektorju \vec{N} pravimo vektor glavne normale, vektorju \vec{B} pa vektor binormale.

Definicija 1.3.10. Pritisnjena ravnina v točki s je ravnina, ki jo razpenjata tangentni in normalni vektor ter gre skozi $\vec{r}(s)$.

Trditev 1.3.11. Pritisnjena ravnina v točki s je ravnina, ki se najbolje prilega krivulji v okolici $\vec{r}(s)$.

Dokaz. Velja

$$\vec{n} \cdot (\vec{r}(s+h) - \vec{r}(s)) = \vec{n} \cdot \vec{r}'(s) \cdot h + \vec{n} \cdot \vec{r}''(s) \cdot \frac{h^2}{2} + \vec{n} \cdot \vec{o}(h^3).$$

Ta izraz bo najmanjši, ko bo $\vec{n} \parallel \vec{B}(s)$. □

Trditev 1.3.12. Za regularno \mathcal{C}^2 parametrizacijo \vec{r} krivulje Γ velja

$$\vec{T} = \frac{\dot{\vec{r}}(t)}{\|\dot{\vec{r}}(t)\|}, \quad \text{in} \quad \vec{N} = \frac{\dot{\vec{r}} \times (\ddot{\vec{r}} \times \dot{\vec{r}})}{\|\dot{\vec{r}}\| \cdot \|\ddot{\vec{r}} \times \dot{\vec{r}}\|}.$$

Dokaz. Uporabimo verižno pravilo. □

1.3.3 Ukrivljenost krivulj

Definicija 1.3.13. Fleksijska ukrivljenost je definirana kot

$$\kappa(s) = \|\vec{r}''(s)\| = \|\vec{T}'(s)\|.$$

Opomba 1.3.13.1. Velja

$$\kappa = \frac{\|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}\|}{\|\dot{\vec{r}}\|^3}.$$

Definicija 1.3.14. Pritisnjena krožnica je krožnica z radijem

$$\rho(s) = \frac{1}{\kappa(s)}$$

in središčem v točki

$$\vec{r}(s) + \rho(s) \cdot \vec{N}(s),$$

ki leži v pritisnjeni ravnini.

⁴ To ni nujno dobra definicija.

Opomba 1.3.14.1. Pritisnjena krožnica je parametrizirana s

$$\varphi \mapsto \vec{r} + \rho \cdot \vec{N} + \rho \cdot (\vec{T} \cdot \cos \varphi + \vec{N} \cdot \sin \varphi).$$

Definicija 1.3.15. *Torzijska ukrivljenost*⁵ krivulje $\vec{r} \in \mathcal{C}^3$ je definirana kot

$$\omega(s) = \|\vec{B}'(s)\|.$$

Opomba 1.3.15.1. Velja

$$\omega = \frac{[\dot{\vec{r}}, \ddot{\vec{r}}, \ddot{\vec{r}}]}{\|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}\|^2}.$$

Trditev 1.3.16. Velja

$$\vec{N}' = -\kappa \cdot \vec{T} + \omega \cdot \vec{B}.$$

Dokaz. Opazimo, da velja $\vec{N}' \perp \vec{N}$, saj je $\vec{N} = 1$. Sedaj preprosto odvajamo zvezi

$$\vec{N} \cdot \vec{T} = 0 \quad \text{in} \quad \vec{N} \cdot \vec{B} = 0.$$

□

Izrek 1.3.17 (Frenet-Serretov sistem). Velja

$$\begin{bmatrix} \vec{T} \\ \vec{N} \\ \vec{B} \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \omega \\ 0 & -\omega & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{T} \\ \vec{N} \\ \vec{B} \end{bmatrix}.$$

⁵ Tudi *zvitost*.

1.4 Ploskve v \mathbb{R}^3

1.4.1 Definicija

Definicija 1.4.1. *Ploskev* je dvodimenzionalna podmnogoterost v \mathbb{R}^3 .

Definicija 1.4.2. *Gradient* je vektor

$$\text{grad } F = \nabla F = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{bmatrix}.$$

Trditev 1.4.3. Gradient je pravokoten na tangenti podprostor ploskve.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Trditev 1.4.4. Naj bo $\vec{r}: D \rightarrow \Sigma$ regularna parametrizacija. Tedaj vektorja

$$\vec{r}_s(s_0, t_0) \quad \text{in} \quad \vec{r}_t(s_0, t_0)$$

razpenjata tangenti prostor.

Dokaz. Opazimo, da sta linearno neodvisna in sta

$$t \mapsto \vec{r}(s_0, t) \quad \text{in} \quad t \mapsto \vec{r}(s, t_0)$$

krivulji na Σ , zato sta njuna odvoda v tangentnem prostoru. □

Opomba 1.4.4.1. Velja, da je

$$\vec{r}_s \times \vec{r}_t$$

normalni vektor.

1.4.2 I. fundamentalna forma

Definicija 1.4.5. Naj bo Σ gladka ploskev v \mathbb{R}^3 z regularno parametrizacijo $\vec{r}: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, kjer je $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Naj bo

$$E(u, v) = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u, \quad F(u, v) = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v \quad \text{in} \quad G(u, v) = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v.$$

Kvadratni formi

$$(x, y) \mapsto Ex^2 + 2Fxy + Gy^2$$

z matriko

$$\begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix} (u, v)$$

pravimo *I. fundamentalna forma* ploskve Σ .

Opomba 1.4.5.1. V vsaki točki je zgornja kvadratna forma strogo pozitivno definitna.

Trditev 1.4.6. Naj bo Γ krivulja na ploskvi Σ , oziroma

$$\Gamma = \{ \vec{r}(u(t), v(t)) \mid t \in I \}.$$

Tedaj je njena dolžina enaka

$$\int_I \sqrt{E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2} dt.$$

Dokaz. Velja

$$\frac{d}{dt} (\vec{r}(u(t), v(t))) = \vec{r}_u \cdot \dot{u} + \vec{r}_v \cdot \dot{v}.$$

Sledi, da je dolžina enaka

$$\int_I |\vec{r}_u \cdot \dot{u} + \vec{r}_v \cdot \dot{v}| dt = \int_I \sqrt{(\vec{r}_u \cdot \dot{u} + \vec{r}_v \cdot \dot{v})^2} dt. \quad \square$$

Trditev 1.4.7. Kot α med koordinatnima krivljama na ploskvi določa zveza

$$\cos \alpha = \frac{F}{\sqrt{E \cdot G}}.$$

Dokaz. Naj bosta Γ_1 in Γ_2 krivulji na ploskvi Σ s parametrizacijama⁶

$$\gamma_1: t \mapsto (u_1(t), v_1(t)) \quad \text{in} \quad \gamma_2: t \mapsto (u_2(t), v_2(t)).$$

Naj bosta

$$\vec{\Gamma}_1 = (\vec{r}_u \cdot \dot{u}_1 + \vec{r}_v \cdot \dot{v}_1)(t_1) \quad \text{in} \quad \vec{\Gamma}_2 = (\vec{r}_u \cdot \dot{u}_2 + \vec{r}_v \cdot \dot{v}_2)(t_2)$$

tangentna vektorja v ρ . Tedaj je

$$\cos \alpha = \frac{\langle \vec{\Gamma}_1, \vec{\Gamma}_2 \rangle}{\|\vec{\Gamma}_1\| \cdot \|\vec{\Gamma}_2\|}.$$

Označimo

$$\langle x, y \rangle_\rho = \left\langle \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix} x, y \right\rangle.$$

Opazimo, da velja

$$\langle \vec{\Gamma}_1, \vec{\Gamma}_2 \rangle = \langle \vec{\gamma}_1, \vec{\gamma}_2 \rangle_\rho$$

in

$$\|\vec{\Gamma}_i\| = \sqrt{\langle \vec{\gamma}_i, \vec{\gamma}_i \rangle_\rho}.$$

Dobimo

$$\cos \alpha = \frac{\langle \vec{\gamma}_1, \vec{\gamma}_2 \rangle_\rho}{\sqrt{\langle \vec{\gamma}_1, \vec{\gamma}_1 \rangle_\rho} \cdot \sqrt{\langle \vec{\gamma}_2, \vec{\gamma}_2 \rangle_\rho}}.$$

Sedaj preprosto vstavimo $\vec{\gamma}_1 = (1, 0)$ in $\vec{\gamma}_2 = (0, 1)$. □

⁶ $\Gamma_i = \vec{r}(\gamma_i)$.

1.4.3 Površina ploskve

Definicija 1.4.8. Površina ploskve Σ z regularno parametrizacijo $\vec{r}: D \rightarrow \Sigma$ je integral

$$\iint_D |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| \, du \, dv = \iint_D \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv.$$

Opomba 1.4.8.1. Množice z mero 0 ne vplivajo na vrednost integrala.

Posledica 1.4.8.2. Če je Σ graf funkcije f , je njena površina enaka

$$\iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy.$$

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Trditev 1.4.9. Površina ploskve je neodvisna od regularne parametrizacije.

Dokaz. Naj bo $\vec{\rho} = \vec{r}(u(s, t), v(s, t))$. Sledi

$$\dot{\vec{\rho}}_s = \vec{r}_u \cdot u_s + \vec{r}_v \cdot v_s \quad \text{in} \quad \dot{\vec{\rho}}_t = \vec{r}_u \cdot u_t + \vec{r}_v \cdot v_t.$$

Sledi, da je

$$\vec{\rho}_s \times \vec{\rho}_t = (\vec{r}_v \times \vec{r}_u) \cdot (u_s v_t - v_s u_t) = |(\vec{r}_v \times \vec{r}_u)(\Phi(s, t))| \cdot |J\Phi|,$$

kjer je $\Phi: \Omega \rightarrow D$ difeomorfizem s predpisom

$$\Phi(s, t) = (u(s, t), v(s, t)).$$

□

2 Vektorska analiza

2.1 Skalarna in vektorska polja

Definicija 2.1.1. Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}^3$ odprta. Funkcijam oblike $\mathcal{U}: D \rightarrow \mathbb{R}$ pravimo *skalarno polje*. Preslikavam $\vec{R}: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ oblike pravimo *vektorsko polje*.

Definicija 2.1.2. *Standardna baza* je množica

$$\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}.$$

Definicija 2.1.3. Pravimo, da je baza $\{\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}\}$ *pozitivno orientirana*, če je

$$[\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}] > 0.$$

Če je mešani produkt negativen, pravimo, da je baza *negativno orientirana*.

Opomba 2.1.3.1. Standardna baza je pozitivno orientirana.

Opomba 2.1.3.2. Baza je pozitivno orientirana natanko tedaj, ko je

$$\vec{p} \times \vec{q} = \vec{r}.$$

Definicija 2.1.4. *Smerni odvod* skalarne polja \mathcal{U} v smeri vektorja \vec{s} v točki p je limita

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\mathcal{U}(\vec{p} + t\vec{s}) - \mathcal{U}(\vec{p})}{t} = \frac{\partial \mathcal{U}}{\partial \vec{s}}(\vec{p}),$$

če obstaja.

Opomba 2.1.4.1. Če je $\mathcal{U} \in \mathcal{C}^1(D)$, velja

$$\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial \vec{s}}(\vec{p}) = (D\mathcal{U})(\vec{p}) \cdot \vec{s} = \text{grad } \mathcal{U} \cdot \vec{s}.$$

Definicija 2.1.5. Operator *nabla* je operator

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

Trditev 2.1.6. Naj bo $\mathcal{U} \in \mathcal{C}^1(D)$. V točki $\vec{p} \in D$ skalarne polje najhitreje narašča v smeri gradienta, najhitreje pa pada v nasprotni smeri.

Dokaz. The proof is obvious and need not be mentioned. □

Opomba 2.1.6.1. V smereh, pravokotnih na gradient, se \mathcal{U} najpočasneje spreminja.

Definicija 2.1.7. Naj bo \vec{R} vektorsko polje. *Divergenca* polja je sled odvoda, oziroma

$$\text{div } \vec{R} = X_x + Y_y + Z_z = \vec{\nabla} \cdot \vec{R}.$$

Definicija 2.1.8. Naj bo \vec{R} vektorsko polje. *Rotor* polja je produkt⁷

$$\text{rot } \vec{R} = \vec{\nabla} \times \vec{R}.$$

⁷ Abuse of notation, nabla uporabimo po komponentah.

Trditev 2.1.9. Naj bo D odprta podmnožica \mathbb{R}^3 , $\mathcal{U} \in \mathcal{C}^2(D)$ skalarno in $\vec{R} \in \mathcal{C}^2(D)$ vektorsko polje. Tedaj velja

- i) $\text{rot}(\text{grad } \mathcal{U}) = \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \mathcal{U} = \vec{0}$ in
- ii) $\text{div}(\text{rot } \mathcal{U}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{R}) = 0$.

Dokaz. Velja

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \mathcal{U} = (u_{zy} - u_{yz}, u_{xz} - u_{zx}, u_{yx} - u_{xy}) = \vec{0}$$

in

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{R}) = Z_{yx} - Y_{zx} + X_{zy} - Z_{xy} + Y_{xz} - X_{yz} = 0. \quad \square$$

Definicija 2.1.10. Vektorsko polje je *potencialno*, če obstaja tako skalarno polje $\mathcal{U} \in \mathcal{C}^1(D)$, da je $\vec{R} = \text{grad } \mathcal{U}$. Polju \mathcal{U} pravimo *potencial*.

Definicija 2.1.11. Naj bo \mathcal{U} skalarno polje. *Laplaceov operator* je

$$\Delta \mathcal{U} = \text{div grad } \mathcal{U} = \mathcal{U}_{xx} + \mathcal{U}_{yy} + \mathcal{U}_{zz}.$$

Definicija 2.1.12. Funkcijam, ki rešijo enačbo

$$\Delta \mathcal{U} = 0,$$

pravimo *harmonične funkcije*.

Definicija 2.1.13. Množica $D \subseteq \mathbb{R}^3$ je *konveksna*, če za poljubni točki $\vec{a}, \vec{b} \in D$ in $t \in [0, 1]$ tudi

$$t\vec{a} + (1-t)\vec{b} \in D.$$

Definicija 2.1.14. Množica $D \subseteq \mathbb{R}^3$ je *zvezdasta*, če obstaja taka točka $\vec{a} \in D$, da je za vse $\vec{b} \in D$ in $t \in [0, 1]$ tudi

$$t\vec{a} + (1-t)\vec{b} \in D.$$

Stvarno kazalo

I

Izrek

Frenet-Serretov sistem, [10](#)

K

Krivulja, [8](#)

Dolžina, [8](#)

Naravna parametrizacija, [8](#)

Normalna, pritisnjena ravnina, [9](#)

Pritisnjena krožnica, [9](#)

Ukrivljenost, [9](#)

M

Množica

Konveksna, [15](#)

Zvezdasta, [15](#)

P

Ploskev, [11](#)

I. fundamentalna forma, [11](#)

Površina, [13](#)

Podmnogoterost, [4](#)

Definicijska funkcija, [4](#)

Tangentni prostor, [6](#)

Polje, [14](#)

Divergenca, [14](#)

Laplaceov operator, [15](#)

Nabla, [14](#)

Potencialno, [15](#)

Rotor, [14](#)

Smerni odvod, [14](#)

Preslikava

Gradient, [11](#)

Prostor

Orientacija baze, [14](#)

Standardna baza, [14](#)