

Zum Begriff der Gruppe

sowie den Sätzen von

Lagrange, Fermat, Euler und Wilson

mit einem Ausblick auf das Lösen von Gleichungen
und auflösbare Gruppen

Jochen Ziegenbalg

ziegenbalg.edu@gmail.com

<https://jochen-ziegenbalg.github.io/materialien/>

Inhalt

1 Historische Vorbemerkungen: Zur Entstehung und Entwicklung der Gruppentheorie (Überblick)	5
1.1 Die erste Wurzel: Das Gleichungsproblem	5
1.1.1 Lagrange: Permutation der Wurzeln	5
1.1.2 Ruffini und Abel: der Unmöglichkeitbeweis	5
1.1.3 Galois: Geburt des Gruppenbegriffs	5
1.2 Die zweite Wurzel: Zahlentheorie	6
1.3 Die dritte Wurzel: Geometrie und Transformationen	6
1.3.1 Cayley: die erste abstrakte Definition	6
1.3.2 Klein und das Erlanger Programm (1872)	7
1.3.3 Sophus Lie: kontinuierliche Gruppen	7
1.4 Konsolidierung: von der Permutation zur Abstraktion	7
1.4.1 Jordan – Hölder	7
1.4.2 Von der konkreten zur axiomatischen Gruppe	8
1.5 Das 20. Jahrhundert: Ausbau und Vollendung	8
1.5.1 Darstellungstheorie	8
1.5.2 Die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen	8
Zusammenfassende Zeittafel	9
2 Definitionen, Grundbegriffe, erste Beispiele	10
2.1 Grundbegriffe	10
2.2 Erste Beispiele	11
2.2.1 Die Deckabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks	11
2.2.2 Diedergruppen	12

2.2.3	Zweierpotenzen	12
2.2.4	Gruppen und Zahlbereichserweiterungen	12
2.2.5	Die Kleinsche Vierergruppe	13
2.2.6	Die Tetraeder-Drehgruppe	13
2.3	Gruppentafeln / Cayley-Tafeln	14
2.4	Aggregierende Schreibweisen	16
3	Untergruppen und Nebenklassen	16
3.1	Untergruppen	16
3.2	Die Links-Multiplikation	18
3.3	Nebenklassen	18
3.4	Der Index einer Untergruppe	20
3.5	Der Satz von Lagrange	20
4	Gruppen-Homomorphismen	21
5	Permutationsgruppen	22
5.1	Transpositionen	24
6	Erzeugende Elemente und zyklische Gruppen	26
7	Gruppen primer Restklassen	28
7.1	Primitivwurzeln	29
8	Die Sätze von Fermat, Euler und Wilson	29
9	Normalteiler, Faktorgruppen, einfache Gruppen	30
9.1	Normalteiler	30
9.2	Faktorgruppen	32
10	Direkte Produkte	33
10.1	Direkte Produkte von Gruppen	33
10.2	Der Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen	34
11	Subnormalreihen, Kompositionsreihen, auflösbare Gruppen	35
11.1	Subnormalteiler und Subnormalreihen	35
11.2	Kommutator, Kommutatorgruppen, Kommutatorreihen	36
11.3	Die Sätze von Schreier und Jordan-Hölder	37
12	Skizze: Polynomgleichungen	37
12.1	Gleichungen 2. Grades	38
12.2	Gleichungen 3. Grades	39
12.3	Gleichungen 4. Grades	41
12.4	Gleichungen 5. Grades	41

INHALT	3
12.5 Der Satz von Vieta und Symmetrien bei den Wurzeln	42
12.6 Ruffini, Abel und Galois	43
13 Ausblick	44
A Anhang: Zahlentheoretische Grundbegriffe	45
A.1 Die Division mit Rest	45
A.2 Die Teilbarkeitsrelation	45
A.3 Der größte gemeinsame Teiler	45
A.4 Der Euklidische Algorithmus	46
A.5 Der erweiterte Euklidische Algorithmus	47
A.6 Restklassen	50
A.6.1 Addition von Restklassen	50
A.6.2 Multiplikation von Restklassen	51
A.6.3 Die Ring-Struktur von Restklassen	51
B Literaturhinweise	52
C Internet-Quellen	53

Vorbemerkungen

- Mathematischen Texte werden oft nach dem Prinzip der maximalen Redundanzfreiheit verfasst. Auch allgemeinere Bemerkungen z.B. historischer Art oder Bemerkungen zur Motivation oder auf der Metaebene werden gelegentlich als „Lyrik“ abgetan. Dies mag vielleicht für Texte auf dem allerhöchsten fachlichem Niveau der Forschung akzeptabel sein, nicht aber für Texte, die sich an Lernende ohne grosses Vorwissen wenden. Die historische (und auch die kulturgeschichtliche) Sicht der Dinge gehört nach Auffassung des Autors grundsätzlich zur Mathematik; Bemerkungen zur Methodologie können das Lernen erleichtern und Ausführungen zum wissenschaftlichen Umfeld können zur Beschäftigung mit dem jeweiligen Gegenstand motivieren.
 - Viele der gruppentheoretischen Beispiele dieses Manuskripts sind zahlentheoretischer Natur. Und speziell, was *endliche* Gruppen betrifft, wird in vielen Beispielen von der „modularen Arithmetik“ bzw. Restklassen-Arithmetik in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ Gebrauch gemacht. In Anhang A sind einige der zahlentheoretischen Grundbegriffe zusammengestellt.
 - Die Zahlentheorie war spätestens seit Euklid (um ca. 300 v.Chr.) ein stark von Algorithmen geprägtes Gebiet der Mathematik. Es ist also nur natürlich, dass man immer wieder bemüht war, Geräte, Hilfsmittel oder Maschinen zu konstruieren, die beim Ausführen der Algorithmen hilfreich waren: angefangen mit den Zahlwörtern, Zahlssystemen, Rechentafeln, Rechentischen, ersten Rechenmaschinen (Suan Pan), mechanischen Rechenmaschinen bis hin zu den modernen Computern¹.
- Als eines der letzten Hilfsmittel sind Ende des 21. Jahrhunderts die Computeralgebra Systeme (CAS) hinzugekommen. Neben allgemeinen algorithmischen Systemen oder Programmiersprachen (wie Macsyma, Maxima, Maple, Mathematica, Python, ...) ist im Bereich der Algebra speziell das System GAP² zu nennen. Dieses Manuskript kann und will nicht eine Einführung in die Thematik „Computeralgebra“ sein. Es beschränkt sich deshalb, wo angebracht, auf kurze, sporadische Hinweise.
- *Schliesslich:* Der Autor ist aus unterschiedlichen Gründen kein Freund des Buchstaben ß (Eszett). Das Eszett wird dementsprechend in diesem Manuskript (ähnlich wie im „Schweizer Hochdeutsch“) bis auf extrem seltene Ausnahmen, wie z.B. bei Gauß, vermieden. In direkten Zitaten wird das ß-Zeichen verwendet, wenn es im Original vorkommt.

¹ siehe Ziegenbalg, 2015, Algorithmen von Hammurapi bis Gödel, Kap. 3 (Historische Bezüge)

² Groups, Algorithms, Programming - a System for Computational Discrete Algebra

1 Historische Vorbemerkungen: Zur Entstehung und Entwicklung der Gruppentheorie (Überblick)

(mit Unterstützung der KI-Software Claude)

1.1 Die erste Wurzel: Das Gleichungsproblem

1.1.1 Lagrange: Permutation der Wurzeln

Joseph-Louis Lagrange³ untersuchte in seiner Abhandlung *Réflexions sur la résolution algébrique des équations*, warum die klassischen Lösungsformeln für Gleichungen 2., 3. und 4. Grades funktionieren, für den Grad 5 aber keine analoge Formel gefunden werden konnte. Sein zentraler Trick: Er betrachtete sogenannte **Lagrange-Resolventen** – rationale Funktionen der Wurzeln einer Gleichung – und untersuchte, wie viele verschiedene Werte diese Funktionen annehmen, wenn man die Wurzeln auf alle möglichen Weisen permutiert.

Er bemerkte, dass die Anzahl der verschiedenen Werte einer solchen Resolvente stets ein Teiler von $n!$ ist (wobei n der Grad der Gleichung ist) – ein früher Vorbote dessen, was später als **Satz von Lagrange** in der Gruppentheorie bekannt wurde: Die Ordnung einer Untergruppe teilt die Ordnung der Gruppe. Lagrange selbst hatte jedoch noch keinen Gruppenbegriff; er rechnete mit konkreten Permutationen, nicht mit einer abstrakten Struktur.

1.1.2 Ruffini und Abel: der Unmöglichkeitbeweis

Paolo Ruffini⁴ veröffentlichte 1799 einen (lückenhaften) Beweis, dass die allgemeine Gleichung fünften Grades nicht durch Radikale auflösbar ist. Sein Beweis enthielt Lücken, die erst **Niels Henrik Abel**⁵ 1824 in seiner kurzen, aber vollständigen Arbeit *Mémoire sur les équations algébriques* schloss – der sogenannte **Satz von Abel-Ruffini**. Abel benutzte dabei bereits implizit Eigenschaften von Permutationsgruppen, ohne den Begriff selbst zu prägen.

1.1.3 Galois: Geburt des Gruppenbegriffs

Évariste Galois⁶ ging entscheidend weiter als Abel: Statt nur zu zeigen, dass die allgemeine Gleichung 5. Grades unauflösbar ist, entwickelte er ein Kriterium, das für jede beliebige Gleichung entscheidet, ob sie durch Radikale lösbar ist. Dazu ordnete er jeder Gleichung eine Gruppe von Permutationen ihrer Wurzeln zu – die heute so genannte **Galois-Gruppe**.

³ Joseph-Louis de Lagrange, 1736–1813, italienischer Mathematiker, Physiker und Astronom der später in Berlin und Paris wirkte

⁴ Paolo Ruffini, 1765–1822, italienischer Mathematiker, Mediziner und Philosoph

⁵ Niels Henrik Abel, 1802–1829, norwegischer Mathematiker

⁶ Évariste Galois, 1811–1832, französischer Mathematiker

*Galois' Kernidee: Eine Gleichung ist genau dann durch Radikale auflösbar, wenn ihre Galois-Gruppe eine Kette von Normalteilern besitzt, deren sukzessive Quotienten abelsch (genauer: zyklisch von Primzahlordnung) sind – heute nennt man eine solche Gruppe **auf-lösbar**.*

Galois führte damit als Erster den Begriff *groupe* in der uns bekannten technischen Bedeutung ein und arbeitete bereits mit Konzepten, die wir heute als **Normalteiler** (er nannte sie „proportionale Teilung“) und **Quotientengruppe** bezeichnen würden.

Galois starb 1832 mit nur 20 Jahren bei einem Duell. In der Nacht zuvor verfasste er in Eile Briefe, in denen er seine mathematischen Ideen skizzierte. Seine Arbeiten waren der Pariser Akademie zuvor zweimal eingereicht und zweimal zurückgewiesen worden (u. a. von Cauchy und Poisson) – zu radikal neu und unzureichend erklärt. Erst 1846, vierzehn Jahre nach seinem Tod, veröffentlichte **Joseph Liouville** Galois' Manuskripte im *Journal de Mathématiques* und machte sie damit der mathematischen Welt zugänglich.

1.2 Die zweite Wurzel: Zahlentheorie

Carl Friedrich Gauß⁷ arbeitete in den *Disquisitiones Arithmeticae* unabhängig von Lagrange und Galois mit Strukturen, die wir heute als Gruppen erkennen: die multiplikative Gruppe der primen Restklassen modulo n , die additive Struktur quadratischer Formen unter Komposition, sowie zyklische Gruppen bei der Untersuchung der Kreisteilungsgleichung $x^n - 1 = 0$. Gauß bewies etwa, dass die primen Restklassen modulo einer Primzahl p eine zyklische Gruppe der Ordnung $p - 1$ bilden – ohne diesen Begriff zu benutzen, aber der Sache nach völlig korrekt und vollständig.

1.3 Die dritte Wurzel: Geometrie und Transformationen

1.3.1 Cayley: die erste abstrakte Definition

Arthur Cayley⁸ veröffentlichte 1854 die Arbeit *On the theory of groups, as depending on the symbolic equation $\theta^n = 1$* , in der er eine Gruppe erstmals unabhängig von einer konkreten Realisierung als Permutationsmenge definierte – über eine Verknüpfungstafel (die sogenannte **Cayley-Tafel**). Diese Abstraktion wurde zunächst kaum beachtet; erst Jahrzehnte später setzte sich die abstrakte Sichtweise durch.

⁷ Johann Carl Friedrich Gauß, 1777–1855, deutscher Mathematiker, Statistiker, Astronom, Geodät, Elektrotechniker und Physiker

⁸ Arthur Cayley, 1821–1895, englischer Mathematiker

1.3.2 Klein und das Erlanger Programm (1872)

Felix Klein⁹ revolutionierte mit seiner Antrittsvorlesung an der Universität Erlangen die Sicht auf Geometrie überhaupt: Statt Geometrien durch ihre Axiome zu charakterisieren, schlug er vor, jede Geometrie durch ihre **Symmetriegruppe** zu definieren – also durch die Gruppe der Transformationen, unter denen die geometrischen Eigenschaften invariant bleiben.

Zum Erlanger Programm:

- **Euklidische Geometrie** $\leftrightarrow$ Gruppe der Kongruenzabbildungen (Translationen, Rotationen, Spiegelungen)
- **Affine Geometrie** $\leftrightarrow$ Gruppe der affinen Abbildungen
- **Projektive Geometrie** $\leftrightarrow$ Gruppe der projektiven Transformationen

Damit wurde die Gruppe zum organisierenden Prinzip der gesamten Geometrie – ein enormer konzeptioneller Sprung, der weit über das ursprüngliche Gleichungsproblem hinausging.

1.3.3 Sophus Lie: kontinuierliche Gruppen

Sophus Lie¹⁰ entwickelte ab etwa 1873, teils in Zusammenarbeit mit Klein, die Theorie der **kontinuierlichen Transformationsgruppen** (heute: Lie-Gruppen). Sein Ziel war ein Analogon zur Galois-Theorie für Differentialgleichungen: So wie eine algebraische Gleichung genau dann durch Radikale lösbar ist, wenn ihre (diskrete) Galois-Gruppe auflösbar ist, sollte eine Differentialgleichung genau dann durch Quadraturen lösbar sein, wenn ihre (kontinuierliche) Symmetriegruppe bestimmte Eigenschaften besitzt. Lie-Gruppen wurden im 20. Jahrhundert zu einem der zentralen Werkzeuge der theoretischen Physik.

1.4 Konsolidierung: von der Permutation zur Abstraktion

1.4.1 Jordan – Hölder

Camille Jordan¹¹ veröffentlichte mit dem monumentalen *Traité des substitutions et des équations algébriques* die erste systematische, buchlange Darstellung der Galois-Theorie und der Theorie der Permutationsgruppen. Er bewies wichtige Struktursätze, u.a. Vorformen dessen, was später als **Satz von Jordan-Hölder**¹² bekannt wurde: Zwei Kompositionsreihen einer Gruppe (Ketten von Normalteilern, deren Quotienten einfache Gruppen sind) sind bis auf Reihenfolge und Isomorphie eindeutig bestimmt.

⁹ Felix Christian Klein, 1849–1925, deutscher Mathematiker

¹⁰ Marius Sophus Lie, 1842–1899, norwegischer Mathematiker

¹¹ Marie Ennemond Camille Jordan, 1838–1922, französischer Mathematiker

¹² Otto Ludwig Hölder, 1859–1937, deutscher Mathematiker

1.4.2 Von der konkreten zur axiomatischen Gruppe

In den 1880er Jahren lösten mehrere Mathematiker den Gruppenbegriff endgültig von seiner Herkunft als Permutationsmenge:

- **1882** — **Walther von Dyck**¹³ gibt eine axiomatische Definition abstrakter Gruppen mittels Erzeugenden und Relationen (Grundlage der kombinatorischen Gruppentheorie).
- **1889** — **Otto Hölder** ergänzt den Satz von Jordan zum vollständigen **Jordan-Hölder-Satz** und untersucht einfache Gruppen von kleiner Ordnung systematisch.
- **1893** — **Heinrich Weber**¹⁴ formuliert in *Lehrbuch der Algebra* eine axiomatische Definition, die der heute gebräuchlichen (Menge, assoziative Verknüpfung, neutrales Element, inverse Elemente) sehr nahekommt und erstmals klar zwischen endlichen und unendlichen Gruppen unterscheidet.

Damit war um 1900 der Übergang vollzogen: Eine Gruppe war nun ein abstraktes Objekt, das durch Axiome definiert wurde – Permutationsgruppen, zahlentheoretische Gruppen und geometrische Transformationsgruppen erwiesen sich als bloße *Realisierungen* derselben Struktur (formal abgesichert später durch den **Satz von Cayley**: jede Gruppe ist isomorph zu einer Permutationsgruppe).

1.5 Das 20. Jahrhundert: Ausbau und Vollendung

1.5.1 Darstellungstheorie

Ferdinand Georg Frobenius¹⁵ begründete ab 1896 die **Darstellungstheorie endlicher Gruppen** – die Untersuchung von Gruppen mittels ihrer Wirkung durch lineare Abbildungen auf Vektorräumen. **William Burnside**¹⁶ und **Issai Schur**¹⁷ bauten diese Theorie systematisch aus. Sie verband die Gruppentheorie eng mit der linearen Algebra und wurde später fundamental für die Quantenmechanik (Symmetriegruppen von Teilchen) und die Kristallographie.

1.5.2 Die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen

Ein zentrales Ziel wurde die vollständige Liste aller **endlichen einfachen Gruppen** – der „Bausteine“, aus denen sich nach dem Jordan-Hölder-Satz jede endliche Gruppe zusammensetzt. Dieses Projekt, an dem Hunderte Mathematiker über Jahrzehnte arbeiteten, wurde in den 1980er Jahren im Wesentlichen abgeschlossen (der ursprüngliche Beweis verteilte sich auf schätzungsweise 10.000–15.000 Zeitschriftenseiten). Er umfasst:

¹³ Walther Franz Anton Dyck, 1856–1934, deutscher Mathematiker

¹⁴ Heinrich Martin Georg Weber, 1842–1913, deutscher Mathematiker.

¹⁵ Ferdinand Georg Frobenius, 1849–1917, deutscher Mathematiker

¹⁶ William Burnside, 1852–1927, englischer Mathematiker

¹⁷ Issai Schur, 1875–1941, russisch-deutscher Mathematiker

- zyklische Gruppen von Primzahlordnung,
- alternierende Gruppen A_n für $n \geq 5$,
- Gruppen vom Lie-Typ (16 unendliche Familien),
- 26 **sporadische Gruppen**, darunter die berühmte *Monstergruppe* mit etwa $8 \cdot 10^{53}$ Elementen.

Spätere Arbeiten (u. a. von Aschbacher¹⁸ und Smith¹⁹ in den 2000er Jahren) schlossen verbliebene Lücken im Beweis der Klassifikation.

Zusammenfassende Zeittafel

Jahr(e)	Ereignis	Person(en)
1640	kleiner Satz von Fermat (ohne Beweis)	Fermat
1736	kleiner Satz von Fermat, Beweis von Euler	Euler
1763	Eulersche φ -Funktion; Satz von Euler (Zahlentheorie)	Euler
1770/71	Permutation der Wurzeln, Resolventen	Lagrange
1799/1824	Unauflösbarkeit der Gleichung 5. Grades	Ruffini, Abel
1801	Restklassengruppen, Kreisteilung	Gauß
1830–32	Begriff Gruppe , Auflösbarkeitskriterium	Galois
1846	Posthume Veröffentlichung	Liouville (Hrsg.)
1854	Erste abstrakte Definition	Cayley
1870	Systematisches Lehrbuch der Permutationsgruppen	Jordan
1872	Erlanger Programm	Klein
1873 ff.	Kontinuierliche Transformationsgruppen	Lie
1882–93	Axiomatisierung des Gruppenbegriffs	von Dyck, Hölder, Weber
1896 ff.	Darstellungstheorie	Frobenius, Burnside, Schur
1980er	Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen	zahlreiche Autoren

¹⁸ Michael George Aschbacher, geb. 1944, amerikanischer Mathematiker

¹⁹ Stephen D. Smith, geb. 1948, amerikanischer Mathematiker

2 Definitionen, Grundbegriffe, erste Beispiele

2.1 Grundbegriffe

Definition 2.1 Eine Gruppe ist ein “Tripel” $(G, \circ, e)$ bestehend aus einer Menge G , einer zweistelligen Verknüpfung $\circ : G \times G \rightarrow G$ und einem speziellen Element $e \in G$ mit den folgenden Eigenschaften:

1. Die Verknüpfung $\circ$ ist assoziativ; d.h.:
Für alle $a, b, c \in G$ gilt $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$.
2. Existenz eines neutralen Elements:
Für alle $a \in G$ gilt $a \circ e = e \circ a = a$.
3. Existenz von inversen Elementen:
Zu jedem Element $a \in G$ gibt es ein Element $b \in G$ mit der Eigenschaft $a \circ b = b \circ a = e$.

Definition 2.2 Weitere Grundbegriffe:

1. Falls für alle $a, b \in G$ stets $a \circ b = b \circ a$ gilt, so heisst die Gruppe *kommutativ* oder auch *abelsche Gruppe*.
2. Falls G eine *endliche Menge* ist, so heisst G *endliche Gruppe*; andernfalls *unendliche Gruppe*.
3. Die Mächtigkeit (d.h. im Falle einer endlichen Gruppe die Elementzahl) der Gruppe G heisst die *Ordnung* von G ; im Zeichen: $|G|$.

Hinweis: Im restlichen Manuskript werden praktisch nur endliche Gruppen betrachtet. Wenn also nichts weiter gesagt ist, ist davon auszugehen, dass mit “Gruppe” stets “endliche Gruppe” gemeint ist.

Bemerkungen

1. Die Menge G wird auch als die *Trägermenge* der Gruppe bezeichnet. Wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, spricht man oft auch kurz von der Gruppe G .
2. Als Verknüpfungssymbol für die (zweistellige) Verknüpfung wird oft das gewöhnliche Multiplikationszeichen $(\cdot)$ bzw. das Additionszeichen $(+)$ verwendet; letzteres meist bei kommutativen Gruppen. Das Multiplikationszeichen $\cdot$ wird gelegentlich auch weggelassen, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht. An Stelle von $a \circ b$ wird also auch $a \cdot b$ oder ab geschrieben.
3. Das spezielle Element e heisst *neutrales Element*. Wird die Gruppe multiplikativ geschrieben, so verwendet man oft das Symbol 1 für das neutrale Element; wird die Gruppe additiv geschrieben, so verwendet man meist das Symbol 0 für das neutrale Element.
4. Sind $a, b \in G$ mit $a \circ b = b \circ a = e$, so heisst b *invers* zu a .
5. Die in der Definition des Gruppenbegriffs geforderten Eigenschaften liessen sich im Prinzip auch noch etwas „sparsamer“ (d.h. mit etwas weniger Voraussetzungen) formulieren, aber darauf kommt es hier nicht an.

Die Eindeutigkeit des inversen Elements

Satz 2.1 (Eindeutigkeit des inversen Elements)

Es sei G eine Gruppe und $x \in G$. Ist y ein zu x inverses Element und z ein Element von G mit der Eigenschaft $x \circ z = e$, so ist $y = z$.

Beweis: $y = y \circ e = y \circ (x \circ z) = (y \circ x) \circ z = e \circ z = z$

Bemerkung: Ein zu x inverses Element y ist also *eindeutig* bestimmt. Es heisst somit **das** Inverse von x und wird (in funktionaler Schreibweise) in der Form x^{-1} geschrieben. Es gilt also

$$x \circ x^{-1} = x^{-1} \circ x = e.$$

Im Falle der additiven Schreibweise $(G, +, 0)$ wird das Inverse von x in der Form $-x$ geschrieben. Es gilt dann $x + (-x) = (-x) + x = 0$.

Aufgabe 2.1 Es sei G eine Gruppe und $x, y \in G$. Zeigen Sie

$$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$$

Aufgabe 2.2 Es sei G eine Gruppe und für alle $x \in G$ sei $x \circ x = e$. Zeigen Sie G ist kommutativ.

2.2 Erste Beispiele

Es gibt ausgezeichnete Bücher oder Internet-Seiten, die den Themen Gruppen, Beispiele für Gruppen und Darstellungen für Gruppen gewidmet sind. Hier seien nur die folgenden erwähnt (der Autor lernt gern über weitere dazu und wird sie gern in dieses Manuskript aufnehmen).

- Budden F. J.: The Fascination of Groups; Cambridge University Press 1972
- Group Explorer: Visualization software for the abstract algebra classroom
<https://nathancarter.github.io/group-explorer/index.html>

Wenn an dieser Stelle noch die folgenden Beispiele aufgeführt sind, dann dient dies im Wesentlichen der weiteren "Dramaturgie" dieses Texts.

2.2.1 Die Deckabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks

Die Menge D_3 der Deckabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen als Gruppenverknüpfung und der identischen Abbildung als neutralem Element.

Gruppenelemente sind:

- 3 Drehungen (um 120, 240 und 360 Grad) um den Schwerpunkt
- 3 Achsenspiegelungen an den (ortsfesten) Mittelsenkrechten
- neutrales Element: Die Drehung um 360 Grad (= 0 Grad), also die identische Abbildung

Diese Gruppe wird auch als *Diedergruppe* D_3 bezeichnet.

Etwas genauer: In der folgenden Abbildung seien A, B und C (ortsfeste) Punkte in der Ebene, die ein gleichseitiges Dreieck bestimmen. S sei der Schwerpunkt dieses Dreiecks.

Weiterhin seien:

- δ_1 die Drehung um S (entgegen dem Uhrzeigersinn) um 120 Grad,
- δ_2 die Drehung um S um 240 Grad,
- δ_3 die Drehung um S um 360 Grad (= 0 Grad).

Schliesslich seien

- σ_1 die (Achsen-) Spiegelung an der (ortsfesten) Achse AS,
- σ_2 die Spiegelung an der Achse BS, und
- σ_3 die Spiegelung an der Achse CS.




Abbildung 2.1: Die Diedergruppe D_3

2.2.2 Diedergruppen

Verwendet man an Stelle eines gleichseitigen Dreiecks ein regelmässiges n -Eck als Ausgangsfigur, so gibt es n Drehungen und n Spiegelungen, welche das n -Eck in sich überführen. Sie bilden die Trägermenge der (aus $2n$ Elementen bestehenden) *Diedergruppe* D_n .

2.2.3 Zweierpotenzen

Die Menge $Pot(2, n) = \{2^x, x \in \mathbb{Z}\}$ mit der gewöhnlichen Multiplikation von Brüchen als Gruppenverknüpfung und der Zahl Eins 1 ($= 2^0$) als neutralem Element.

2.2.4 Gruppen und Zahlbereichserweiterungen

Die Notwendigkeit, jeweils wohlbekannte Zahlbereiche erweitern zu wollen, bestand meist in dem Wunsch, bestimmte in den "alten" Zahlbereichen unlösbare Gleichungen lösbar machen zu können. So führten Gleichungen vom Typ

- $5 + x = 2$ von den natürlichen zu den ganzen Zahlen
- $3 \cdot x = 4$ zu den Brüchen und den rationalen Zahlen

- $x^2 - 5 \cdot x + 2 = 0$ zu den algebraischen Zahlen
- $x^2 = -1$ zu den komplexen Zahlen

(Die Motivation für die nichtalgebraischen ("transzendenten") reellen Zahlen war eine andere.)

Man vervollständigte (besonders in den ersten beiden Beispielen) Zahlbereiche, in denen die Inversenbildung nicht durchgängig möglich war so, dass die Inversenbildung weitestgehend möglich gemacht wurde.

Die Gruppen, zu denen man so gelangte, waren

$(\mathbb{Z}, +, 0)$, $(\mathbb{Q}, +, 0)$, $(\mathbb{Q}^+, \cdot, 1)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot, 1)$, $(\mathbb{R}, +, 0)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot, 1)$, $(\mathbb{C}, +, 0)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot, 1)$

(Dabei sei $\mathbb{Q}^+ := \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$, $\mathbb{Q}^* := \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ und entsprechend $\mathbb{R}^*$ und $\mathbb{C}^*$.)

2.2.5 Die Kleinsche Vierergruppe

Es sei $G := \{(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)\}$. Die Verknüpfung $\oplus$ möge die folgenden Bedingungen erfüllen:

$$\begin{aligned}(1,0) \oplus (1,0) &= (0,0) \\ (1,0) \oplus (0,1) &= (1,1) \\ (1,0) \oplus (1,1) &= (0,1) \\ (0,1) \oplus (0,1) &= (0,0) \\ (0,1) \oplus (1,1) &= (1,0) \\ (1,1) \oplus (1,1) &= (0,0)\end{aligned}$$

Aufgabe: Ergänzen Sie dies (in minimaler Weise) zu einer Gruppentafel – wobei $(0,0)$ das neutrale Element bezüglich $\oplus$ sei.

Die Gruppe $(G, \oplus, (0,0))$ wird als *Kleinsche Vierergruppe*²⁰ bezeichnet.

2.2.6 Die Tetraeder-Drehgruppe

Die Menge der (physich im 3-dimensionalen Euklidischen Raum realisierbaren) räumlichen Bewegungen (Drehungen), die ein regelmässiges *Tetraeder*²¹ in sich überführen, zusammen mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen als Gruppenverknüpfung. Die Tetraeder-Drehgruppe²² besteht aus den folgenden 12 Elementen:

- Die Drehungen jeweils um die Achse durch eine Ecke und den Schwerpunkt der gegenüberliegenden Seite um 60 bzw. 120 Grad.
Dies sind 8 ($= 4 \cdot 2$) Drehungen (eine davon ist in der Abbildung anhand der roten Achse dargestellt).

²⁰ nach Felix Klein benannt

²¹ Tetraeder: Vierflächner oder Vierflach

²² Bei der (vollen) Tetraedergruppe kommen noch "Spiegelungen" hinzu, die sich aber nicht als räumliche Drehungen, sondern nur in der Permutationsdarstellung realisieren lassen.

- Die Drehungen jeweils um die Achse durch die Seitenmitten zweier gegenüberliegender Seiten um 180 Grad. Dies sind 3 Drehungen (eine davon ist in der Abbildung anhand der blauen Achse dargestellt).
- Die identische Abbildung (neutrales Element).




Figure 2.2: Räumliche Drehungen eines Tetraeders

2.3 Gruppentafeln / Cayley-Tafeln

Bei endlichen Gruppen lässt sich die Wirkung der Verknüpfung vollständig in einer tabellenartigen Form, der sogenannten Verknüpfungstafel (auch *Cayley-Tafel*²³ genannt) darstellen. Die folgende Verknüpfungstafel zur Gruppe D_3 ist folgendermassen zu lesen: Das Ergebnis des Produkts

Element linke Spalte mal Element Zeile oben
ist im „Kreuzungspunkt“ dargestellt.

Dabei ist zuerst die Abbildung in der (linken) Spalte und dann die Abbildung in der (oberen) Zeile auszuführen.

$\circ$	δ_0	δ_1	δ_2	σ_1	σ_2	σ_3
δ_0	δ_0	δ_1	δ_2	σ_1	σ_2	σ_3
δ_1	δ_1	δ_2	δ_0	σ_2	σ_3	σ_1
δ_2	δ_2	δ_0	δ_1	σ_3	σ_1	σ_2
σ_1	σ_1	σ_3	σ_2	δ_0	δ_2	δ_1
σ_2	σ_2	σ_1	σ_3	δ_1	δ_0	δ_2
σ_3	σ_3	σ_2	σ_1	δ_2	δ_1	δ_0

Gruppentafel der Diedergruppe D_3

²³ Arthur Cayley, 1821–1895, engl. Mathematiker

Gruppentafel zur Restklassen-Addition: ein konkretes Beispiel $n = 6$:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$

Gruppentafel der (additiven) zyklischen Gruppe $\mathbb{Z}_6$

Aufgabe 2.3: Stellen Sie die Gruppentafel zu der Tetraeder-Drehgruppe auf.

Bemerkung: Das Computeralgebra System **Maxima** verfügt über bequem zu benutzende Grundbefehle zur Erzeugung von Gruppentafeln. Beispiele:

Restklassen-Addition:

```
zn_add_table(6)
matrix(
  [ 0,1,2,3,4,5 ],
  [ 1,2,3,4,5,0 ],
  [ 2,3,4,5,0,1 ],
  [ 3,4,5,0,1,2 ],
  [ 4,5,0,1,2,3 ],
  [ 5,0,1,2,3,4 ] )
```

Restklassen-Multiplikation (hierbei werden nur die "primen" Restklassen berücksichtigt)

```
zn_mult_table(15);
matrix(
  [ 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 ],
  [ 2, 4, 8, 14, 1, 7, 11, 13 ],
  [ 4, 8, 1, 13, 2, 14, 7, 11 ],
  [ 7, 14, 13, 4, 11, 2, 1, 8 ],
  [ 8, 1, 2, 11, 4, 13, 14, 7 ],
  [ 11, 7, 14, 2, 13, 1, 8, 4 ],
  [ 13, 11, 7, 1, 14, 8, 4, 2 ],
  [ 14, 13, 11, 8, 7, 4, 2, 1 ] )
```

2.4 Aggregierende Schreibweisen

Bei multiplikativer Schreibweise: *Potenzierung*

Gruppe: $(G, \circ, e)$; meist mit $e = 1$

- $x^1 := x, \quad x^2 := x \circ x, \quad x^3 := x \circ x \circ x, \dots, x^n := x \circ x^{n-1}, \dots$
- $x^0 = e$ ($= 1$ (bei multiplikativer Schreibweise))
- x^{-1} = Inverses von x bei multiplikativer Schreibweise
- $x^{-2} = x^{-1} \circ x^{-1}, x^{-3} = x^{-1} \circ x^{-2}, \dots, x^{-n} := x^{-1} \circ x^{-(n-1)}, \dots$

Bei additiver Schreibweise: *Vervielfachung*

Gruppe: $(G, +, e)$; meist mit $e = 0$

- $1 \cdot x = x, \quad 2 \cdot x = x + x, \quad 3 \cdot x = x + x + x, \dots, n \cdot x = x + (n-1) \cdot x, \dots$
- $0 \cdot x = e$ ($= 0$ (bei additiver Schreibweise))
- $-1 \cdot x = -x$ = Inverses von x bei additiver Schreibweise
- $-2 \cdot x = (-x) + (-x), \quad -3 \cdot x = (-x) + (-x) + (-x), \dots$
 $-n \cdot x = (-x) + (-(n-1)) \cdot x, \dots$

Bemerkung: Beim gewöhnlichen Potenzieren von (z.B. reellen) Zahlen entsteht immer wieder die Frage: Warum ist $a^0 = 1$ (und nicht etwa, wie manchmal vermutet, gleich 0)? Für eine angemessene Beantwortung dieser Frage ist die Beschäftigung mit dem *Permanenzprinzip* von Hankel²⁴ hilfreich; siehe z.B.:

<https://jochen-ziegenbalg.github.io/materialien/Manuskripte/Zum-Permanenzprinzip.pdf>

3 Untergruppen und Nebenklassen

3.1 Untergruppen

Definition: Sei $(G, \circ, e)$ eine Gruppe und U eine Teilmenge von G mit den Eigenschaften:

- $e \in G$
- Für alle $x, y \in U$ gilt $x \circ y \in U$.
- Für alle $x \in U$ ist $x^{-1} \in U$.

Dann heisst U *Untergruppe* von G ; im Zeichen: $U \leq G$.

Bemerkungen:

- Die Menge U ist also eine Untergruppe von G , wenn sie das neutrale Element von G enthält und bezüglich der Gruppenverknüpfung von G und der Inversenbildung abgeschlossen ist.
- Mit anderen Worten: Ist $(U, \circ, e)$ mit der auf U eingeschränkten Verknüpfung von G und mit dem neutralen Element $e \in G$ ebenfalls eine Gruppe, so ist U eine Untergruppe von G .

²⁴ Hermann Hankel, 1838–1873, deutscher Mathematiker

Beispiele:

Wir betrachten die Gruppe D_3 der Deckabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks (siehe Definition des Gruppenbegriffs).

Mit Hilfe ihrer Gruppentafel ermitteln wir die folgenden Untergruppen:

- die "trivialen" Untergruppen: $\{\delta_0\}$ und D_3 selbst,
- die Untergruppen der Ordnung 2: $\{\sigma_1, \delta_0\}$, $\{\sigma_2, \delta_0\}$ und $\{\sigma_3, \delta_0\}$,
- die Untergruppe der Ordnung 3: $\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$.

Aufgabe 3.1 Zeigen Sie, dass dies alle Untergruppen von D_3 sind.

(Hinweis: Nehmen Sie an, dass ein beliebiges Element x in einer Untergruppe U von enthalten ist und ziehen Sie Schlüsse daraus, welche weiteren Elemente noch in U enthalten sein müssen, damit die Untergruppenkriterien erfüllt sind.)

Aufgabe 3.2

- Ermitteln Sie alle Untergruppen der Gruppe $(\mathbb{Z}, +, 0)$.
- Ermitteln Sie alle Untergruppen der additiven Restklassengruppen für $n = 5, 6, 8$ und 12 .
- Ermitteln Sie alle Untergruppen der Tetraeder-Drehgruppe (siehe Beispiel 2.2.6).

Die Untergruppen einer Gruppe bilden einen "Verband". Dies ist eine algebraische Struktur, die hier nicht näher erläutert werden soll. Verbände lassen sich aber gut visualisieren. In Abbildung 3.1 ist der Untergruppen-Verband der *symmetrischen Gruppe* S_4 dargestellt (zur Gruppe S_4 siehe Definition 5.1).




Figure 3.1: Der Verband der Untergruppen der Gruppe S_4

Quelle: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Symmetric_group_S4;_lattice_of_subgroups_Hasse_diagram;_all_30_subgroups.svg

(Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)

Bezeichnungen: S: symmetrische Gruppe, A: alternierende Gruppe, Dih (dihedral group): Diedergruppe, C (cyclic group): zyklische Gruppe

3.2 Die Links-Multiplikation

Definition: Sei $a \in G$. Die Abbildung $\lambda_a : G \rightarrow G$ mit $\lambda_a(x) = a \cdot x$ heisst *Links-Multiplikation* (genauer eigentlich: Links-Verknüpfung) mit dem Element a .

Beispiele:

$$\begin{array}{llll} \text{Gruppe: } (\mathbb{Q}, \cdot, 1); & a = 2: & \lambda_2(x) = 2 \cdot x & (\text{Verdopplungs-Abbildung}) \\ \text{Gruppe: } (\mathbb{Z}, +, 0); & a = 6: & \lambda_6(x) = 6 + x & (\text{Verschiebung, Translation}) \end{array}$$

Satz 3.1 Die Links-Multiplikation ist bijektiv.

Beweis: Die Umkehrabbildung von λ_a ist die durch das Inverse von a gegebene Links-Multiplikation $\lambda_{a^{-1}}$.

Für alle $x \in G$ gilt also $\lambda_{a^{-1}}(\lambda_a(x)) = \lambda_{a^{-1}}(a \cdot x) = a^{-1} \cdot (a \cdot x) = x \quad (= \lambda_a(\lambda_{a^{-1}}(x)))$.

Entsprechend ist der Begriff der Rechts-Multiplikation ρ_a definiert:

$$\rho_a : G \rightarrow G \quad \text{mit} \quad \rho_a(x) := x \cdot a.$$

3.3 Nebenklassen

Definition: Es sei G eine Gruppe, U eine Untergruppe von G und a ein beliebiges Element von G . Dann heisst die Menge

$$a \circ U := \{a \circ x / x \in U\}$$

die durch a gegebene Links-Nebenklasse (engl. left coset) von U . Entsprechend ist der Begriff der Rechts-Nebenklasse definiert durch

$$U \circ a := \{x \circ a / x \in U\}.$$

Bei multiplikativ geschriebenen Gruppen schreibt man meist kurz aU an Stelle von $a \circ U$ bzw. Ua an Stelle von $U \circ a$.

Bemerkung: Offensichtlich ist $aU = \{\lambda_a(x) : x \in U\} =: \lambda_a(U)$.

Beispiele: Wir betrachten die Gruppe D_3 der Deckabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks (s.o.). Die Links-Nebenklassen der Untergruppe $U := \{\sigma_1, \delta_0\}$ sind:

- $\delta_0 \circ U = \delta_0 \circ \{\sigma_1, \delta_0\} = \{\sigma_1, \delta_0\} = U$
- $\delta_1 \circ U = \delta_1 \circ \{\sigma_1, \delta_0\} = \{\sigma_2, \delta_1\}$
- $\delta_2 \circ U = \delta_2 \circ \{\sigma_1, \delta_0\} = \{\sigma_3, \delta_2\}$
- $\sigma_1 \circ U = \sigma_1 \circ \{\sigma_1, \delta_0\} = \{\delta_0, \sigma_1\} = U$
- $\sigma_2 \circ U = \sigma_2 \circ \{\sigma_1, \delta_0\} = \{\delta_1, \sigma_2\} = \delta_1 \circ U$
- $\sigma_3 \circ U = \sigma_3 \circ \{\sigma_1, \delta_0\} = \{\delta_2, \sigma_3\} = \delta_2 \circ U$

Die Nebenklassen stimmen paarweise überein; es gibt also drei Links-Nebenklassen zur Untergruppe U von G .

Aufgabe 3.3

Geben Sie die Links-Nebenklassen der restlichen Untergruppen von G an.

Aufgabe 3.4

- Ermitteln Sie die Links-Nebenklassen aller Untergruppen der Gruppe aus Beispiel 2.2.5.
- Ermitteln Sie die Links-Nebenklassen aller Untergruppen der Restklassengruppen $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ für $n = 5, 6, 7, 8, 9, 12$.
- Führen Sie Entsprechendes für die Rechts-Nebenklassen durch.

Satz 3.2 (Eigenschaften von Nebenklassen)

Es sei G eine Gruppe und U eine Untergruppe von G . Dann gilt

- Für alle $a, b \in G$ und $x, y \in U$ gilt: Aus $ax = by$ folgt $aU = bU$.
- Für alle $x \in G$ gilt: $x \in U \iff xU = U$.
- Die Nebenklasse xU ist stets gleichmächtig zu U .
- Für alle $x, y \in G$ gilt: $xU = yU \iff y^{-1}x \in U$.
- Für alle x und $y \in G$ gilt: entweder $xU \cap yU = \emptyset$ oder $xU = yU$.
D.h.: Je zwei Nebenklassen von G sind entweder elementefremd oder gleich.
- $G = \dot{\bigcup}_{x \in G} xU$. D.h. G ist die disjunkte Vereinigung der (verschiedenen) Nebenklassen von U .

Beweis:

- Aus $ax = by$ folgt $a = byx^{-1}$. Also gilt für ein beliebiges $w \in U$: $aw = byx^{-1}w \in bU$ und somit, da w ein beliebiges Element von U war: $aU \subseteq bU$. Umgekehrt folgt aus einer symmetrischen Argumentation in a und b : $bU \subseteq aU$. Insgesamt gilt somit $aU = bU$.
- " $\Rightarrow$ ": Es sei $x \in U$. Dann ist (wegen der Abgeschlossenheitseigenschaft von U) $xU = \{xy : y \in U\} \subseteq U$. Weiterhin kann jedes Element $t \in U$ in der Form $t = xy$ (mit einem geeigneten Element $y \in U$) geschrieben werden. Man verwende dazu $t = x^{-1}y$. Also ist $xU = U$.
" $\Leftarrow$ ": Es sei nun $xU = U$. Dann ist insbesondere $xe \in U$, also $x \in U$.
- Dies folgt aus der Tatsache, dass die Links-Multiplikation als Abbildung bijektiv ist.
- Übung
- Angenommen $xU \cap yU \neq \emptyset$. Dann gibt es ein Element z mit $z \in xU \cap yU$. Es gibt also Elemente $u, v \in U$ mit $z = xu = yv$. Daraus folgt $x = xuu^{-1} = yvu^{-1}$ und somit $x \in yU$. Hieraus folgt sofort $xU \subseteq yU$. Aus Symmetriegründen folgt ebenso $yU \subseteq xU$ und insgesamt ist $xU = yU$.
- Für jedes $x \in G$ gilt $x \in xU$.

Bemerkung: Die Eigenschaften (5.) besagt, dass verschiedene Nebenklassen von U disjunkt (elementfremd) sind. Die Eigenschaften (5.) und (6.) besagen, dass die Gesamtheit der Nebenklassen von U eine Zerlegung von G darstellt.

Satz 3.3 (Zusammenfassung)

Es sei G eine Gruppe und U eine Untergruppe von G . Dann gilt: G ist die disjunkte Vereinigung der (gleichmächtigen) (Links-) Nebenklassen von U .

$$G = \dot{\bigcup}_{x \in G} xU \quad (3.1)$$

3.4 Der Index einer Untergruppe

Definition 3.1 Es sei G eine Gruppe und U eine Untergruppe von G . Die Anzahl der Links-Nebenklassen von U in G heisst der *Index* von U in G . Im Zeichen: $|G : U|$.

Beispiel: Die additive Gruppe $Z_{12} := \mathbb{Z}/(12)$ der Restklassen *modulo* 12.

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{6}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{7}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{8}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$
$\bar{9}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$
$\bar{10}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$
$\bar{11}$	$\bar{11}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{8}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$

Gruppentafel der additiven Gruppe Z_{12}

Eine der Untergruppen von Z_{12} ist $\{0, 3, 6, 9\}$. Die Links-Nebenklassen von U sind: $0 + U = \{0, 3, 6, 9\}$, $1 + U = \{1, 4, 7, 10\}$ und $2 + U = \{2, 5, 8, 11\}$.

Probe: Es gibt 3 disjunkte (Links-) Nebenklassen zu je 4 Elementen; $3 \cdot 4 = 12$.

3.5 Der Satz von Lagrange

Satz 3.4 (Lagrange²⁵)

Es sei G eine endliche Gruppe und U eine Untergruppe von G .

Dann gilt: $|G| = |G : U| \cdot |U|$.

Insbesondere gilt die

Folgerung: Die Ordnung jeder Untergruppe ist stets ein Teiler der Gruppenordnung.)

Beweis: Für jede Gruppe G gilt $G = \bigcup_{x \in G} xU$. Da G eine endliche Gruppe ist, gibt es nur endlich viele verschiedene Links-Nebenklassen von U ; diese seien mit $g_1U, g_2U, g_3U, \dots, g_nU$ bezeichnet. Also ist (wegen der Disjunktheits-Eigenschaft²⁶ der Links-Nebenklassen)

$$|G| = |g_1U \dot{\cup} g_2U \dot{\cup} g_3U, \dot{\cup}, \dots, \dot{\cup} g_nU| = |g_1U| + |g_2U| + |g_3U| + \dots + |g_nU|.$$

Da alle Links-Nebenklassen von U gleichmächtig sind, folgt daraus: $|G| = n \cdot |U|$.

Da n als die Anzahl der Links-Nebenklassen von U in G (also als der Index von U in G) definiert war, folgt $|G| = |G : U| \cdot |U|$.

Folgerung und Bemerkung zur und Motivation der Bezeichnungsweise: $|G : U| = \frac{|G|}{|U|}$.

²⁵ Joseph-Louis de Lagrange, 1736–1813, franz. Mathematiker, primäre Wirkungsorte (Mathematik): Berlin und Paris

²⁶ Das Symbol $\dot{\cup}$ soll "disjunkte Vereinigung" andeuten.

4 Gruppen-Homomorphismen

Vorbemerkungen und Grundbegriffe

Die Mathematik des 20. Jahrhunderts war dadurch charakterisiert, dass sie sich besonders der strukturellen Merkmale der untersuchten Objekte annahm. Mit den Strukturen selber rückten dabei fast automatisch die *strukturerhaltenden Abbildungen* in das Blickfeld. In der Algebra werden derartige strukturerhaltende Abbildungen als *Homomorphismen* bezeichnet.

Definition 4.1 Es seien $(G, \circ, e)$ und $(H, \cdot, 1)$ beliebige Gruppen und $f : G \rightarrow H$ eine Abbildung von G in H . Wenn für alle $g, h \in G$ gilt

$$f(g \circ h) = f(g) \cdot f(h) \text{ und } f(g^{-1}) = (f(g))^{-1} \quad (4.1)$$

der letzte Ausdruck wird in Kurzform oft folgendermaßen geschrieben: $f(g)^{-1}$

dann nennt man f einen (Gruppen-) *Homomorphismus*²⁷.

Ist f darüber hinaus bijektiv, so nennt man f einen *Isomorphismus*²⁸. Wenn es einen Isomorphismus zwischen den Gruppen G und H gibt, dann werden die Gruppen "isomorph" genannt; im Zeichen $G \cong H$.

Bemerkung: In der Algebra pflegt man, isomorphe Objekte nicht mehr zu unterscheiden; sie werden dort als "gleich" angesehen. So bezieht sich z.B. die Klassifikation der "einfachen" Gruppen (siehe Definition 9.2) jeweils auf einen Isomorphietyp von jeder Gruppe.

Aufgabe 4.1 $f : G \rightarrow H$ sei ein Homomorphismus.

Zeigen Sie:

- $f(e) = 1$
 - $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$
- (Der letzte Ausdruck wird in Kurzform oft folgendermassen geschrieben: $f(x)^{-1}$).

Beispiele

1. Die "Verdreifachungs-Abbildung" $f : (\mathbb{Z}, +, 0) \rightarrow (\mathbb{Z}, +, 0) : f(x) := 3x$ ist ein Homomorphismus, aber kein Isomorphismus (Übung).
2. Die Verdreifachungs-Abbildung $f : (\mathbb{R}, +, 0) \rightarrow (\mathbb{R}, +, 0) : f(x) := 3x$ ist ein Isomorphismus. (Übung)
3. Die Menge $\mathbb{Z}_2 := \{0, 1\}$ ist mit der folgendermassen definierten Verknüpfung $+$ eine Gruppe: $0 + 0 = 0, \quad 0 + 1 = 1, \quad 1 + 0 = 1, \quad 1 + 1 = 0$.

Die Abbildung $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_2, +)$ sei wie folgt definiert:

$$f(x) := \begin{cases} 0, & \text{wenn } x \text{ eine gerade Zahl ist} \\ 1, & \text{wenn } x \text{ eine ungerade Zahl ist} \end{cases}$$

²⁷ homomorph: strukturerhaltend; von ähnlicher Gestalt

Homomorphismus: verknüpfungstreue Abbildung

²⁸ isomorph: strukturerhaltend; von gleicher Gestalt

Zeigen Sie: f ist ein Homomorphismus.

4. Es sei $\mathbb{R}^+ := \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ die Menge der positiven reellen Zahlen.

Für die Gruppen $G = (\mathbb{R}, +)$ und $H = (\mathbb{R}^+, \cdot)$ ist die Abbildung

$\Phi : G \rightarrow H$ mit $\Phi(x) = 2^x$ ein Isomorphismus, denn

• Φ ist Verknüpfungstreu: $\Phi(x + y) = 2^{x+y} = 2^x \cdot 2^y = \Phi(x)\Phi(y)$

• Φ ist injektiv:

Aus $\Phi(x) = \Phi(y)$ folgt $2^x = 2^y$ und somit $2^{x-y} = 1$.

Daraus folgt $x - y = 0$ und somit (wie zu zeigen war): $x = y$

• Φ ist surjektiv:

Es sei $y \in \mathbb{R}^+$.

Mit $x := \log_2 y$ ist dann $\Phi(x) = 2^x = 2^{\log_2 y} = y$.

Also ist Φ ein Isomorphismus

Aufgabe 4.2

Zeigen Sie anhand von geeigneten Beispielen: Die Links-Multiplikation ist in der Regel kein Homomorphismus.

Definition 4.2

- Ein bijektiver Homomorphismus wird *Isomorphismus* genannt.
- Ein surjektiver Homomorphismus wird *Epimorphismus* genannt.
- Ein injektiver Homomorphismus wird *Monomorphismus* oder auch *Inklusion* (deutsch: *Einbettung*) genannt.

Sonderfall: Homomorphismen der Gruppe G in sich

- Ein Homomorphismus der Gruppe G in sich wird *Endomorphismus* genannt.
- Ein Isomorphismus der Gruppe G in sich wird *Automorphismus* genannt.

Die Abbildung α_g der Gruppe G in sich sei definiert durch:

$$\alpha_g : G \rightarrow G \quad \text{mit} \quad x \rightarrow \alpha_g(x) := g^{-1}xg \quad (\forall x \in G) \quad (4.2)$$

Aufgabe 4.3 Zeigen Sie: α_g ist ein Automorphismus von G .

Definition 4.3 Ein Automorphismus der Form (4.2) wird als *innerer Automorphismus* oder auch als *Konjugation mit g* bezeichnet.

5 Permutationsgruppen

Ist M eine beliebige Menge, so ist die Menge $\text{Sym}(M)$ der Permutationen von M (= Menge der bijektiven Abbildungen von M auf sich) eine Gruppe mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen als Gruppenverknüpfung und der identischen Abbildung als neutralem Element. Die Gruppe wird die *symmetrische Gruppe* von M genannt; eine andere Bezeichnung ist: $S(M)$. Ist M endlich, bestehend aus n Elementen, so schreibt man auch S_n an Stelle von $\text{Sym}(M)$.

Eine Gruppe G wird *Permutationsgruppe* genannt, wenn sie isomorph zu einer Untergruppe einer symmetrischen Gruppe $\text{Sym}(M)$ ist.

Permutationen *endlicher* Mengen können in der Form von Zuordnungstabellen dargestellt werden; die Permutation σ z.B. in der Form

$$\sigma = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f & g & h & j & k \\ f & e & c & k & b & g & j & h & a & d \end{pmatrix} \quad (5.1)$$

Dabei ist $\sigma(a) = f$, $\sigma(b) = e$, $\sigma(c) = c$, $\sigma(d) = k$, $\sigma(e) = b$,
 $\sigma(f) = g$, $\sigma(g) = j$, $\sigma(h) = h$, $\sigma(j) = a$, $\sigma(k) = d$.

Permutationen lassen sich auch in der *Zyklenschreibweise* darstellen; im obigen Beispiel: $\sigma = (a, f, g, j)(b, e)(c)(d, k)(h)$.

Ein Element x mit $\sigma(x) = x$ heisst *Fixpunkt* der Permutation σ . Permutationen ohne Fixpunkte heissen *fixpunktfrei*. Zyklen der Form (x) stellen Fixpunkte dar. Zyklen der Länge 1 werden meist weggelassen; für das obige Beispiel gilt also: $\sigma = (a, f, g, j)(b, e)(d, k)$.

Bemerkung: Da es bei den Permutationen einer Menge M aus mathematischer Sicht im wesentlichen nur auf die Elementzahl der Menge M ankommt, werden wir uns im Folgenden mit Permutationen der Standard-Mengen $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ befassen.

Definition 5.1 Mit S_n wird die Gruppe aller Permutationen der Menge $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ bezeichnet. Sie heisst die *symmetrische Gruppe* über der Menge $\{1, 2, 3, \dots, n\}$.

Satz 5.1 $|S_n| = n!$ (Beweis: Übung)

Aufgabe 5.1 Zeigen Sie: Die Gruppe S_3 ist strukturgleich (*isomorph*) zur Gruppe D_3 .

Bemerkung: Zur Reihenfolge der Ausführung von Permutationen²⁹

Bei der Reihenfolge der Ausführung von Permutationen gibt es unterschiedliche Praktiken. In vielen Teilgebieten der Mathematik ist die *Hintereinanderausführung* (bzw. *Komposition*) $f \circ g$ zweier Funktionen (bzw. Abbildungen) wie folgt definiert:

$$(f \circ g)(x) := f(g(x)) \quad (\text{also: zuerst } g, \text{ dann } f) \quad (5.2)$$

Dies ist im Prinzip eine eindeutige Angelegenheit.

Wenn es sich bei den Abbildungen um Permutationen handelt, lässt man aber in der Regel das Argument x weg (da man ja auf die (bijektiven) Abbildungen selbst und ihre Gruppeneigenschaften bei der Hintereinanderausführung fokussiert ist. Man hat es in der Theorie der Permutationsgruppen dann in der Regel nur noch mit Ausdrücken der Art

$$\sigma \circ \tau \quad (5.3)$$

(mit $\sigma, \tau \in S_n$) zu tun.

Und da stellt sich immer wieder die Frage, welche der Permutationen als erste und welche als zweite auszuführen ist.

²⁹ Zur Verdeutlichung der Sachlage wird im Rahmen dieser Bemerkung das Verknüpfungszeichen $\circ$ bewusst verwendet.

Entsprechend der natürlichen Leserichtung (von links nach rechts) hiesse das: "zuerst σ , dann τ "; entsprechend der Definition (5.2) hiesse es aber "zuerst τ , dann σ ".

Für jede der Verfahrensformen

(1.) "erst rechts, dann links" bzw.

(2.) "erst links, dann rechts"

gibt es gute Gründe.

Für (1.) spricht die übliche Schreibweise, wie sie z.B. aus der Analysis bekannt ist.

Für (2.) spricht der konkrete Umgang mit Transpositionen (also die Unterstützung der natürlichen Leserichtung) und alles, was für die "Postfix-Notation" bzw. die "umgekehrte polnische Notation (UPN)"³⁰ spricht.

Vereinbarung: Wie auch immer, man muss sich nur festlegen. Obwohl im Prinzip vieles für die Variante (2.) spricht³¹, wird im Folgenden nach der (traditionelleren) Variante (1.) verfahren. (Man beachte aber, dass diese Festlegung unabhängig von der Ausführung der Gruppenverknüpfung anhand von Verknüpfungstafeln ist.)

5.1 Transpositionen

Definition 5.2: Zyklen der Länge 2 heissen *Transpositionen*.

Es gilt der **Satz:** Jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Demonstration anhand eines Beispiels

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ 6 & 5 & 3 & 8 & 2 & 7 & 9 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (5.4)$$

Die entsprechende Zyklendarstellung lautet:

$$(1\ 6\ 7\ 9)(2\ 5)(3)(4\ 8\ 0) \quad (5.5)$$

Da man bei Permutationen (wie auch sonst in der Gruppentheorie) sehr bald das Verknüpfungszeichen $\circ$ weglässt, sieht man der Darstellung (5.5) nicht an, ob es sich um eine oder um vier Permutationen handelt. Wenn die Permutationen, wie in (5.5), elementfremd sind, macht das aber keinen Unterschied im Hinblick auf die Ausführung der Permutationen. An-

³⁰ vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Umgekehrte_polnische_Notation

³¹ Beim UPN-Verfahren schreibt man Funktionen bzw. Funktionsanwendungen nicht wie sonst oft in der Form $f(x)$ sondern in der Form xf . In der Konsequenz schreibt man dann statt $(\sigma \circ \tau)(x)$ in UPN-Notation $x(\sigma \circ \tau)$, und das lässt sich in der Regel mit sehr viel weniger Klammern oder ganz klammerfrei in der Form $x\sigma\tau$ ausdrücken. Klammern verursachen bei Computerprogrammen in der Regel, dass ein spezieller Speicher für die Zwischenergebnisse angelegt werden muss. Das kostet Speicherplatz und Zeit (für das Umspeichern). Programmiersprachen, die auf hochgradige Effizienz hin konzipiert sind, wie z.B. Forth (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Forth_\(Programmiersprache\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Forth_(Programmiersprache))), verwenden deshalb gern die umgekehrte polnische Notation. In technischer Hinsicht hängt dies eng mit der Verwendung von sogenannten "stack"-Speichern (Stapel-Speicher, Kellerspeicher, siehe: <https://de.wikipedia.org/wiki/Stapelspeicher>) zusammen.

ders sieht es aus, wenn die Zyklendarstellung von Permutationen nicht aus elementfremden Zyklen besteht.

Die Darstellung (5.5) lässt sich wie folgt in ein Verknüpfungs-Produkt von Transpositionen auflösen (zur Erinnerung: Leserichtung von rechts nach links):

$$(1\ 6\ 7\ 9) = (1\ 6)(6\ 7)(7\ 9)$$

$$(4\ 8\ 0) = (4\ 8)(8\ 0)$$

also ist insgesamt

$$\sigma = (1\ 6\ 7\ 9)(2\ 5)(3)(4\ 8\ 0) = (1\ 6)(6\ 7)(7\ 9)(2\ 5)(4\ 8)(8\ 0)$$

Definition 5.3 Eine Permutation heisst *gerade*, wenn sie sich als Produkt einer *geraden Anzahl von Transpositionen* darstellen lässt.

Die Gruppe aller geraden Permutationen von n Elementen wird als *alternierende Gruppe* A_n bezeichnet.

Satz 5.2 Die Gesamtheit A_n der geraden Transpositionen über der Menge $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ ist (mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen) eine Gruppe; genauer: eine Untergruppe vom Index 2 der symmetrischen Gruppe S_n .

Beweis: Übung

Aufgabe 5.2

Ermitteln Sie die Gruppen A_3 und A_4 in der Permutationsdarstellung.

Zeigen Sie: Die alternierende Gruppe A_4 ist isomorph zur Tetraeder-Drehgruppe.

Bemerkung: Permutationsgruppen stellen nicht einfach ein weiteres Beispiel für Gruppen dar, sondern sie verkörpern die Vielfalt und die wesentlichen Merkmale des Gruppenbegriffs. Denn nach dem **Satz von Cayley** über Permutationsgruppen gilt:

Satz 5.3 Jede Gruppe ist isomorph zu einer Permutationsgruppe.³²

Beweis: Die Linksmultiplikation $\lambda_g : x \rightarrow g \cdot x$ ist eine bijektive Abbildung der Gruppe G auf sich und damit ein Element von $\text{Sym}(G)$, die mit der natürlichen Verknüpfung der Hintereinanderausführung eine Gruppe bildet. Wir betrachten nun die folgende Abbildung:

$$T : G \rightarrow \text{Sym}(G) \quad \text{mit} \quad T(g) := \lambda_g \quad (5.6)$$

Behauptung: T ist ein injektiver Homomorphismus (eine Einbettung) von G in $\text{Sym}(G)$.

- Zur Homomorphie-Eigenschaft der Abbildung T :

Zu zeigen ist $T(g \cdot h) = T(g) \cdot T(h)$ bzw. $\lambda_{g \cdot h} = \lambda_g \circ \lambda_h$.

Für alle $x \in G$ ist $\lambda_{g \cdot h}(x) = (g \cdot h) \cdot x$

Andererseits ist $(\lambda_g \circ \lambda_h)(x) = \lambda_g(\lambda_h(x)) = \lambda_g(h \cdot x) = g \cdot (h \cdot x)$.

Aus der Assoziativität der Gruppen-Verknüpfung folgt, dass T ein Homomorphismus ist.

- Zur Injektivität der Abbildung T :

Es sei $T(g) = T(h)$. Daraus folgt für alle $x \in G$: $\lambda_g(x) = \lambda_h(x)$ und somit $g \cdot x = h \cdot x$. Und

³² Zitat Wikipedia: Der Satz von Cayley bildet damit einen Ausgangspunkt der Darstellungstheorie, die eine gegebene Gruppe untersucht, indem sie ihre Darstellungen auf konkreten und gut verstandenen Gruppen nutzt. ... Permutationsgruppen sind sehr praktisch in dem Sinne, dass man ihre Elemente (die Permutationen) bequem aufschreiben und leicht mit ihnen rechnen kann. Dies ist insbesondere in der Computeralgebra nützlich.

daraus folgt $g = h$. Also ist T injektiv.

Eine schöne Anwendung der Permutationsidee ist zu finden in Ringel C.M.: Permutationen: Das Fotoautomaten-Paradox und andere Überraschungen: <https://www.math.uni-bielefeld.de/~ringel/lectures/monalisa/Welcome.htm>

6 Erzeugende Elemente und zyklische Gruppen

Satz 6.1 (Durchschnittsbildung und Untergruppen):

1. Der Durchschnitt zweier Untergruppen einer Gruppe G ist eine Untergruppe von G .
2. Der Durchschnitt beliebig vieler Untergruppen einer Gruppe G ist eine Untergruppe von G .

Beweis: Übung

Definition 6.1 Es sei G eine Gruppe und M eine Teilmenge von G . Weiterhin sei

$$D = \bigcap_{M \subseteq U \leq G} U \quad (6.1)$$

der Durchschnitt aller Untergruppen U von G , welche die Menge M enthalten. Dann ist D ebenfalls eine Untergruppe von G ; sie wird als die von der Menge M *erzeugte* Untergruppe bezeichnet; im Zeichen: $\langle M \rangle$.

Besteht die Menge M aus endlich vielen Elementen so sagt man, die Untergruppe $\langle M \rangle$ von G ist *endlich erzeugt*.

Besteht die Menge M nur aus einem Element x , ist also $M = \{x\}$, so schreibt man auch kurz $\langle x \rangle$ an Stelle von $\langle \{x\} \rangle$ und bezeichnet $\langle x \rangle$ als die von dem Element x erzeugte Untergruppe von G .

Gruppen, die von einem Element x erzeugt sind, heissen *zyklische* Gruppen.

Bemerkung: Es sei G eine zyklische Gruppe; etwa $G = \langle x \rangle$. Aufgrund der Abgeschlossenheit von G , muss G alle Produkte der Form $x, x^2, x^3, \dots, x^n, \dots$ sowie das neutrale Element e enthalten. In endlichen Gruppen sind diese Element jedoch nicht alle verschieden. Es muss also ein $n \in \mathbb{N}$ geben mit der Eigenschaft $x^n = e$. Das kleinste derartige n ist die Ordnung der zyklischen Gruppe $\langle x \rangle$.

Beispiele:

1. Die Menge der rationalen Zahlen (mit der gewöhnlichen Multiplikation) enthält die zyklische Gruppe $\langle 2 \rangle = \{2^x : x \in \mathbb{Z}\}$; m.a.W.: die (multiplikativ geschriebene) zyklische Gruppe besteht aus den Elementen $2, 2^2, 2^3, \dots, 2^n, \dots$ sowie $2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}, \dots, 2^{-n}, \dots$ und dem neutralen Element $2^0 (= 1)$.
2. Die Menge der ganzen Zahlen (mit der gewöhnlichen Addition) enthält die zyklische Gruppe $\langle 6 \rangle$ der durch 6 teilbaren ganzen Zahlen; m.a.W.: die (additiv geschriebene)

zyklische Gruppe $\langle 6 \rangle$ besteht aus den Elementen $6, 12, 18, 24, \dots$, sowie $-6, -12, -18, -24, \dots$ und dem neutralen Element 0 .

3. Die zyklische Gruppe der ebenen Drehungen eines regelmässigen 8-Ecks besteht aus den 8 folgenden Drehungen (etwa im Uhrzeigersinn):

$\delta_1 = \text{Drehung um } 45 \text{ Grad}$

$\delta_2 = \text{Drehung um } 90 \text{ Grad}$

$\delta_3 = \text{Drehung um } 135 \text{ Grad}$

$\dots$

$\delta_6 = \text{Drehung um } 270 \text{ Grad}$

$\delta_7 = \text{Drehung um } 315 \text{ Grad}$

$\delta_8 = \text{Drehung um } 360 \text{ Grad} = \text{Drehung um } 0 \text{ Grad} =: \delta_0$

(letzteres ist das neutrale Element bzw. die identische Abbildung)

4. Die (additive) Gruppe $\mathbb{Z}/(n)$ ($= \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) der Restklassen *modulo* n ist eine zyklische Gruppe, die z.B. von dem Element (der Restklasse) $\bar{1}$ erzeugt wird.

Für $n = 6$ ist z.B.: $\mathbb{Z}/(6) = \{\bar{1}, \bar{1} + \bar{1}, \bar{1} + \bar{1} + \bar{1}, \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1}, \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1}, \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1} + \bar{1}\}$ bzw. $\mathbb{Z}/(6) = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$ (mit $\bar{6} = \bar{0}$)

Bemerkung: Es sei G eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung n ; etwa

$G = \langle x \rangle = \{x, x^2, x^3, \dots, x^{n-1}, x^n\}$. Dann gilt $x^n = e$ und $x^{-1} = x^{n-1}$.

Definition 6.2

Sei G eine Gruppe und $x \in G$. Als *Ordnung* des Elements x (im Zeichen: $\text{ord}(x)$) wird die kleinste positive natürliche Zahl n bezeichnet, für die die Gleichung $x^n = e$ gilt.

Mit anderen Worten: Die Ordnung des Elements x ist gleich der Ordnung der Untergruppe $\langle x \rangle$ von G ; im Zeichen: $\text{ord}(x) = |\langle x \rangle|$.

Aufgabe 6.1

G sei eine Gruppe, in der jedes Element höchstens die Ordnung 2 hat. Zeigen Sie: G ist kommutativ.

Bemerkung: Die wohl bekannteste Gruppe mit dieser Eigenschaft ist die *Kleinsche Vierergruppe*.

Aufgabe 6.2

Informieren Sie sich über die Kleinsche Vierergruppe (siehe Beispiel 2.2.5).

Satz 6.2 (Ordnung von Gruppenelementen):

Sei G eine endliche Gruppe der Ordnung n und x ein beliebiges Element von G . Dann gilt:

(i) Die Ordnung des Elements x ein Teiler der Gruppenordnung: $\text{ord}(x) \mid |G|$.

(ii) $x^n = e$

Beweis: (i) Dies ist eine unmittelbare Folgerung aus dem Satz von Lagrange.

(ii) Es sei k der Index der Untergruppe $\langle x \rangle$ in G und r die Ordnung von x . Nach dem Satz von Lagrange gilt $|G| = |G : \langle x \rangle| \cdot \text{ord}(x)$ bzw. $n = k \cdot r$. Mit diesen Bezeichnungen gilt: $x^n = x^{k \cdot r} = (x^r)^k = e^k = e$.

Für zyklische Gruppen gelten schliesslich die sehr leicht zu beweisenden Aussagen:

- Jede Gruppe von Primzahlordnung ist zyklisch.
- Jede zyklische Gruppe ist kommutativ.

7 Gruppen primer Restklassen

Zum Auffrischen zahlentheoretischer Grundbegriffe wird ggf. ein Blick in den Anhang A empfohlen.

Satz 7.1 (Gruppen primer Restklassen)

Es sei $\mathbb{Z}_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ die Menge der Restklassen *modulo* n . Die Menge $G_n \subseteq \mathbb{Z}_n$ sei definiert durch:

$$G_n := \{x \in \mathbb{Z}_n : \text{ggT}(x, n) = 1\}$$

G_n enthält also genau die Restklassen, deren Repräsentant teilerfremd zu n ist. Dann bildet G_n mit der Restklassenmultiplikation eine Gruppe, die Gruppe der *Einheiten*³³ von $\mathbb{Z}_n$. Sie wird auch als die Gruppe der *primen Restklassen modulo* n bezeichnet.

Beweis:

- Zum neutralen Element: Das neutrale Element $\bar{1}$ ist offensichtlich in G_n enthalten.
- Zur multiplikativen Abgeschlossenheit: Es ist zu zeigen: Sind $\bar{a}$ und $\bar{b}$ Elemente von G_n , dann ist auch $\bar{a} \cdot \bar{b}$ ein Element von G_n . Dazu ist zu zeigen: Ist $\text{ggT}(a, n) = 1$ und $\text{ggT}(b, n) = 1$, dann ist auch $\text{ggT}(a \cdot b, n) = 1$. Dies folgt aber unmittelbar aus dem Satz von der eindeutigen Primfaktorzerlegung.
- Zur Abgeschlossenheit bezüglich der Inversenbildung: Zu zeigen: Jedes Element $\bar{a}$ besitzt ein Inverses in G_n . Sei also $\text{ggT}(a, n) = 1$. Dann gibt es nach dem EBBB-Lemma ganze Zahlen x und y mit der Eigenschaft $1 = x \cdot a + y \cdot n$. Man findet diese ganzen Zahlen x und y mit Hilfe des erweiterten Euklidischen Algorithmus (Berlekamp Algorithmus). In $\mathbb{Z}_n$ bedeutet dies $\bar{1} = \bar{x} \cdot \bar{a}$. Es ist noch zu zeigen, dass x teilerfremd zu n ist. Wäre es dies nicht, so hätte erst recht das Produkt $x \cdot a$ einen gemeinsamen Primfaktor mit n und könnte nicht kongruent zu 1 *modulo* n sein. Das mit dem Berlekamp Algorithmus zu findende Element $\bar{x}$ liegt also in G_n und ist somit das Inverse von $\bar{a}$.

Folgerungen

- Die Gruppe der primen Restklassen *modulo* n hat per Definition die Ordnung $\varphi(n)$, wo φ die *Eulersche Funktion* ("Totientenfunktion") ist.
- Ist p eine Primzahl, so hat die Gruppe der primen Restklassen *modulo* p die Ordnung $p - 1$.

Beweis: Dies sind direkte Umsetzungen der Definition der Eulerschen Totientenfunktion, vgl. z.B. [Ziegenbalg 2015].

Aufgabe 7.1 Zeigen Sie:

- Ist p eine Primzahl so ist sie für $0 < k < p$ ein Teiler von $\binom{p}{k}$.
- Ist p eine Primzahl, so gilt im Restklassenring $\mathbb{Z}_p$: $(x + y)^p = x^p + y^p$.

Hinweis: Stellen Sie $(x + y)^p$, in "ausmultiplizierter" Form dar.

³³ Als *Einheiten* eines Rings werden die multiplikativ invertierbaren Elemente bezeichnet.

7.1 Primitivwurzeln

In seiner legendären Veröffentlichung „Disquisitiones Arithmeticae“ (vgl. Literaturverzeichnis) untersuchte C.F. Gauß die Bedingungen, unter denen die Gruppe der primen Restklassen von $\mathbb{Z}_n$ zyklisch ist und wie viele erzeugende Elemente (bzw. Primitivwurzeln, wie sie damals genannt wurden) es dann gibt.

Wir zitieren³⁴ den

Satz 7.2: Für die Einheitengruppe des Restklassenrings $\mathbb{Z}_n$ gilt:

- (i) Die Gruppe besitzt genau dann Primitivwurzeln, wenn ihre Ordnung von der Form $2, 4, p^k$ oder $2 \cdot p^k$ für eine natürliche Zahl k und eine ungerade Primzahl p ist.
- (ii) Wenn es im Restklassenring Primitivwurzeln gibt, dann ist ihre Anzahl gleich $\varphi(\varphi(n))$.

Bemerkungen: Die Voraussetzung zu diesem Satz (Teil (ii)) ist wesentlich: Es ist zwar $\varphi(\varphi(15)) = \varphi(8) = 4$; da es aber keine Primitivwurzeln modulo 15 gibt³⁵, bleibt die Gesamtaussage des Satzes wahr. Ist g eine Primitivwurzel von $\mathbb{Z}_n$, dann ist die Gruppe der Einheiten von $\mathbb{Z}_n$ gleich $\{g, g^2, g^3, \dots, g^k, \dots, g^{\varphi(n)} = g^0\}$. Man betrachte die von g^k erzeugte Untergruppe; g^k ist genau dann eine Primitivwurzel, wenn k teilerfremd zu $\varphi(n)$ ist. Und davon gibt es nach Definition genau $\varphi(\varphi(n))$ Elemente.

8 Die Sätze von Fermat, Euler und Wilson

Satz 8.1 (Lagrange, Euler³⁶)

Es sei n eine ganze Zahl und a eine zu n teilerfremde ganze Zahl.

Dann gilt $a^{\varphi(n)} = 1 \pmod{n}$.

Satz 8.2 (Fermat³⁷)

Es sei p eine Primzahl und a eine ganze Zahl, die nicht von p geteilt wird.

Dann gilt $a^{p-1} = 1 \pmod{p}$.

Beweis: Die beiden letzten Sätze folgen unmittelbar aus dem Satz von Lagrange (bzw. dem Satz über die Ordnung von Gruppenelementen), angewandt auf die Gruppe der primen Restklassen.

Satz 8.3 (Wilson³⁸) Für jede natürliche Zahl n gilt:

$$n \text{ ist eine Primzahl} \iff (n-1)! = -1 \pmod{n} \quad (8.1)$$

³⁴ in heutiger Notation

³⁵ Die Einheitengruppe ist isomorph zur Kleinschen Vierergruppe, in der jedes Element selbstinvers ist.

³⁶ Leonhard Euler, 1707–1783, Schweizer Mathematiker; primäre Wirkungsorte (Mathematik): Basel, Berlin, St. Petersburg

³⁷ Pierre de Fermat, 1607–1665, französischer Jurist und Mathematiker

³⁸ John Wilson, 1741–1793, britischer Mathematiker

Beweis: (i) Es sei n eine Primzahl. Die (zyklische, multiplikative) Gruppe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ der primen Restklassen modulo n besteht aus den $n - 1$ Elementen

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \dots, \overline{k}, \dots, \overline{n-3}, \overline{n-2}, \overline{n-1}. \quad (8.2)$$

Zwischenbehauptung: Aus $\overline{k}^2 = \overline{1}$ folgt $k = 1$ oder $k = n - 1$. Denn aus $k^2 = 1 \pmod{n}$ folgt n teilt $k^2 - 1$. Das heisst n teilt $(k - 1) \cdot (k + 1)$ und da n nach Voraussetzung eine Primzahl ist, folgt daraus n teilt $k - 1$ oder n teilt $k + 1$. Die einzig möglichen Fälle für k sind dann $k = 1$ (d.h. $k - 1 = 0$) oder $k = n - 1$ (d.h. $(k + 1) = n$). (Ende der Zwischenbehauptung)

Für $n - 1$ gilt: $(n - 1)^2 = n^2 - 2n + 1$ ist kongruent zu 1 modulo n . Die einzigen *selbstinversen* Element in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sind also $\overline{n - 1}$ und $\overline{1}$. In der Gruppe der primen Restklassen von $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ hat also, abgesehen von $\overline{n - 1}$ und $\overline{1}$, jedes Element ein von ihm verschiedenes Inverses. Und deshalb ergänzen sich im Ausdruck

$$(n - 1)! \quad (= \overline{1} \cdot \overline{2} \cdot \overline{3} \cdot \dots \cdot \overline{k} \cdot \dots \cdot \overline{n - 3} \cdot \overline{n - 2} \cdot \overline{n - 1}) \quad (8.3)$$

(abgesehen von den Faktoren $\overline{n - 1}$ und $\overline{1}$) alle Faktoren paarweise (zu $\overline{1}$) auf und wir erhalten das Ergebnis:

$$(n - 1)! = n - 1 = -1 \pmod{n} \quad (8.4)$$

(ii) Es sei nun andererseits n keine Primzahl, etwa $n = a \cdot b$. Dann sind a und b kleiner als n und die Restklassen $\overline{a}$ und $\overline{b}$ treten im Produkt (8.3) als Faktoren auf. Das Produkt ist dann also gleich Null modulo n – und die Gleichung in (8.1) gilt nicht.

9 Normalteiler, Faktorgruppen, einfache Gruppen

9.1 Normalteiler

Aufgabe 9.1: Sei $U \leq G$ ³⁹. Zeigen Sie (etwa am Beispiel der Gruppe D_3), dass für Nebenklassen in der Regel **nicht** gilt:

$$xU = Ux \quad (9.1)$$

Definition 9.1: Falls die Gleichung (9.1) für alle $x \in G$ erfüllt ist, nennt man U einen *Normalteiler*⁴⁰ von G .

Bezeichnungen: U sei ein Normalteiler der Gruppe G .

- $U \trianglelefteq G$: U ist ein Normalteiler von G ; dabei ist möglich: $U = G$.
- $U \triangleleft G$: U ist ein echter Normalteiler von G ; d.h. (in der Regel) $U \neq G$.
- $U \triangleleftneq G$: U ist ein von G verschiedener Normalteiler von G .
 $\neq$ (Durch diese Bezeichnung soll besonders deutlich gemacht werden, dass U eine echte Teilmenge von G ist.)

³⁹ Diese Ausdrucksweise wird als Abkürzung für den Ausdruck "Sei G eine Gruppe und U eine Untergruppe von G " verwendet

⁴⁰ ältere Bezeichnung: invariante Untergruppe; engl.: normal subgroup

Bemerkung: Die Bedingung (9.1) kann als eine Art verallgemeinerter Kommutativität angesehen werden. Dies spielt besonders im Zusammenhang mit der Lösung von Polynomgleichungen und "auflösbaren" Gruppen eine wichtige Rolle.

Aufgabe 9.2

1. Zeigen Sie: Bedingung (9.1) ist gleichwertig zu:

(a) Für alle $x \in G$ und für alle $u \in U$ gilt: $x^{-1}ux \in U$

(b) Für alle $x \in G$ gilt $x^{-1}Ux = U$

Eine Untergruppe U ist also ein Normalteiler, wenn sie durch jeden inneren Automorphismus von G auf sich abgebildet wird.

2. Zeigen Sie Normalteiler in den bisher behandelten Beispielen auf.
3. Zeigen Sie anhand der bisher behandelten Beispiele Untergruppen auf, die keine Normalteiler sind.
4. Zeigen Sie: Jede Untergruppe einer abelschen Gruppe ist ein Normalteiler.
5. Zeigen Sie: Jede Untergruppe vom Index 2 ist ein Normalteiler.

In Abbildung 9.1 ist der Untergruppen-Verband der Symmetrischen Gruppe S_4 unter Berücksichtigung der Normalteiler dargestellt. Die Normalteiler sind dabei durch dicke Punkte und die Normalteiler-Relationen durch dick gezeichnete Verbindungslinien dargestellt. (Man beachte: Die eingezeichneten Normalteiler sind jeweils nur Normalteiler in Bezug auf die unmittelbar "darüber" liegende Gruppe.)




Figure 9.1: Normalteiler in der Gruppe S_4 ; vgl. Abb. 3.1

"dicke" Linien bedeuten "Normalteiler" zwischen den jeweiligen Endpunkten

Offensichtlich ist: Jede Gruppe G besitzt die "trivialen" Normalteiler $\{1\}$ und G .

Definition 9.2 Gruppen, die nur die trivialen Normalteiler besitzen, heissen *einfache Gruppen*⁴¹.

Wie wir in Abschnitt 6 gesehen haben, ist jede Gruppe von Primzahlordnung zyklisch und einfach (Satz von Lagrange). Dies führt zu einem unendlichen Vorrat von kommutativen einfachen Gruppen. Die nichtkommutativen einfachen Gruppen treten sehr viel seltener auf. Ihre Ordnungen sind z.B. in der *Online Encyclopedia of Integer Sequences*, OEIS A001034, beschrieben. Die Ordnungen der ersten Glieder dieser Folge sind: 60, 168, 360, 504, 660, 1092, 2448, 2520, 3420, 4080, 5616, 6048, 6072, 7800, 7920, 9828, ... (Man vergleiche hierzu das Zitat von H. Wielandt in der Fussnote.)

9.2 Faktorgruppen

Definition 9.3 Es sei N ein Normalteiler der Gruppe G . Mit G/N sei die Menge der Nebenklassen von N in G bezeichnet. Dann kann durch die folgende Definition

$$xN \cdot yN := xyN \quad (9.2)$$

eine Gruppenverknüpfung auf der Menge der Nebenklassen definiert werden.

Die so gebildete neue Gruppe $(G/N, \cdot, N)$ wird als *Faktorgruppe* von G modulo N (gelegentlich sprachlich auch ausgedrückt als "Faktorgruppe von G nach N ") bezeichnet.

Aufgabe 9.3 Erläutern Sie, warum die Definition (9.2) sinnvoll ist und warum etwas Entsprechendes nicht funktioniert, wenn N nur eine Untergruppe (und kein Normalteiler) von G ist. Zeigen Sie, dass die Definition (9.2) wohldefiniert⁴² ist.

Aufgabe 9.4 Es sei N ein Normalteiler der Gruppe G . Dann ist die Abbildung

$$\varphi : G \rightarrow G/N$$

mit $\varphi(g) := gN$ ein Gruppen-Epimorphismus (d.h. ein surjektiver Gruppen-Homomorphismus).

Definition 9.4 Die Abbildung $\varphi : G \rightarrow H$ sei ein Homomorphismus der Gruppe G in die Gruppe H . Die Menge $\text{Ker}(\varphi) := \{x \in G : \varphi(x) = 1\}$ wird als der *Kern* von φ bezeichnet. Die Menge $\text{Im}(\varphi) := \varphi(G) := \{\varphi(x) : x \in G\}$ wird als das *Bild* von G unter der Abbildung φ bezeichnet.

Aufgabe 9.5 Die Abbildung $\varphi : G \rightarrow H$ sei ein Homomorphismus der Gruppe G in die Gruppe H .

1. Zeigen Sie: Der Kern von φ ist ein Normalteiler von G .
2. Das Bild $\text{Im}(\varphi)$ ist eine Untergruppe von H .
3. Die Faktorgruppe $G/\text{Ker}(\varphi)$ ist isomorph zu $\text{Im}(\varphi)$.

⁴¹ An dieser Stelle ist das folgende Zitat (sinngemäss) von H. Wielandt (Univ. Tübingen) unverzichtbar: „Eine Gruppe heisst einfach, wenn sie besonders kompliziert ist.“

⁴² d.h. unabhängig von der Wahl der jeweiligen Repräsentanten

10 Direkte Produkte

Die Konstruktion des “direkten Produkts” gibt es praktisch in jeder mathematischen Struktur. Sie dient dazu,

- neue Objekte aus bekannten, bestehenden Objekten zu konstruieren
- die Struktur komplexer Objekte durch den Rückgriff auf einfachere, bereits bekannte Objekte transparent zu machen.

Die Konstruktion von direkten Produkten basiert zunächst immer auf dem cartesischen Produkt der beteiligten Trägermengen.

Im Folgenden wird das direkte Produkt von Gruppen für den Fall multiplikativ geschriebener Gruppen erläutert. Als Symbol für die Gruppenverknüpfung bei den bestehenden Gruppen wird das Symbol $\cdot$ und für die Gruppenverknüpfung des direkten Produkts wird (vorerst) das Symbol $\circ$ verwendet

10.1 Direkte Produkte von Gruppen

Definition 10.1 Das *direkte Produkt* zweier Gruppen G und H ist wie folgt definiert:

1. Die *Trägermenge* des direkten Produkts ist das *cartesische Produkt*⁴³ der Mengen G und H :

$$G \times H = \{(x, y) : x \in G \text{ und } y \in H\} \quad (10.1)$$

2. Die Gruppenverknüpfung des direkten Produkts wird “komponentenweise” definiert:

$$(a, b) \circ (c, d) := (a \cdot b, c \cdot d) \quad (10.2)$$

(Wobei links mit $\circ$ das neue und rechts mit $\cdot$ die alten Verknüpfungszeichen gemeint sind.)

Folgerung Das neutrale Element ist $(1, 1)$ und für die inversen Elemente gilt: $(a, b)^{-1} = (a^{-1}, b^{-1})$.

Bemerkung und Aufgabe Zeigen Sie: Für drei Gruppen A , B und C sind offenbar die direkten Produkte $(A \times B) \times C$ und $A \times (B \times C)$ isomorph.

Man lässt deshalb (auch im Fall von vier und mehr Gruppen) die Klammern weg und schreibt z.B. einfach $A \times B \times C$.

Beispiele

1. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$: *Kleinsche Vierergruppe*⁴⁴. Sie unterscheidet sich von der einzigen anderen Gruppe der Ordnung 4, der zyklischen Gruppe $\mathbb{Z}_4$, z.B. dadurch, dass letztere (aber nicht erstere) Elemente der Ordnung 4 enthält.

⁴³ nach René Descartes, genannt Cartesius, 1596–1650, französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler

⁴⁴ nach Felix Klein benannt

2. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$: Sie ist isomorph zu $\mathbb{Z}_6$, aber nicht zu D_3 , da erstere (aber nicht letztere) kommutativ ist.
3. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ und $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$: Dies sind die nichtzyklischen, kommutativen Gruppen der Ordnung 8.
4. $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$: Dies ist die einzige nichtzyklische Gruppe der Ordnung 9.
5. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$: Sie ist isomorph zur zyklischen Gruppe $\mathbb{Z}_{10}$
6. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
7. $2\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z}$ Dies ist das direkte Produkt aus den geraden und den durch 3 teilbaren Zahlen.
8. Auch gemischte direkte Produkte aus endlichen und unendlichen Gruppen sind möglich. Z.B. (im Falle von additiv geschriebenen Gruppen) $\mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ u.s.w.
9. Auch direkte Produkte aus abelschen und nicht-abelschen Gruppen sind möglich; z.B. $D_3 \times \mathbb{Z}_2$

Aufgabe 10.1

- Interpretieren und begründen Sie: $|A| \times |B| = |A| \cdot |B|$.
- Zeigen Sie: Sind A und B abelsche Gruppen, so auch $A \times B$.
- Zeigen Sie: Die natürliche Zahl n sei das Produkt zweier unterschiedlicher Primzahlen p und q ($n = p \cdot q$). Dann gilt: $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ ist isomorph zu der zyklischen Gruppe $\mathbb{Z}_n$ ($= \mathbb{Z}_{p \cdot q}$).

10.2 Der Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen

Der Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen (auch als *Struktursatz* bezeichnet), liefert eine vollständige Klassifikation dieser Gruppen.

Die Bausteine abelscher Gruppen sind:

- Im Fall endlicher Gruppen: Die zyklischen Gruppen, deren Ordnung eine Primzahl oder eine Primzahlpotenz ist.
- Im unendlichen Fall: Die (additive) Gruppe der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$.

Der Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen besagt, dass alle endlich erzeugten abelschen Gruppen aus diesen Bausteinen zusammengesetzt sind:

Satz 10.1 Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen

Jede endlich erzeugte abelsche Gruppe G ist zu einer endlichen direkten Summe von zyklischen Gruppen, deren Ordnung die Potenz einer Primzahl ist, und unendlichen zyklischen Gruppen isomorph.

Beispiel: Die abelschen Gruppen der Ordnung 8 sind (bis auf Isomorphie):

- $\mathbb{Z}/(8)$: zyklische Gruppe der Ordnung 8
- $\mathbb{Z}/(4) \times \mathbb{Z}/(2)$
- $\mathbb{Z}/(2) \times \mathbb{Z}/(2) \times \mathbb{Z}/(2)$

11 Subnormalreihen, Kompositionsreihen, auflösbare Gruppen

11.1 Subnormalteiler und Subnormalreihen

Definition 11.1 Ist N ein Normalteiler der Gruppe G und M ein Normalteiler von N , so wird M als *Subnormalteiler* (engl. *subnormal subgroup*) von G bezeichnet.

Im Zeichen: $M \triangleleft N \triangleleft G$

Aufgabe 11.1 Zeigen Sie anhand der bisher behandelten Untergruppen: Es sein G eine Gruppe und M ein Subnormalteiler von G . Dann muss M nicht notwendigerweise ein Normalteiler von G sein.

Definition 11.2 Eine endliche, absteigende Reihe von Untergruppen der Gruppe G

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_{k-1} > G_k > \cdots > G_n = \{e\} \quad (11.1)$$

heisst *Subnormalreihe*, wenn jede Untergruppe ein Normalteiler ihres Vorgängers ist, wenn also für $k \geq 1$ stets gilt: $G_k \triangleleft G_{k-1}$. Die “Faktoren” dieser Reihe sind die Faktorgruppen G_{k-1}/G_k .

Ist jede der Untergruppen G_i sogar ein Normalteiler von G , dann heisst die Reihe *Normalreihe*.

Eine Subnormalreihe heisst *Kompositionsreihe*, falls jeder ihrer Faktoren G_{k-1}/G_k eine einfache Gruppe ist, sie heisst *auflösbare Reihe*, wenn jeder ihrer Faktoren eine kommutative Gruppe (abelsche Gruppe) ist.

Eine Gruppe heisst *auflösbar*, wenn sie eine Subnormalreihe mit abelschen Faktorgruppen (also eine auflösbare Reihe) besitzt.

Aufgabe 11.2 Machen Sie sich klar: Ist G eine abelsche Gruppe, so ist jede ihrer Untergruppen ein Normalteiler und jede Reihe von Untergruppen eine Normalreihe und damit auch eine Subnormalreihe.

Bemerkung: Eines der berühmtesten Ergebnisse über endliche, auflösbare Gruppen ist der

Satz von Feit-Thompson: *Jede Gruppe ungerader Ordnung ist auflösbar.*

Zitat (https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Feit-Thompson) Trotz der beeindruckend einfachen Formulierung dieses Satzes sind keine zugänglichen Beweise bekannt. Der Satz wurde bereits 1911 von William Burnside vermutet, konnte aber erst 1963 von W. Feit⁴⁵ und J. G. Thompson⁴⁶ bewiesen werden. Der originale Beweis umfasst mehr als 250 Seiten ...⁴⁷

In der Gruppentheorie spielen die Gruppen, deren Ordnung durch 2 teilbar ist, oft eine besondere (Aussenseiter-) Rolle. Dies soll den Gruppentheoretiker Ph. Hall⁴⁸ zu der pointierten Bemerkung “Two is the oddest of all primes” veranlasst haben.

⁴⁵ Walter Feit, 1930–2004, US-amerikanischer Mathematiker (Gruppentheorie)

⁴⁶ John Griggs Thompson, geb. 1932, US-amerikanischer Mathematiker (Gruppentheorie)

⁴⁷ William Burnside, 1852–1927, englischer Mathematiker (besonders Gruppentheorie)

⁴⁸ Philip Hall, 1904–1982 englischer Mathematiker (Gruppentheorie und Kombinatorik)

11.2 Kommutator, Kommutatorgruppen, Kommutatorreihen

Aufgabe 11.3 Zeigen Sie: Ist G eine Gruppe und $g, h \in G$, dann ist $(h \cdot g)^{-1} = g^{-1} \cdot h^{-1}$.

Man sagt, die Elemente g und h einer Gruppe G *kommutieren* (sind vertauschbar), wenn $g \cdot h = h \cdot g$ ist.

Definition 11.3 Der *Kommutator*⁴⁹ $[g, h]$ zweier Elemente g und h einer Gruppe G ist definiert durch $[g, h] := g^{-1}h^{-1}gh$ ($= (hg)^{-1}gh$).

Aufgabe 11.4 Was kann man über die Kommutatoren in abelschen Gruppen sagen?

Aufgabe 11.5 Zeigen Sie: Wenn die Elemente g und $h \in G$ kommutieren, dann ist ihr Kommutator gleich dem neutralen Element.

Bemerkung: Der *Kommutator* ist ein Indikator dafür, wie sehr zwei Elemente einer Gruppe das Kommutativgesetz verletzen.

Definition 11.4 Die von allen Kommutatoren erzeugte Untergruppe K einer Gruppe G wird als *Kommutatorgruppe* oder *abgeleitete Gruppe* von G bezeichnet; im Zeichen $K(G)$ oder $G^{(1)}$.

Aufgabe 11.6 Zeigen Sie: Die Kommutatorgruppe K der Gruppe G ist stets ein Normalteiler von G .

Hinweis: Zeigen Sie, dass Kommutatoren durch innere Automorphismen in Kommutatoren abgebildet werden.

Aufgabe 11.7 Es sei G eine Gruppe und K ihre Kommutatorgruppe. Zeigen Sie G/K ist kommutativ.

Die Iterierung der Kommutatorgruppenbildung

$$G^{(n+1)} := K(G^n) \quad (11.2)$$

führt zur *Kommutatorreihe* oder *abgeleiteten Reihe* von G .

Bemerkung: Wenn die Kommutatorreihe einer Gruppe G nach endlich vielen (etwa n) Schritten bei der trivialen Gruppe $G^{(n)} = \{e\}$ endet, so ist die Gruppe auflösbar. Die Kommutatorreihe stellt eine Möglichkeit dar, zu entscheiden, ob eine Gruppe auflösbar ist oder nicht. Sie stellt eine Möglichkeit dar, eine Subnormalreihe mit abelschen Faktoren zu konstruieren.

Aufgabe 11.8

- Bestimmen Sie die Kommutatorgruppe der symmetrischen Gruppe S_4 .
- Konstruieren Sie eine Kommutatorreihe für die symmetrischen Gruppe S_4 .
- Zeigen Sie $K(A_5) = A_5$.

Bemerkung: Die alternierende Gruppe A_5 ist damit nicht auflösbar. Sie ist die kleinste nicht auflösbare Gruppe (vgl. OEIS A056866) und zugleich die kleinste nicht-zyklische einfache Gruppe (OEIS A001034).

⁴⁹ lateinisch *commutare*: vertauschen

11.3 Die Sätze von Schreier und Jordan-Hölder

Die folgenden Ergebnisse werden in diesem Manuskript nur zitiert.

Satz 11.1 Jede endliche abelsche Gruppe besitzt eine Subnormalreihe mit zyklischen Faktorgruppen.

Folgerung: Jede Subnormalreihe einer (endlichen) abelschen Gruppe kann zu einer Subnormalreihe mit zyklischen Faktoren verfeinert werden.

Aufgabe 11.9 Beschreiben Sie, was man sinnvollerweise unter einer *Verfeinerung* einer Reihe von Untergruppen verstehen sollte.

Satz 11.2 (Satz von Schreier⁵⁰) Je zwei Subnormalreihen einer Gruppe G besitzen isomorphe Verfeinerungen.

Satz 11.3 (Satz von Jordan-Hölder⁵¹) Je zwei Kompositionsreihen einer (endlichen) Gruppe G sind isomorph.

Aufgabe 11.10 Erläutern und verdeutlichen Sie die Sätze von Schreier und Jordan-Hölder anhand der Untergruppenverbände der Gruppe S_4 (siehe Abbildung 9.1).

Aufgabe 11.11

- Begründen Sie: Jede endliche Gruppe besitzt (mindestens) eine Kompositionsreihe.
- Zeigen Sie: In der Gruppe $(\mathbb{Z}, +, 0)$ gibt es Reihen von Untergruppen der Form

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_{k-1} > G_k > \cdots \quad (11.3)$$

die nicht nach endlich vielen Schritten bei der trivialen Untergruppe $\{0\}$ enden.

12 Skizze: Polynomgleichungen

Im Folgenden ist eine grobe Skizze anhand der einschlägigen Schritte gegeben. Für wesentlich detailliertere Darstellungen sei z.B. auf [Pésic] und [Bewersdorf] verwiesen. Eine sehr schöne, lebendige kulturhistorische Beschreibung der Verwicklungen bei der Lösung von Gleichungen 3. Grades findet man in [de Padova].

Zunächst sei klargestellt, was und was nicht mit der “Lösung”⁵² einer Gleichung gemeint ist. Gleichungen lassen sich in vielfältiger Weise lösen, z.B. auch numerisch in der Form von Näherungslösungen, oder sogar graphisch. Dies ist hier nicht gemeint. Im Folgenden geht es um *exakte* Lösungen. Aber was heisst “exakt”? Was ist eine exakte Lösung der Gleichung $x^2 - 3 = 0$? Exakter als dass man sagt die Lösung ist “Wurzel 3” (im Zeichen: $\sqrt{3}$) geht es nicht. Man muss dann allerdings auch erläutern, wie man mit so einer Lösung rechnet.

⁵⁰ Otto Schreier, 1901–1929, österreichischer Mathematiker

⁵¹ Camille Jordan, 1838–1922, französischer Mathematiker

Otto Ludwig Hölder, 1859–1937, deutscher Mathematiker

⁵² Im Kontext dieser Thematik werden die Lösungen oft auch als “Wurzeln” bezeichnet.

Zum Rechnen mit Wurzeln

Wie soll man mit $\sqrt{3}$ rechnen? Es geht nicht anders als dass man seinen bisherigen “Rechenbereich”, die rationalen Zahlen, verlässt und in einen neuen Rechenbereich eintritt; ähnlich, wie man, als es notwendig war, den Rechenbereich der ganzen Zahlen zu verlassen, um die dort nicht mehr möglichen Rechnungen im Bereich der Bruchzahlen durchzuführen. Man muss also alle Zahlen der Art $a + b\sqrt{3}$ hinzunehmen, wobei a und b rationale Zahlen sind und mit dem Symbol $\sqrt{3}$ folgendermassen zu rechnen ist: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$. Wie man weiter mit diesen “Zahlen” rechnen muss, ist klar, wenn die bisherigen Rechengesetze möglichst uneingeschränkt weiter bestehen sollen (entsprechend dem *Permanenzprinzip* von Hankel⁵³). Für die Multiplikation bedeutet das z.B. $(a + b\sqrt{3}) \cdot (c + d\sqrt{3}) = (ac + 3bd) + (ad + bc) \cdot \sqrt{3}$. Entsprechend müssen dann aber in dieser Art Schritt für Schritt noch andere Quadratwurzeln wie $\sqrt{5}$, und andere Wurzeln, wie $\sqrt[n]{n}$ hinzugenommen werden. Man gelangt so zum Zahlbereich der algebraischen Zahlen. Allgemein sind die *algebraischen Zahlen* definiert als die Nullstellen von Polynomen der Art

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad (12.1)$$

mit rationalen Koeffizienten $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$.

Aufgabe 12.1 Zeigen Sie: Die Menge $\mathbb{A}$ der algebraischen Zahlen ist abzählbar.

12.1 Gleichungen 2. Grades

Eine Gleichung der Form

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (12.2)$$

(mit den rationalen Koeffizienten a, b und c , mit $a \neq 0$) wird als *quadratische Gleichung* (über den rationalen Zahlen) bezeichnet. Ihre Lösungen (“Wurzeln”) sind

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{und} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (12.3)$$

Sie waren i.w. schon im Altertum bekannt; wenn sich auch die Darstellung stark von der heutigen Form unterschied. Der Mathematiker Al-Khwarizmi⁵⁴ hat ihre Lösungen in systematischer Form behandelt und dargestellt (vgl. z.B. auch: [Ziegenbalg, Figurierte Zahlen, 2024]).

Ein Polynom (über einem Körper) ist ein Ausdruck der Form

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad (12.4)$$

in der “Unbestimmten” x , wobei $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$ beliebige Elemente des Körpers sind. Wir werden es hier nur mit dem Körper $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen zu tun haben. Der *Grad* des Polynoms ist n , wenn $a_n \neq 0$ ist.

⁵³ Hermann Hankel, 1839–1873, deutscher Mathematiker

⁵⁴ Al-Khwarizmi, ca. 780 – ca. 850, persisch-arabischer Mathematiker; auf seinen Namen geht der Begriff des *Algorithmus* und auf den Titel eines seiner Bücher geht auch der Begriff der *Algebra* zurück; vgl. z.B. <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Khwarizmi/>

Die linke Seite der Gleichung (12.2) ist ein Polynom des Grades 2. Wir werden später auch Polynome höheren Grades betrachten. Dabei wird es sich als günstig erweisen, wenn man davon ausgeht, dass der “führende Koeffizient” des jeweils betrachteten Polynoms gleich 1 ist, wenn also das Polynom, wie man sagt, *normiert* ist. Im Fall von (12.4) ist dies der zu x^n gehörende Koeffizient, also a_n . Man kann dies stets dadurch erreichen, dass man die Gleichung durch diesen (per Definition von Null verschiedenen) Koeffizienten “durchdividiert”.

In schulischer Darstellung wird die normierte quadratische Gleichung oft in der Form

$$x^2 + px + q = 0 \quad (12.5)$$

geschrieben. Ihre Lösungen sind

$$x_1 = \frac{-p + \sqrt{p^2 - 4q}}{2} \quad \text{und} \quad x_2 = \frac{-p - \sqrt{p^2 - 4q}}{2} \quad (12.6)$$

Bei näherem Hinschauen fällt auf, dass es zwischen den Koeffizienten der Gleichung und den Lösungen folgende Beziehungen gibt:

$$\begin{aligned} x_1 \cdot x_2 &= q \\ x_1 + x_2 &= -p \end{aligned} \quad (12.7)$$

Die Gleichungen (12.7) gehen auf Vieta⁵⁵ zurück. Man bezeichnet sie daher als die Gleichungen (bzw. *Wurzelgleichungen*) von Vieta. Man kann die Gleichung durch direktes Nachrechnen verifizieren.

Es gilt aber auch: Die quadratische Gleichung

$$(x - x_1) \cdot (x - x_2) = x^2 - (x_1 + x_2) \cdot x + x_1 \cdot x_2 = 0 \quad (12.8)$$

hat dieselben Wurzeln wie (12.5). Es handelt sich also um dieselbe Gleichung und die Koeffizienten sind paarweise gleich. Die Gleichungen in (12.7) ergeben sich damit durch einen einfachen *Koeffizientenvergleich*⁵⁶.

12.2 Gleichungen 3. Grades

Im Folgenden werden die Koeffizienten der jeweiligen Polynome passend zum Exponenten von x^k durchnumeriert, wobei der führende Koeffizient stets gleich 1 ist. Das Auffinden einer Lösungsformel von Gleichungen der Form

$$x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0 \quad (12.9)$$

⁵⁵ François Viète, in latinisierender Form auch Vieta genannt, 1540–1603, französischer Advokat und Mathematiker

⁵⁶ Zwei Polynom-Darstellungen stellen dasselbe Polynom dar, wenn ihre Koeffizienten gleich sind.

war in der Geschichte der Mathematik mit erheblichen Problemen verbunden, bis N. Tartaglia⁵⁷ und G. Cardano⁵⁸ schliesslich die hochgradig komplizierten Lösungen fanden. Eine sehr lebendige Erzählung der verworrenen Geschichte um das Auffinden der “Cardanischen Formeln” ist in dem Buch [de Padova] zu finden.

In heutiger Notation lauten die Lösungen⁵⁹:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \left(\frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{4a_0a_2^3 - a_1^2a_2^2 - 18a_0a_1a_2 + 4a_1^3 + 27a_0^2}}{23^{\frac{3}{2}}} + \frac{(-1)a_2^3}{27} + \frac{a_1a_2 - 3a_0}{6} \right)^{\frac{1}{3}} - \\
 &\quad \frac{\left(\frac{\sqrt{3}i}{2} + \frac{-1}{2} \right) \left(\frac{-1a_2^2}{9} + \frac{a_1}{3} \right)}{\left(\frac{\sqrt{4a_0a_2^3 - a_1^2a_2^2 - 18a_0a_1a_2 + 4a_1^3 + 27a_0^2}}{23^{\frac{3}{2}}} + \frac{-1a_2^3}{27} + \frac{a_1a_2 - 3a_0}{6} \right)^{\frac{1}{3}}} + \frac{-1a_2}{3} \\
 x_2 &= \left(\frac{\sqrt{3}i}{2} + \frac{-1}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{4a_0a_2^3 - a_1^2a_2^2 - 18a_0a_1a_2 + 4a_1^3 + 27a_0^2}}{23^{\frac{3}{2}}} + \frac{-1a_2^3}{27} + \frac{a_1a_2 - 3a_0}{6} \right)^{\frac{1}{3}} - \\
 &\quad \frac{\left(\frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2} \right) \left(\frac{-1a_2^2}{9} + \frac{a_1}{3} \right)}{\left(\frac{\sqrt{4a_0a_2^3 - a_1^2a_2^2 - 18a_0a_1a_2 + 4a_1^3 + 27a_0^2}}{23^{\frac{3}{2}}} + \frac{-1a_2^3}{27} + \frac{a_1a_2 - 3a_0}{6} \right)^{\frac{1}{3}}} + \frac{-1a_2}{3} \\
 x_3 &= \left(\frac{\sqrt{4a_0a_2^3 - a_1^2a_2^2 - 18a_0a_1a_2 + 4a_1^3 + 27a_0^2}}{23^{\frac{3}{2}}} + \frac{-1a_2^3}{27} + \frac{a_1a_2 - 3a_0}{6} \right)^{\frac{1}{3}} - \\
 &\quad \frac{\frac{-1a_2^2}{9} + \frac{a_1}{3}}{\left(\frac{\sqrt{4a_0a_2^3 - a_1^2a_2^2 - 18a_0a_1a_2 + 4a_1^3 + 27a_0^2}}{23^{\frac{3}{2}}} + \frac{-1a_2^3}{27} + \frac{a_1a_2 - 3a_0}{6} \right)^{\frac{1}{3}}} + \frac{-1a_2}{3}
 \end{aligned}$$

So kompliziert die Lösungen auch aussehen mögen, es gelten auch hier wieder die “Vietaschen” Gleichungen:

$$\begin{aligned}
 x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 &= -a_0 \\
 x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 &= a_1 \\
 x_1 + x_2 + x_3 &= -a_2
 \end{aligned} \tag{12.10}$$

⁵⁷ Niccolo Tartaglia, 1500–1557, italienischer Mathematiker der Renaissance

⁵⁸ Gerolamo Cardano, auch Geronimo oder Girolamo Cardano, 1501–1576, italienischer Arzt, Philosoph und Mathematiker der Renaissance

⁵⁹ erstellt mit Hilfe des (open source) Computeralgebra Systems **Maxima**
<https://maxima.sourceforge.io/de/index.html>

Auch im Hinblick auf die Bestätigung der Gleichungen in (12.10) ist die “Vieta-Darstellung”

$$\begin{aligned} x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 &= (x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_3) \\ &= x^3 - x^2 \cdot (x_1 + x_2 + x_3) + x \cdot (x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3) - x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \end{aligned} \quad (12.11)$$

hilfreich.

Computeralgebra Systeme, wie Maxima, verfügen in der Regel über vielfältige Funktionen zur Umformulierung und insbesondere Vereinfachung von algebraischen Ausdrücken. In Maxima sind z.B. die Funktionen `ratsimp` und `fullratsimp`⁶⁰ oft hilfreich für die vereinfachte Darstellung.

Beispiele (mit den obigen Werten von x_1 , x_2 und x_3 :

Eingabe: `ratsimp( $x_1 + x_2 + x_3$ )`

Ausgabe: $-a_2$

Eingabe: `ratsimp( $x_1 * x_2 + x_1 * x_3 + x_2 * x_3$ )`

Ausgabe: a_1

Die Eingabe: `ratsimp( $x_1 * x_2 * x_3$ )` führt nicht zum Ziel, aber die

Eingabe: `fullratsimp( $x_1 * x_2 * x_3$ )` liefert die

Ausgabe: $-a_0$.

12.3 Gleichungen 4. Grades

Auch für Gleichungen der Art

$$x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0 \quad (12.12)$$

mit rationalen Koeffizienten fand man in der Folgezeit Lösungen mit Wurzelausdrücken (Radikalen), indem man sie trickreich auf Gleichungen niedrigeren Grades reduzierte. Die Lösungen fallen aber nochmals komplizierter aus als im Falle der Gleichungen dritten Grades. Deswegen sei hier auf ihre Darstellung verzichtet.

Aufgabe 12.2 Spielen Sie den Prozess der Lösungsfindung auf Ihrem bevorzugten Computeralgebra System (CAS) durch und überprüfen Sie insbesondere die Gültigkeit der Vietaschen Wurzelgleichungen.

Aufgabe 12.3 Formulieren Sie für Gleichungen vierten Grades die Analoga zu den Vietaschen Gleichungen in (12.10) und begründen Sie diese.

12.4 Gleichungen 5. Grades

Für Gleichungen fünften Grades fand man (ausser in Spezialfällen) keine Lösungen. Aufgrund der Kompliziertheit der Lösungen von Gleichungen dritten und vierten Grades nahm man lange Zeit an, dass die Lösungen für Gleichungen fünften Grades noch mal wesentlich komplizier-

⁶⁰ Maxima Hilfesystem: `fullratsimp` repeatedly applies `ratsimp` followed by non-rational simplification to an expression until no further change occurs, and returns the result.

ter ausfallen würden und dass man sich dementsprechend noch mehr anstrengen müsse, die Lösungen zu finden. Da dies trotz aller Bemühungen nicht gelang, kam langsam der Verdacht auf, dass es für “allgemeine” Gleichungen fünften Grades, also Gleichungen der Form

$$1 \cdot x^5 + a_4 \cdot x^4 + a_3 \cdot x^3 + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0 = 0 \quad (12.13)$$

ausser in Spezialfällen keine Lösungsformel mit Radikalen (d.h. Wurzelausdrücken) gibt.

12.5 Der Satz von Vieta und Symmetrien bei den Wurzeln

Zur *Symmetrie* gibt es wohl so viele Zitate wie zu kaum einem anderen Thema in der Mathematik. Ein Mathematiker, der sich besonders intensiv mit Fragen der Symmetrie befasst und ein Standardwerk dazu geschrieben hat (siehe Literaturverzeichnis), ist Hermann Weyl⁶¹. Im Folgenden seien zwei Zitate von ihm wiedergegeben.

Die Symmetrie ist diejenige Idee, mit deren Hilfe der Mensch im Laufe der Jahrhunderte versuchte, Ordnung, Schönheit und Vollkommenheit zu begreifen und zu schaffen.

Symmetrisch ist ein Gebilde dann, wenn man irgend etwas damit machen kann und das Ergebnis so aussieht wie zuvor.

Eine Funktion f bzw. ein Ausdruck (Term) in den Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ heisst *symmetrisch*, wenn sich ihr Wert (wie auch immer er definiert sein mag) bei einer beliebigen Vertauschung (Permutation) der Variablen nicht ändert.

Ein Beispiel: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

Es ist $f(x, y, z) = f(y, z, x) = f(z, x, y) = f(y, x, z) = f(x, z, y) = f(z, y, x)$

Im Zusammenhang mit dem Lösen von Polynomgleichungen spielen die “elementarsymmetrischen Funktionen” des Satzes von Vieta eine besondere Rolle.

Satz 12.1 Satz von Vieta

Es sei

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0 \quad (12.14)$$

eine Polynomgleichung vom Grad n mit rationalen Koeffizienten und den Wurzeln $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ⁶².

Dann gilt

⁶¹ Hermann Weyl, 1885–1955, deutscher Mathematiker, Physiker und Philosoph

⁶² Dass es gerade n Lösungen gibt, folgt aus dem *Fundamentalsatz der Algebra*: Jedes nicht konstante Polynom im Bereich der komplexen Zahlen besitzt mindestens eine Nullstelle. (Es gilt sogar, dass die Anzahl der Nullstellen, wenn sie mit der richtigen Vielfachheit gezählt werden, insgesamt gleich dem Grad des Polynoms ist.)

$$\begin{aligned}
a_0 &= (-1)^n \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_{n-2} \cdot x_{n-1} \cdot x_n \\
a_1 &= (-1)^{n-1} \cdot (x_1 x_2 x_3 \dots x_{n-1} + x_1 x_3 \dots x_n + \dots + x_2 \dots x_{n-1} x_n) \\
a_2 &= (-1)^{n-2} \cdot (x_1 x_2 x_3 \dots x_{n-2} + \dots + x_3 x_4 \dots x_{n-1} x_n) \\
&\dots \\
a_{n-3} &= (-1)^3 \cdot (x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + \dots + x_{n-2} x_{n-1} x_n) \\
a_{n-2} &= (-1)^2 \cdot (x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_1 x_n + x_2 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n) \\
a_{n-1} &= (-1)^1 \cdot (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1} + x_n)
\end{aligned} \tag{12.15}$$

Wie im Falle $n = 2$ (vgl. Gleichung 12.8) folgt dies aus dem Vergleich der Koeffizienten der Polynome (12.14) und $(x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1}) \cdot (x - x_n)$; letzteres in ausmultiplizierter Form.

Im Falle einer Polynomgleichung wie (12.14) hängt die Struktur der Lösungen natürlich auf das Engste mit den Koeffizienten $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_2, a_1, a_0$ zusammen. Aber der Satz von Vieta macht es möglich, den Fokus bei Fragen zur Lösbarkeit der Gleichung weg von den Koeffizienten und hin zu den Wurzeln $x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1$ zu verschieben – und deren Symmetrien ins Spiel zu bringen.

12.6 Ruffini, Abel und Galois

Nachdem die Lösungen für Polynomgleichungen dritten und vierten Grades gefunden waren und man sich bei den Gleichungen fünften Grades die Zähne ausbiss, lenkten (aufbauend auf der Arbeit von Vieta) Mathematiker wie Ruffini und Abel das Augenmerk hin zu den Wurzeln der Gleichungen, deren Symmetrien sie zunehmend besser in den Griff bekamen.

Aufbauend auf den Arbeiten von Ruffini konnte Abel zeigen, dass für die Auflösung von Polynomgleichungen gewisse Vertauschungs-Operationen unter den Wurzeln notwendig waren. Indem er zeigte, dass es eine solche hinreichend uneingeschränkte Vertauschbarkeit nicht gab, konnte er zeigen, dass es keine allgemeine Lösungsformel für Gleichungen fünften Grades geben konnte.

Über diese Vertauschbarkeit von Permutationen kam der Aspekt der Kommutativität ins Spiel und da Abel sich als erster in systematischer Weise damit befasst hat, werden kommutative Gruppen heute auch als *abelsche Gruppen* bezeichnet.

Abels Vorgehensweise machte allerdings eine allgemeine Klassifizierung der durch Radikale lösbaren Polynomgleichungen noch nicht möglich. Beim Vorliegen einer konkreten Gleichung lieferte seine Vorgehensweise nicht eine Aussage der Art: Diese Gleichung ist lösbar bzw. nicht lösbar.

Unabhängig davon waren aber für spezielle Gleichungen 5. Grades die Lösungen bekannt. So z.B. die "Kreisteilungsgleichung" $x^5 - 1 = 0$, deren Lösungen schon Gauß kannte. Und natürlich kann man für jedes 5-Tupel von (rationalen) Zahlen leicht ein Polynom angeben, das genau diese 5 Zahlen als Wurzeln besitzt (Begründung: Übung).

Entscheidend im Zusammenhang mit dem Beweis von Abel ist, dass es keine “allgemeine Lösung” bzw. Lösungsformel gibt, mit der man die Lösung, wie im Falle der quadratischen Gleichung, in jedem Fall “ausrechnen” kann.

Ein entscheidender Schritt blieb Galois vorbehalten, der auf der Basis seiner Arbeit mit Permutationen auch den für die Mathematik fundamentalen Begriff der *Gruppe* prägte. Er zeigte, dass zu jeder Polynomgleichung eine spezifische Gruppe von Permutationen gehört und dass die Gleichung durch Radikale genau dann lösbar ist, wenn diese Gruppe auflösbar ist (im Sinne von Abschnitt 11).

Speziell für Polynome vom Grad 5 (oder höher) konnte er zeigen, dass diese Symmetriegruppe gleich der gesamten Gruppe S_5 sein müsste. Da aber die alternierende Gruppe A_5 als Untergruppe von S_5 einfach ist (und somit keine Subnormalreihe besitzt), ist die Gruppe S_5 nicht auflösbar. Und somit gibt es für Polynomgleichungen vom Grad grösser oder gleich fünf keine allgemeine “Lösungsformel”, mit der ihre Wurzeln bestimmt werden können.

Die nach ihm benannte *Galois-Theorie* stellt einen ein-eindeutigen Zusammenhang zwischen der Galois-Gruppe eines Polynoms und gewissen Körpererweiterungen des Grundkörpers her, aus dem die Koeffizienten des Polynoms stammen (im obigen Fall $\mathbb{Q}$).

Die Galois-Theorie macht auch eine algorithmische Erschliessung des Themas “Lösung von Polynomgleichungen durch Radikale” möglich. Sie ist zu diesem Zweck auch in viele Computer-algebra-Systeme “eingebaut”.

Im historischen Prozess der Theorie des Gleichungslösens entstanden immer kompliziertere Lösungen. Man vergleiche dazu etwa die Gleichungen von Abschnitt 12.2. Da diese Ausdrücke von Hand kaum noch zu bewältigen waren, entwickelte man zur besseren Strukturierung des Prozesses hilfreiche Begriffe wie *Determinanten* und *Resolventen*. Sie sind auch heute noch selbst im Zusammenhang mit der Nutzung von Computeralgebra Systemen hilfreich und sinnvoll.

13 Ausblick

Im Laufe des 20. Jahrhunderts und danach zeigte sich in vielen Feldern der Wissenschaft, wie fundamental und fruchtbar das Konzept der Gruppe ist – nicht nur in der Mathematik sondern z.B. auch in der Physik. Das folgende Zitat von Irving Adler (amerikanischer Mathematiker, Wissenschaftsautor und Pädagoge, 1913–2021) wirft ein helles Licht auf die Bedeutung der Gruppentheorie für die Physik:

The importance of group theory was emphasized very recently when some physicists using group theory predicted the existence of a particle that had never been observed before, and described the properties it should have. Later experiments proved that this particle really exists and has those properties.

A Anhang: Zahlentheoretische Grundbegriffe

(Kompakte Darstellung. Bezeichnungen, Basiswissen und Beweise

in grösserer Ausführlichkeit: siehe [Ziegenbalg, Elementare Zahlentheorie 2015])

Eine grosse und bedeutende Familie von Beispielen aus der Zahlentheorie im Kontext der Gruppentheorie sind die primen Restklassen in Restklassen-Ringen. In diesem Zusammenhang spielen die hier zunächst behandelten Themen "Division mit Rest", "Euklidischer Algorithmus" und das "EBBB-Lemma" eine besondere Rolle.

A.1 Die Division mit Rest

Fundamental für die gesamte Zahlentheorie ist das Verfahren der

Division mit Rest: Zu beliebigen natürlichen Zahlen a und b ($b \neq 0$) gibt es stets nichtnegative ganze Zahlen q und r ($0 \leq r < b$) mit der Eigenschaft

$$a = q \cdot b + r$$

Dabei heisst q der *Quotient* und r der *Rest* bei der Ganzzahldivision von a durch b .

Zur Plausibilität: Machen Sie sich die Aussage (auch durch eine Skizze) anhand eines geeigneten Beispiels klar (z.B. mit $a = 15$ und $b = 5$).

A.2 Die Teilbarkeitsrelation

Ein wichtiger Sonderfall bei der Division mit Rest ist der Fall, wo der Rest gleich Null ist. Dann ist also $a = q \cdot b$ und dies führt zu der

Definition A.1 Man sagt: Die natürliche Zahl b ist ein *Teiler* der natürlichen Zahl a , wenn es eine natürliche Zahl n gibt mit der Eigenschaft $a = n \cdot b$.

Schreib- und Sprechweisen: " $b \mid a$ " bzw. " b teilt a " für " b ist ein Teiler von a "

Mit $T(a)$ sei die Menge aller Teiler der natürlichen Zahl a bezeichnet: $T(a) := \{x \in \mathbb{N} : x \mid a\}$.

Beispiel: $T(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

Bemerkung: Die Teilbarkeitsrelation " $x \mid y$ " ist eine *Ordnungsrelation* auf der Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen.

A.3 Der größte gemeinsame Teiler

Definition A.2 Es seien a und b natürliche Zahlen mit den Teilmengen $T(a)$ und $T(b)$. Mit $\text{ggT}(a, b)$ sei der *größte gemeinsame Teiler* von a und b bezeichnet, also das größte Element⁶³ der Menge $T(a) \cap T(b)$.

Bemerkungen: Die Menge $T(a) \cap T(b)$ ist niemals leer, denn sie enthält in jedem Fall die natürliche Zahl 1. Ist $T(a) \cap T(b) = 1$ (d.h. $\text{ggT}(a, b) = 1$), so nennt man die Zahlen a und b *teilerfremd* (oder *relativ prim*).

⁶³ im Sinne der natürlichen Ordnung der natürlichen Zahlen: $1 < 2 < 3 \dots k-1 < k < k+1, \dots$

In der Definition des ggT wird der Begriff "der Grösste" im Sinne der gewöhnlichen Ordnungsrelation der natürlichen Zahlen verwendet. Das Prädikat "der Grösste" trifft aber auch zu, wenn man die Teilbarkeitsrelation als Ordnungsrelation verwendet; d.h.:

Satz A.1 Es seien a und b natürliche Zahlen. Dann gilt: Jeder gemeinsame Teiler von a und b ist ein Teiler von $\text{ggT}(a, b)$.

Erfreulicherweise ist der Begriff des ggT bestens mit dem Verfahren der Division mit Rest verträglich:

Satz A.2 (Der ggT und die Division mit Rest): Für beliebige natürlichen Zahlen a und b gilt: Ist $a = q \cdot b + r$ (mit ganzen Zahlen q und r), so gilt $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(b, r)$.

Beweis: Übung

A.4 Der Euklidische Algorithmus

Nimmt man abwechselnd immer das Kleinere vom Größeren weg, dann muss der Rest schließlich die vorhergehende Größe messen.^a

Euklid, Die Elemente, Zehntes Buch §3

^a Subtraktionsform ("Wechselwegnahme") des Euklidischen Algorithmus

Im Folgenden soll das Verfahren von der Division mit Rest etwas systematischer dargestellt werden. Mit den Umbenennungen $a_0 := a$, $a_1 := b$, $q_1 := q$ und $a_2 := r$ führt die wiederholte Anwendung des Satzes von der Division mit Rest zu dem folgenden System von Gleichungen:

$$\begin{array}{lll}
 a_0 = q_1 \cdot a_1 + a_2 & (0 \leq a_2 < a_1) & \text{(Zeile 0)} \\
 a_1 = q_2 \cdot a_2 + a_3 & (0 \leq a_3 < a_2) & \text{(Zeile 1)} \\
 a_2 = q_3 \cdot a_3 + a_4 & (0 \leq a_4 < a_3) & \text{(Zeile 2)} \\
 \dots & \dots & \dots \\
 a_{k-1} = q_k \cdot a_k + a_{k+1} & (0 \leq a_{k+1} < a_k) & \text{(Zeile } k-1) \\
 a_k = q_{k+1} \cdot a_{k+1} + a_{k+2} & (0 \leq a_{k+2} < a_{k+1}) & \text{(Zeile } k) \\
 a_{k+1} = q_{k+2} \cdot a_{k+2} + a_{k+3} & (0 \leq a_{k+3} < a_{k+2}) & \text{(Zeile } k+1)
 \end{array}$$

Für die Divisionsreste gilt nach dem Satz von der Division mit Rest:

$$a = a_0 > a_1 > a_2 > \dots > a_{k-1} > a_k > a_{k+1} > \dots$$

Da alle Divisionsreste nichtnegative ganze Zahlen sind, muss die Kette dieser (streng monoton fallenden) Reste abbrechen; es muss also einen letzten von Null verschiedenen Divisionsrest a_n geben. Der nächste auf a_n folgende Divisionsrest muss dann gleich Null sein: $a_{n+1} = 0$. Die letzten Zeilen des obigen Gleichungssystems lauten also:

$$\begin{aligned}
a_{n-2} &= q_{n-1} \cdot a_{n-1} + a_n \quad (0 \leq a_n < a_{n-1}) \quad (\text{Zeile } n-2) \\
a_{n-1} &= q_n \cdot a_n + a_{n+1} \quad (a_{n+1} = 0) \quad (\text{Zeile } n-1)
\end{aligned}$$

Table 2: Euklidischer Algorithmus

Satz A.3 (Euklidischer Algorithmus): Der letzte von Null verschiedene Divisionsrest (a_n) im Euklidischen Algorithmus ist der größte gemeinsame Teiler der natürlichen Zahlen a und b : $a_n = \text{ggT}(a, b)$.

Beweisskizze: Aus dem Zeilenschema des Euklidischen Algorithmus folgt im Zusammenhang mit dem Satz von der Division mit Rest bzw. mit Satz A.2 :

$$\begin{aligned}
\text{ggT}(a, b) &= \\
\text{ggT}(a_0, a_1) &= \text{ggT}(a_1, a_2) = \dots = \text{ggT}(a_k, a_{k+1}) = \dots = \\
\text{ggT}(a_{n-1}, a_n) &= \text{ggT}(a_n, a_{n+1}) = \text{ggT}(a_n, 0) = a_n
\end{aligned}$$

Der Euklidische Algorithmus eignet sich hervorragend zur Abarbeitung mit einem Computer. Die obige Form der Wechselwegnahme bezeichnen wir als die *Divisionsform* des Euklidischen Algorithmus⁶⁴.

A.5 Der erweiterte Euklidische Algorithmus

Die der ursprünglichen Formulierung von Euklid entsprechende Form wird gelegentlich als die *Subtraktionsform* und die obige mit den (Ganzzahl-) Quotienten arbeitende Form als die *Divisionsform* des Euklidischen Algorithmus bezeichnet. Verfolgt man den Euklidischen Algorithmus im Sinne des folgenden (Maxima-) Programms recht genau und führt Buch über die Zwischenergebnisse, so erhält man als Ergebnis das (untenstehende) EBBB-Lemma.⁶⁵

```

EBBB_div(a0, b0) := /* der erweiterte Euklidische Algorithmus / EBBB-Algorithmus */
block([a : a0, b : b0, r, akp0, akp1, akp2, /* p ... für plus */
      qkp0, qkp1, qkp2,
      xkp0, xkp1, xkp2,
      ykp0, ykp1, ykp2 ],
( k : 0,
  akp0 : a0, akp1 : b0,
  qkp1 : quotient(akp0, akp1),
  akp2 : akp0 - qkp1 * akp1, r: akp2,
  xkp0 : 1, ykp0 : 0,
  xkp1 : 0, ykp1 : 1,
  xkp2 : xkp0 - qkp1 * xkp1,
  ykp2 : ykp0 - qkp1 * ykp1,

  print("k  akp0  akp1  akp2  qkp1  xkp0  xkp1  xkp2  ykp0  ykp1  ykp2  Rest  a * x + b * y "),
  printf(true, " ~6d ~5d ~3d ~3d ~3d ~3d ~3d ~3d ~3d ~3d ~5d ~3d
                                     ~a ~3d ~a ~3d ~a ~3d ~%",
    k, akp0, akp1, akp2, qkp1, xkp0, xkp1, xkp2, ykp0, ykp1, ykp2, akp2, a, "*", xkp2, "+", b, "*", ykp2 ),

```

⁶⁴ mehr dazu in [Ziegenbalg 2015]

⁶⁵ Das Programm wurde nicht im Hinblick auf Minimalität sondern auf die Verständlichkeit des Codes erstellt. Bei rein funktionaler Verwendung des Programms können die print-Befehle leicht entfernt oder auskommentiert werden. Es ist geplant, das Programm in downloadbarer Form auf die Homepage des Autors zu stellen: <https://jochen-ziegenbalg.github.io/materialien/>

```

while not(akp2 = 0) do
( k : k+1,
  akp0 : akp1,
  akp1 : akp2,
  qkp1 : quotient(akp0, akp1),
  akp2 : akp0 - qkp1 * akp1,

  xkp0 : xkp1, xkp1 : xkp2,
  ykp0 : ykp1, ykp1 : ykp2,

  xkp2 : xkp0 - qkp1 * xkp1,
  ykp2 : ykp0 - qkp1 * ykp1,

  printf(true, " ~6d ~5d ~3d ~3d ~3d ~3d ~3d ~3d ~3d ~3d ~3d ~5d ~3d
               ~a ~3d ~a ~3d ~a ~3d ~%",
    k, akp0, akp1, akp2, qkp1, xkp0, xkp1, xkp2, ykp0, ykp1, ykp2, akp2, a, "*", xkp2, "+", b, "*", ykp2 ),

  if akp2 = 0 then return([akp1, [xkp1, ykp1]] ) ) ) )

```

Zwei konkrete Aufruf des Programms:

```
EBBB_div(136, 60);
```

"k	akp0	akp1	akp2	qkp1	xkp0	xkp1	xkp2	ykp0	ykp1	ykp2	Rest	a * x	+	b * y	"
0	136	60	16	2	1	0	1	1	0	1	-2	16	136	*	1 + 60 * -2
1	60	16	12	3	0	1	-3	1	-2	7	7	12	136	*	-3 + 60 * 7
2	16	12	4	1	1	-3	4	-2	7	-9	-9	4	136	*	4 + 60 * -9
3	12	4	0	3	-3	4	-15	7	-9	34	34	0	136	*	-15 + 60 * 34

Ausgabe des Funktionswerts: [4, [4,-9]]

Ergebnis: ggT(136, 60) = 4 = 136*4 + 60 *(-9)

```
EBBB_div(954, 348);
```

"k	akp0	akp1	akp2	qkp1	xkp0	xkp1	xkp2	ykp0	ykp1	ykp2	Rest	a * x	+	b * y	"
0	954	348	258	2	1	0	1	0	1	-2	258	954	*	1 + 348 * -2	
1	348	258	90	1	0	1	-1	1	-2	3	3	90	954	*	-1 + 348 * 3
2	258	90	78	2	1	-1	3	-2	3	-8	-8	78	954	*	3 + 348 * -8
3	90	78	12	1	-1	3	-4	3	-8	11	11	12	954	*	-4 + 348 * 11
4	78	12	6	6	3	-4	27	-8	11	-74	-74	6	954	*	27 + 348 * -74
5	12	6	0	2	-4	27	-58	11	-74	159	159	0	954	*	-58 + 348 * 159

Ausgabe des Funktionswerts: [6, [27,-74]]

Ergebnis: ggT(954, 348) = 6 = 954*27 + 348 *(-74)

EBBB-Lemma: Ist g der größte gemeinsame Teiler der natürlichen Zahlen a und b , so gilt: Es gibt ganze Zahlen x und y mit der Eigenschaft:

$$g = a \cdot x + b \cdot y \quad (\text{A.1})$$

(Es gibt zu a und b übrigens nicht nur ein Bézout-Paar (x_0, y_0) . Alle Lösungen erhält man durch $x = x_0 + k \cdot \frac{b}{d}$ und $y = y_0 - k \cdot \frac{a}{d}$ mit $d = \text{ggT}(a, b)$ und $k \in \mathbb{Z}$.)

Folgerung: Sind a und b teilerfremd, d.h. ist $\text{ggT}(a, b) = 1$, dann gilt $a \cdot x + y \cdot b = 1$. Es ist dann also $a \cdot x = 1 \pmod{b}$ und das Verfahren des EBBB Lemmas ermöglicht die Berechnung von multiplikativen Inversen im Restklassenring $\mathbb{Z}_b$.

Das Lemma wird auch als *Satz vom erweiterten Euklidischen Algorithmus* (engl. extended Euclidean algorithm) bezeichnet. Er macht es möglich, den größten gemeinsamen Teiler von a und b als eine (ganzahlige) Linearkombination⁶⁶ von a und b darzustellen: $g = a \cdot x + b \cdot y$.

Bemerkungen: Die Bezeichnung EBBB beruht auf dem folgenden Hintergrund

E: Euklid (ca. 325–265 v. Chr.)

B: Claude Gaspard Bachet de Méziriac (1581–1638), französischer Mathematiker

B: Étienne Bézout (1730–1783), französischer Mathematiker

B: Elwyn Ralph Berlekamp (1940–2019), amerikanischer Mathematiker und Informatiker, der sich insbesondere mit Codierungstheorie beschäftigt hat

Euklid beschrieb den Algorithmus zur Ermittlung des größten gemeinsamen Teilers in seinem epochalen Werk „Die Elemente“. **Bézout** beschrieb die Aussage des EBBB-Lemmas 1766 in seinem Buch „Cours de Mathématiques a l’usage des Gardes du Pavillon et de la Marine“. Die Koeffizienten x und y in Gleichung A.1 werden gelegentlich auch als *Bezout-Koeffizienten* bezeichnet. Allerdings war die Aussage bezogen auf ganze Zahlen bereits vorher von Claude Gaspard **Bachet de Méziriac** aufgestellt worden, der sie in seinem 1624 erschienenen Buch „Problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres“ behandelt hatte. **Berlekamp** hat den erweiterten Euklidischen Algorithmus zur Faktorisierung von Polynomen über einem endlichen Körper genutzt. Der hinter dem Verfahren des EBBB-Lemmas stehende Algorithmus wird heute auch oft als Berlekamp-Algorithmus bezeichnet (vgl. Wikipedia, 2025-09-22).

Zum besseren Verständnis des erweiterten Euklidischen Algorithmus sei dies an einem konkreten Beispiel (mit $a = 136$ und $b = 60$) erläutert (vgl. Ausdruck). Entsprechend der Division mit Rest ist:

$$\begin{aligned} 136 &= 2 \cdot 60 + 16 & \text{bzw.} & 16 = 1 \cdot 136 + (-2) \cdot 60 \\ 60 &= 3 \cdot 16 + 12 & \text{bzw.} & 12 = 1 \cdot 60 + (-3) \cdot 16 \\ 16 &= 1 \cdot 12 + 4 & \text{bzw.} & 4 = 1 \cdot 16 + (-1) \cdot 12 \\ 12 &= 3 \cdot 4 + 0 & & \text{Rest} = \text{Null: Ende des Verfahrens} \end{aligned}$$

Damit endet der euklidische Algorithmus mit dem Ergebnis $\text{ggT}(136, 60) = 4$.

Wenn wir nun die jeweils vorangehenden Reste einsetzen, erhalten wir die folgende Linearkombinations-Darstellung aller Reste mit den Ausgangszahlen $a = 136$ und $b = 60$:

$$\begin{aligned} 16 &= 1 \cdot 136 + (-2) \cdot 60 \\ 12 &= 1 \cdot 60 + (-3) \cdot 16 = 1 \cdot 60 + (-3) \cdot (1 \cdot 136 + (-2) \cdot 60) = (-3) \cdot 136 + 7 \cdot 60 \\ 4 &= 1 \cdot 16 + (-1) \cdot 12 = 1 \cdot (136 + (-2) \cdot 60) + (-1) \cdot ((-3) \cdot 136 + 7 \cdot 60) \\ &= 4 \cdot 136 + (-9) \cdot 60 \end{aligned}$$

⁶⁶gelegentlich wird dies auch als *Vielfachensumme* bezeichnet

A.6 Restklassen

Definition A.3: Für die (nichtnegative) natürliche Zahl n und die ganzen Zahlen a und b ist definiert: “ a ist kongruent zu b modulo n ”, genau dann, wenn n ein Teiler von $b - a$ ist.

Schreibweisen: $a = b \pmod{n}$ oder $a = b \pmod{n}$ oder $a = b \pmod{n}$
 oder auch: $a \equiv b \pmod{n}$ oder $a \equiv b \pmod{n}$ oder $a \equiv b \pmod{n}$

Aufgabe A.1

- Zeigen Sie: Die Relation “ist kongruent zu” ist eine Äquivalenzrelation.
- Geben Sie sinnvolle Interpretationen für die Aussagen
 - “ a ist kongruent zu b modulo 1”
 - “ a ist kongruent zu b modulo 0”

Definition A.4: Die Menge der Restklassen der Relation “ a ist kongruent zu b modulo n ” wird in der Form $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{Z}/(n)$ oder kurz $\mathbb{Z}_n$ geschrieben.

Bemerkung: Die Äquivalenzklassen der Relation “ist kongruent zu” werden in diesem Zusammenhang als *Restklassen* bezeichnet.

Da die Relation kompatibel zur Addition und Multiplikation von $\mathbb{Z}$ ist, nennt man sie auch eine *Kongruenzrelation*.

Aufgabe A.2

- Aus wie vielen Elementen besteht $\mathbb{Z}/(n)$? Geben Sie ein vollständiges Repräsentantensystem an.
- Wie viele Restklassen gibt es im Fall $n = 1$ oder $n = 0$?

A.6.1 Addition von Restklassen

Die Addition (und später auch die Multiplikation) von Restklassen wird in natürlicher Weise über ihre Repräsentanten definiert.

Definition A.5: In $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ wird wie folgt eine Addition von Restklassen definiert:

$$\bar{a} \oplus \bar{b} := \overline{a + b} \quad (\text{A.2})$$

Aufgabe A.3

- Erläutern Sie, die Aussage “Die durch (A.2) gegebene Operation $\oplus$ ist wohldefiniert”.
- Zeigen Sie, dass die Operation $\oplus$ wohldefiniert ist.
- Geben Sie ein in Bezug auf $\oplus$ neutrales Element an.

Definition Die Gruppe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \oplus, \bar{0})$ wird als die additive Gruppe der Restklassen modulo n bezeichnet – im Kontrast zu der später in Abschnitt A behandelten multiplikativen Gruppe der *primen Restklassen* modulo n .

Aufgabe A.4 Geben Sie der Aussage “Die additive Gruppe der Restklassen modulo n erbt die Eigenschaften der Assoziativität und der Kommutativität von $\mathbb{Z}$ ” einen Sinn.

Neben der *Addition* von Restklassen spielt besonders die *Multiplikation* von Restklassen eine wichtige Rolle in der Zahlentheorie. Wir werden später im Abschnitt über *prime Restklassen* darauf eingehen (Kapitel 7).

A.6.2 Multiplikation von Restklassen

Entsprechend der Addition von Restklassen wird die Multiplikation von Restklassen wie folgt definiert:

Definition A.6 (Multiplikation von Restklassen): $\bar{a} \otimes \bar{b} := \overline{a \cdot b}$

Aufgabe A.5 Formulieren und beweisen Sie:

- Die Restklasse $\bar{1}$ ist das neutrale Element bezüglich der Multiplikation von Restklassen.
- Die Multiplikation von Restklassen ist assoziativ und kommutativ.
- Die Multiplikation von Restklassen ist distributiv bezüglich der Addition von Restklassen

A.6.3 Die Ring-Struktur von Restklassen

Satz A.4 Die Restklassen $\mathbb{Z}_n$ bilden mit der Addition $\oplus$, der Multiplikation $\otimes$, dem Nullelement $\bar{0}$ und dem Einselement $\bar{1}$ einen kommutativen Ring mit Einselement.

Bemerkung: Durch die Einführung neuer Operationen wächst der Bedarf an neuen Symbolen für diese Operationen stark an. Wenn sich die neuen Operationen „kanonisch“⁶⁷ aus den bereits behandelten Operationen ergeben und wenn wesentliche Eigenschaften von den alten Operationen auf die neuen Operationen „vererbt“ werden, lässt man i.d.R. sehr bald die neuen Bezeichnungen fallen und verwendet die früheren Bezeichnungen; im Falle der Restklassen schreibt man also sehr bald wieder $\bar{a} + \bar{b}$ und $\bar{a} \cdot \bar{b}$ an Stelle von $\bar{a} \oplus \bar{b}$ und $\bar{a} \otimes \bar{b}$.

⁶⁷In der Mathematik bezeichnet man eine Vorgehensweise als kanonisch, wenn man es nicht auf vernünftige Weise anders machen kann.

B Literaturhinweise

- Alexandroff P. S.: Einführung in die Gruppentheorie ; VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Neunte Auflage Berlin 1975
- Baumgartner L.: Gruppentheorie; Walter de Gruyter & Co., Sammlung Götschen, Berlin 1964
- Baumslag G. and Chandler B.: Theory and Problems of Group Theory; Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, 1968
- Bewersdorff J.: Algebra für Einsteiger; Springer Spektrum, 6. Auflage, Springer Spektrum, Wiesbaden 2019
- Budden F. J.: The Fascination of Groups; Cambridge University Press 1972
- Burnside W.: Theory of groups of finite order; Dover Publications, 1955 (2nd ed.)
- de Padova Th.: Alles wird Zahl; Carl Hanser Verlag, München 2021
- Deutsches Institut für Fernstudien (DIFF): Grundkurs Mathematik / Elemente der Gruppentheorie, Tübingen 1972
- Edwards H.M.: Galois Theory; Springer Verlag, New York 1984
- Euklid: Die Elemente; Nach Heibergs Text aus dem Griechischen übersetzt und herausgegeben von Clemens Thaer, 8. Aufl., Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1991
- Gauß C.F.: Disquisitiones Arithmeticae (1801)
- Gorenstein D.: Finite Groups; Harper & Row Publishers, New York 1968
- Grossmann J. und Magnus W.: Gruppen und ihre Graphen, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1971
- Hall M.: The theory of groups; The Macmillan Company, New York 1961 (2nd ed.)
- Huppert B.: Endliche Gruppen I; Springer Verlag, Berlin 1967
- Kochendörffer R.: Lehrbuch der Gruppentheorie unter besonderer Berücksichtigung der endlichen Gruppen; Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig 1966
- Kurosh A. G.: The Theory of Groups; Chelsea Publishing Company, New York 1960
- Ledermann: Introduction to Group Theory; Oliver & Boyd, Edinburgh 1973
- Péscic P.: Abels Beweis; Springer-Verlag, Berlin 2005/2007
- Weyl H.: Symmetrie, 3. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2017
- Wielandt H.: Finite permutation groups; Academic Press, New York 1964
- Ziegenbalg J. / O. / B.: Algorithmen von Hammurapi bis Gödel (4. Aufl.), Springer Spektrum, Wiesbaden 2015
- Ziegenbalg J.: Elementare Zahlentheorie – Beispiele, Geschichte, Algorithmen (2. Aufl.), Springer Spektrum, Wiesbaden 2015
- Ziegenbalg J.: Figurierte Zahlen (2. Aufl.); Springer Spektrum, Wiesbaden 2024

C Internet-Quellen

MacTutor Mathematics History

<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/>

spezielle Themen:

Algebra - History Topics

<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/category-algebra/>

The development of group theory

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Development_group_theory/

Wikipedia; Gruppen / Reihe(Gruppentheorie)

<https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppentheorie>

[https://de.wikipedia.org/wiki/Reihe_\(Gruppentheorie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Reihe_(Gruppentheorie))

Liste kleiner Gruppen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_kleiner_Gruppen#Glossar

alternierende Gruppen A4:

[https://de.wikipedia.org/wiki/A4_\(Gruppe\)](https://de.wikipedia.org/wiki/A4_(Gruppe))

Wolfram Inc. / Mathworld / Tetraedergruppen:

<https://mathworld.wolfram.com/TetrahedralGroup.html>

Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS):

https://oeis.org/wiki/Number_of_groups_of_order_n#Solvable_groups

https://oeis.org/wiki/Classification_of_finite_simple_groups

Number of groups of order n:

<https://oeis.org/A000001>

Number of Abelian groups of order n:

<https://oeis.org/A000688>

Orders of non-abelian simple groups (= Orders of non-cyclic simple groups):

<https://oeis.org/A001034>

Orders of non-solvable groups:

<https://oeis.org/A056866>

Ringel C.M.: Permutationen: Das Fotoautomaten-Paradox und andere Überraschungen

<https://www.math.uni-bielefeld.de/~ringel/lectures/monalisa/Welcome.htm>

Group Explorer: Visualization software for the abstract algebra classroom

<https://nathancarter.github.io/group-explorer/index.html>

Group Tables and Subgroup Diagrams

<https://hobbes.la.asu.edu/groups/groups.html>

Computeralgebra software GAP

GAP - Groups, Algorithms, Programming - a System for Computational Discrete Algebra

<https://www.gap-system.org/>

Index

φ -Funktion, 28

Äquivalenzrelation, 50

Abel, Niels, 5, 10

Abel, Niels Henrik, 43

abelsche Gruppe, 10

alternierende Gruppe, 25

Aschbacher, Michael, 9

assoziativ, 10

auflösbare Gruppe, 35, 37

auflösbare Reihe, 35

Automorphismus, 22

innerer, 22

Bachet de Méziriac, Claude-Gaspard, 28

Berlekamp Algorithmus, 28

Berlekamp, Elwyn Ralph, 28

Burnside, William, 8, 35

cartesisches Produkt, 33

Cayley, Arthur, 6

Cayley-Tafel, 14

Diedergruppe, 12, 17, 18

disjunkte Vereinigung, 20

Durchschnitt von Untergruppen, 26

Einbettung, 22

einfache Gruppe, 32

Einheit, 28

Einheitengruppe, 28

elementarsymmetrische Funktion, 42

endlich erzeugte Gruppe, 26, 34

Endomorphismus, 22

Epimorphismus, 22

Erlanger Programm, 7

erzeugendes Element, 26

Euler, Leonhard, 28, 29

Eulersche φ -Funktion, 28

Eulersche Totienten-Funktion, 28

Faktorgruppe, 32

Feit, Walter, 35

Fermat, Pierre de Fermat, 29

Fixpunkt, 23

Frobenius, Ferdinand, 8

Galois, Évariste, 5, 43

Gauß, Carl Friedrich, 6

gerade Permutation, 24, 25

Gruppe, 10

Restklassen modulo n , 50

abelsch, 10

auflösbar, 35

einfach, 32

endlich erzeugt, 26

kommutativ, 10

zyklisch, 26

Gruppentafel, 14

Hölder, Otto, 7, 37

Homomorphismus, 21

Index einer Untergruppe, 20

Inklusion, 22

innerer Automorphismus, 22

invariante Untergruppe, 30

inverses Element, 10

isomorphe Gruppen, 21

Isomorphismus, 21, 22

Jordan, Camille, 7, 37

Kern eines Homomorphismus, 32

Klein, Felix, 7

Kleinsche Vierergruppe, 13

Koeffizientenvergleich, 39

kommutativ, 10

Kommutativität, 31

Kommutator, 36

Kommutatorreihe, 36

Kommutatorgruppe, 36

Kompositionsreihe, 35

Kongruenzabbildung, 7

Kongruenzrelation, 50

Konjugation, 22

Kreisteilungsgleichung, 43

Lagrange, Joseph-Louis, 5
Lemma von Bachet, 28
Lie, Sophus, 7
Links-Multiplikation, 18
Links-Nebenklasse, 18

Monomorphismus, 22
Monstergruppe, 9

Nebenklasse, 16, 18
neutrales Element, 10
Normalreihe, 35
Normalteiler, 30

Ordnung einer Gruppe, 10
Ordnung eines Elements, 27
Ordnungsrelation, 45

Permutation, 22
 gerade, 24
Permutation , 8
Permutationsgruppe, 22
Polynom, 38
Polynomgleichung, 37
Potenzierung, 16
prime Restklassen, 28
Primitivwurzel, 29

Rechts-Multiplikation, 18
Rechts-Nebenklasse, 18
Restklassen, 20, 27, 50
Ruffini, Paolo, 5, 43

Satz von Cayley, 25
Satz von Euler, 29
Satz von Feit-Thompson, 35
Satz von Fermat, 29

Satz von Jordan-Hölder, 37
Satz von Lagrange, 5, 20, 32
Satz von Schreier, 37
Satz von Vieta, 42
Satz von Wilson, 29
Schreier, Otto, 37
Schur, Issai, 8
Smith, Stephen, 9
Subnormalreihe, 35
Subnormalteiler, 35
Symmetrie, 42
symmetrische Gruppe, 22, 23

Tetraeder, 13
Tetraeder-Drehgruppe, 13
Thompson, John Griggs, 35
Totienten-Funktion, 28
Transposition, 24
triviale Untergruppe, 17
trivialer Normalteiler, 32

Untergruppe, 16
Untergruppen-Verband, 17, 31

Verband, 17, 31
Vervielfachung, 16
Vieta, François Viète, 39
Vietasche Wurzelgleichungen, 39
von Dyck, Walter, 8

Weber, Heinrich, 8
Wilson, John, 29
Wurzelgleichungen von Vieta, 39

Zyklenschreibweise, 23
zyklische Gruppe, 26