Verificación de la base simulada

Base: 400 casos y 45 columnas · semilla 4040 (la misma configuración y semilla dan la misma base)
StatSim Pro 2027.01.15 · 21 de octubre de 2026

⚠️ 5 avisos de la configuración

- Escala "Autoeficacia académica": con N=400, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (5.66, según la Media 33 y el rango por ítem [1, 5]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 95 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 22: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Procrastinación académica": con N=400, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (6.66, según la Media 32 y el rango por ítem [1, 5]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 85 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 22: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Familia": con N=400, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (3.33, según la Media 18 y el rango por ítem [1, 7]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 22: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Amigos": con N=400, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (3.33, según la Media 18 y el rango por ítem [1, 7]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 22: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Otros significativos": con N=400, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (3, según la Media 19 y el rango por ítem [1, 7]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 22: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.

La base se genera igual: son límites del modelo que conviene conocer antes de usarla.

Verificación: pedido vs. obtenido

Cada parámetro configurado, medido sobre la base recién generada. Útil como evidencia en el anexo metodológico.

PARÁMETRO	VARIABLE	PEDIDO	OBTENIDO	ESTADO
Media	Autoeficacia académica	33.00	33.01	✓ coincide
DE	Autoeficacia académica	5.50	5.51	✓ coincide
Media	Procrastinación académica	32.00	32.00	✓ coincide
DE	Procrastinación académica	6.40	6.41	✓ coincide
Media	Familia	18.00	18.02	✓ coincide
DE	Familia	3.20	3.23	✓ coincide
Media	Amigos	18.00	18.00	✓ coincide

PARÁMETRO	VARIABLE	PEDIDO	OBTENIDO	ESTADO
DE	Amigos	3.20	3.22	✓ coincide
Media	Otros significativos	19.00	19.00	✓ coincide
DE	Otros significativos	2.90	2.93	✓ coincide
α	Autoeficacia académica	0.88	0.891	✓ coincide
α	Procrastinación académica	0.85	0.847	✓ coincide
α	Familia	0.85	0.840	✓ coincide
α	Amigos	0.85	0.854	✓ coincide
α	Otros significativos	0.83	0.826	✓ coincide
r	Autoeficacia académica ↔ Promedio ponderado	0.45	0.450	✓ coincide
r	Procrastinación académica ↔ Promedio ponderado	-0.38	-0.380	✓ coincide
r	Apoyo social percibido — EAS ↔ Promedio ponderado	0.22	0.220	✓ coincide
r	Autoeficacia académica ↔ Procrastinación académica	-0.40	-0.400	✓ coincide
r	Autoeficacia académica ↔ Apoyo social percibido — EAS	0.30	0.300	✓ coincide
r	Procrastinación académica ↔ Apoyo social percibido — EAS	-0.18	-0.180	✓ coincide
%	Sexo (Mujer / Hombre)	55% / 45%	55.0% / 45.0%	✓ coincide
prevalencia	Riesgo de deserción (desenlace binario)	18.0%	18.0%	✓ coincide
OR	Riesgo de deserción ~ Autoeficacia académica (OR por DE, regresión logística)	0.55	0.56	✓ coincide
OR	Riesgo de deserción ~ Procrastinación académica (OR por DE, regresión logística)	1.70	1.52	✓ coincide
OR	Riesgo de deserción ~ Promedio ponderado (OR por DE, regresión logística)	0.60	0.56	✓ coincide

Vista Previa de Datos Generados

PARTICIPANTES	VARIABLES	PRUEBAS
400	45	5