Verificación de la base simulada

Base: 450 casos y 31 columnas · semilla 5050 (la misma configuración y semilla dan la misma base)
StatSim Pro 2027.01.15 · 21 de octubre de 2026

⚠️ 4 avisos de la configuración

- Escala "Postergación": con N=450, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (3.33, según la Media 15 y el rango por ítem [1, 5]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 24: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Distracción": con N=450, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (3, según la Media 14 y el rango por ítem [1, 5]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 24: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Desorganización": con N=450, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (3, según la Media 14 y el rango por ítem [1, 5]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 24: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.
- Escala "Autoeficacia académica": con N=450, su total entero queda escalonado incluso con la DE máxima posible (4.66, según la Media 26 y el rango por ítem [1, 5]): la prueba de Kolmogorov–Smirnov, la que se usa con N ≥ 50, rechazará su normalidad en ≈ 99 % de las muestras aunque su forma sea normal (Shapiro–Wilk es mucho menos sensible). Para bajar a ≈ 13 % haría falta DE ≈ 24: añade ítems o amplía el rango por ítem, o reduce N.

La base se genera igual: son límites del modelo que conviene conocer antes de usarla.

Verificación: pedido vs. obtenido

Cada parámetro configurado, medido sobre la base recién generada. Útil como evidencia en el anexo metodológico.

PARÁMETRO	VARIABLE	PEDIDO	OBTENIDO	ESTADO
Media	Postergación	15.00	15.00	✓ coincide
DE	Postergación	3.00	3.00	✓ coincide
Media	Distracción	14.00	13.98	✓ coincide
DE	Distracción	2.90	2.94	✓ coincide
Media	Desorganización	14.00	13.99	✓ coincide
DE	Desorganización	2.80	2.81	✓ coincide
Media	Autoeficacia académica	26.00	25.98	✓ coincide
DE	Autoeficacia académica	4.50	4.49	✓ coincide
α	Postergación	0.82	0.812	✓ coincide
α	Distracción	0.80	0.820	✓ coincide
α	Desorganización	0.78	0.783	✓ coincide
α	Autoeficacia académica	0.86	0.853	✓ coincide
r	Procrastinación académica — EPA ↔ Autoeficacia académica	-0.40	-0.401	✓ coincide
%	Sexo (Mujer / Hombre)	50% / 50%	50.0% / 50.0%	✓ coincide

Vista Previa de Datos Generados

PARTICIPANTES	VARIABLES	PRUEBAS
450	31	4