

Corrigé exercice2 Bacc D 2016

Exercice 2

1) Les faces d'un dé truqué sont numérotées : 1, 2, 2, 3, 4 et 6.

On lance une seule fois ce dé.

P_i est la probabilité d'apparition de la face numérotée i .

Le nombre de cas possibles est 6.

On a une seule face numérotée 1, donc $P_1 = \frac{1}{6}$

On a deux faces numérotée 2, donc $P_2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

On a une seule face numérotée 3, donc $P_3 = \frac{1}{6}$

On a une seule face numérotée 4, donc $P_4 = \frac{1}{6}$

On a une seule face numérotée 6, donc $P_6 = \frac{1}{6}$

2) On lance deux fois le dé.

Tableau de la somme des numéros obtenus

+	1	2	3	4	6
1	2	3	4	5	7
2	3	4	5	6	8
3	4	5	6	7	9
4	5	6	7	8	10
6	7	8	9	10	12

a) A : « La somme des deux numéros obtenus est égale à 4 »

$$A = \{(1;3);(2;2);(3;1)\}$$

$$P(A) = P_1 \cdot P_3 + P_2 \cdot P_2 + P_3 \cdot P_1 = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$$

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

b) On note X la variable aléatoire définie par la somme des numéros affichés lors des deux lancements.

L'univers image est $X(\Omega) = \{2;3;4;5;6;7;8;9;10;12\}$.

$$P(X=2) = P_1 \cdot P_1 = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$P(X=3) = 2 \cdot P_1 \cdot P_2 = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$$

$$P(X=4)=P_2^2+2P_1 \cdot P_3=\left(\frac{1}{3}\right)^2+2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}=\frac{1}{6}$$

$$P(X=5)=2P_1 \cdot P_4+2P_2 \cdot P_3=2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}+2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}=\frac{1}{6}$$

$$P(X=6)=2P_2 \cdot P_4+P_3 \cdot P_3=2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}+\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{5}{36}$$

$$P(X=7)=2P_3 \cdot P_4+2P_1 \cdot P_6=2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}+2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}=\frac{1}{9}$$

$$P(X=8)=2P_2 \cdot P_6+(P_6)^2=2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}+\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{5}{36}$$

$$P(X=9)=2P_3 \cdot P_6=2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}=\frac{1}{18}$$

$$P(X=10)=2P_4 \cdot P_6=2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}=\frac{1}{18}$$

$$P(X=12)=P_6^2=\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{1}{36}$$

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$

Espérance mathématique de X

$$E(X)=2 \cdot \frac{1}{36}+3 \cdot \frac{1}{9}+4 \cdot \frac{1}{6}+5 \cdot \frac{1}{6}+6 \cdot \frac{5}{36}+7 \cdot \frac{1}{9}+8 \cdot \frac{5}{36}+9 \cdot \frac{1}{18}+10 \cdot \frac{1}{18}+12 \cdot \frac{1}{36}$$

$$E(X)=6$$

3-On lance trois fois de suite le dé.

Y est la variable aléatoire égale au nombre d'apparition de la face portant le numéro 2.

$$Y(\Omega)=\{0;1;2;3\} \quad .$$

Y suit la loi binomiale de paramètre $p=P_2=\frac{1}{3}$, $n=3$ et $q=1-p=\frac{2}{3}$.

Pour tout $k \in \{0;1;2;3\}$, $P[Y=k]=C_3^k p^k q^{3-k}$.

$$P[Y=0]=C_3^0 p^0 q^3=C_3^0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$$

$$P[Y=1]=C_3^1 p^1 q^2=C_3^1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$$

$$P[Y=2]=C_3^2 p^2 q^1=C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^1=\frac{2}{9}$$

$$P[Y=3] = C_3^3 p^1 q^0 = C_3^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^0 = \frac{1}{27}$$

y_i	0	1	2	3
P[Y=y_i]	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$

b- Variance

$$V(Y) = npq = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$V(Y) = \frac{2}{3} \quad .$$