

Johannes Byle

11.15

$$U = (m_1 + m_2)gL_1(1 - \cos \phi_1) + m_2gL_2(1 - \cos \phi_2)$$

$$T = \frac{1}{2}m_1L_1^2\dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2}m_2[L_1^2\dot{\phi}_1^2 + L_2^2\dot{\phi}_2^2 + 2L_1L_2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)]$$

Assuming the small angle approximation:

$$U = (m_1 + m_2)gL_1\frac{\phi_1^2}{2} + m_2gL_2\frac{\phi_2^2}{2}$$

$$T = \frac{1}{2}L_1^2\dot{\phi}_1^2(m_1 + m_2) + \frac{1}{2}m_2L_2^2\dot{\phi}_2^2 + m_2L_1L_2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2$$

Which give us the equations of motion which match (11.41) and (11.42):

$$\begin{bmatrix} (m_1 + m_2)L_1^2 & m_2L_1L_2 \\ m_2L_1L_2 & m_2L_2^2 \end{bmatrix} \ddot{\phi} = - \begin{bmatrix} (m_1 + m_2)gL_1 & 0 \\ 0 & m_2gL_2 \end{bmatrix} \phi$$

11.16(a)

$$K - \omega^2 M = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2)(gL_1 - \omega^2 L_1^2) & -\omega^2 m_2 L_1 L_2 \\ -\omega^2 m_2 L_1 L_2 & m_2(gL_2 - \omega^2 L_2^2) \end{bmatrix}$$

$$\det(K - \omega^2 M) = (m_1 + m_2)(gL_1 - \omega^2 L_1^2)m_2(gL_2 - \omega^2 L_2^2) - (-\omega^2 m_2 L_1 L_2)^2$$