# 박해준님 복약안내문

병동 : 3W(312)
환자번호 : 01463490 / 나이(성별) : 48 세(남)
처방일 : 2026-05-15 / 진료과 : OS

병원명 : 청구성심병원
출력일 : 2026-05-15 09:43

| 약품 | 용법 | 부작용 및 주의사항 |
|---|---|---|
| 한미 세프라딘 캡슐 500mg<br>  <br>기밀용기, 실온(1 ~ 30℃)보관 | 1일 3회 1캡슐 씩<br><br>4일 | ●효능 : 세균 증식 억제 및 사멸을 통해 감염으로 인한 질환을 치료 및 예방하는 항생제입니다. 투약 중단 금지<br><br>1. 증상이 호전되더라도 의사의 지시없이 복용을 중단하지 않습니다.<br>2. 페니실린 알레르기 또는 다른 항생제 알레르기가 있는 경우 미리 의사, 약사에게 알립니다.<br>3. 이 약은 설사를 유발할 수 있으나 의사, 약사의 지시없이 임의로 지사제를 복용하지 않습니다. |
| 락스타 더블 캡슐<br>  <br>기밀용기, 실온보관(1-30℃) | 1일 3회 1 씩<br><br>4일 | ●효능 : 장내 세균총을 정상화하여 변비, 묽은 변, 복부팽만감 등의 증상을 개선합니다.<br><br>1. 이 약은 캡슐을 개봉하지 않고 통째로 삼켜 복용합니다.<br>2. 이 약은 식사와 상관없이 복용 가능하며, 위장 장애가 있는 경우 음식과 함께 복용하는 것이 좋습니다.<br>3. 설사로 인한 수분손실을 보충하기 위해, 염분 또는 당을 함유하고 있는 음료를 충분히 섭취합니다.<br>4. 복용 2일 후에도 증상이 개선되지 않을 경우 의사와 상의합니다. |
| 건일 로딘 정 200mg<br>  <br>기밀용기 | 1일 3회 1정 씩<br><br>4일 | ●효능 : 비스테로이드성 소염진통제로 급성 염증 및 통증을 완화시킵니다.<br><br>1. 이 약을 복용하는 동안 술을 마시지 않습니다.<br>2. 쉽게 출혈이 발생할 수 있으므로 부상에 주의하고 부드러운 칫솔 및 전기 면도기를 사용합니다.<br>4. 태아에게 해로울 수 있으므로 임신 중 복용하지 않으며, 일시적인 불임을 일으킬 수 있으므로 임신계획이 있는 경우에도 복용하지 않습니다.<br>4. 알레르기 반응, 속쓰림, 피토함, 호흡곤란, 심한 복통, 가슴통증 등이 나타나는 경우 즉시 의사, 약사에게 알립니다. |
| 스테렌 정<br>  <br>기밀용기, 실온(1-30℃)보관 | 1일 3회 1정 씩<br><br>4일 | ●효능 : 위점막 보호 및 재생을 통해 위염 예방 및 위점막 병변을 개선합니다.<br><br>1. 의사, 약사의 지시에 따라 복용합니다. 임의로 더 많이 또는 더 오래 복용하지 않습니다.<br>2. 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. |

정성보건