

LISTA 2

1. Weronika Jakubowska

Zad. 1 lista 2

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

Obliczam macierz transponowaną R^T

$$R^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

Sprawdzam czy zachodzi warunek $R^T R = I_3$

$$R^T R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$0 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

$$0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 0 + 0 \cdot 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 0 = 0$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 0 \cdot 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 \cdot 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 0 + 0 \cdot 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 0 = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 0 \cdot 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 \cdot 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Warunek $R^T R = I_3$ zachodzi

Sprawdźmy, czy zachodzi warunek $RR^T = I_3$

$$RR^T = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$0 \cdot 0 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$0 \cdot 1 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 0 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

$$1 \cdot 0 + 0 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

$$1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

$$0 \cdot 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

$$0 \cdot 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Zachodzi warunek $RR^T = I_3$

Sprawdźmy, czy zachodzi warunek $\det R = 1$

$$\det R = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1$$

Zachodzi warunek $\det R = 1$

Macierz R

• jest nieosobliwa (wyznacznik różny od 0)

• jest to macierz ortogonalna bo spełnia warunek $R^T R = I_3$

$$R^T R = R R^T = I_3$$

$\xrightarrow{\text{transpozycja}}$

• macierz odwrotna do macierzy R jest jej macierzą transponowaną, tj. $R^{-1} = R^T$. Macierz ta też jest ortogonalna

• macierze ortogonalne służą do przekształceń ortogonalnych,

2. Igor Dominiak

Zadanie 2 Lista 2

i, j, k $i = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)^T$, $j = ?$, $k = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right)^T$

układ prostokątny $\|i\| = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ $\|k\| = 1$

$$\begin{cases} i \times j = k \\ j \times k = i \\ k \times i = j \end{cases}$$

$$j = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & \cancel{1} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} i - \frac{\sqrt{3}}{2} k = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\|k\| = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

Sprawdzenie:

$$\det \begin{vmatrix} i_1 & i_2 & i_3 \\ j_1 & j_2 & j_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot 1$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{3}{4} = 0$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{3}{4} = 0$$

3. Karolina Głuszek

3. Sprawdźmy warunki prawokrętności:

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$$

$$\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$$

$$\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{i}_0 \times \vec{j}_0 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} + 0 \vec{j} + \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{k} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \vec{k}_0$$

$$\vec{j}_0 \times \vec{k}_0 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{vmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} + 0 \vec{j} - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{k} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \vec{i}_0$$

$$\vec{k}_0 \times \vec{i}_0 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{vmatrix} = 0 \vec{i} + 1 \vec{j} + 0 \vec{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{j}_0$$

Układ 0 jest prawokrętny

$$\vec{i}_1 \times \vec{j}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} = 0 \vec{i} + 0 \vec{j} + 1 \vec{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \neq \vec{k}_1$$

Układ 1 nie jest prawokrętny

Wersory po zmianie:

$$\vec{i}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{j}_1 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{k}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{i}_1 \times \vec{j}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} = 0 \vec{i} + 0 \vec{j} + 1 \vec{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{k}_1$$

$$\vec{j}_1 \times \vec{k}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{j} + 0 \vec{k} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{i}_1$$

$$k_1 \times i_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & +1 \\ +\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \vec{i} + \frac{1}{2} \vec{j} + 0 \vec{k} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{j}_1$$

Po zmianie wektorów układ 1 jest prawosłowny

Wyznaczamy macierz obrotu R_0^1

$$p_0 = R_0^1 p_1$$

$$R_0^1 = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$p_1 = (R_0^1)^{-1} \cdot p_0$$

Wiedząc, że macierz obrotu jest macierzą ortogonalną

$$(R_0^1)^{-1} = (R_0^1)^T$$

$$p_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2} \\ \frac{1 - \sqrt{6}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

4. Jan Bronicki

4. Macierze bazowe dla grupy obrotów $SO(3)$ to elementarne obroty względem osi głównych, czyli

$$\text{rot}(x, \phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\phi & -s_\phi \\ 0 & s_\phi & c_\phi \end{bmatrix}, \quad \text{rot}(y, \theta) = \begin{bmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{bmatrix}, \quad \text{rot}(z, \psi) = \begin{bmatrix} c_\psi & -s_\psi & 0 \\ s_\psi & c_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Pokazać na konkretnym przykładzie (wykorzystując ogólną postać macierzy bazowych), że mnożenie macierzy obrotu względem różnych osi jest nieprzemienne, zaś względem tej samej osi – jest przemienne.

$$\left. \begin{aligned} \text{rot}(y, \alpha) \cdot \text{rot}(y, \beta) &= \text{rot}(y, \beta) \cdot \text{rot}(y, \alpha) \\ \text{rot}(y, \alpha) \cdot \text{rot}(z, \beta) &\neq \text{rot}(z, \beta) \cdot \text{rot}(y, \alpha) \end{aligned} \right\}$$

$$R_1 = \text{rot}(y, \alpha) \cdot \text{rot}(z, \beta) = \begin{bmatrix} c_\alpha & 0 & s_\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\alpha & 0 & c_\alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_\beta & -s_\beta & 0 \\ s_\beta & c_\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\beta c_\alpha & -s_\beta c_\alpha & s_\alpha \\ s_\beta c_\alpha & c_\beta c_\alpha & 0 \\ -s_\alpha c_\beta & s_\alpha s_\beta & c_\alpha \end{bmatrix}$$

$$R_2 = \text{rot}(z, \beta) \cdot \text{rot}(y, \alpha) = \begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\beta & 0 \\ s_\beta & c_\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_\alpha & 0 & s_\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\alpha & 0 & c_\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\beta c_\alpha & -s_\beta & c_\beta s_\alpha \\ s_\beta c_\alpha & c_\beta & s_\beta s_\alpha \\ -s_\alpha & 0 & c_\alpha \end{bmatrix}$$

$$R_1 \neq R_2!$$

$$R_3 = \text{rot}(y, \alpha) \cdot \text{rot}(y, \beta) = \begin{bmatrix} c_\alpha & 0 & s_\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\alpha & 0 & c_\alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_\beta & 0 & s_\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\beta & 0 & c_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta - s_\alpha s_\beta & 0 & c_\alpha s_\beta + s_\alpha c_\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\alpha c_\beta - s_\beta c_\alpha & 0 & -s_\alpha s_\beta + c_\alpha c_\beta \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= c_\alpha c_\beta - s_\alpha s_\beta \\ \sin(\alpha + \beta) &= s_\alpha c_\beta + s_\beta c_\alpha \end{aligned} \right\}$$

$$R_4 = \text{rot}(y, \beta) \cdot \text{rot}(y, \alpha) = \begin{bmatrix} c_\beta & 0 & s_\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\beta & 0 & c_\beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_\alpha & 0 & s_\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\alpha & 0 & c_\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta - s_\alpha s_\beta & 0 & c_\beta s_\alpha + c_\alpha s_\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\beta c_\alpha - s_\alpha c_\beta & 0 & -s_\alpha s_\beta + c_\alpha c_\beta \end{bmatrix}$$

$$R_3 = R_4!$$

5. Wiktor Springer

$$\begin{aligned}
 RPY(\alpha, \beta, \varphi) &= \text{rot}(z, \alpha) \cdot \text{rot}(y, \beta) \cdot \text{rot}(x, \varphi) \\
 &= \begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_\beta & 0 & s_\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\beta & 0 & c_\beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\varphi & -s_\varphi \\ 0 & s_\varphi & c_\varphi \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta & -s_\alpha & c_\alpha s_\beta \\ s_\alpha c_\beta & c_\alpha & s_\alpha s_\beta \\ -s_\beta & 0 & c_\beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\varphi & -s_\varphi \\ 0 & s_\varphi & c_\varphi \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta & -s_\alpha c_\varphi + c_\alpha s_\beta s_\varphi & s_\alpha s_\varphi + c_\alpha s_\beta c_\varphi \\ s_\alpha c_\beta & c_\alpha c_\varphi + s_\alpha s_\beta s_\varphi & -c_\alpha s_\varphi + s_\alpha s_\beta c_\varphi \\ -s_\beta & c_\beta s_\varphi & c_\beta c_\varphi \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

6. Kajetan Zdanowicz

Kajetan Zdanowicz 248933

Zad. 6

$$R = RPY\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{3}, 0\right)$$

$$RPY(\alpha, \beta, \gamma) = \text{rot}(z, \alpha) \cdot \text{rot}(y, \beta) \cdot \text{rot}(x, \gamma)$$

$$RPY(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{bmatrix} C_\alpha & -S_\alpha & 0 \\ S_\alpha & C_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_\beta & 0 & S_\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -S_\beta & 0 & C_\beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C_\gamma & -S_\gamma \\ 0 & S_\gamma & C_\gamma \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C_\alpha C_\beta & -S_\alpha & C_\alpha S_\beta \\ S_\alpha C_\beta & C_\alpha & S_\alpha S_\beta \\ -S_\beta & 0 & C_\beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C_\gamma & -S_\gamma \\ 0 & S_\gamma & C_\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_\alpha C_\beta & -S_\alpha C_\gamma + C_\alpha S_\beta S_\gamma & S_\alpha S_\gamma + C_\alpha S_\beta C_\gamma \\ S_\alpha C_\beta & C_\alpha C_\gamma + S_\alpha S_\beta S_\gamma & -C_\alpha S_\gamma + S_\alpha S_\beta C_\gamma \\ -S_\beta & C_\beta S_\gamma & C_\beta C_\gamma \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} S_\alpha = 1 \\ S_\beta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ S_\gamma = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} C_\alpha = 0 \\ C_\beta = \frac{1}{2} \\ C_\gamma = 1 \end{array}$$

$$RPY\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, 0\right) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

7. Izabella Cwojdzńska

zad 7 Izabella Cwojdzńska 248001

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} =$$

$$= E(\alpha, \beta, \gamma)$$

$$c\beta = \sqrt{2}/2 \rightarrow 1^\circ \quad \beta = \frac{\pi}{4} \quad s\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$E(\alpha, \frac{\pi}{4}, \gamma) = \begin{bmatrix} c\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot c\gamma - s\alpha s\gamma & -s\gamma \cdot c\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} - s\alpha c\gamma & \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot c\alpha \\ s\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot c\gamma + s\alpha c\gamma & -s\alpha s\gamma \frac{\sqrt{2}}{2} + c\alpha c\gamma & \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot s\alpha \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot c\gamma & \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot s\gamma & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = *$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot c\gamma = 0 \Rightarrow c\gamma = 0 \Rightarrow \gamma = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot s\gamma \Rightarrow s\gamma = 1$$

$$* = E(\alpha, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} -s\alpha & -c\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} c\alpha \\ c\alpha & -s\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} s\alpha \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -s\alpha = 0 \\ c\alpha = 1 \\ -\sqrt{2}/2 = -\cos\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 0 &= -s\alpha \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{\sqrt{2}}{2} c\alpha \\ 0 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot s\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -s\alpha = 0 \\ c\alpha = 1 \\ c\alpha = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} -s\alpha &= 0 \\ c\alpha &= 1 \\ s\alpha &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} s\alpha = 0 \\ c\alpha = 1 \end{cases} \Rightarrow \alpha = 0$$

$$c\beta = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow 2^\circ \quad \beta = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow s\beta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$E(\alpha, -\frac{\pi}{4}, \gamma) = \begin{bmatrix} c\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot c\gamma - s\alpha c\gamma & -s\gamma \cdot c\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} - s\alpha c\gamma & -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot c\alpha \\ s\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot c\gamma + s\alpha c\gamma & -s\alpha s\gamma \frac{\sqrt{2}}{2} + c\alpha c\gamma & -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot s\alpha \\ \frac{\sqrt{2}}{2} c\gamma & -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot s\gamma & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot c\gamma &= 0 \Rightarrow c\gamma = 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot s\gamma &= \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow s\gamma = -1 \end{aligned} \Rightarrow \gamma = -\frac{\pi}{2}$$

$$E(\alpha, -\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} s_\alpha & \frac{\sqrt{2}}{2} c_\alpha & -\frac{\sqrt{2}}{2} c_\alpha \\ -c_\alpha & s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} s_\alpha \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} s_\alpha = 0 \\ -c_\alpha = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} c_\alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -\frac{\sqrt{2}}{2} c_\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} s_\alpha = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} s_\alpha = 0 \\ c_\alpha = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} c_\alpha = -1 \\ s_\alpha = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} s_\alpha = 0 \\ c_\alpha = -1 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \pi$$

$$E(\pi, -\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{2})$$

RPY

$$RPY(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta & -s_\alpha c_\gamma + c_\alpha s_\beta s_\gamma & s_\alpha s_\gamma + c_\alpha s_\beta c_\gamma \\ s_\alpha c_\beta & c_\alpha c_\gamma + s_\alpha s_\beta s_\gamma & -c_\alpha s_\gamma + s_\alpha s_\beta c_\gamma \\ -s_\beta & c_\beta s_\gamma & c_\beta c_\gamma \end{bmatrix}$$

$$-s_\beta = 0$$

$$s_\beta = 0$$

$$1^\circ \beta = 0$$

$$\begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\gamma \\ s_\alpha & c_\alpha c_\gamma & -c_\alpha s_\gamma \\ 0 & s_\gamma & c_\gamma \end{bmatrix} = RPY(\alpha, 0, \gamma)$$

$$\begin{cases} s_\gamma = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ c_\gamma = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \gamma = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} & s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \\ s_\alpha & c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} & -c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = RPY(\alpha, 0, \frac{\pi}{4})$$

$$\begin{cases} s_\alpha = 1 \\ c_\alpha = 0 \\ -s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \\ s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} s_\alpha = 1 \\ c_\alpha = 0 \\ s_\alpha = 1 \\ c_\alpha = 0 \\ s_\alpha = 1 \\ c_\alpha = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$1^\circ RPY(\alpha, \beta, \gamma) = RPY(\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{4})$$

$$2^\circ \quad s\beta = 0 \quad \beta = \pi$$

$$RPY(\alpha, \pi, \gamma) = \begin{bmatrix} -c_\alpha & -s_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\gamma \\ -s_\alpha & c_\alpha c_\gamma & -c_\alpha s_\gamma \\ 0 & -s_\gamma & -c_\gamma \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} -s_\gamma &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -c_\gamma &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} s_\gamma &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ c_\gamma &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned} \Rightarrow \gamma = -\frac{3\pi}{4}$$

$$RPY(\alpha, \pi, \frac{3\pi}{4}) = \begin{bmatrix} -c_\alpha & s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} & -s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -s_\alpha & -c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} & c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -c_\alpha = 0 \\ -s_\alpha = 1 \\ s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \\ -s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c_\alpha = 0 \\ s_\alpha = -1 \\ s_\alpha = -1 \\ c_\alpha = 0 \\ s_\alpha = -1 \\ c_\alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = -\frac{\pi}{2}$$

$$2^\circ \quad RPY(\alpha, \beta, \gamma) = (-\frac{\pi}{2}, \pi, -\frac{3\pi}{4})$$

$$3^\circ \quad s\beta = 0 \Rightarrow \beta = -\pi$$

$$RPY(\alpha, -\pi, \gamma) = \begin{bmatrix} -c_\alpha & -s_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\gamma \\ -s_\alpha & c_\alpha c_\gamma & -c_\alpha s_\gamma \\ 0 & -s_\gamma & -c_\gamma \end{bmatrix} =$$

$$\begin{aligned} -s_\gamma &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -c_\gamma &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned} \Rightarrow \gamma = -\frac{3\pi}{4}$$

$$RPY(\alpha, -\pi, \frac{\pi}{4}) = \begin{bmatrix} -c_\alpha & s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} & -s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -s_\alpha & -c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} & c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -c_\alpha = 0 \\ -s_\alpha = 1 \\ s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \\ s_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ c_\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c_\alpha = 0 \\ s_\alpha = -1 \\ s_\alpha = -1 \\ c_\alpha = 0 \\ s_\alpha = -1 \\ c_\alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = -\frac{\pi}{2}$$

3°

$$RPY(\alpha, \beta, \gamma) = RPY(-\frac{\pi}{2}, -\pi, -\frac{3\pi}{4})$$