

# **Formelsammlung Mathematik**

Juli 2017

0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	8	10
9	1001	9	11
10	1010	A	12
11	1011	B	13
12	1100	C	14
13	1101	D	15
14	1110	E	16
15	1111	F	17

$$\sin(-x) = -\sin x$$
$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$
$$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$
$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$
$$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

**Polarkoordinaten**

$$x = r \cos \varphi$$
$$y = r \sin \varphi$$
$$\varphi \in (-\pi, \pi]$$
$$\det J = r$$

**Zylinderkoordinaten**

$$x = r_{xy} \cos \varphi$$
$$y = r_{xy} \sin \varphi$$
$$z = z$$
$$\det J = r_{xy}$$

**Kugelkoordinaten**

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$
$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$
$$z = r \cos \theta$$
$$\varphi \in (-\pi, \pi], \theta \in [0, \pi]$$
$$\det J = r^2 \sin \theta$$

$$\theta = \beta - \pi/2$$
$$\beta \in [-\pi/2, \pi/2]$$
$$\cos \theta = \sin \beta$$
$$\sin \theta = \cos \beta$$

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Grundlagen</b>	<b>5</b>		
1.1 Arithmetik	5	3.2.2 Konvergente Folgen	17
1.1.1 Zahlenbereiche	5	3.2.3 Häufungspunkte	17
1.1.2 Intervalle	5	3.2.4 Cauchy-Folge	17
1.1.3 Summen	5	3.2.5 Beschränkte Folgen	17
1.1.4 Produkte	6	3.3 Reihen	17
1.1.5 Binomischer Lehrsatz	6	3.3.1 Absolute Konvergenz	18
1.1.6 Potenzgesetze	6	3.3.2 Konvergenzkriterien	18
1.2 Gleichungen	6	3.3.3 Cauchy-Produkt	18
1.2.1 Äquivalenzumformungen	6	3.4 Reelle Funktionen	18
1.2.2 Quadratische Gleichungen	7	3.4.1 Monotone Funktionen	18
1.3 Komplexe Zahlen	7	3.4.2 Grenzwert einer Funktion	18
1.3.1 Rechenoperationen	7	3.4.3 Stetige Funktionen	18
1.3.2 Betrag	7	3.5 Differentialrechnung	18
1.3.3 Konjugation	7	3.5.1 Differentialquotient	18
1.4 Logik	7	3.5.2 Ableitungsregeln	19
1.4.1 Aussagenlogik	7	3.5.3 Tangente und Normale	19
1.4.2 Prädikatenlogik	9	3.5.4 Taylorreihe	19
1.5 Mengenlehre	10	3.5.5 Kurvendiskussion	19
1.5.1 Definitionen	10	3.6 Integralrechnung	19
1.5.2 Boolesche Algebra	10	3.6.1 Regelfunktionen	19
1.5.3 Teilmengenrelation	10	3.6.2 Stetige Funktionen	19
1.5.4 Natürliche Zahlen	10	3.6.3 Hauptsatz	19
1.5.5 ZFC-Axiome	10	3.6.4 Integrationsregeln	19
1.5.6 Kardinalität	11	3.6.5 Integral bei Polstellen	20
1.6 Funktionen	11	3.7 Skalarfelder	20
1.6.1 Surjektionen	11	3.7.1 Partielle Ableitungen	20
1.6.2 Injektionen	11	3.7.2 Gradient	20
1.6.3 Bijektionen	11	3.7.3 Richtungsableitung	21
1.6.4 Komposition	11	3.8 Vektorfelder	21
1.6.5 Einschränkung	11	3.8.1 Tangentialraum	21
1.6.6 Bild	12	3.8.2 Richtungsableitung	21
1.6.7 Urbild	12	3.9 Variationsrechnung	21
1.7 Formale Systeme	13	3.9.1 Fundamentallemma	21
1.7.1 Formale Sprachen	13	3.9.2 Euler-Lagrange-Gleichung	21
1.7.2 Formale Grammatiken	13	3.10 Fourier-Analyse	22
1.7.3 Formale Systeme	13	3.10.1 Fourierreihen	22
1.8 Mathematische Strukturen	14		
<b>2 Funktionen</b>	<b>15</b>	<b>4 Lineare Algebra</b>	<b>23</b>
2.1 Elementare Funktionen	15	4.1 Grundbegriffe	23
2.1.1 Exponentialfunktion	15	4.1.1 Norm	23
2.1.2 Logarithmusfunktion	15	4.1.2 Skalarprodukt	23
2.1.3 Winkelfunktionen	15	4.2 Koordinatenvektoren	24
2.2 Zahlentheoretische Funktionen	16	4.2.1 Koordinatenraum	24
2.2.1 Eulersche Phi-Funktion	16	4.2.2 Kanonisches Skalarprodukt	24
2.2.2 Carmichael-Funktion	16	4.3 Matrizen	25
		4.3.1 Quadratische Matrizen	25
<b>3 Analysis</b>	<b>17</b>	4.4 Lineare Gleichungssysteme	26
3.1 Ungleichungen	17	4.5 Multilineare Algebra	26
3.1.1 Dreiecksungleichung	17	4.5.1 Äußeres Produkt	26
3.1.2 Bernoullische Ungleichung	17	4.6 Analytische Geometrie	27
3.2 Konvergenz	17	4.6.1 Geraden	27
3.2.1 Umgebungen	17	4.6.2 Ebenen	27
		<b>5 Differentialgeometrie</b>	<b>28</b>

5.1	Kurven . . . . .	28	9.1	Gruppentheorie . . . . .	34
5.1.1	Parameterkurven . . . . .	28	9.1.1	Grundbegriffe . . . . .	34
5.1.2	Differenzierbare Parameterkurven . . . . .	28	9.1.2	Gruppenaktionen . . . . .	34
5.2	Koordinatensysteme . . . . .	28	9.2	Ringe . . . . .	34
5.2.1	Polarkoordinaten . . . . .	28	9.2.1	Polynome . . . . .	34
5.3	Mannigfaltigkeiten . . . . .	28	9.3	Körper . . . . .	34
5.3.1	Grundbegriffe . . . . .	28			
5.3.2	Vektorfelder . . . . .	29			
<b>6</b>	<b>Funktionentheorie</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>Tabellen</b>	<b>35</b>
6.1	Holomorphe Funktionen . . . . .	30	10.1	Kombinatorik . . . . .	35
6.2	Harmonische Funktionen . . . . .	30	10.1.1	Binomialkoeffizienten . . . . .	35
6.3	Wegintegrale . . . . .	30	10.1.2	Stirling-Zahlen erster Art . . . . .	36
			10.1.3	Stirling-Zahlen zweiter Art . . . . .	36
<b>7</b>	<b>Dynamische Systeme</b>	<b>31</b>	10.2	Zahlentheorie . . . . .	37
7.1	Grundbegriffe . . . . .	31	10.2.1	Primzahlen . . . . .	37
7.2	Iterationen . . . . .	31			
<b>8</b>	<b>Kombinatorik</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>Anhang</b>	<b>38</b>
8.1	Kombinatorische Funktionen . . . . .	32	11.1	Griechisches Alphabet . . . . .	38
8.1.1	Faktorielle . . . . .	32	11.2	Frakturbuchstaben . . . . .	38
8.1.2	Binomialkoeffizienten . . . . .	32	11.3	Mathematische Konstanten . . . . .	38
8.2	Differenzenrechnung . . . . .	32	11.4	Physikalische Konstanten . . . . .	38
8.3	Endliche Summen . . . . .	32	11.5	Einheiten . . . . .	39
8.4	Formale Potenzreihen . . . . .	33	11.5.1	Vorsätze . . . . .	39
8.4.1	Ring der formalen Potenzreihen . . . . .	33	11.5.2	SI-System . . . . .	39
8.4.2	Binomische Reihe . . . . .	33	11.5.3	Nicht-SI-Einheiten . . . . .	39
			11.5.4	Britische Einheiten . . . . .	39
<b>9</b>	<b>Algebra</b>	<b>34</b>	11.6	Abkürzungsverzeichnis . . . . .	40
			11.6.1	Alphabetisches Verzeichnis . . . . .	40
			11.6.2	Thematisches Verzeichnis . . . . .	40

# 1 Grundlagen

## 1.1 Arithmetik

### 1.1.1 Zahlenbereiche

Natürliche Zahlen ab null:

$$\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}. \quad (1.1)$$

Natürliche Zahlen ab eins:

$$\mathbb{N}_1 := \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}. \quad (1.2)$$

Natürliche Zahlen:

$$\begin{aligned} \mathbb{N}, \text{ wenn es keine Rolle spielt,} \\ \text{ob } \mathbb{N} := \mathbb{N}_0 \text{ oder } \mathbb{N} := \mathbb{N}_1. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Ganze Zahlen:

$$\mathbb{Z} := \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}. \quad (1.4)$$

Rationale Zahlen:

$$\mathbb{Q} := \{\frac{z}{n} \mid z \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}_0\}. \quad (1.5)$$

Reelle Zahlen:

$$\mathbb{R} := \overline{\mathbb{Q}} \text{ bezüglich } d(x, y) = |x - y|. \quad (1.6)$$

Positive reelle Zahlen:

$$\mathbb{R}^+ := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}. \quad (1.7)$$

Nichtnegative reelle Zahlen:

$$\mathbb{R}_0^+ := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}. \quad (1.8)$$

Negative reelle Zahlen:

$$\mathbb{R}^- := \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}. \quad (1.9)$$

Nichtpositive reelle Zahlen:

$$\mathbb{R}_0^- := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}. \quad (1.10)$$

Komplexe Zahlen:

$$\mathbb{C} := \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}. \quad (1.11)$$

Quaternionen:

$$\mathbb{H} := \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}. \quad (1.12)$$

Algebraische Zahlen:

$$\mathbb{A} := \{a \in \mathbb{C} \mid \exists P \in \mathbb{Q}[X]: P(a) = 0\}. \quad (1.13)$$

Irrationale Zahlen:

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \{\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, e, \dots\}. \quad (1.14)$$

Transzendente Zahlen:

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{A} = \{\pi, e, \dots\}. \quad (1.15)$$

Es gelten die folgenden Teilmengenbeziehungen:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H}. \quad (1.16)$$

Es gilt die folgende Abstufung der Mächtigkeit:

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = |\mathbb{A}| < |\mathbb{R}| = |\mathbb{C}|. \quad (1.17)$$

### 1.1.2 Intervalle

Abgeschlossene Intervalle:

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}. \quad (1.18)$$

Offene Intervalle:

$$(a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}. \quad (1.19)$$

Halboffene Intervalle:

$$[a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}, \quad (1.20)$$

$$(a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}. \quad (1.21)$$

Unbeschränkte Intervalle:

$$[a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}, \quad (1.22)$$

$$(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}, \quad (1.23)$$

$$(-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}, \quad (1.24)$$

$$(-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}. \quad (1.25)$$

### 1.1.3 Summen

**Definition. Summe.**

Für eine Folge  $(a_n)$ :

$$\sum_{k=m}^{m-1} a_k := 0, \quad (\text{leere Summe}) \quad (1.26)$$

$$\sum_{k=m}^n a_k := a_n + \sum_{k=m}^{n-1} a_k. \quad (n \geq m) \quad (1.27)$$

Für eine Konstante  $c$  gilt:

$$\sum_{k=m}^n c = (n - m + 1) c. \quad (1.28)$$

Der Summierungsoperator ist linear:

$$\sum_{k=m}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=m}^n a_k + \sum_{k=m}^n b_k, \quad (1.29)$$

$$\sum_{k=m}^n c a_k = c \sum_{k=m}^n a_k. \quad (1.30)$$

Indexverschiebung ist möglich:

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m-j}^{n-j} a_{k+j} = \sum_{k=m+j}^{n+j} a_{k-j}. \quad (1.31)$$

Aufspaltung ist möglich:

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m}^p a_k + \sum_{k=p+1}^n a_k. \quad (1.32)$$

Vertauschung der Reihenfolge bei Doppelsummen:

$$\sum_{i=p}^m \sum_{j=q}^n a_{ij} = \sum_{j=q}^m \sum_{i=p}^n a_{ij}. \quad (1.33)$$

### 1.1.4 Produkte

#### Definition. Produkt.

Für eine Folge  $(a_n)$ :

$$\prod_{k=m}^{m-1} a_k := 1, \quad (\text{leeres Produkt}) \quad (1.34)$$

$$\prod_{k=m}^n a_k := a_n \prod_{k=m}^{n-1} a_k. \quad (n \geq m) \quad (1.35)$$

Für eine Konstante  $c$  gilt:

$$\prod_{k=m}^n c = c^{n-m+1}. \quad (1.36)$$

Unter Voraussetzung des Kommutativgesetzes gilt

$$\prod_{k=m}^n (a_k b_k) = \left( \prod_{k=m}^n a_k \right) \left( \prod_{k=m}^n b_k \right), \quad (1.37)$$

$$\prod_{k=m}^n a_k^c = \left( \prod_{k=m}^n a_k \right)^c. \quad (c \in \mathbb{N}_0) \quad (1.38)$$

Formel (1.38) gilt auch für  $a_k \in \mathbb{R}^+$  und  $c \in \mathbb{C}$ .

Formel (1.37) ist ein Spezialfall von

$$\prod_{i=p}^m \prod_{j=q}^n a_{ij} = \prod_{j=q}^n \prod_{i=p}^m a_{ij}. \quad (1.39)$$

Indexverschiebung ist möglich:

$$\prod_{k=m}^n a_k = \prod_{k=m-j}^{n-j} a_{k+j} = \prod_{k=m+j}^{n+j} a_{k-j}. \quad (1.40)$$

Aufspaltung ist möglich:

$$\prod_{k=m}^n a_k = \left( \prod_{k=m}^p a_k \right) \left( \prod_{k=p+1}^n a_k \right). \quad (1.41)$$

Für  $a_k \in \mathbb{R}^+$  gilt

$$\prod_{k=m}^n a_k = \exp \left( \sum_{k=m}^n \ln(a_k) \right). \quad (1.42)$$

### 1.1.5 Binomischer Lehrsatz

Sei  $R$  ein unitärer Ring. Für  $a, b \in R$  mit  $ab = ba$  gilt:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad (1.43)$$

und

$$(a-b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k a^{n-k} b^k. \quad (1.44)$$

Die ersten Formeln sind:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (1.45)$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (1.46)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \quad (1.47)$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3, \quad (1.48)$$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4, \quad (1.49)$$

$$(a-b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4. \quad (1.50)$$

### 1.1.6 Potenzgesetze

#### Definition. Potenz.

Für  $a$  aus einem Monoid und  $n \in \mathbb{Z}, n \geq 1$ :

$$a^0 := 1, \quad (1.51)$$

$$a^n := a^{n-1} \cdot a. \quad (1.52)$$

Für  $a \in \mathbb{R}, a > 0$  und  $x \in \mathbb{C}$ :

$$a^x := \exp(\ln(a)x). \quad (1.53)$$

Für  $a \in \mathbb{R}, a > 0$  und  $x, y \in \mathbb{C}$  gilt:

$$a^{x+y} = a^x a^y, \quad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x}. \quad (1.54)$$

## 1.2 Gleichungen

#### Definition. Bestimmungsgleichung.

Sind  $f, g$  auf der Grundmenge  $G$  definierte Funktionen, so nennt man

$$f(x) = g(x) \quad (1.55)$$

eine *Bestimmungsgleichung*, wenn die Lösungsmenge

$$L = \{x \in G \mid f(x) = g(x)\} \quad (1.56)$$

gesucht ist.

Bei den  $x \in G$  kann es sich auch um Tupel  $x = (x_1, x_2)$  oder  $x = (x_1, x_2, x_3)$  usw. handeln. Man spricht in diesem Fall von einer Gleichung *in mehreren Variablen*.

Handelt es sich bei den Funktionswerten von  $f, g$  um Tupel, dann spricht man von einem *Gleichungssystem*.

#### 1.2.1 Äquivalenzumformungen

Äquivalenzumformungen lassen die Lösungsmenge einer Gleichung unverändert. Seien  $A(x), B(x)$  zwei Aussageformen bzw. zwei Gleichungen. Aus

$$\forall x \in G [A(x) \iff B(x)] \quad (1.57)$$

folgt

$$\{x \in G \mid A(x)\} = \{x \in G \mid B(x)\}. \quad (1.58)$$

Aus

$$\forall x \in G [A(x) \implies B(x)] \quad (1.59)$$

folgt jedoch nur noch

$$\{x \in G \mid A(x)\} \subseteq \{x \in G \mid B(x)\}. \quad (1.60)$$

Seien  $f, g, h$  Funktionen mit Definitionsmenge  $G$  und Zielmenge  $Z = \mathbb{R}$  oder  $Z = \mathbb{C}$ .

Für alle  $x$  gilt:

$$f(x) = g(x) \iff f(x) + h(x) = g(x) + h(x), \quad (1.61)$$

$$f(x) = g(x) \iff f(x) - h(x) = g(x) - h(x). \quad (1.62)$$

Besitzt  $h(x)$  keine Nullstellen, dann gilt für alle  $x$ :

$$f(x) = g(x) \iff f(x)h(x) = g(x)h(x), \quad (1.63)$$

$$f(x) = g(x) \iff \frac{f(x)}{h(x)} = \frac{g(x)}{h(x)}. \quad (1.64)$$

Besitzt  $h(x)$  aber Nullstellen, dann gilt immerhin noch für alle  $x$ :

$$f(x) = g(x) \implies f(x)h(x) = g(x)h(x). \quad (1.65)$$

Sei  $f, g: G \rightarrow Z$ . Sei  $\varphi_x: Z \rightarrow Z'$  eine Injektion für jedes

$x \in G$ . Es gilt

$$f(x) = g(x) \iff \varphi_x(f(x)) = \varphi_x(g(x)) \quad (1.66)$$

für alle  $x \in G$ .

Bei einer Kette von Äquivalenzumformungen wird links das Äquivalenzzeichen geschrieben, in der Mitte die Gleichung und rechts hinter einem senkrechten Strich die Operation  $\varphi_x(w)$ , welche als nächstes auf beide Seiten der Gleichung angewendet werden soll.

Beispiel:

$$\begin{array}{lcl} 2x + 4 = 2x^2 - 8x + 2 & | & w/2 \\ \iff x + 2 = x^2 - 4x + 1 & | & w - 2 \\ \iff x = x^2 - 4x - 1 & | & w - x \\ \iff 0 = x^2 - 7x - 1. \end{array}$$

Am Anfang befinden sich eventuell Bedingungen für  $x$ . Bei Fallunterscheidungen wird eine Verschärfung der Bedingungen vorgenommen, so dass es zur Verkleinerung der Grundmenge kommt. Nach einer Fallunterscheidung ergeben sich unter Umständen neue Injektionen.

## 1.2.2 Quadratische Gleichungen

**Definition. Quadratische Gleichung.**

Eine Gleichung der Form  $ax^2 + bx + c = 0$  mit  $a \neq 0$  heißt *quadratische Gleichung*.

Wegen  $a \neq 0$  lässt sich die Gleichung durch  $a$  dividieren und es entsteht die äquivalente Normalform  $x^2 + px + q = 0$  mit  $p := b/a$  und  $q := c/a$ .

**Lösung.** Seien nun die  $a, b, c$  reelle Zahlen. Die Zahl

$$D = p^2 - 4q \quad (1.67)$$

heißt *Diskriminante*. Für  $D > 0$  gibt es zwei reelle Lösungen:

$$x_1 = \frac{-p - \sqrt{D}}{2} = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad (1.68)$$

$$x_2 = \frac{-p + \sqrt{D}}{2} = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (1.69)$$

Für  $D = 0$  fallen beiden Lösungen zu einer *doppelten Lösung* zusammen:

$$x_1 = x_2 = -\frac{p}{2} = -\frac{b}{2a}. \quad (1.70)$$

Für  $D < 0$  gibt es keine reelle Lösung. Aber es gibt zwei komplexe Lösungen, die zueinander konjugiert sind:

$$x_1 = \frac{-p - i\sqrt{|D|}}{2}, \quad x_2 = \frac{-p + i\sqrt{|D|}}{2}. \quad (1.71)$$

In jedem Fall gelten die Formeln von Vieta:

$$p = -(x_1 + x_2), \quad q = x_1 x_2. \quad (1.72)$$

## 1.3 Komplexe Zahlen

### 1.3.1 Rechenoperationen

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}, \quad (1.73)$$

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}. \quad (1.74)$$

### 1.3.2 Betrag

Für alle  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$  gilt:

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad (1.75)$$

$$z_2 \neq 0 \implies \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad (1.76)$$

$$z \bar{z} = |z|^2. \quad (1.77)$$

### 1.3.3 Konjugation

Für alle  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2, \quad (1.78)$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \quad z_2 \neq 0 \implies \overline{\left( \frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, \quad (1.79)$$

$$\bar{\bar{z}} = z, \quad |\bar{z}| = |z|, \quad z \bar{z} = |z|^2, \quad (1.80)$$

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}, \quad (1.81)$$

$$\overline{\cos(z)} = \cos(\bar{z}), \quad \overline{\sin(z)} = \sin(\bar{z}), \quad (1.82)$$

$$\overline{\exp(z)} = \exp(\bar{z}). \quad (1.83)$$

## 1.4 Logik

### 1.4.1 Aussagenlogik

#### 1.4.1.1 Boolesche Algebra

**Distributivgesetz:**

$$A \vee (B \wedge C) \iff (A \vee B) \wedge (A \vee C), \quad (1.84)$$

$$A \wedge (B \vee C) \iff (A \wedge B) \vee (A \wedge C). \quad (1.85)$$

#### 1.4.1.2 Zweistellige Funktionen

Es gibt 16 zweistellige boolesche Funktionen.

AB	Wert		
00	a		
01	b		
10	c		
11	d		
Nr.	dcba	Fkt.	Name
0	0000	0	Kontradiktion
1	0001	$\overline{A \vee B}$	NOR
2	0010	$\overline{B} \Rightarrow A$	
3	0011	$\overline{A}$	
4	0100	$\overline{A} \Rightarrow B$	
5	0101	$\overline{B}$	
6	0110	$A \oplus B$	Kontravalenz
7	0111	$\overline{A \wedge B}$	NAND
8	1000	$A \wedge B$	Konjunktion
9	1001	$A \Leftrightarrow B$	Äquivalenz
10	1010	$B$	Projektion
11	1011	$A \Rightarrow B$	Implikation
12	1100	$A$	Projektion
13	1101	$B \Rightarrow A$	Implikation
14	1110	$A \vee B$	Disjunktion
15	1111	1	Tautologie

#### 1.4.1.3 Darstellung mit Negation, Konjunktion und Disjunktion

$$A \Rightarrow B \iff \overline{A} \vee B, \quad (1.86)$$

$$(A \Leftrightarrow B) \iff (\overline{A \wedge B}) \vee (A \wedge B), \quad (1.87)$$

$$A \oplus B \iff (\overline{A \wedge B}) \vee (A \wedge \overline{B}). \quad (1.88)$$

Tabelle 1.1: Rechnen mit komplexen Zahlen

Name	Operation	Polarform	kartesische Form
Identität	$z$	$= re^{i\varphi}$	$= a + bi$
Addition	$z_1 + z_2$		$= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$
Subtraktion	$z_1 - z_2$		$= (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$
Multiplikation	$z_1 z_2$	$= r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$	$= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$
Division	$\frac{z_1}{z_2}$	$= \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$	$= \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} i$
Kehrwert	$\frac{1}{z}$	$= \frac{1}{r} e^{-i\varphi}$	$= \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} i$
Realteil	$\operatorname{Re}(z)$	$= \cos \varphi$	$= a$
Imaginärteil	$\operatorname{Im}(z)$	$= \sin \varphi$	$= b$
Konjugation	$\bar{z}$	$= re^{-i\varphi}$	$= a - bi$
Betrag	$ z $	$= r$	$= \sqrt{a^2 + b^2}$
Argument	$\arg(z)$	$= \varphi$	$= s(b) \arccos\left(\frac{a}{r}\right)$

$$s(b) := \begin{cases} +1 & \text{if } b \geq 0, \\ -1 & \text{if } b < 0 \end{cases}$$

Tabelle 1.2: Boolesche Algebra

<b>Disjunktion</b>	<b>Konjunktion</b>	
$A \vee A \Leftrightarrow A$	$A \wedge A \Leftrightarrow A$	Idempotenzgesetze
$A \vee 0 \Leftrightarrow A$	$A \wedge 1 \Leftrightarrow A$	Neutralitätsgesetze
$A \vee 1 \Leftrightarrow 1$	$A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$	Extremalgesetze
$A \vee \bar{A} \Leftrightarrow 1$	$A \wedge \bar{A} \Leftrightarrow 0$	Komplementärgesetze
$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$	$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$	Kommutativgesetze
$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$	$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$	Assoziativgesetze
$\overline{A \vee B} \Leftrightarrow \bar{A} \wedge \bar{B}$	$\overline{A \wedge B} \Leftrightarrow \bar{A} \vee \bar{B}$	De Morgansche Regeln
$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$	$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$	Absorptionsgesetze

#### 1.4.1.4 Tautologien

Ringschluss:

$$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \wedge (C \Rightarrow A) \Rightarrow (A \Leftrightarrow B) \wedge (A \Leftrightarrow C) \wedge (B \Leftrightarrow C). \quad (1.97)$$

Modus ponens:

$$(A \Rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B. \quad (1.89)$$

Ringschluss, allgemein:

$$(A_1 \Rightarrow A_2) \wedge \dots \wedge (A_{n-1} \Rightarrow A_n) \wedge (A_n \Rightarrow A_1) \Rightarrow \forall i, j [A_i \Leftrightarrow A_j]. \quad (1.98)$$

Modus tollens:

$$(A \Rightarrow B) \wedge \bar{B} \Rightarrow \bar{A}. \quad (1.90)$$

Ersetzungsregel:

Modus tollendo ponens:

$$(A \vee B) \wedge \bar{A} \Rightarrow B. \quad (1.91)$$

Für jede Funktion  $P: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$  gilt:

$$P(A) \wedge (A \Leftrightarrow B) \Rightarrow P(B). \quad (1.99)$$

Modus ponendo tollens:

$$\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge A \Rightarrow \bar{B}. \quad (1.92)$$

Regel zur Implikation:

$$A \wedge B \Rightarrow C \Leftrightarrow A \Rightarrow (B \Rightarrow C). \quad (1.100)$$

Kontraposition:

$$A \Rightarrow B \Leftrightarrow \bar{B} \Rightarrow \bar{A}. \quad (1.93)$$

Vollständige Fallunterscheidung:

$$(A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \oplus B \Rightarrow C), \quad (1.101)$$

Beweis durch Widerspruch:

$$(\bar{A} \Rightarrow B \wedge \bar{B}) \Rightarrow A. \quad (1.94)$$

$$(A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C) \Leftrightarrow (A \vee B \Rightarrow C). \quad (1.102)$$

Zerlegung einer Äquivalenz:

$$(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A). \quad (1.95)$$

Vollständige Fallunterscheidung, allgemein:

$$\forall k [A_k \Rightarrow C] \Rightarrow (\bigoplus_{k=1}^n A_k \Rightarrow C), \quad (1.103)$$

$$\forall k [A_k \Rightarrow C] \Leftrightarrow (\exists k [A_k \Rightarrow C]). \quad (1.104)$$

Kettenschluss:

$$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow C). \quad (1.96)$$



## 1.4.2 Prädikatenlogik

### 1.4.2.1 Rechenregeln

Verneinung (De Morgansche Regeln):

$$\overline{\forall x[P(x)]} \iff \exists x[\overline{P(x)}], \quad (1.105)$$

$$\overline{\exists x[P(x)]} \iff \forall x[\overline{P(x)}]. \quad (1.106)$$

Verallgemeinerte Distributivgesetze:

$$P \vee \forall x[Q(x)] \iff \forall x[P \vee Q(x)], \quad (1.107)$$

$$P \wedge \exists x[Q(x)] \iff \exists x[P \wedge Q(x)]. \quad (1.108)$$

Verallgemeinerte Idempotenzgesetze:

$$\begin{aligned} \exists x \in M [P] &\iff (M \neq \{\}) \wedge P \\ &\iff \begin{cases} P & \text{wenn } M \neq \{\}, \\ 0 & \text{wenn } M = \{\}. \end{cases} \end{aligned} \quad (1.109)$$

$$\begin{aligned} \forall x \in M [P] &\iff (M = \{\}) \vee P \\ &\iff \begin{cases} P & \text{wenn } M \neq \{\}, \\ 1 & \text{wenn } M = \{\}. \end{cases} \end{aligned} \quad (1.110)$$

Äquivalenzen:

$$\forall x \forall y [P(x, y)] \iff \forall y \forall x [P(x, y)], \quad (1.111)$$

$$\exists x \exists y [P(x, y)] \iff \exists y \exists x [P(x, y)], \quad (1.112)$$

$$\forall x [P(x) \wedge Q(x)] \iff \forall x [P(x)] \wedge \forall x [Q(x)], \quad (1.113)$$

$$\exists x [P(x) \vee Q(x)] \iff \exists x [P(x)] \vee \exists x [Q(x)], \quad (1.114)$$

$$\forall x [P(x) \Rightarrow Q] \iff \exists x [P(x)] \Rightarrow Q, \quad (1.115)$$

$$\forall x [P \Rightarrow Q(x)] \iff P \Rightarrow \forall x [Q(x)], \quad (1.116)$$

$$\exists x [P(x) \Rightarrow Q(x)] \iff \forall x [P(x)] \Rightarrow \exists x [Q(x)]. \quad (1.117)$$

Implikationen:

$$\exists x \forall y [P(x, y)] \implies \forall y \exists x [P(x, y)], \quad (1.118)$$

$$\forall x [P(x)] \vee \forall x [Q(x)] \implies \forall x [P(x) \vee Q(x)], \quad (1.119)$$

$$\exists x [P(x) \wedge Q(x)] \implies \exists x [P(x)] \wedge \exists x [Q(x)], \quad (1.120)$$

$$\forall x [P(x) \Rightarrow Q(x)] \implies (\forall x [P(x)] \Rightarrow \forall x [Q(x)]), \quad (1.121)$$

$$\forall x [P(x) \Leftrightarrow Q(x)] \implies (\forall x [P(x)] \Leftrightarrow \forall x [Q(x)]). \quad (1.122)$$

### 1.4.2.2 Endliche Mengen

Sei  $M = \{x_1, \dots, x_n\}$ . Es gilt:

$$\forall x \in M [P(x)] \iff P(x_1) \wedge \dots \wedge P(x_n), \quad (1.123)$$

$$\exists x \in M [P(x)] \iff P(x_1) \vee \dots \vee P(x_n). \quad (1.124)$$

### 1.4.2.3 Beschränkte Quantifizierung

$$\begin{aligned} \forall x \in M [P(x)] &:\iff \forall x [x \notin M \vee P(x)] \\ &\iff \forall x [x \in M \Rightarrow P(x)], \end{aligned} \quad (1.125)$$

$$\exists x \in M [P(x)] :\iff \exists x [x \in M \wedge P(x)], \quad (1.126)$$

$$\forall x \in M \setminus N [P(x)] \iff \forall x [x \notin N \Rightarrow P(x)]. \quad (1.127)$$

### 1.4.2.4 Quantifizierung über Produktmengen

$$\forall (x, y) [P(x, y)] \iff \forall x \forall y [P(x, y)], \quad (1.128)$$

$$\exists (x, y) [P(x, y)] \iff \exists x \exists y [P(x, y)]. \quad (1.129)$$

Analog gilt

$$\forall (x, y, z) \iff \forall x \forall y \forall z, \quad (1.130)$$

$$\exists (x, y, z) \iff \exists x \exists y \exists z \quad (1.131)$$

usw.

### 1.4.2.5 Alternative Darstellung

Sei  $P: G \rightarrow \{0, 1\}$  und  $M \subseteq G$ . Mit  $P(M)$  ist die Bildmenge von  $P$  bezüglich  $M$  gemeint. Es gilt

$$\begin{aligned} \forall x \in M [P(x)] &\iff P(M) = \{1\} \\ &\iff M \subseteq \{x \in G \mid P(x)\} \end{aligned} \quad (1.132)$$

und

$$\begin{aligned} \exists x \in M [P(x)] &\iff \{1\} \subseteq P(M) \\ &\iff M \cap \{x \in G \mid P(x)\} \neq \{\}. \end{aligned} \quad (1.133)$$

### 1.4.2.6 Eindeutigkeit

Quantor für eindeutige Existenz:

$$\begin{aligned} \exists! x [P(x)] &:\iff \exists x [P(x) \wedge \forall y [P(y) \Rightarrow x = y]] \\ &\iff \exists x [P(x)] \wedge \forall x \forall y [P(x) \wedge P(y) \Rightarrow x = y]. \end{aligned} \quad (1.134)$$

## 1.5 Mengenlehre

### 1.5.1 Definitionen

Aufzählende Notation:

$$a \in \{x_1, \dots, x_n\} :\Leftrightarrow a = x_1 \vee \dots \vee a = x_n. \quad (1.135)$$

Beschreibende Notation:

$$a \in \{x \mid P(x)\} :\Leftrightarrow P(a), \quad (1.136)$$

$$\{x \in M \mid P(x)\} := \{x \mid x \in M \wedge P(x)\}, \quad (1.137)$$

$$\{f(x) \mid P(x)\} := \{y \mid y = f(x) \wedge P(x)\}. \quad (1.138)$$

Teilmengenrelation:

$$A \subseteq B :\Leftrightarrow \forall x [x \in A \implies x \in B]. \quad (1.139)$$

Gleichheit:

$$A = B :\Leftrightarrow \forall x [x \in A \iff x \in B]. \quad (1.140)$$

Vereinigungsmenge:

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}. \quad (1.141)$$

Schnittmenge:

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}. \quad (1.142)$$

Differenzmenge:

$$A \setminus B := \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}. \quad (1.143)$$

Symmetrische Differenz:

$$A \triangle B := \{x \mid x \in A \oplus x \in B\}. \quad (1.144)$$

Komplementärmenge:

$$A^C := G \setminus A. \quad (G: \text{Grundmenge}) \quad (1.145)$$

Vereinigung über indizierte Mengen:

$$\bigcup_{i \in I} A_i := \{x \mid \exists i \in I [x \in A_i]\}. \quad (1.146)$$

Schnitt über indizierte Mengen:

$$\bigcap_{i \in I} A_i := \{x \mid \forall i \in I [x \in A_i]\}. \quad (1.147)$$

### 1.5.2 Boolesche Algebra

Distributivgesetze:

$$M \cup (A \cap B) = (M \cup A) \cap (M \cup B), \quad (1.148)$$

$$M \cap (A \cup B) = (M \cap A) \cup (M \cap B). \quad (1.149)$$

### 1.5.3 Teilmengenrelation

Zerlegung der Gleichheit:

$$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A. \quad (1.150)$$

Umschreibung der Teilmengenrelation:

$$\begin{aligned} A \subseteq B &\iff A \cap B = A \\ &\iff A \cup B = B \\ &\iff A \setminus B = \emptyset. \end{aligned} \quad (1.151)$$

Kontraposition:

$$A \subseteq B = B^C \subseteq A^C. \quad (1.152)$$

### 1.5.4 Natürliche Zahlen

#### 1.5.4.1 Von-Neumann-Modell

Mengentheoretisches Modell der natürlichen Zahlen:

$$\begin{aligned} 0 &:= \{\}, & 1 &:= \{0\}, & 2 &:= \{0, 1\}, \\ 3 &:= \{0, 1, 2\}, & & \text{usw.} \end{aligned} \quad (1.153)$$

Nachfolgerfunktion:

$$x' := x \cup \{x\}. \quad (1.154)$$

#### 1.5.4.2 Vollständige Induktion

Ist  $A(n)$  mit  $n \in \mathbb{N}$  eine Aussageform, so gilt:

$$\begin{aligned} A(n_0) \wedge \forall n \geq n_0 [A(n) \implies A(n+1)] \\ \implies \forall n \geq n_0 [A(n)]. \end{aligned} \quad (1.155)$$

Die Aussage  $A(n_0)$  ist der *Induktionsanfang*.

Die Implikation

$$A(n) \implies A(n+1) \quad (1.156)$$

heißt *Induktionsschritt*. Beim Induktionsschritt muss  $A(n+1)$  gezeigt werden, wobei  $A(n)$  als gültig vorausgesetzt werden darf.

### 1.5.5 ZFC-Axiome

Axiom der Bestimmtheit:

$$\forall A \forall B [A = B \iff \forall x [x \in A \iff x \in B]]. \quad (1.157)$$

Axiom der leeren Menge:

$$\exists M \forall x [x \notin M]. \quad (1.158)$$

Axiom der Paarung:

$$\forall x \forall y \exists M \forall a [a \in M \iff x = a \vee y = a]. \quad (1.159)$$

Axiom der Vereinigung:

$$\forall S \exists M \forall x [x \in M \iff \exists A \in S [x \in A]]. \quad (1.160)$$

Axiom der Aussonderung:

$$\forall A \exists M \forall x [x \in M \iff x \in A \wedge \varphi(x)]. \quad (1.161)$$

Axiom des Unendlichen:

$$\exists M [\{\} \in M \wedge \forall x \in M [x \cup \{x\} \in M]]. \quad (1.162)$$

Axiom der Potenzmenge:

$$\forall A \exists M \forall T [T \in M \iff T \subseteq A]. \quad (1.163)$$

Axiom der Ersetzung:

$$\begin{aligned} \forall a \in A \exists^{-1} b [\varphi(a, b)] \\ \implies \exists B \forall b [b \in B \iff \exists a \in A [\varphi(a, b)]]. \end{aligned} \quad (1.164)$$

Axiom der Fundierung:

$$\forall A [A \neq \{\} \implies \exists x \in A [x \cap A = \{\}]]. \quad (1.165)$$

Auswahlaxiom:

$$\begin{aligned} \forall x, y \in A [x \neq y \implies x \cap y = \{\}] \\ \wedge \forall x \in A [x \neq \{\}] \\ \implies \exists M \forall x \in A \exists^{-1} u \in x [u \in M]. \end{aligned} \quad (1.166)$$

Tabelle 1.3: Boolesche Algebra

<b>Vereinigung</b>	<b>Schnitt</b>	
$A \cup A = A$	$A \cap A = A$	Idempotenzgesetze
$A \cup \{\} = A$	$A \cap G = A$	Neutralitätsgesetze
$A \cup G = G$	$A \cap \{\} = \{\}$	Extremalgesetze
$A \cup \bar{A} = G$	$A \cap \bar{A} = \{\}$	Komplementärgesetze
$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$	Kommutativgesetze
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	Assoziativgesetze
$A \cup \bar{B} = \bar{A} \cap \bar{B}$	$A \cap \bar{B} = \bar{A} \cup \bar{B}$	De Morgansche Regeln
$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$	Absorptionsgesetze

$G$ : Grundmenge

### 1.5.6 Kardinalität

#### Definition. Gleichmächtigkeit.

Zwei Mengen  $M, N$  heißen *gleichmächtig*, notiert als  $|M| = |N|$ , wenn es eine bijektive Abbildung  $f: M \rightarrow N$  gibt.

Eine Menge  $M$  heißt *weniger mächtig oder gleichmächtig*, notiert als  $|M| \leq |N|$ , wenn es eine injektive Abbildung  $f: M \rightarrow N$  gibt. Äquivalent dazu ist, dass es eine surjektive Abbildung  $g: N \rightarrow M$  gibt.

Eine Menge heißt *abzählbar unendlich*, wenn sie gleichmächtig zu den natürlichen Zahlen ist.

Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation.

#### Definition. Kardinalzahl.

Die Äquivalenzklassen

$$|M| := \{N \mid |M|=|N|\} \quad (1.167)$$

heißen *Kardinalzahlen*.

#### Satz von Cantor-Bernstein.

Aus  $|M| \leq |N|$  und  $|N| \leq |M|$  folgt  $|M| = |N|$ .

#### 1.5.6.1 Potenzmengen

**Satz von Cantor.** Für jede Menge gilt  $|M| < |2^M|$ .

Ist  $M$  endlich, dann gilt  $|M| = 2^{|M|}$ .

## 1.6 Funktionen

### 1.6.1 Surjektionen

#### Definition. Surjektion.

Eine Funktion  $f: A \rightarrow B$  heißt *surjektiv*, wenn  $f(A) = B$  ist. Damit ist gemeint, dass jedes Element der Zielmenge wenigstens einmal der Funktionswert von einem Element der Definitionsmenge ist.

### 1.6.2 Injektionen

#### Definition. Injektion.

Eine Funktion  $f: A \rightarrow B$  heißt *injektiv*, wenn

$$\forall x_1, x_2 \in A [f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2] \quad (1.168)$$

gilt.

### 1.6.3 Bijektionen

#### Definition. Bijektion.

Eine Funktion  $f: A \rightarrow B$  heißt *bijektiv*, wenn sie injektiv und surjektiv ist.

Eine Funktion  $f: A \rightarrow B$  ist genau dann bijektiv, wenn es ein  $g$  mit

$$g \circ f = \text{id}_A \quad \text{und} \quad f \circ g = \text{id}_B \quad (1.169)$$

gibt. Wenn  $f$  bijektiv ist, so gibt es  $g$  genau einmal und  $g$  wird die *Umkehrfunktion* oder *Inverse* von  $f$  genannt und als  $f^{-1}$  notiert.

### 1.6.4 Komposition

#### Definition. Komposition.

Für zwei Funktionen  $f: A \rightarrow B$  und  $g: B \rightarrow C$  ist die *Komposition* ( $g$  nach  $f$ ) durch

$$g \circ f: A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(x) := g(f(x)) \quad (1.170)$$

definiert.

Für die Komposition gilt das Assoziativgesetz:

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h). \quad (1.171)$$

Die Komposition von Injektionen ist eine Injektion.

Die Komposition von Surjektionen ist eine Surjektion.

Die Komposition von Bijektionen ist eine Bijektion.

Sind  $f, g$  Bijektionen, so gilt

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}. \quad (1.172)$$

Ist  $g \circ f$  injektiv, so ist  $f$  injektiv.

Ist  $g \circ f$  surjektiv, so ist  $g$  surjektiv.

Ist  $g \circ f$  bijektiv, so ist  $f$  injektiv und  $g$  surjektiv.

#### Definition. Iteration.

Für eine Funktion  $\varphi: A \rightarrow A$  wird

$$\varphi^0 := \text{id}_A, \quad \varphi^{n+1} := \varphi^n \circ \varphi \quad (1.173)$$

*Iteration* von  $\varphi$  genannt.

### 1.6.5 Einschränkung

#### Definition. Einschränkung.

Sei  $f: A \rightarrow B$  und  $M \subseteq A$ . Die Funktion  $g(x) = f(x)$  mit  $g: M \rightarrow B$  wird *Einschränkung* von  $f$  genannt und mit  $f|_M$  notiert.

Sei  $f: A \rightarrow B$  und  $M \subseteq A$ . Mit der Inklusionsabbildung  $i(x) := x$  mit  $i: M \rightarrow A$  gilt:

$$f|_M = f \circ i. \quad (1.174)$$

Es gilt

$$g \circ (f|_M) = (g \circ f)|_M. \quad (1.175)$$

### 1.6.6 Bild

**Definition. Bild.**

Ist  $f: A \rightarrow B$  und  $M \subseteq A$ , so wird

$$f(M) := \{f(x) \mid x \in M\} \quad (1.176)$$

das *Bild* von  $M$  unter  $f$  genannt.

Es gilt

$$f(M \cup N) = f(M) \cup f(N), \quad (1.177)$$

$$f(M \cap N) = f(M) \cap f(N), \quad (1.178)$$

$$f\left(\bigcup_{i \in I} M_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(M_i), \quad (1.179)$$

$$I \neq \emptyset \implies f\left(\bigcap_{i \in I} M_i\right) = \bigcap_{i \in I} f(M_i), \quad (1.180)$$

$$M \subseteq N \implies f(M) \subseteq f(N), \quad (1.181)$$

$$f(\emptyset) = \emptyset, \quad (1.182)$$

$$(g \circ f)(M) = g(f(M)). \quad (1.183)$$

### 1.6.7 Urbild

**Definition. Urbild.**

Ist  $f: A \rightarrow B$ , so wird

$$f^{-1}(M) := \{x \in A \mid f(x) \in M\}. \quad (1.184)$$

das *Urbild* von  $M$  unter  $f$  genannt.

Es gilt

$$f^{-1}(M \cup N) = f^{-1}(M) \cup f^{-1}(N), \quad (1.185)$$

$$f^{-1}(M \cap N) = f^{-1}(M) \cap f^{-1}(N), \quad (1.186)$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} M_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(M_i), \quad (1.187)$$

$$I \neq \emptyset \implies f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} M_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(M_i), \quad (1.188)$$

$$M \subseteq N \implies f^{-1}(M) \subseteq f^{-1}(N), \quad (1.189)$$

$$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset, \quad (1.190)$$

$$f^{-1}(B) = A, \quad (1.191)$$

$$f^{-1}(M \setminus N) = f^{-1}(M) \setminus f^{-1}(N), \quad (1.192)$$

$$f^{-1}(B \setminus M) = B \setminus f^{-1}(M), \quad (1.193)$$

$$(g \circ f)^{-1}(M) = f^{-1}(g^{-1}(M)), \quad (1.194)$$

$$(f|_M)^{-1}(N) = M \cap f^{-1}(N). \quad (1.195)$$

## 1.7 Formale Systeme

### 1.7.1 Formale Sprachen

#### Definition. Formale Sprache.

Eine *formale Sprache*  $L$  ist eine Teilmenge der kleenschen Hülle über einer Menge  $\Sigma$ , kurz  $L \subseteq \Sigma^*$ . Die Menge  $\Sigma$  wird *Alphabet* genannt, ihre Elemente heißen *Symbole*.

Die kleensche Hülle  $\Sigma^*$  besteht aus allen möglichen Konkatenationen von Symbolen aus  $\Sigma$ . Die Konkatenationen von  $\Sigma^*$  heißen *Wörter*. Die leere Konkatenation ist zulässig und wird mit  $\varepsilon$  notiert. Die Elemente von  $L$  heißen *wohlgeformte Wörter* oder *wohlgeformte Formeln*, engl. *well formed formulas*, kurz *wff*.

Ein Wort  $a$  ist ein Tupel

$$a = (a_1, \dots, a_m). \quad (a_k \in \Sigma) \quad (1.196)$$

Sind  $a, b$  zwei Wörter, dann ist mit  $ab$  deren Konkatenation gemeint:

$$ab := (a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n). \quad (1.197)$$

Es gilt  $\varepsilon a = a$  und  $a\varepsilon = a$ . Bei  $\varepsilon$  handelt es sich um das leere Tupel.

#### Definition. Konkatenation von Sprachen.

Konkatenation von  $L_1$  und  $L_2$ :

$$L_1 \circ L_2 := \{ab \mid a \in L_1, b \in L_2\}. \quad (1.198)$$

#### Definition. Potenz einer Sprache.

Potenzen von  $L$ :

$$L^0 := \{\varepsilon\}, \quad (1.199)$$

$$L^n := L^{n-1} \circ L. \quad (1.200)$$

#### Definition. Kleensche Hülle einer Sprache.

Kleensche Hülle von  $L$ :

$$L^* := \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} L^k. \quad (1.201)$$

Positive Hülle von  $L$ :

$$L^+ := \bigcup_{k \in \mathbb{N}_1} L^k. \quad (1.202)$$

### 1.7.2 Formale Grammatiken

#### Definition. Formale Grammatik.

Eine *formale Grammatik* ist ein Tupel  $(N, \Sigma, P, S)$ , wobei  $N$  die *Nonterminalsymbole*,  $\Sigma$  die *Terminalsymbole*,  $P$  die *Produktionsregeln* sind und  $S$  ein *Startsymbol* ist. Die Mengen  $N, \Sigma, P$  müssen endlich sein. Die Mengen  $N$  und  $\Sigma$  müssen disjunkt sein. Bei  $\Sigma$  handelt es sich um ein Alphabet. Das Startsymbol ist ein Element  $S \in N$ .

Bei  $P$  handelt es sich um eine Relation

$$P \subseteq N \times (N \cup \Sigma)^* \quad (1.203)$$

oder allgemeiner

$$P \subseteq (N \cup \Sigma)^* \setminus \Sigma^* \times (N \cup \Sigma)^*. \quad (1.204)$$

Produktionsregeln werden in der Form  $n \rightarrow w$  notiert und drücken aus, dass in jedem Wort das Nonterminalsymbol  $n$  durch das Wort  $w$  ersetzt werden darf. Allgemeiner bedeutet  $t \rightarrow w$ , dass ein Teilwort  $t$  durch  $w$  ersetzt werden darf.

Die Produktionsregeln werden ausgehend vom Startsymbol immer weiter angewendet bis keine Nonterminalsymbole mehr vorhanden sind. Die Menge aller möglichen Produktionen bildet eine formale Sprache  $L \subseteq \Sigma^*$ .

Für Produktionsregeln der Form (1.203) wurde eine Kurznotation geschaffen, die EBNF:

Symbol	Nonterminalsymbol
"Symbol"	Terminalsymbol
w1, w2	$w_1 w_2$ (Konkatenation)
$n = w1 \mid w2$ .	$n \rightarrow w_1, n \rightarrow w_2$
$n = \{w\}$ .	$n \rightarrow \varepsilon, n \rightarrow wn$
$n = [w]$ .	$n \rightarrow w, n \rightarrow wn$

### 1.7.3 Formale Systeme

#### Definition. Formales System.

Ein *formales System* ist ein Tupel  $(\Sigma, L, A, R)$ , wobei  $\Sigma$  ein Alphabet,  $L$  eine formale Sprache über dem Alphabet,  $A$  eine Menge von Axiomen und  $R$  eine Menge von Ableitungsrelationen ist. Die Menge der *Axiome* ist eine beliebige Teilmenge von  $L$ . Eine *Ableitungsrelation* ist eine zwei oder mehrstellige Relation über  $L$ , die

$$a_1, \dots, a_n \vdash b \quad (1.205)$$

geschrieben wird. Eine wohlgeformte Formel wird *Satz* genannt, wenn sie ein Axiom ist oder über eine Kette von Ableitungen aus den Axiomen folgt.

## 1.8 Mathematische Strukturen

### Axiome

**E:** Abgeschlossenheit.

Die Verknüpfung führt nicht aus der Menge heraus.

**A:** Assoziativgesetz.

$$\forall a, b, c [(a * b) * c = a * (b * c)].$$

**N:** Existenz des neutralen Elements.

$$\exists e \forall a [e * a = a * e = a].$$

**I:** Existenz der inversen Elemente.

$$\forall a \exists b [a * b = b * a = e].$$

**K:** Kommutativgesetz.

$$\forall a, b [a * b = b * a].$$

**I\*:** Existenz der multiplikativ inversen Elemente.

$$\forall a \neq 0 \exists b [a * b = b * a = 1].$$

**DI:** Linksdistributivgesetz.

$$\forall a, x, y [a * (x + y) = a * x + a * y].$$

**Dr:** Rechtsdistributivgesetz.

$$\forall a, x, y [(x + y) * a = x * a + y * a].$$

**D:** Distributivgesetze.

DI und Dr.

**T:** Nullteilerfreiheit.

$$\forall a, b [a \neq 0 \wedge b \neq 0 \implies a * b \neq 0]$$

bzw. die Kontraposition

$$\forall a, b [a * b = 0 \implies a = 0 \vee b = 0].$$

**U:** Unterscheidbarkeit von Null- und Einselement.

Die neutralen Elemente bezüglich Addition und Multiplikation sind unterschiedlich.

### Strukturen

Strukturen mit einer inneren Verknüpfung:

<b>EA</b>	Halbgruppe
<b>EAN</b>	Monoid
<b>EANI</b>	Gruppe
<b>EANIK</b>	abelsche Gruppe

Strukturen mit zwei inneren Verknüpfungen:

<b>EANIK, EA, D</b> . . . . .	Ring
<b>EANIK, EAK, D</b> . . . . .	kommutativer Ring
<b>EANIK, EAN, D</b> . . . . .	unitärer Ring
<b>EANIK, EANK, DTU</b>	Integritätsring
<b>EANIK, EANI*K, DTU</b>	Körper

### Axiome für Relationen

**R:** Reflexivität.

$$\forall a (aRa).$$

**S:** Symmetrie.

$$\forall a, b (aRb \iff bRa).$$

**T:** Transitivität.

$$\forall a, b, c (aRb \wedge bRc \implies aRc).$$

**An:** Antisymmetrie.

$$\forall a, b (aRb \wedge bRa \implies a = b).$$

**L:** Linearität.

$$\forall a, b (aRb \vee bRa).$$

**Ri:** Irrreflexivität.

$$\forall a (\neg aRa).$$

**A:** Asymmetrie.

$$\forall a, b (aRb \implies \neg bRa).$$

**Min:** Existenz der Minimalelemente.

$$\forall T \subseteq M, T \neq \emptyset \exists x \in T \forall y \in T \setminus \{x\} (x < y).$$

### Relationen

<b>RST</b> . . . . .	Äquivalenzrelation
<b>RAnT</b> . . . .	Halbordnung
<b>RAnTL</b> . . . .	Totalordnung
<b>RiAT</b> . . . . .	strenge Halbordnung
<b>RiATL</b> . . . .	strenge Totalordnung
<b>RiATLMin</b>	Wohlordnung

## 2 Funktionen

### 2.1 Elementare Funktionen

#### 2.1.1 Exponentialfunktion

**Definition.** *Exponentialfunktion:*  $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,

$$\exp(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (2.1)$$

**Eigenschaften.** Die Einschränkung von  $\exp$  auf  $\mathbb{R}$  ist injektiv und hat die Bildmenge  $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ .

Die Exponentialfunktion ist holomorph auf ganz  $\mathbb{C}$  und stimmt mit ihrer eigenen Ableitung überein:

$$\exp'(x) = \exp(x). \quad (2.2)$$

Für  $x, y \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y), \quad (2.3)$$

$$\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}, \quad (2.4)$$

$$\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}. \quad (2.5)$$

**Eulersche Formel.** Für alle  $x \in \mathbb{C}$  gilt:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x. \quad (2.6)$$

#### 2.1.2 Logarithmusfunktion

**Definition.** *Natürlicher Logarithmus.*

Für  $x \in \mathbb{R}^+$ :

$$\ln(x) := \int_1^x \frac{1}{t} dt. \quad (2.7)$$

Für  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ,  $z = re^{i\varphi}$ :

$$\ln(z) := \ln(r) + i\varphi. \quad (2.8)$$

**Eigenschaften.** Für  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  gilt:

$$\ln(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{z^h - 1}{h}. \quad (2.9)$$

Die Logarithmusfunktion ist auf  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_0^-$  holomorph.

#### 2.1.3 Winkelfunktionen

**Definition.** *Winkelfunktionen.*

*Sinus:*  $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,

$$\sin(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \quad (2.10)$$

*Kosinus:*  $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,

$$\cos(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad (2.11)$$

*Tangens:*  $\mathbb{C} \setminus \{k\pi + \pi/2 \mid k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{C}$ ,

$$\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}. \quad (2.12)$$

*Kotangens:*  $\mathbb{C} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{C}$ ,

$$\cot(x) := \frac{\cos(x)}{\sin(x)}. \quad (2.13)$$

*Sekans:*  $\mathbb{C} \setminus \{k\pi + \pi/2 \mid k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{C}$ ,

$$\sec(x) := \frac{1}{\cos(x)}. \quad (2.14)$$

*Kosekans:*  $\mathbb{C} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{C}$ ,

$$\csc(x) := \frac{1}{\sin(x)}. \quad (2.15)$$

Darstellung durch die Exponentialfunktion:  
Für  $x \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\cos x = \operatorname{Re}(e^{ix}) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad (2.16)$$

$$\sin x = \operatorname{Im}(e^{ix}) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}. \quad (2.17)$$

Die Funktionen  $\sin, \cos$  sind holomorph auf ganz  $\mathbb{C}$ . Die Ableitungen sind

$$\sin' x = \cos x, \quad (2.18)$$

$$\cos' x = -\sin x. \quad (2.19)$$

#### 2.1.3.1 Symmetrie und Periodizität

Für  $x \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad (\text{Punktsymmetrie}) \quad (2.20)$$

$$\cos(-x) = \cos x, \quad (\text{Achsensymmetrie}) \quad (2.21)$$

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x, \quad (2.22)$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x, \quad (2.23)$$

$$\sin(x + \pi) = -\sin x, \quad (2.24)$$

$$\cos(x + \pi) = -\cos x, \quad (2.25)$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x = -\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right), \quad (2.26)$$

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x = -\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right). \quad (2.27)$$

#### 2.1.3.2 Additionstheoreme

Für  $x, y \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \quad (2.28)$$

$$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y, \quad (2.29)$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \quad (2.30)$$

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y. \quad (2.31)$$

#### 2.1.3.3 Trigonometrischer Pythagoras

Für  $x \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1. \quad (2.32)$$

#### 2.1.3.4 Produkte

Für  $x, y \in \mathbb{C}$  gilt:

$$2 \sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y), \quad (2.33)$$

$$2 \cos x \cos y = \cos(x - y) + \cos(x + y), \quad (2.34)$$

$$2 \sin x \cos y = \sin(x - y) + \sin(x + y). \quad (2.35)$$

### 2.1.3.5 Summen und Differenzen

Für  $x, y \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \quad (2.36)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}, \quad (2.37)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \quad (2.38)$$

$$\cos x - \cos y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{y-x}{2}. \quad (2.39)$$

### 2.1.3.6 Winkelvielfache

Für  $x \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x, \quad (2.40)$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad (2.41)$$

$$\sin(3x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \quad (2.42)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x. \quad (2.43)$$

Zusätzlich gilt:

$$\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1. \quad (2.44)$$

Rekursionsformeln für  $x, n \in \mathbb{C}$ :

$$\cos(nx) = 2 \cos x \cos((n-1)x) - \cos((n-2)x), \quad (2.45)$$

$$\sin(nx) = 2 \cos x \sin((n-2)x) - \sin((n-2)x). \quad (2.46)$$

## 2.2 Zahlentheoretische Funktionen

### 2.2.1 Eulersche Phi-Funktion

**Definition.** *Eulersche Phi-Funktion:*

$$\varphi(n) := |\{a \in N \mid 1 \leq a \leq n \wedge \text{ggT}(a, n) = 1\}|. \quad (2.47)$$

Für zwei teilerfremde Zahlen  $m, n$  gilt:

$$\varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n). \quad (2.48)$$

Für jede Primzahlpotenz  $p^k$  mit  $k \in \mathbb{Z}$  und  $k \geq 1$  gilt:

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}. \quad (2.49)$$

Besitzt die Zahl  $n$  die Primfaktorzerlegung

$$n = \prod_{p|n} p^{k_p}, \quad (2.50)$$

so gilt:

$$\varphi(n) = \prod_{p|n} (p^{k_p} - p^{k_p-1}) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right). \quad (2.51)$$

### 2.2.2 Carmichael-Funktion

**Definition.** *Carmichael-Funktion:*

$$\begin{aligned} \lambda(n) &:= \min\{m \mid \forall a [\text{ggT}(a, n) = 1 \\ &\implies a^m \equiv 1 \pmod{n}]\}. \end{aligned} \quad (2.52)$$



# 3 Analysis

## 3.1 Ungleichungen

### 3.1.1 Dreiecksungleichung

In einem metrischen Raum  $(X, d)$  gilt für  $x, y, z \in X$  die allgemeine Dreiecksungleichung:

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z), \quad (3.1)$$

$$|d(x, y) - d(y, z)| \leq d(x, z). \quad (3.2)$$

Ist  $X$  ein normierter Raum, so wird durch  $d(x, y) := \|x - y\|$  eine Metrik induziert. Somit gilt

$$\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|, \quad (3.3)$$

$$\| \|x - y\| - \|y - z\| \| \leq \|x - z\|. \quad (3.4)$$

Wird nun  $x := x_1$ ,  $z := -x_2$  und  $y := 0$  gesetzt, so ergibt sich die Dreiecksungleichung für normierte Räume:

$$\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\|, \quad (3.5)$$

$$\| \|x_1\| - \|x_2\| \| \leq \|x_1 - x_2\|. \quad (3.6)$$

Normen sind z. B.  $\|x\| = |x|$  für  $x \in \mathbb{R}$  und  $\|z\| = |z|$  für  $z \in \mathbb{C}$ . Allgemeiner

$$\|v\|^2 = \sum_{k=1}^n v_k^2 \quad (3.7)$$

für einen Koordinatenvektor  $v \in \mathbb{R}^n$ ,  $v = (v_k)_{k=1}^n$ .

Ist  $\langle v, w \rangle$  ein Skalarprodukt, so wird durch

$$\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle} \quad (3.8)$$

eine Norm induziert.

### 3.1.2 Bernoullische Ungleichung

Für  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x \geq -1$  und  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n \geq 1$  gilt

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx. \quad (3.9)$$

Die Ungleichung wird nur für  $n = 1$  oder  $x = 0$  zu einer Gleichung.

## 3.2 Konvergenz

### 3.2.1 Umgebungen

Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum und  $p \in X$ .

**Definition. Offene  $r$ -Umgebung.**

Offene  $r$ -Umgebung von  $p$ :

$$U_r(p) := \{q \mid d(p, q) < r\}. \quad (r > 0) \quad (3.10)$$

Standardmetrik:

$$d(p, q) := |p - q|, \quad (X = \mathbb{R}, X = \mathbb{C}) \quad (3.11)$$

$$d(p, q) := \|p - q\|. \quad (\text{normierte Räume}) \quad (3.12)$$

### 3.2.2 Konvergente Folgen

**Definition. Konvergente Folge.**

Eine Folge  $(a_n): \mathbb{N} \rightarrow X$  heißt *konvergent* gegen  $g$ , wenn

$$\forall r > 0 \exists n_0 \forall n > n_0: a_n \in U_r(g). \quad (3.13)$$

Man schreibt dann  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g$  und bezeichnet  $g$  als *Grenzwert*. Hierbei gilt

$$a_n \in U_r(g) \iff d(a_n, g) < r. \quad (3.14)$$

**Sandwichsatz.** Seien  $(a_n)$  und  $(b_n)$  reelle Folgen mit  $a_n \rightarrow g$  und  $b_n \rightarrow g$ . Gilt  $a_n \leq c_n \leq b_n$  für fast alle  $n$ , so konvergiert  $(c_n)$  auch gegen  $g$ .

### 3.2.3 Häufungspunkte

**Definition. Häufungspunkt.**

Eine Punkt  $h$  heißt *Häufungspunkt* einer Folge  $(a_n)$ , wenn

$$\forall r > 0 \forall n_0 \exists n > n_0: a_n \in U_r(h). \quad (3.15)$$

Besitzt eine Folge  $(a_n)$  einen Grenzwert  $g$ , so ist  $g$  auch ein Häufungspunkt von  $(a_n)$ .

### 3.2.4 Cauchy-Folge

**Definition. Cauchy-Folge, vollständiger Raum.**

Sei  $(X, d)$  ein metrischer Raum. Eine Folge  $(a_n)$  heißt *Cauchy-Folge*, wenn

$$\forall r > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n > N: d(a_m, a_n) < r. \quad (3.16)$$

Ein metrischer Raum  $(X, d)$  heißt *vollständig*, wenn jede Cauchy-Folge von Punkten aus  $X$  einen Grenzwert  $g$  mit  $g \in X$  besitzt. Ein vollständiger normierter Raum heißt *Banachraum*.

### 3.2.5 Beschränkte Folgen

**Definition. Beschränkte Folge.**

Eine Teilmenge  $M \subseteq \mathbb{R}$  heißt *nach oben beschränkt*, wenn

$$\exists S_o \forall x \in M (x \leq S_o). \quad (3.17)$$

und *nach unten beschränkt*, wenn

$$\exists S_u \forall x \in M (x \geq S_u). \quad (3.18)$$

Die Zahl  $S_o$  heißt *obere Schranke* und  $S_u$  heißt *untere Schranke*. Eine Folge heißt *beschränkt*, wenn sowohl eine untere als auch eine obere Schranke existiert.

**Definition. Supremum, Infimum.**

*Supremum:*

$$\sup(M) := \min\{S_o \mid \forall x \in M (x \leq S_o)\}. \quad (3.19)$$

*Infimum:*

$$\inf(M) := \max\{S_u \mid \forall x \in M (x \geq S_u)\}. \quad (3.20)$$

**Definition. Supremum, Infimum einer Folge.**

Bei einer Folge  $(a_n): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  sind die Begriffe (3.17) bis (3.20) bezüglich der Bildmenge von  $(a_n)$  definiert.

Jede nach oben beschränkte nichtleere Teilmenge  $M \subseteq \mathbb{R}$  besitzt ein Supremum. Jede nach unten beschränkte nichtleere Teilmenge  $M \subseteq \mathbb{R}$  besitzt ein Infimum. Jede beschränkte nichtleere Teilmenge  $M \subseteq \mathbb{R}$  besitzt ein Infimum und ein Supremum.

## 3.3 Reihen

**Definition. Reihe.**

Sei  $(a_n)$  eine Folge. Die Folge  $(s_n)$  von Partialsummen

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k \quad (3.21)$$

wird *Reihe* genannt. Der Grenzwert

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k \quad (3.22)$$

wird als *Summe* der Reihe bezeichnet.

Jede beliebige Folge  $(a_n)$  lässt sich durch

$$b_0 := a_0, \quad b_k := a_k - a_{k-1} \quad (3.23)$$

als Reihe

$$a_n = \sum_{k=0}^n b_k = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) \quad (3.24)$$

darstellen. Die Summe auf der rechten Seite von (3.24) wird als *Teleskopsumme* bezeichnet.

### 3.3.1 Absolute Konvergenz

**Definition. Absolute Konvergenz.**

Sei  $X$  ein normierter Raum. Eine Reihe  $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$  mit  $a_k \in X$  heißt *absolut konvergent*, wenn

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|a_k\| < \infty. \quad (3.25)$$

Es gilt:  $X$  ist ein Banachraum gdw. jede absolut konvergente Reihe konvergent ist.

Ist  $X$  ein Banachraum und  $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$  eine absolut konvergente Reihe mit  $a_k \in X$ , so gilt:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma(k)}, \quad \sigma \in \text{Sym}(\mathbb{N}_0). \quad (3.26)$$

Eine konvergente Reihe, für die (3.26) gilt, heißt *unbedingt konvergent*.

### 3.3.2 Konvergenzkriterien

#### 3.3.2.1 Quotientenkriterium

Gegeben ist eine unendliche Reihe  $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ , wobei die  $a_k$  reelle oder komplexe Zahlen sind und  $a_k \neq 0$  ab einem gewissen  $k$  ist. Gilt

$$\exists q < 1 \exists k_0 \forall k > k_0: \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq q, \quad (3.27)$$

so ist  $(s_n)$  absolut konvergent. S. (3.25). Gilt jedoch

$$\exists k_0 \forall k > k_0: \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \geq 1, \quad (3.28)$$

so ist  $(s_n)$  divergent.

Existiert der Grenzwert

$$g = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|, \quad (3.29)$$

so gilt:

$$g < 1 \implies (s_n) \text{ ist absolut konvergent}, \quad (3.30)$$

$$g > 1 \implies (s_n) \text{ ist divergent}, \quad (3.31)$$

$$g = 1 \implies \text{keine Aussage}. \quad (3.32)$$

### 3.3.3 Cauchy-Produkt

Sei

$$A_m := \sum_{n=0}^m a_n, \quad A := \lim_{m \rightarrow \infty} A_m, \quad (3.33)$$

$$B_m := \sum_{n=0}^m b_n, \quad B := \lim_{m \rightarrow \infty} B_m, \quad (3.34)$$

$$C_m := \sum_{n=0}^m c_n, \quad C := \lim_{m \rightarrow \infty} C_m. \quad (3.35)$$

**Definition. Cauchy-Produkt.**

Das *Cauchy-Produkt* von zwei Reihen  $(A_m)$  und  $(B_m)$  ist definiert durch

$$C_m := \sum_{n=0}^m c_n \quad \text{mit} \quad c_n := \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}. \quad (3.36)$$

Das Cauchy-Produkt von zwei reellen oder komplexen absolut konvergenten Reihen ist absolut konvergent und es gilt

$$C = AB. \quad (3.37)$$

**Satz von Mertens.** Das Cauchy-Produkt von reellen oder komplexen konvergenten Reihen, eine davon absolut konvergent, ist konvergent und es gilt (3.37).

## 3.4 Reelle Funktionen

**Definition. Reelle Funktion.**

Eine Funktion  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $D \subseteq \mathbb{R}$  heißt *reelle Funktion*.

### 3.4.1 Monotone Funktionen

Jede streng monotone reelle Funktion ist injektiv.

### 3.4.2 Grenzwert einer Funktion

Ist  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  eine reelle Funktion,  $I$  eine offenes Intervall und  $x_0 \in I$ , so gilt:

$$\begin{aligned} g &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \\ \iff g &= \lim_{x \uparrow x_0} f(x) \wedge g = \lim_{x \downarrow x_0} f(x). \end{aligned} \quad (3.38)$$

### 3.4.3 Stetige Funktionen

Sei  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  eine reelle Funktion und  $I$  ein offenes Intervall. Die Funktion  $f$  ist stetig bei  $x_0 \in I$  gdw.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0). \quad (3.39)$$

Sind  $f, g$  stetige Funktion, so ist auch  $g \circ f$  stetig.

**Zwischenwertsatz.** Sei  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion und sei  $a < b$ . Bei  $f(a) < f(b)$  gilt:

$$\forall y \in [f(a), f(b)] \exists x \in [a, b]: y = f(x). \quad (3.40)$$

Bei  $f(a) > f(b)$  gilt:

$$\forall y \in [f(b), f(a)] \exists x \in [a, b]: y = f(x). \quad (3.41)$$

## 3.5 Differentialrechnung

### 3.5.1 Differentialquotient

**Definition. Differentialquotient.**

Sei  $U \subseteq \mathbb{R}$  ein offenes Intervall und sei  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ . Die Funktion  $f$  heißt differenzierbar an der Stelle  $x_0 \in U$ , falls der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (3.42)$$

existiert. Dieser Grenzwert heißt *Differentialquotient* oder *Ableitung* von  $f$  an der Stelle  $x_0$ . Notation:

$$f'(x_0), \quad (Df)(x_0), \quad \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}. \quad (3.43)$$

### 3.5.2 Ableitungsregeln

Sind  $f, g, h$  an der Stelle  $x$  differenzierbare Funktionen, ist  $h(x) \neq 0$  und ist  $a$  eine reelle Zahl, so gilt

$$(af)'(x) = af'(x), \quad (3.44)$$

$$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x), \quad (3.45)$$

$$(f-g)'(x) = f'(x) - g'(x), \quad (3.46)$$

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + g'(x)f(x), \quad (3.47)$$

$$\left(\frac{f}{h}\right)'(x) = \frac{f'(x)h(x) - h'(x)f(x)}{h(x)^2}. \quad (3.48)$$

#### 3.5.2.1 Kettenregel

Ist  $g$  differenzierbar an der Stelle  $x_0$  und  $f$  differenzierbar an der Stelle  $g(x_0)$ , so ist  $f \circ g$  differenzierbar an der Stelle  $x_0$  und es gilt

$$(f \circ g)'(x_0) = (f' \circ g)(x_0) g'(x_0). \quad (3.49)$$

### 3.5.3 Tangente und Normale

Funktionsgleichung der Tangente an den Graphen von  $f$  an der Stelle  $x_0$ :

$$T(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \quad (3.50)$$

Funktionsgleichung der Normale an den Graphen von  $f$  an der Stelle  $x_0$ :

$$N(x) = f(x_0) + \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0). \quad (3.51)$$

### 3.5.4 Taylorreihe

Sei  $f$  eine an der Stelle  $a$  unendlich oft differenzierbare reelle Funktion.

**Definition. Taylorreihe.**

*Taylorreihe* von  $f$  an der Stelle  $a$ :

$$\begin{aligned} f[a](x) &:= (\exp((x-a)D)f)(a) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(D^k f)(a)}{k!} \cdot (x-a)^k \\ &= f(a) + f'(a) \cdot (x-a) + \frac{f''(a)}{2} \cdot (x-a)^2 + \dots \end{aligned} \quad (3.52)$$

mit  $f^{(k)}(a) = (D^k f)(a)$ .

Für Polynomfunktionen und für  $\exp$ ,  $\sin$ ,  $\cos$  gilt

$$\forall x \in \mathbb{R}: f[a](x) = f(x). \quad (3.53)$$

### 3.5.5 Kurvendiskussion

#### 3.5.5.1 Extrempunkte

**Definition. Lokaler Extremwert.**

Sei  $D$  eine offene Menge und  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ . Ein Wert  $f(x_0)$  heißt *lokales Maximum*, wenn

$$\exists r > 0 \forall x \in U_r(x_0): f(x) \leq f(x_0). \quad (3.54)$$

Ein Wert  $f(x_0)$  heißt *lokales Minimum*, wenn

$$\exists r > 0 \forall x \in U_r(x_0): f(x) \geq f(x_0). \quad (3.55)$$

Ist  $f(x) = f(x_0)$  nur bei  $x = x_0$ , dann spricht man von einem *strengen* lokalen Minimum bzw. Maximum.

## 3.6 Integralrechnung

### 3.6.1 Regelfunktionen

Ist  $T$  eine Treppenfunktion mit  $T(x) := t_k$  für  $x \in (x_k, x_{k+1})$ , so gilt:

$$\int_a^b T(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) t_k. \quad (3.56)$$

**Definition. Regelfunktion.**

Eine Funktion  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heißt *Regelfunktion*, wenn es eine Folge von Treppenfunktionen gibt, die gleichmäßig gegen  $f$  konvergiert.

Ist  $(T_n)$  eine gleichmäßig gegen die Regelfunktion  $f$  konvergente Folge von Treppenfunktionen, so gilt:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b T_n(x) dx. \quad (3.57)$$

Jede stückweise stetige Funktion ist eine Regelfunktion.

### 3.6.2 Stetige Funktionen

Sei  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige, monoton steigende Funktion mit  $f(x) \geq 0$  auf dem gesamten Definitionsbereich.

Untersumme:

$$\underline{A}_n = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \frac{b-a}{n} \quad (3.58)$$

Obersumme:

$$\overline{A}_n = \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \frac{b-a}{n} \quad (3.59)$$

Es gilt:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{A}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{A}_n. \quad (3.60)$$

### 3.6.3 Hauptsatz

Sei  $I$  ein Intervall, offen, halboffen, geschlossen oder unendlich. Sei  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig.

**Definition. Integralfunktion.**

*Integralfunktion:*

$$F(x) := \int_a^x f(x) dx, \quad F: I \rightarrow \mathbb{R}. \quad (3.61)$$

**Definition. Stammfunktion.**

Gilt  $F' = f$ , so wird  $F$  *Stammfunktion* von  $f$  genannt.

**Hauptsatz.** Die Integralfunktion ist differenzierbar und es gilt  $F' = f$ . Ist  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $F$  eine Stammfunktion von  $f$ , so gilt

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) \quad (3.62)$$

für  $a, b \in I$ .

### 3.6.4 Integrationsregeln

#### 3.6.4.1 Linearität

Für integrierbare Funktionen  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  und eine Konstante  $c \in \mathbb{R}$  gilt die Additivität:

$$\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad (3.63)$$

und die Homogenität:

$$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx. \quad (3.64)$$

### 3.6.4.2 Substitutionsregel

Für  $f \in C(I \rightarrow \mathbb{R})$  und  $\varphi \in C^1([a, b] \rightarrow \mathbb{R})$  mit  $\varphi([a, b]) \subseteq I$  gilt

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx. \quad (3.65)$$

### 3.6.4.3 Partielle Integration

Für  $f, g \in C^1([a, b] \rightarrow \mathbb{R})$  gilt

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b g(x)f'(x) dx. \quad (3.66)$$

### 3.6.5 Integral bei Polstellen

Bei Polstellen im Integrationsintervall ist Vorsicht geboten. Man könnte z. B. auf die Idee kommen, dass einfach

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx = \left[ -\frac{1}{2x^2} \right]_{-1}^1 = 0 \quad (3.67)$$

gerechnet werden kann. Die Funktion  $f(x) := x^{-3}$  besitzt jedoch eine Polstelle bei  $x = 0$ , ist dort somit nicht definiert und die Lücke ist auch nicht stetig behebbar. Der Hauptsatz (3.62) setzt aber einen stetigen Integranden voraus.

Um solche Situationen angehen zu können, ist eine Erweiterung des Integralbegriffs notwendig.

#### Definition. Cauchy-Hauptwert.

*Cauchy-Hauptwert* (kurz CH, engl. PV für *principal value*) bei einer Definitionslücke  $x = c$ :

$$\text{PV} \int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left( \int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right). \quad (3.68)$$

Nun gilt:

$$\text{PV} \int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx = 0. \quad (3.69)$$

Die Flächeninhalte auf beiden Seiten der Polstelle sind von unterschiedlichem Vorzeichen und heben sich gegenseitig auf.

Eine alternative Erweiterung ist die Erweiterung des Integranden auf einen komplexen Definitionsbereich. Da die Funktion  $f(z) := z^{-3}$  meromorph ist, lässt sich der Integrationsweg um die Polstelle herumführen und es gilt

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{z^3} dz = 0. \quad (3.70)$$

Zu beachten ist aber, dass z. B.

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{z^2} dz = -2 \quad (3.71)$$

ist, obwohl

$$\text{PV} \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx \quad (3.72)$$

nicht existiert.

Man beachte auch, dass in der komplexen Ebene der Umlaufsinn um die Polstelle unter Umständen eine Rolle spielt, denn die Wegunabhängigkeit des Integrals für einen holomorphen Integranden ist nur für einfach zusammenhängende Gebiete sichergestellt. Z. B. ist

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{z} dz = -\pi i \quad (3.73)$$

für den Integrationsweg oberhalb der Polstelle,

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{z} dz = +\pi i \quad (3.74)$$

für den Integrationsweg unterhalb der Polstelle und

$$\text{PV} \int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = 0. \quad (3.75)$$

## 3.7 Skalarfelder

Sei  $x := (x_k)_{k=1}^n$  und  $a := (a_k)_{k=1}^n$ . Sei  $f: G \rightarrow \mathbb{R}$  wobei  $G \subseteq \mathbb{R}^n$  eine offene Menge ist.

### 3.7.1 Partielle Ableitungen

#### Definition. Partielle Ableitung.

Die *partiellen Ableitungen* von  $f$  an der Stelle  $a \in G$  sind definiert durch

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x)}{\partial x_k} \Big|_{x=a} &:= \frac{df(a_1, \dots, t, \dots, a_n)}{dt} \Big|_{t=a_k} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_k + h, \dots, a_n) - f(a)}{h}. \end{aligned} \quad (3.76)$$

Kurzschreibweisen:

$$(D_k f)(a), \quad (\partial_k f)(a). \quad (3.77)$$

### 3.7.2 Gradient

Sei  $(e_k)_{k=1}^n$  die kanonische Basis des  $\mathbb{R}^n$ .

#### Definition. Gradient.

*Gradient* an der Stelle  $a$ :

$$\begin{aligned} (\nabla f)(a) &:= \sum_{k=1}^n e_k (D_k f)(a) \\ &= ((D_1 f)(a), \dots, (D_n f)(a)). \end{aligned} \quad (3.78)$$

Formale Schreibweise:

$$\nabla := \sum_{k=1}^n e_k D_k. \quad (3.79)$$

Ist  $(\nabla f)(x)$  stetig bei  $x = a$ , so ist  $f$  bei  $a$  differenzierbar.

### 3.7.2.1 Tangentialraum

Ist  $f: G \rightarrow \mathbb{R}$  in einer Umgebung von  $x_0 \in G$  differenzierbar, so existiert bei  $x_0$  auf eindeutige Art ein Tangentialraum, der durch

$$T(x) = f(x_0) + \langle (\nabla f)(x_0), x - x_0 \rangle \quad (3.80)$$

beschrieben wird.

### 3.7.3 Richtungsableitung

**Definition. Richtungsableitung.**

*Richtungsableitung* an der Stelle  $a$  in Richtung  $v$ :

$$\begin{aligned} (D_v f)(a) &:= \left. \frac{d}{dt} f(a + tv) \right|_{t=0} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + hv) - f(a)}{h}. \end{aligned} \quad (3.81)$$

Die partiellen Ableitungen sind die Richtungsableitungen bezüglich der Standardbasis  $(e_k)$ :

$$(D_{e_k} f)(a) = (D_k f)(a). \quad (3.82)$$

Ist  $f$  an der Stelle  $a$  differenzierbar, so gilt:

$$(D_v f)(a) = \langle v, (\nabla f)(a) \rangle = \sum_{k=1}^n v_k (D_k f)(a). \quad (3.83)$$

Sind  $f, g$  an der Stelle  $a$  differenzierbar, so gilt dort:

$$D_v(f + g) = D_v f + D_v g, \quad (3.84)$$

$$\forall r \in \mathbb{R}: D_v(rf) = r D_v f, \quad (3.85)$$

$$D_v(fg) = g D_v f + f D_v g, \quad (3.86)$$

$$D_{v+w} f = D_v f + D_w f. \quad (3.87)$$

## 3.8 Vektorfelder

Sei  $f: G \rightarrow \mathbb{R}^m$  wobei  $G \subseteq \mathbb{R}^n$  eine offene Menge ist.

**Definition. Jacobi-Matrix.**

*Jacobi-Matrix* an der Stelle  $a$ :

$$(J[f](a))_{ij} := (D_j f_i)(a). \quad (3.88)$$

Schreibweisen:

$$J[f](a) = (Df)(a) = (\nabla \otimes f)^T(a) \quad (3.89)$$

und

$$J[f](x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x} = \frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}. \quad (3.90)$$

### 3.8.1 Tangentialraum

Ist  $f: (G \subseteq \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^m$  bei  $x_0 \in G$  differenzierbar, so gibt es dort einen Tangentialraum, der durch

$$T(x) = f(x_0) + (Df)(x_0)(x - x_0) \quad (3.91)$$

beschrieben wird.

### 3.8.2 Richtungsableitung

**Definition. Richtungsableitung.**

*Richtungsableitung* von  $f$  an der Stelle  $a$ :

$$(D_v f)(a) := \left. \frac{d}{dt} f(a + tv) \right|_{t=0}. \quad (3.92)$$

Ist  $f: (G \subseteq \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^m$  bei  $a \in G$  differenzierbar, so gilt:

$$(D_v f)(a) = (\langle v, \nabla \rangle f)(a) = J[f](a) v, \quad (3.93)$$

kurz  $D_v = \langle v, \nabla \rangle$ .

## 3.9 Variationsrechnung

### 3.9.1 Fundamentallema

Sei  $I := [a, b]$  kompakt und sei  $g: I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Wenn

$$\int_a^b g(x) h(x) dx = 0 \quad (3.94)$$

für jede unendlich oft differenzierbare Funktion  $h: I \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $h(a) = h(b) = 0$  gilt, so ist  $g(x) = 0$  für alle  $x$ .

### 3.9.2 Euler-Lagrange-Gleichung

Sei  $I := [a, b]$  kompakt. Sei

$$F: I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (3.95)$$

zweimal stetig differenzierbar. Gesucht ist eine zweimal stetig differenzierbare Funktion  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  mit fixen Randwerten  $f(a) = A$  und  $f(b) = B$ , für die

$$J(f) := \int_a^b F(x, f(x), f'(x)) dx \quad (3.96)$$

einen Extremwert annimmt.

Die Euler-Lagrange-Gleichung

$$\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} = 0 \quad (3.97)$$

mit  $y = f(x)$  und  $y' = f'(x)$  ist eine notwendige Bedingung dafür.

## 3.10 Fourier-Analysis

### 3.10.1 Fourierreihen

#### 3.10.1.1 Fourier-Koeffizienten

**Komplexe Fourier-Koeffizienten:**

$$c_k[s] = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e^{-ki\omega t} s(t) dt. \quad (3.98)$$

Nach Normierung  $x := \omega t$ ,  $f(x) := s(x/\omega)$ :

$$c_k[f] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-kix} f(x) dx. \quad (3.99)$$

Es gilt ( $\lambda$ : eine Konstante):

$$c_k[f + g] = c_k[f] + c_k[g], \quad (3.100)$$

$$c_k[\lambda f] = \lambda c_k[f]. \quad (3.101)$$

**Reelle Fourier-Koeffizienten:**

$$a_k[s] = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(k\omega t) s(t) dt, \quad (3.102)$$

$$b_k[s] = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \sin(k\omega t) s(t) dt. \quad (3.103)$$

Nach Normierung  $x := \omega t$ ,  $f(x) := s(x/\omega)$ :

$$a_k[f] = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) f(x) dx, \quad (3.104)$$

$$b_k[f] = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) f(x) dx. \quad (3.105)$$

# 4 Lineare Algebra

## 4.1 Grundbegriffe

### 4.1.1 Norm

#### Definition. Norm.

Eine Abbildung  $v \mapsto \|v\|$  von einem Vektorraum  $V$  über dem Körper  $K$  in die nichtnegativen reellen Zahlen heißt *Norm*, wenn für alle  $v, w \in V$  und  $a \in K$  die drei Axiome

$$\|v\| = 0 \implies v = 0, \quad (4.1)$$

$$\|av\| = |a| \|v\|, \quad (4.2)$$

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \quad (4.3)$$

erfüllt sind.

Eigenschaften:

$$\|v\| = 0 \iff v = 0, \quad (4.4)$$

$$\| -v \| = \|v\|, \quad (4.5)$$

$$\|v\| \geq 0. \quad (4.6)$$

Dreiecksungleichung nach unten:

$$|\|v\| - \|w\|| \leq \|v - w\|. \quad (4.7)$$

### 4.1.2 Skalarprodukt

Ein Vektorraum über dem Körper  $\mathbb{R}$  heißt *reeller Vektorraum*, einer über dem Körper  $\mathbb{C}$  heißt *komplexer Vektorraum*.

#### 4.1.2.1 Definition

Sei  $V$  ein reeller Vektorraum. Eine Abbildung  $f: V^2 \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(x, y) = \langle x, y \rangle$  heißt *Skalarprodukt*, wenn folgende Axiome erfüllt sind. Für  $v, w \in V$  und  $\lambda \in \mathbb{R}$  gilt:

$$\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle, \quad (4.8)$$

$$\langle v, \lambda w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle, \quad (4.9)$$

$$\langle v, w_1 + w_2 \rangle = \langle v, w_1 \rangle + \langle v, w_2 \rangle, \quad (4.10)$$

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \quad (4.11)$$

$$\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0. \quad (4.12)$$

Sei  $V$  ein komplexer Vektorraum und  $f: V^2 \rightarrow \mathbb{C}$ . Für  $v, w \in V$  und  $\lambda \in \mathbb{R}$  gilt:

$$\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}, \quad (4.13)$$

$$\langle \lambda v, w \rangle = \overline{\lambda} \langle v, w \rangle, \quad (4.14)$$

$$\langle v, \lambda w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle, \quad (4.15)$$

$$\langle v, w_1 + w_2 \rangle = \langle v, w_1 \rangle + \langle v, w_2 \rangle, \quad (4.16)$$

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \quad (4.17)$$

$$\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0. \quad (4.18)$$

#### 4.1.2.2 Eigenschaften

Das reelle Skalarprodukt ist eine symmetrische bilineare Abbildung.

#### 4.1.2.3 Winkel und Längen

##### Definition. Winkel, orthogonale Vektoren.

Der *Winkel*  $\varphi$  zwischen  $v$  und  $w$  ist definiert durch die Beziehung:

$$\langle v, w \rangle = \|v\| \|w\| \cos \varphi. \quad (4.19)$$

*Orthogonal:*

$$v \perp w \iff \langle v, w \rangle = 0. \quad (4.20)$$

Ein Skalarprodukt  $\langle v, w \rangle$  induziert die Norm

$$\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}. \quad (4.21)$$

#### 4.1.2.4 Orthonormalbasis

Sei  $B = (b_k)_{k=1}^n$  eine Basis eines endlichdimensionalen Vektorraumes über den reellen oder komplexen Zahlen.

##### Definition. Orthonormalbasis.

Gilt  $\langle b_i, b_j \rangle = 0$  für alle  $i, j$  mit  $i \neq j$ , so wird  $B$  *Orthogonalbasis* genannt. Ist  $B$  nicht unbedingt eine Basis, so spricht man von einem *Orthogonalsystem*.

##### Definition. Orthonormalbasis.

Ist  $B$  eine Orthogonalbasis und gilt zusätzlich  $\langle b_k, b_k \rangle = 1$  für alle  $k$ , so wird  $B$  *Orthonormalbasis* (ONB) genannt. Ist  $B$  nicht unbedingt eine Basis, so spricht man von einem *Orthonormalsystem*.

Sei  $v = \sum_k v_k b_k$  und  $w = \sum_k w_k b_k$ . Mit  $\sum_k$  ist immer  $\sum_{k=1}^n$  gemeint.

Ist  $B$  eine Orthonormalbasis, so gilt:

$$\langle v, w \rangle = \sum_k \overline{v_k} w_k. \quad (4.22)$$

Ist  $B$  nur eine Orthogonalbasis, so gilt:

$$\langle v, w \rangle = \sum_k \langle b_k, b_k \rangle \overline{v_k} w_k \quad (4.23)$$

Allgemein gilt:

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i,j} g_{ij} \overline{v_i} w_j \quad (4.24)$$

mit  $g_{ij} = \langle b_i, b_j \rangle$ . In reellen Vektorräumen ist die komplexe Konjugation wirkungslos und kann somit entfallen.

Ist  $B$  eine Orthogonalbasis und  $v = \sum_k v_k b_k$ , so gilt:

$$v_k = \frac{\langle b_k, v \rangle}{\langle b_k, b_k \rangle}. \quad (4.25)$$

Ist  $B$  eine Orthonormalbasis, so gilt speziell:

$$v_k = \langle b_k, v \rangle. \quad (4.26)$$

#### 4.1.2.5 Orthogonale Projektion

Orthogonale Projektion von  $v$  auf  $w$ :

$$P[w](v) := \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle} w. \quad (4.27)$$

#### 4.1.2.6 Gram-Schmidt-Verfahren

Für linear unabhängige Vektoren  $v_1, \dots, v_n$  wird durch

$$w_k := v_k - \sum_{i=1}^{k-1} P[w_i](v_k) \quad (4.28)$$

ein Orthogonalsystem  $w_1, \dots, w_n$  berechnet.

Speziell für zwei nicht kollineare Vektoren  $v_1, v_2$  gilt

$$w_1 = v_1, \quad (4.29)$$

$$w_2 = v_2 - P[w_1](v_2). \quad (4.30)$$

### 4.1.2.7 Musikalische Isomorphismen

**Definition. Musikalische Isomorphismen.**

Sei  $V$  ein endlichdimensionaler Vektorraum und  $V^*$  sein Dualraum. Die lineare Abbildung

$$\Phi: V \rightarrow V^*, \quad \Phi(u)(v) := \langle u, v \rangle \quad (4.31)$$

ist ein kanonischer Isomorphismus. Man nennt  $u^\flat := \Phi(u)$  und  $\omega^\sharp := \Phi^{-1}(\omega)$  die *musikalischen Isomorphismen*.

## 4.2 Koordinatenvektoren

### 4.2.1 Koordinatenraum

Addition von  $a, b \in K^n$ :

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{bmatrix}. \quad (4.32)$$

Subtraktion:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a_1 - b_1 \\ \vdots \\ a_n - b_n \end{bmatrix}. \quad (4.33)$$

Skalarmultiplikation von  $\lambda \in K$  mit  $a \in K^n$ :

$$\lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} \lambda a_1 \\ \vdots \\ \lambda a_n \end{bmatrix}. \quad (4.34)$$

Ist  $K$  ein Körper, so bildet die Menge

$$K^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid \forall k: a_k \in K\} \quad (4.35)$$

bezüglich der Addition (4.32) und der Multiplikation (4.34) einen Vektorraum, der *Koordinatenraum* genannt wird. Das Tupel  $E_n = (e_1, \dots, e_n)$  mit

$$\begin{aligned} e_1 &:= (1, 0, 0, \dots, 0), \\ e_2 &:= (0, 1, 0, \dots, 0), \\ e_3 &:= (0, 0, 1, \dots, 0), \\ &\dots \\ e_n &:= (0, 0, 0, \dots, 1) \end{aligned} \quad (4.36)$$

bildet eine geordnete Basis von  $K^n$ , die *kanonische Basis* genannt wird. Es gilt

$$a = (a_1, \dots, a_n) = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n. \quad (4.37)$$

### 4.2.2 Kanonisches Skalarprodukt

**Definition. Kanonisches Skalarprodukt.**

Für  $a, b \in \mathbb{R}^n$ :

$$\langle a, b \rangle := \sum_{k=1}^n a_k b_k. \quad (4.38)$$

Für  $a, b \in \mathbb{C}^n$ :

$$\langle a, b \rangle := \sum_{k=1}^n \overline{a_k} b_k \quad (4.39)$$

Die kanonische Basis (4.36) ist eine Orthonormalbasis bezüglich diesem Skalarprodukt, s. 4.1.2.4. Das Skalarprodukt induziert die Norm

$$|a| := \sqrt{\langle a, a \rangle} = \sqrt{\sum_{k=1}^n |a_k|^2}, \quad (4.40)$$

die *Vektorbetrag* genannt wird.

Jedem Koordinatenvektor  $a \neq 0$  lässt sich ein Einheitsvektor  $\hat{a} := \frac{a}{|a|}$  zuordnen, der in Richtung von  $a$  zeigt und die Eigenschaft  $|\hat{a}| = 1$  besitzt.

Es gilt

$$a \perp b \iff \langle a, b \rangle = 0, \quad (4.41)$$

$$a \uparrow \uparrow b \iff \langle a, b \rangle = |a| |b|, \quad (4.42)$$

$$a \uparrow \downarrow b \iff \langle a, b \rangle = -|a| |b|. \quad (4.43)$$

Allgemein gilt

$$\langle a, b \rangle = |a| |b| \cos \varphi. \quad (\varphi = \angle(a, b)) \quad (4.44)$$



## 4.3 Matrizen

### 4.3.1 Quadratische Matrizen

#### 4.3.1.1 Matrizenring

Mit  $K^{n \times n}$  wird die Menge quadratischen Matrizen

$$(a_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \ddots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (4.45)$$

mit Einträgen  $a_{ij}$  aus dem Körper  $K$  bezeichnet.

Die Menge  $K^{n \times n}$  bildet bezüglich Addition und Multiplikation von Matrizen einen Ring (s. 1.8).

Das neutrale Element der Multiplikation ist die Einheitsmatrix

$$E_n = (\delta_{ij}), \quad \delta_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{wenn } i = j, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad (4.46)$$

Das sind

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{usw.} \quad (4.47)$$

#### 4.3.1.2 Symmetrische Matrizen

Eine quadratische Matrix  $A = (a_{ij})$  heißt symmetrisch, falls gilt  $a_{ij} = a_{ji}$  bzw.  $A^T = A$ .

Jede reelle symmetrische Matrix besitzt ausschließlich reelle Eigenwerte und die algebraischen Vielfachheiten stimmen mit den geometrischen Vielfachheiten überein.

Jede reelle symmetrische Matrix  $A$  ist diagonalisierbar, d. h. es gibt eine invertierbare Matrix  $T$  und eine Diagonalmatrix  $D$ , so dass  $A = TDT^{-1}$  gilt.

Sei  $V$  ein  $K$ -Vektorraum und  $(b_k)_{k=1}^n$  eine Basis von  $V$ . Für jede symmetrische Bilinearform  $f: V^2 \rightarrow K$  ist die Darstellungsmatrix

$$A = (f(b_i, b_j)) \quad (4.48)$$

symmetrisch. Ist  $A \in K^{n \times n}$  eine symmetrische Matrix, so ist

$$f(x, y) = x^T A y. \quad (4.49)$$

eine symmetrische Bilinearform für  $x, y \in K^n$ . Ist  $K = \mathbb{R}$  und  $A$  positiv definit, so ist (4.49) ein Skalarprodukt auf  $\mathbb{R}^n$ .

#### 4.3.1.3 Reguläre Matrizen

Eine quadratische Matrix  $A \in K^{n \times n}$  heißt *regulär* oder *invertierbar*, wenn es eine inverse Matrix  $A^{-1}$  gibt, so dass

$$A^{-1}A = E_n \quad (\iff AA^{-1} = E_n) \quad (4.50)$$

gilt, wobei mit  $E_n$  die Einheitsmatrix gemeint ist. Jede reguläre Matrix besitzt genau eine inverse Matrix. Eine Matrix  $A$  ist genau dann regulär, wenn  $\det(A) \neq 0$  gilt. Die Menge der regulären Matrizen bildet bezüglich Matrizenmultiplikation eine Gruppe, die *allgemeine lineare Gruppe*

$$\text{GL}(n, K) := \{A \in K^{n \times n} \mid \det(A) \neq 0\}. \quad (4.51)$$

Ist  $V$  ein Vektorraum über dem Körper  $K$ , so bilden die Automorphismen bezüglich Verkettung eine Gruppe, die *Automorphismengruppe*

$$\text{GL}(V) = \text{Aut}(V). \quad (4.52)$$

Ein *Endomorphismus* ist eine lineare Abbildung, welche eine Selbstabbildung ist. Ein *Automorphismus* ist eine bijektiver Endomorphismus.

Wählt man auf  $V$  eine Basis  $B$ , so ist die Zuordnung der Darstellungsmatrix

$$M_B^B: \text{Aut}(V) \rightarrow \text{GL}(\dim V, K) \quad (4.53)$$

eine Gruppenisomorphismus.

Eine quadratische Matrix, die nicht regulär ist, heißt *singulär*. Endomorphismen, die nicht bijektiv sind, lassen die Dimension ihrer Definitionsmenge schrumpfen:

$$f \in \text{End}(V) \setminus \text{Aut}(V) \iff \dim f(V) < \dim V. \quad (4.54)$$

Für Matrizen  $A \in K^{n \times n}$  bedeutet das, dass sie nicht den vollen Rang besitzen:

$$\det A = 0 \iff \text{rk}(A) < n = \dim K^n. \quad (4.55)$$

Inversionsformel:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}. \quad (4.56)$$

**Definition.** Wird in der Matrix  $A$  die Zeile  $i$  und die Spalte  $j$  entfernt, so entsteht eine neue Matrix  $[A]_{ij}$ , die *Streichungsmatrix* von  $A$  genannt wird.

Laplacescher Entwicklungssatz:

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det([A]_{ij}), \quad (4.57)$$

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det([A]_{ij}). \quad (4.58)$$

#### 4.3.1.4 Determinanten

Für Matrizen  $A, B \in K^{n \times n}$  und  $r \in K$  gilt:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B), \quad (4.59)$$

$$\det(A^T) = \det(A), \quad (4.60)$$

$$\det(rA) = r^n \det(A), \quad (4.61)$$

$$\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}. \quad (4.62)$$

Für eine Diagonalmatrix  $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$  gilt:

$$\det(D) = \prod_{k=1}^n d_k. \quad (4.63)$$

Eine linke Dreiecksmatrix ist eine Matrix der Form  $(a_{ij})$  mit  $a_{ij} = 0$  für  $i < j$ . Eine rechte Dreiecksmatrix ist die Transponierte einer linken Dreiecksmatrix.

Für eine linke oder rechte Dreiecksmatrix  $A = (a_{ij})$  gilt:

$$\det(A) = \prod_{k=1}^n a_{kk}. \quad (4.64)$$

#### 4.3.1.5 Eigenwerte

**Eigenwertproblem:** Für eine gegebene quadratische Matrix  $A$  bestimme

$$\{(\lambda, v) \mid Av = \lambda v, v \neq 0\}. \quad (4.65)$$

Das homogene lineare Gleichungssystem

$$Av = \lambda v \iff (A - \lambda E_n)v = 0 \quad (4.66)$$

besitzt Lösungen  $v \neq 0$  gdw.

$$p(\lambda) := \det(A - \lambda E_n) = 0. \quad (4.67)$$

Bei  $p(\lambda)$  handelt es sich um ein normiertes Polynom vom Grad  $n$ , das *charakteristisches Polynom* genannt wird.

**Eigenraum:**

$$\text{Eig}(A, \lambda) := \{v \mid Av = \lambda v\}. \quad (4.68)$$

Die Dimension  $\dim \text{Eig}(A, \lambda)$  wird *geometrische Vielfachheit* von  $\lambda$  genannt.

**Spektrum:**

$$\sigma(A) := \{\lambda \mid \exists v \neq 0: Av = \lambda v\}. \quad (4.69)$$

#### 4.3.1.6 Nilpotente Matrizen

**Definition. Nilpotente Matrix.**

Eine quadratische Matrix  $A \in K^{n \times n}$  heißt *nilpotent*, wenn es eine Zahl  $k \in \mathbb{N}, k \geq 1$  gibt, so dass gilt:

$$A^k = 0. \quad (4.70)$$

Die erste solche Zahl heißt *Nilpotenzgrad* der Matrix  $A$ .

Eine äquivalente Bedingung ist:

$$p_A(\lambda) := \det(\lambda E - A) = \lambda^n. \quad (4.71)$$

**Eigenschaften.** Sei  $A$  eine nilpotente Matrix. Es gilt:

- $A$  besitzt nur den Eigenwert  $\lambda = 0$ .
- $\det(A) = \text{tr}(A) = 0$ .
- $E - A$  ist invertierbar.

### 4.4 Lineare Gleichungssysteme

Ein lineares Gleichungssystem mit  $m$  Gleichungen und  $n$  Unbekannten hat die Form:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_n. \end{aligned} \quad (4.72)$$

Das System lässt sich durch

$$A := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (4.73)$$

und

$$x := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b := \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad (4.74)$$

zusammenfassen.

Äquivalente Matrixform von (4.72):

$$Ax = b. \quad (4.75)$$

Erweiterte Koeffizientenmatrix:

$$(A|b) := \left[ \begin{array}{cccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_n \end{array} \right]. \quad (4.76)$$

Lösungskriterium:

$$\exists x[Ax = b] \iff \text{rg}(A) = \text{rg}(A|b). \quad (4.77)$$

Eindeutige Lösung (bei  $n$  Unbekannten):

$$\exists! x[Ax = b] \iff \text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = n. \quad (4.78)$$

Im Fall  $m = n$  gilt:

$$\begin{aligned} \exists! x[Ax = b] &\iff A \in \text{GL}(n, K) \\ &\iff \text{rg}(A) = n \iff \det(A) \neq 0. \end{aligned} \quad (4.79)$$

## 4.5 Multilineare Algebra

### 4.5.1 Äußeres Produkt

Sei  $V$  ein Vektorraum und sei  $v_k \in V$  für alle  $k$ .

Sind  $a = \sum_{k=1}^n a_k v_k$  und  $b = \sum_{k=1}^n b_k v_k$  beliebige Linearkombinationen, so gilt

$$\begin{aligned} a \wedge b &= \sum_{i,j} a_i b_j v_i \wedge v_j \\ &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i) v_i \wedge v_j \end{aligned} \quad (4.80)$$

und

$$\begin{aligned} a \wedge b &= a \otimes b - b \otimes a \\ &= \sum_{i,j} (a_i b_j - a_j b_i) v_i \otimes v_j \\ &= \sum_{i,j} a_i b_j (v_i \otimes v_j - v_j \otimes v_i). \end{aligned} \quad (4.81)$$

#### 4.5.1.1 Alternator

Für  $a_k \in V$  ist  $\text{Alt}_p: T^p(V) \rightarrow A^p(V) \subseteq T^p(V)$  mit

$$\begin{aligned} &\text{Alt}_p(a_1 \otimes \dots \otimes a_p) \\ &:= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) (a_{\sigma(1)} \otimes \dots \otimes a_{\sigma(p)}). \end{aligned} \quad (4.82)$$

Es ist  $A^p(V)$  isomorph zu  $A^p(V)$  und man setzt:

$$a_1 \wedge \dots \wedge a_p = p! \text{Alt}_p(a_1 \otimes \dots \otimes a_p). \quad (4.83)$$

Speziell gilt

$$\text{Alt}_2(a \otimes b) := \frac{1}{2}(a \otimes b - b \otimes a). \quad (4.84)$$

und

$$a \wedge b = 2 \text{Alt}_2(a \otimes b). \quad (4.85)$$

#### 4.5.1.2 Äußere Algebra

Darstellung als Quotientenraum:

$$\Lambda^2(V) = T^2(V) / \{v \otimes v \mid v \in V\}. \quad (4.86)$$

Dimension: Ist  $\dim(V) = n$ , so gilt

$$\dim(\Lambda^k(V)) = \binom{n}{k}. \quad (4.87)$$

## 4.6 Analytische Geometrie

### 4.6.1 Geraden

#### 4.6.1.1 Parameterdarstellung

**Punktrichtungsform:**

$$p(t) = p_0 + t\underline{v}, \quad (4.88)$$

$p_0$ : Stützpunkt,  $\underline{v}$ : Richtungsvektor. Die Gerade ist dann die Menge  $g = \{p(t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ .

Der Vektor  $\underline{v}$  repräsentiert außerdem die Geschwindigkeit, mit der diese Parameterdarstellung durchlaufen wird:  $p'(t) = \underline{v}$ .

**Gerade durch zwei Punkte:** Sind zwei Punkte  $p_1, p_2$  mit  $p_1 \neq p_2$  gegeben, so ist durch die beiden Punkte eine Gerade gegeben. Für diese Gerade ist

$$p(t) = p_1 + t(p_2 - p_1) \quad (4.89)$$

eine Punktrichtungsform. Durch Umformung ergibt sich die **Zweipunkteform**:

$$p(t) = (1 - t)p_1 + tp_2. \quad (4.90)$$

Bei (4.90) handelt es sich um eine Affinkombination. Gilt  $t \in [0, 1]$ , so ist (4.90) eine Konvexkombination: eine Parameterdarstellung für die Strecke von  $p_1$  nach  $p_2$ .

#### 4.6.1.2 Parameterfreie Darstellung

**Hesse-Form:**

$$g = \{p \mid \langle \underline{n}, p - p_0 \rangle = 0\}, \quad (4.91)$$

$p_0$ : Stützpunkt,  $\underline{n}$ : Normalenvektor.

Die Hesse-Form ist nur in der Ebene möglich. Form (4.91) hat in Koordinaten die Form

$$\begin{aligned} g &= \{(x, y) \mid n_x(x - x_0) + n_y(y - y_0) = 0\} \\ &= \{(x, y) \mid n_x x + n_y y = n_x x_0 + n_y y_0\}. \end{aligned} \quad (4.92)$$

**Hesse-Normalform:** (4.91) mit  $|\underline{n}| = 1$ .

Sei  $\underline{v} \wedge \underline{w}$  das äußere Produkt.

**Plückerform:**

$$g = \{p \mid (p - p_0) \wedge \underline{v} = 0\}. \quad (4.93)$$

Die Größe  $\underline{m} = p_0 \wedge \underline{v}$  heißt Moment. Beim Tupel  $(\underline{v} : \underline{m})$  handelt es sich um Plückerkoordinaten für die Gerade.

In der Ebene gilt speziell:

$$g = \{(x, y) \mid (x - x_0)\Delta y = (y - y_0)\Delta x\} \quad (4.94)$$

mit  $\underline{v} = (\Delta x, \Delta y)$ .

Sei  $a := \Delta y$  und  $b := -\Delta x$  und  $c := ax_0 + by_0$ . Aus (4.94) ergibt sich:

$$g = \{(x, y) \mid ax + by = c\}. \quad (4.95)$$

Im Raum ergibt sich ein Gleichungssystem:

$$g = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid \begin{cases} (x - x_0)\Delta y = (y - y_0)\Delta x \\ (y - y_0)\Delta z = (z - z_0)\Delta y \\ (x - x_0)\Delta z = (z - z_0)\Delta x \end{cases} \right\} \quad (4.96)$$

mit  $\underline{v} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ .

#### 4.6.1.3 Abstand Punkt zu Gerade

Sei  $p(t) := p_0 + t\underline{v}$  die Punktrichtungsform einer Geraden und sei  $q$  ein weiterer Punkt. Bei  $\underline{d}(t) := p(t) - q$  handelt es sich um den Abstandsvektor in Abhängigkeit von  $t$ .

Ansatz: Es gibt genau ein  $t$ , so dass gilt:

$$\langle \underline{d}, \underline{v} \rangle = 0. \quad (4.97)$$

Lösung:

$$t = \frac{\langle \underline{v}, q - p_0 \rangle}{\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle}. \quad (4.98)$$

### 4.6.2 Ebenen

#### 4.6.2.1 Parameterdarstellung

Seien  $\underline{u}, \underline{v}$  zwei nicht kollineare Vektoren.

**Punktrichtungsform:**

$$p(s, t) = p_0 + s\underline{u} + t\underline{v}. \quad (4.99)$$

#### 4.6.2.2 Parameterfreie Darstellung

Seien  $\underline{v}, \underline{w}$  zwei nicht kollineare Vektoren. Durch

$$E = \{p \mid (p - p_0) \wedge \underline{v} \wedge \underline{w} = 0\}. \quad (4.100)$$

wird eine Ebene beschrieben.

**Hesse-Form:**

$$E = \{p \mid \langle \underline{n}, p - p_0 \rangle = 0\}, \quad (4.101)$$

$p_0$ : Stützpunkt,  $\underline{n}$ : Normalenvektor. Die Hesse-Form einer Ebene ist nur im dreidimensionalen Raum möglich. Den Normalenvektor bekommt man aus (4.99) mit  $\underline{n} = \underline{u} \times \underline{v}$ .

#### 4.6.2.3 Abstand Punkt zu Ebene

Sei  $p(s, t) := p_0 + s\underline{u} + t\underline{v}$  die Punktrichtungsform einer Ebene und sei  $q$  ein weiterer Punkt. Bei  $\underline{d}(s, t) := p - q$  handelt es sich um den Abstandsvektor in Abhängigkeit von  $(s, t)$ .

Ansatz: Es gibt genau ein Tupel  $(s, t)$ , so dass gilt:

$$\langle \underline{d}, \underline{u} \rangle = 0 \text{ und } \langle \underline{d}, \underline{v} \rangle = 0. \quad (4.102)$$

Lösung: Es ergibt sich ein LGS:

$$\begin{bmatrix} \langle \underline{u}, \underline{u} \rangle & \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle \\ \langle \underline{v}, \underline{u} \rangle & \langle \underline{v}, \underline{v} \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle \underline{u}, q - p_0 \rangle \\ \langle \underline{v}, q - p_0 \rangle \end{bmatrix}. \quad (4.103)$$

Bemerkung: Die Systemmatrix  $g_{ij}$  ist der metrische Tensor für die Basis  $B = (\underline{u}, \underline{v})$ . Die Lösung des LGS ist:

$$s = \frac{\langle g_{12}\underline{v} - g_{12}\underline{u}, q - p_0 \rangle}{g_{11}^2 - g_{12}^2}, \quad (4.104)$$

$$t = \frac{\langle g_{12}\underline{u} - g_{12}\underline{v}, q - p_0 \rangle}{g_{11}^2 - g_{12}^2}. \quad (4.105)$$

# 5 Differentialgeometrie

## 5.1 Kurven

### 5.1.1 Parameterkurven

**Definition. Parameterkurve, Weg, einfacher Weg.**

Sei  $X$  ein topologischer Raum und  $I$  ein reelles Intervall, auch offen oder halboffen, auch unbeschränkt. Eine stetige Funktion

$$\gamma: I \rightarrow X \quad (5.1)$$

heißt *Parameterdarstellung einer Kurve*, kurz *Parameterkurve*. Die Bildmenge  $\gamma(I)$  heißt *Kurve*.

Eine Parameterdarstellung mit einem kompakten Intervall  $I = [a, b]$  heißt *Weg*.

Für einen Weg mit  $I = [a, b]$  heißt  $f(a)$  *Anfangspunkt* und  $\gamma(b)$  *Endpunkt*. Ein Weg mit  $\gamma(a) = \gamma(b)$  heißt *geschlossen*. Ein Weg, dessen Einschränkung auf  $[a, b]$  injektiv ist, heißt *einfach*, auch *doppelpunktfrei* oder *Jordan-Weg*.

**Beispiele.**

Bsp. für einen einfachen geschlossenen Weg:

$$\gamma(t) := \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}, \quad \gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2. \quad (5.2)$$

Die Kurve ist der Einheitskreis.

Bsp. für einen geschlossenen Weg mit Doppelpunkt:

$$\gamma(t) := \begin{bmatrix} 2 \cos t \\ \sin(2t) \end{bmatrix}, \quad f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2. \quad (5.3)$$

Die Kurve ist eine Achterschleife.

### 5.1.2 Differenzierbare Parameterkurven

**Definition. Differenzierbare Parameterkurve, Tangentialvektor, glatt, regulär.**

Eine Parameterkurve  $\gamma: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$  heißt *differenzierbar*, wenn die Ableitung  $\gamma'(t)$  an jeder Stelle  $t$  existiert. Die Ableitung  $\gamma'(t)$  wird *Tangentialvektor* an die Kurve an der Stelle  $t$  genannt.

Ein  $C^k$ -Kurve ist eine Parameterkurve, dessen  $k$ -te Ableitung eine stetige Funktion ist. Ein unendlich oft differenzierbare Parameterkurve heißt *glatt*.

Eine Parameterkurve heißt *regulär*, wenn:

$$\forall t: f'(t) \neq 0. \quad (5.4)$$

**Bogenlänge.** Die Bogenlänge einer stetig differenzierbaren Parameterkurve  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  lässt sich mit der Formel

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt \quad (5.5)$$

mit

$$|\gamma'(t)| := \sqrt{\gamma_1'(t)^2 + \dots + \gamma_n'(t)^2} \quad (5.6)$$

berechnen.

## 5.2 Koordinatensysteme

### 5.2.1 Polarkoordinaten

Polarkoordinaten  $r, \varphi$  sind gegeben durch die Abbildung

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = f(r, \varphi) := \begin{bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{bmatrix} \quad (5.7)$$

mit  $r > 0$  und  $0 \leq \varphi < 2\pi$ .

Umkehrabbildung für  $(x, y) \neq (0, 0)$ :

$$\begin{bmatrix} r \\ \varphi \end{bmatrix} = f^{-1}(x, y) = \begin{bmatrix} r \\ s(y) \arccos\left(\frac{x}{r}\right) \end{bmatrix} \quad (5.8)$$

mit  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

und  $s(y) = \operatorname{sgn}(y) + 1 - |\operatorname{sgn}(y)|$ .

Jacobi-Determinante:

$$\det J = \det((Df)(r, \varphi)) = r. \quad (5.9)$$

Darstellung des metrischen Tensors in Polarkoordinaten:

$$(g_{ij}) = J^T J = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{bmatrix}. \quad (5.10)$$

## 5.3 Mannigfaltigkeiten

### 5.3.1 Grundbegriffe

**Definition. Reguläre Abbildung.**

Seien  $U, V$  offene Mengen. Eine Abbildung

$$\varphi: (U \subseteq \mathbb{R}^n) \rightarrow (V \subseteq \mathbb{R}^m) \quad (5.11)$$

heißt *regulär*, wenn

$$\forall u \in U: \operatorname{rg}((D\varphi)(u)) = \min(m, n) \quad (5.12)$$

gilt. Mit  $(D\varphi)(u)$  ist dabei die Jacobi-Matrix an der Stelle  $u$  gemeint:

$$((D\varphi)(u))_{ij} := \frac{\partial \varphi_i(u)}{\partial u_j}. \quad (5.13)$$

Für  $(D\varphi)(u): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  gilt:

$$n \geq m \implies \forall u: (D\varphi)(u) \text{ ist surjektiv}, \quad (5.14)$$

$$n < m \implies \forall u: (D\varphi)(u) \text{ ist injektiv}. \quad (5.15)$$

**Definition. Karte, lokale Karte.**

Sei  $m, n \in \mathbb{N}, n < m$  und sei  $M \subseteq \mathbb{R}^m$ . Eine Abbildung  $\varphi$  von einer offenen Menge  $U' \subseteq \mathbb{R}^n$  in eine offene Menge  $U \subseteq M$  heißt *Karte*, wenn  $\varphi$  ein Homöomorphismus und  $\varphi: U' \rightarrow \mathbb{R}^m$  eine reguläre Abbildung ist. Ist  $U$  eine offene Umgebung von  $p \in M$ , so heißt  $\varphi$  *lokale Karte* bezüglich  $p$ .

**Definition. Untermannigfaltigkeit des  $\mathbb{R}^m$ .**

Sei  $m, n \in \mathbb{N}, n < m$ . Eine Menge  $M \subseteq \mathbb{R}^m$  heißt *n-dimensionale Untermannigfaltigkeit* des  $\mathbb{R}^m$ , wenn es zu jedem Punkt  $p \in M$  eine lokale Karte

$$\varphi: (U' \subseteq \mathbb{R}^n) \rightarrow (U \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^m) \quad (5.16)$$

gibt.

**Definition. Atlas.**

Ein *Atlas* für eine Mannigfaltigkeit  $M$  ist eine Menge von Karten, deren Bildmengen  $M$  überdecken.

**Definition. Differenzierbare Abbildung.**

Sei  $M$  eine glatte Mannigfaltigkeit. Eine Abbildung  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  ist  $(k$  mal) (stetig) *differenzierbar* gdw. für jede Karte  $\varphi: U' \rightarrow (U \subseteq M)$  das Kompositum  $f \circ \varphi$  ( $k$  mal) (stetig) differenzierbar ist. Es genügt der Nachweis für alle Karten aus einem Atlas.

**Definition. Glatte Abbildung.**

Seien  $M, N$  zwei glatte Mannigfaltigkeiten. Eine Abbildung  $f: M \rightarrow N$  heißt *glatt* gdw. für alle Karten  $\varphi: U' \rightarrow (U \subseteq M)$  und  $\psi: V' \rightarrow (V \subseteq N)$  das Kompositum  $\psi^{-1} \circ f \circ \varphi$  eine glatte Abbildung ist. Es genügt bereits der Nachweis für alle Karten aus jeweils einem Atlas für  $M$  und  $N$ .

### 5.3.2 Vektorfelder

#### 5.3.2.1 Tangentialräume

*Tangentialbündel:*

$$TM := \bigsqcup_{p \in M} T_p M = \bigcup_{p \in M} \{p\} \times T_p M. \quad (5.17)$$

*Kotangentialbündel:*

$$T^*M := \bigsqcup_{p \in M} T_p^* M, \quad (5.18)$$

wobei  $T_p^* M$  eine andere Schreibweise für  $(T_p M)^*$  ist.

*Natürliche Projektion:*

$$\pi(p, v) := p, \quad \pi: TM \rightarrow M. \quad (5.19)$$

Das Tangentialbündel einer glatten Mannigfaltigkeit ist eine glatte Mannigfaltigkeit.

#### 5.3.2.2 Christoffel-Symbole

Sei  $(M, g)$  eine pseudo-riemannsche Mannigfaltigkeit.

Es gilt:

$$\Gamma_{ab}^k = \frac{1}{2} g^{kc} (\partial_a g_{bc} + \partial_b g_{ac} - \partial_c g_{ab}), \quad (5.20)$$

$$\Gamma_{cab} = \frac{1}{2} (\partial_a g_{bc} + \partial_b g_{ac} - \partial_c g_{ab}), \quad (5.21)$$

$$\partial_a g_{bc} = \Gamma_{bac} + \Gamma_{cab}, \quad (5.22)$$

$$\Gamma_{ab}^k = \Gamma_{ba}^k. \quad (5.23)$$

# 6 Funktionentheorie

## 6.1 Holomorphe Funktionen

### Definition. Holomorphe Funktion.

Sei  $U \subseteq \mathbb{C}$  eine offene Menge und  $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ . Die Funktion  $f$  wird *holomorph* an der Stelle  $z_0 \in U$  genannt, wenn der Grenzwert

$$f'(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \quad (6.1)$$

existiert.

Das Argument und Bild von  $f$  werden nun in Real- und Imaginärteil zerlegt. Das sind die Zerlegungen  $z = x + yi$  und  $f(z) = u(x, y) + v(x, y)i$ . Die Funktion  $f(z)$  ist genau dann holomorph an der Stelle  $z_0 = x_0 + y_0i$ , wenn bei  $(x_0, y_0)$  die partiellen Ableitungen stetig sind und die *Cauchy-Riemann-Gleichungen*

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \text{bei } (x_0, y_0) \quad (6.2)$$

gelten. Bei

$$\underline{v} := (u, -v) = (v_x, v_y) = v_x e_x + v_y e_y \quad (6.3)$$

handelt es sich um ein Vektorfeld auf dem Koordinatenraum. Die Gleichungen (6.2) lassen sich nun als Quellenfreiheit

$$0 = \langle \nabla, \underline{v} \rangle = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} \quad (6.4)$$

und Rotationsfreiheit

$$0 = \nabla \wedge \underline{v} = \left( \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) e_x \wedge e_y \quad (6.5)$$

interpretieren.

Für totale Differential

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (6.6)$$

gibt es die Umformulierung

$$df = \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}. \quad (6.7)$$

Hierbei ist  $dz = dx + i dy$  und  $d\bar{z} = dx - i dy$ .

Die Ableitungsoperatoren

$$\frac{\partial f}{\partial z} := \frac{1}{2} \left( \frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad (6.8)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2} \left( \frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad (6.9)$$

mit  $\partial f = \partial u + i \partial v$  heißen *Wirtinger-Operatoren*.

Die Gleichungen (6.2) lassen sich nun zur Gleichung

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0 \quad (6.10)$$

zusammenfassen. Für holomorphe Funktionen reduziert sich das Differential (6.7) wegen (6.10) auf die Form

$$df = \frac{\partial f}{\partial z} dz. \quad (6.11)$$

## 6.2 Harmonische Funktionen

### Definition. Harmonische Funktion.

Sei  $U \subseteq \mathbb{R}^2$  eine offene Menge. Eine Funktion  $\Phi: U \rightarrow \mathbb{R}$  heißt *harmonisch* an der Stelle  $(x_0, y_0)$ , wenn die *Laplace-Gleichung*  $(\Delta \Phi)(x_0, y_0) = 0$  mit dem *Laplace-Operator*

$$\Delta \Phi := \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} \quad (6.12)$$

erfüllt ist.

Ist  $f = u + vi$  an der Stelle  $z_0$  holomorph, so sind der Realteil  $u$  und der Imaginärteil  $v$  an der Stelle  $(x_0, y_0) = (\operatorname{Re} z_0, \operatorname{Im} z_0)$  harmonisch. Das heißt es gilt

$$(\Delta u)(x_0, y_0) = 0, \quad (\Delta v)(x_0, y_0) = 0. \quad (6.13)$$

Ist eine Funktion  $u$  auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet harmonisch, so lässt sich stets eine harmonische Funktion  $v$  finden, so dass  $f = u + vi$  holomorph ist. Die Funktion  $v$  ist bis auf eine additive reelle Konstante  $c$  eindeutig bestimmt. Das heißt,  $v$  darf auch durch  $v + c$  ersetzt werden.

Die Funktion  $v$  wird die *harmonisch Konjugierte* zu  $u$  genannt. An jeder Stelle  $(x_0, y_0)$  treffen die Linien

$$\{(x, y) \mid u(x, y) = u(x_0, y_0)\}, \quad (6.14)$$

$$\{(x, y) \mid v(x, y) = v(x_0, y_0)\} \quad (6.15)$$

senkrecht aufeinander.

## 6.3 Wegintegrale

### Integral einer komplexwertigen Funktion.

Für  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  mit  $f = u + iv$  ist

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt, \quad (6.16)$$

wenn  $u$  und  $v$  integrierbar sind.

### Definition. Kurvenintegral.

Ist  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  ein differenzierbarer Weg (5.1), so wird

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \quad (6.17)$$

das *Kurvenintegral* über  $f$  entlang von  $\gamma$  genannt.

**Integralsatz von Cauchy.** Ist  $G$  ein einfach zusammenhängendes Gebiet und  $f: G \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph, so gilt für jeden Weg  $\gamma$  von  $\gamma(a)$  nach  $\gamma(b)$  die Formel

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)), \quad (6.18)$$

wobei die Funktion  $F$  nicht vom gewählten Weg abhängig ist. Außerdem ist  $F$  eine Stammfunktion zu  $f$ , das heißt es gilt  $F'(z) = f(z)$  für alle  $z \in G$ .

Sind die Voraussetzungen für den Integralsatz erfüllt, dann motiviert Wegunabhängigkeit die Definition

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z) dz := F(z_2) - F(z_1), \quad (6.19)$$

bei der auf Wege gänzlich verzichtet wird.

# 7 Dynamische Systeme

## 7.1 Grundbegriffe

### Definition. Dynamisches System.

Ein Tupel  $(T, M, \Phi)$  mit  $\Phi: T \times M \rightarrow M$  heißt *dynamisches System*, wenn für alle  $t_1, t_2 \in T$  und  $x \in M$  gilt:

$$\Phi(0, x) = x, \quad (7.1)$$

$$\Phi(t_2, \Phi(t_1, x)) = \Phi(t_1 + t_2, x). \quad (7.2)$$

Die Menge  $T$  heißt *Zeitraum*. Ein System mit  $T = \mathbb{N}_0$  oder  $T = \mathbb{Z}$  heißt *zeitdiskret*, eines mit  $T = \mathbb{R}_0^+$  oder  $T = \mathbb{R}$  heißt *zeitkontinuierlich*. Ein System mit  $T = \mathbb{Z}$  oder  $T = \mathbb{R}$  heißt *invertierbar*.

Die Menge  $M$  heißt *Zustandsraum*, ihre Elemente werden *Zustände* genannt.

Für ein invertierbares System handelt es sich bei  $\Phi$  um eine Gruppenaktion (s. 9.1.2) der additiven Gruppe  $(T, +)$ .

Die Menge

$$\Phi(T, x) := \{\Phi(t, x) \mid t \in T\} \quad (7.3)$$

heißt *Orbit* von  $x$ . S. a. (9.9).

## 7.2 Iterationen

### Definition. Iteration.

Für eine Selbstabbildung  $\varphi: M \rightarrow M$  lassen sich die *Iterationen* gemäß

$$\varphi^0 := \text{id}, \quad \varphi^n := \varphi^{n-1} \circ \varphi \quad (7.4)$$

formulieren. Mit  $\text{id}$  ist die identische Abbildung

$$\text{id}: M \rightarrow M, \quad \text{id}(x) := x \quad (7.5)$$

und mit  $g \circ f$  die Komposition (1.170) gemeint. Für ein bijektives  $\varphi$  wird zusätzlich

$$\varphi^{-n} := (\varphi^{-1})^n \quad (7.6)$$

definiert.

Die Iterationen bilden ein dynamisches System gemäß

$$\Phi(n, x) := \varphi^n(x), \quad \Phi: \mathbb{N}_0 \times M \rightarrow M. \quad (7.7)$$

Bei einem bijektiven  $\varphi$  lässt sich das System zum invertierbaren System

$$\Phi(n, x) := \varphi^n(x), \quad \Phi: \mathbb{Z} \times M \rightarrow M \quad (7.8)$$

erweitern.

### Definition. Kompositionsoperator.

Für eine Funktion  $\varphi: A \rightarrow A$  wird der Operator

$$C_\varphi(g) := g \circ \varphi, \quad C_\varphi: B^A \rightarrow B^A \quad (7.9)$$

*Kompositionsoperator* genannt.

Wenn  $B^A$  ein Funktionenraum ist, dann ist der Kompositionsoperator ein linearer Operator.

# 8 Kombinatorik

## 8.1 Kombinatorische Funktionen

### 8.1.1 Faktorielle

#### 8.1.1.1 Fakultät

**Definition. Fakultät.**

Für  $n \in \mathbb{Z}, n \geq 0$ :

$$n! := \prod_{k=1}^n k. \quad (8.1)$$

Rekursionsgleichung:

$$(n+1)! = n!(n+1) \quad (8.2)$$

Die Gammafunktion ist eine Verallgemeinerung der Fakultät:

$$n! = \Gamma(n+1). \quad (8.3)$$

#### 8.1.1.2 Fallende Faktorielle

**Definition. Fallende Faktorielle.**

Für  $a \in \mathbb{C}$  und  $k \geq 0$ :

$$a^{\underline{k}} := \prod_{j=0}^{k-1} (a-j). \quad (8.4)$$

Für  $a, k \in \mathbb{C}$ :

$$a^{\underline{k}} := \lim_{x \rightarrow a} \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x-k+1)}. \quad (8.5)$$

Für  $n \geq k$  und  $k \geq 0$  gilt:

$$n^{\underline{k}} = \frac{n!}{(n-k)!}. \quad (8.6)$$

#### 8.1.1.3 Steigende Faktorielle

**Definition. Steigende Faktorielle.**

Für  $a \in \mathbb{C}$  und  $k \geq 0$ :

$$a^{\bar{k}} := \prod_{j=0}^{k-1} (a+j). \quad (8.7)$$

Für  $a, k \in \mathbb{C}$ :

$$a^{\bar{k}} := \lim_{x \rightarrow a} \frac{\Gamma(x+k)}{\Gamma(x)}. \quad (8.8)$$

Für  $n \geq 1$  und  $n+k \geq 1$  gilt:

$$n^{\bar{k}} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!}. \quad (8.9)$$

## 8.1.2 Binomialkoeffizienten

**Definition. Binomialkoeffizient.**

Für  $a \in \mathbb{C}$  und  $k \in \mathbb{Z}$ :

$$\binom{a}{k} := \begin{cases} \frac{a^{\underline{k}}}{k!} & \text{wenn } k \geq 0, \\ 1 & \text{wenn } k = 0, \\ 0 & \text{wenn } k < 0. \end{cases} \quad (8.10)$$

Für  $a, b \in \mathbb{C}$ :

$$\binom{a}{b} := \lim_{x \rightarrow a} \lim_{y \rightarrow b} \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(y+1)\Gamma(x-y+1)}. \quad (8.11)$$

Für  $0 \leq k \leq n$  gilt die Symmetriebeziehung

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (8.12)$$

und die Rekursionsgleichung

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}. \quad (8.13)$$

Für  $a \in \mathbb{C}$  und  $k \in \mathbb{Z}$  gilt:

$$\binom{-a}{k} = (-1)^k \binom{a+k-1}{k}. \quad (8.14)$$

## 8.2 Differenzenrechnung

**Definition. Differenzoperator.**

*Vorwärtsdifferenz:*

$$(\Delta f)(x) := f(x+1) - f(x), \quad (8.15)$$

$$(\Delta_h f)(x) := f(x+h) - f(x). \quad (8.16)$$

*Rückwärtsdifferenz:*

$$(\nabla_h f)(x) := f(x) - f(x-h). \quad (8.17)$$

Für  $n \in \mathbb{N}_0$  und  $x \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\Delta(x^n) = nx^{n-1}. \quad (8.18)$$

Die Formel gilt auch für  $n \in \mathbb{C}$ , dann aber  $x \in \mathbb{C} \setminus \{k \in \mathbb{Z} \mid k < 0\}$ , da auf dem Streifen unter Umständen Polstellen sind.

Für  $n \in \mathbb{Z}, n \geq 0$  gilt:

$$\sum_{x=a}^{b-1} x^n = \frac{1}{n+1} [x^{n+1}]_{x=a}^{x=b}. \quad (8.19)$$

Die Formel gilt auch für  $a, b \geq 0$  und  $n \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$ .

Für  $a > 0$  und  $x \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\Delta(a^x) = (a-1)a^x. \quad (8.20)$$

## 8.3 Endliche Summen

Summe der Dreieckszahlen:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n}{2}(n+1), \quad (8.21)$$

$$\sum_{k=m}^n k = \frac{1}{2}(n-m+1)(n+m). \quad (8.22)$$

Partialsomme der geometrischen Reihe:

$$\sum_{k=m}^{n-1} q^k = \frac{q^n - q^m}{q-1}, \quad (q \neq 1) \quad (8.23)$$

$$\sum_{k=m}^{n-1} k^p q^k = \left(q \frac{d}{dq}\right)^p \frac{q^n - q^m}{q-1}. \quad (q \neq 1) \quad (8.24)$$



## 8.4 Formale Potenzreihen

### 8.4.1 Ring der formalen Potenzreihen

**Definition. Formale Potenzreihe.**

Ein Ausdruck der Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k := (a_k)_{k=0}^{\infty} = (a_0, a_1, a_2, \dots) \quad (8.25)$$

heißt *formale Potenzreihe*. Mit  $R[[X]]$  wird die Menge der formalen Potenzreihen in der Variablen  $X$  mit Koeffizienten  $a_k \in R$  bezeichnet, wobei  $R$  ein kommutativer Ring mit Einselement ist.

Die Menge  $R[[X]]$  bildet bezüglich der Addition

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k X^k := \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) X^k \quad (8.26)$$

und der Multiplikation

$$\left( \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i \right) \left( \sum_{j=0}^{\infty} b_j X^j \right) := \sum_{k=0}^{\infty} \left( \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) X^k \quad (8.27)$$

einen kommutativen Ring.

**Koeffizientenvergleich.** Weil formale Potenzreihen Folgen entsprechen, sind sie genau dann gleich, wenn sie komponentenweise gleich sind:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k X^k \iff \forall k (a_k = b_k). \quad (8.28)$$

**Division.** Eine formale Potenzreihe  $B$  besitzt höchstens eine Inverse  $B^{-1}$ , so dass  $BB^{-1} = 1$  gilt. Da der Ring kommutativ ist, darf die Division

$$\frac{A}{B} := AB^{-1} = B^{-1}A \quad (8.29)$$

definiert werden, falls  $B$  invertierbar ist.

### 8.4.2 Binomische Reihe

**Definition. Binomische Reihe.**

Für  $a \in \mathbb{C}$ :

$$(1 + X)^a := \sum_{k=0}^{\infty} \binom{a}{k} X^k \quad (8.30)$$

Es gilt:

$$(1 + X)^{a+b} = (1 + X)^a (1 + X)^b \quad (8.31)$$

und

$$(1 + X)^{ab} = ((1 + X)^a)^b. \quad (8.32)$$

# 9 Algebra

## 9.1 Gruppentheorie

### 9.1.1 Grundbegriffe

**Definition. Gruppenhomomorphismus.**

Sind  $(G, *)$  und  $(H, \bullet)$  zwei Gruppen, so heißt  $\varphi: G \rightarrow H$  *Gruppenhomomorphismus*, wenn

$$\forall g_1, g_2 \in G: \varphi(g_1 * g_2) = \varphi(g_1) \bullet \varphi(g_2) \quad (9.1)$$

gilt. Ein *Gruppenisomorphismus* ist ein bijektiver Gruppenhomomorphismus, da die Umkehrabbildung auch wieder ein Gruppenhomomorphismus ist.

**Definition. Direktes Produkt.**

*Direktes Produkt:*

$$G \times H := \{(g, h) \mid g \in G, h \in H\}, \quad (9.2)$$

$$(g_1, h_1) * (g_2, h_2) := (g_1 * g_2, h_1 * h_2). \quad (9.3)$$

**Satz von Lagrange.** Für Gruppen  $G, H$  gilt:

$$H \leq G \implies |G| = |G/H| \cdot |H|. \quad (9.4)$$

### 9.1.2 Gruppenaktionen

**Definition. Gruppenaktion.**

Eine Funktion  $f: G \times X \rightarrow X$  heißt *Gruppenaktion*, wenn

$$\forall g_1, g_2 \in G, x \in X: f(g_1, f(g_2, x)) = f(g_1 g_2, x), \quad (9.5)$$

$$\forall x \in X: f(e, x) = x \quad (9.6)$$

gilt, wobei mit  $e$  das neutrale Element von  $G$  gemeint ist. Anstelle von  $f(g, x)$  wird üblicherweise kurz  $gx$  (oder  $g + x$  bei einer Gruppe  $(G, +)$ ) geschrieben.

Anstelle von *Linksaktionen* kommen auch *Rechtsaktionen* vor, die sich von Linksaktionen in der Reihenfolge unterscheiden. Eine Rechtsaktion  $f: X \times G \rightarrow X$  genügt den Regeln

$$\forall g_1, g_2 \in G, x \in X: f(f(x, g_1), g_2) = f(x, g_1 g_2), \quad (9.7)$$

$$\forall x \in X: f(x, e) = x. \quad (9.8)$$

**Definition. Orbit, Stabilisator.**

Für ein  $x \in X$  wird

$$Gx := \{gx \mid g \in G\} \quad (9.9)$$

*Bahn* oder *Orbit* genannt. Die Menge

$$G_x := \{g \in G \mid gx = x\} \quad (9.10)$$

wird *Fixgruppe* oder *Stabilisator* genannt. Die Menge

$$X^g := \{x \in X \mid gx = x\} \quad (9.11)$$

heißt *Fixpunktmenge*.

Fixgruppen sind immer Untergruppen:

$$\forall x: G_x \leq G. \quad (9.12)$$

Bahnen sind Äquivalenzklassen, die Quotientenmenge

$$X/G := \{Gx \mid x \in X\} \quad (9.13)$$

wird *Bahnenraum* genannt.

**Bahnformel.** Ist  $G$  eine endliche Gruppe, so gilt:

$$|G| = |Gx| \cdot |G_x|. \quad (9.14)$$

**Lemma von Burnside.** Ist  $G$  eine endliche Gruppe, so

gilt:

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|. \quad (9.15)$$

## 9.2 Ringe

Ist  $(R, +, *)$  ein Ring, so gilt für alle  $a, b \in R$ :

$$0 * a = a * 0 = 0, \quad (9.16)$$

$$(-a) * b = a * (-b) = -(a * b), \quad (9.17)$$

$$(-a) * (-b) = -(a * b). \quad (9.18)$$

**Definition. Ringhomomorphismus.**

Sind  $(R, +, *)$  und  $(R', +', *')$  Ringe, so wird  $\varphi: R \rightarrow R'$  als *Ringhomomorphismus* bezeichnet, wenn

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) +' \varphi(b), \quad (9.19)$$

$$\varphi(a * b) = \varphi(a) *' \varphi(b), \quad (9.20)$$

für alle  $a, b \in R$  gilt und  $\varphi(1) = 1$  ist.

### 9.2.1 Polynome

Für zwei Polynome  $f, g \in R[X_1, \dots, X_n]$  gilt:

$$\deg(f + g) \leq \max(\deg f, \deg g), \quad (9.21)$$

$$\deg(fg) \leq (\deg f)(\deg g). \quad (9.22)$$

Für zwei Polynome  $f, g$  mit  $\deg f \neq \deg g$  gilt:

$$\deg(f + g) = \max(\deg f, \deg g). \quad (9.23)$$

Ist  $R$  ein Integritätsring, so gilt für  $f, g \in R[X_1, \dots, X_n]$ :

$$\deg(fg) = (\deg f)(\deg g). \quad (9.24)$$

Seien  $R, S$  kommutative unitäre Ringe, sei  $R \subseteq S$  und sei  $r \in S$ . Die Funktion  $\varphi_r: R[X] \rightarrow S$  mit

$$\varphi_r(\sum_{k=0}^n a_k X^k) := \sum_{k=0}^n a_k r^k \quad (9.25)$$

ist ein Ringhomomorphismus und wird *Einsetzungshomomorphismus* genannt. Für ein festes  $p \in R[X]$  wird die Funktion

$$f: S \rightarrow S, \quad f(r) := \varphi_r(p) \quad (9.26)$$

als *Polynomfunktion* bezeichnet. In einigen Ringen können unterschiedliche Polynome zur selben Polynomfunktion führen.

## 9.3 Körper

**Definition. Körperhomomorphismus.**

Sind  $(K, +, \bullet)$  und  $(K', +', \bullet')$  Körper, so wird  $\varphi: K \rightarrow K'$  als *Körperhomomorphismus* bezeichnet, wenn

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) +' \varphi(b), \quad (9.27)$$

$$\varphi(a \bullet b) = \varphi(a) \bullet' \varphi(b) \quad (9.28)$$

für alle  $a, b \in K$  gilt und  $\varphi(1) = 1$  ist.

# 10 Tabellen

## 10.1 Kombinatorik

### 10.1.1 Binomialkoeffizienten

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$	$k = 7$	$k = 8$	$k = 9$	$k = 10$
$n = 0$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$n = 1$	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$n = 2$	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
$n = 3$	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
$n = 4$	1	4	6	4	1	0	0	0	0	0	0
$n = 5$	1	5	10	10	5	1	0	0	0	0	0
$n = 6$	1	6	15	20	15	6	1	0	0	0	0
$n = 7$	1	7	21	35	35	21	7	1	0	0	0
$n = 8$	1	8	28	56	70	56	28	8	1	0	0
$n = 9$	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	0
$n = 10$	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1
$n = 11$	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11
$n = 12$	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220	66
$n = 13$	1	13	78	286	715	1287	1716	1716	1287	715	286
$n = 14$	1	14	91	364	1001	2002	3003	3432	3003	2002	1001
$n = 15$	1	15	105	455	1365	3003	5005	6435	6435	5005	3003
$n = 16$	1	16	120	560	1820	4368	8008	11440	12870	11440	8008
$n = 17$	1	17	136	680	2380	6188	12376	19448	24310	24310	19448
$n = 18$	1	18	153	816	3060	8568	18564	31824	43758	48620	43758
$n = 19$	1	19	171	969	3876	11628	27132	50388	75582	92378	92378

$$\binom{n}{k}$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$	$k = 7$	$k = 8$	$k = 9$
$n = -15$	1	-15	120	-680	3060	-11628	38760	-116280	319770	-817190
$n = -14$	1	-14	105	-560	2380	-8568	27132	-77520	203490	-497420
$n = -13$	1	-13	91	-455	1820	-6188	18564	-50388	125970	-293930
$n = -12$	1	-12	78	-364	1365	-4368	12376	-31824	75582	-167960
$n = -11$	1	-11	66	-286	1001	-3003	8008	-19448	43758	-92378
$n = -10$	1	-10	55	-220	715	-2002	5005	-11440	24310	-48620
$n = -9$	1	-9	45	-165	495	-1287	3003	-6435	12870	-24310
$n = -8$	1	-8	36	-120	330	-792	1716	-3432	6435	-11440
$n = -7$	1	-7	28	-84	210	-462	924	-1716	3003	-5005
$n = -6$	1	-6	21	-56	126	-252	462	-792	1287	-2002
$n = -5$	1	-5	15	-35	70	-126	210	-330	495	-715
$n = -4$	1	-4	10	-20	35	-56	84	-120	165	-220
$n = -3$	1	-3	6	-10	15	-21	28	-36	45	-55
$n = -2$	1	-2	3	-4	5	-6	7	-8	9	-10
$n = -1$	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1
$n = 0$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1},$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n)$$

### 10.1.2 Stirling-Zahlen erster Art

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$	$k = 7$	$k = 8$	$k = 9$
$n = 0$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$n = 1$	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
$n = 2$	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
$n = 3$	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0
$n = 4$	0	6	11	6	1	0	0	0	0	0
$n = 5$	0	24	50	35	10	1	0	0	0	0
$n = 6$	0	120	274	225	85	15	1	0	0	0
$n = 7$	0	720	1764	1624	735	175	21	1	0	0
$n = 8$	0	5040	13068	13132	6769	1960	322	28	1	0
$n = 9$	0	40320	109584	118124	67284	22449	4536	546	36	1
$n = 10$	0	362880	1026576	1172700	723680	269325	63273	9450	870	45
$n = 11$	0	3628800	10628640	12753576	8409500	3416930	902055	157773	18150	1320

### 10.1.3 Stirling-Zahlen zweiter Art

$$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$$

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$	$k = 7$	$k = 8$	$k = 9$
$n = 0$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$n = 1$	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
$n = 2$	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
$n = 3$	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0
$n = 4$	0	1	7	6	1	0	0	0	0	0
$n = 5$	0	1	15	25	10	1	0	0	0	0
$n = 6$	0	1	31	90	65	15	1	0	0	0
$n = 7$	0	1	63	301	350	140	21	1	0	0
$n = 8$	0	1	127	966	1701	1050	266	28	1	0
$n = 9$	0	1	255	3025	7770	6951	2646	462	36	1
$n = 10$	0	1	511	9330	34105	42525	22827	5880	750	45
$n = 11$	0	1	1023	28501	145750	246730	179487	63987	11880	1155

## 10.2 Zahlentheorie

### 10.2.1 Primzahlen

0	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	
2	179	419	661	947	1229	1523	1823	2131	2437	2749	3083	3433	3733	1
3	181	421	673	953	1231	1531	1831	2137	2441	2753	3089	3449	3739	2
5	191	431	677	967	1237	1543	1847	2141	2447	2767	3109	3457	3761	3
7	193	433	683	971	1249	1549	1861	2143	2459	2777	3119	3461	3767	4
11	197	439	691	977	1259	1553	1867	2153	2467	2789	3121	3463	3769	5
13	199	443	701	983	1277	1559	1871	2161	2473	2791	3137	3467	3779	6
17	211	449	709	991	1279	1567	1873	2179	2477	2797	3163	3469	3793	7
19	223	457	719	997	1283	1571	1877	2203	2503	2801	3167	3491	3797	8
23	227	461	727	1009	1289	1579	1879	2207	2521	2803	3169	3499	3803	9
29	229	463	733	1013	1291	1583	1889	2213	2531	2819	3181	3511	3821	10
31	233	467	739	1019	1297	1597	1901	2221	2539	2833	3187	3517	3823	11
37	239	479	743	1021	1301	1601	1907	2237	2543	2837	3191	3527	3833	12
41	241	487	751	1031	1303	1607	1913	2239	2549	2843	3203	3529	3847	13
43	251	491	757	1033	1307	1609	1931	2243	2551	2851	3209	3533	3851	14
47	257	499	761	1039	1319	1613	1933	2251	2557	2857	3217	3539	3853	15
53	263	503	769	1049	1321	1619	1949	2267	2579	2861	3221	3541	3863	16
59	269	509	773	1051	1327	1621	1951	2269	2591	2879	3229	3547	3877	17
61	271	521	787	1061	1361	1627	1973	2273	2593	2887	3251	3557	3881	18
67	277	523	797	1063	1367	1637	1979	2281	2609	2897	3253	3559	3889	19
71	281	541	809	1069	1373	1657	1987	2287	2617	2903	3257	3571	3907	20
73	283	547	811	1087	1381	1663	1993	2293	2621	2909	3259	3581	3911	21
79	293	557	821	1091	1399	1667	1997	2297	2633	2917	3271	3583	3917	22
83	307	563	823	1093	1409	1669	1999	2309	2647	2927	3299	3593	3919	23
89	311	569	827	1097	1423	1693	2003	2311	2657	2939	3301	3607	3923	24
97	313	571	829	1103	1427	1697	2011	2333	2659	2953	3307	3613	3929	25
101	317	577	839	1109	1429	1699	2017	2339	2663	2957	3313	3617	3931	26
103	331	587	853	1117	1433	1709	2027	2341	2671	2963	3319	3623	3943	27
107	337	593	857	1123	1439	1721	2029	2347	2677	2969	3323	3631	3947	28
109	347	599	859	1129	1447	1723	2039	2351	2683	2971	3329	3637	3967	29
113	349	601	863	1151	1451	1733	2053	2357	2687	2999	3331	3643	3989	30
127	353	607	877	1153	1453	1741	2063	2371	2689	3001	3343	3659	4001	31
131	359	613	881	1163	1459	1747	2069	2377	2693	3011	3347	3671	4003	32
137	367	617	883	1171	1471	1753	2081	2381	2699	3019	3359	3673	4007	33
139	373	619	887	1181	1481	1759	2083	2383	2707	3023	3361	3677	4013	34
149	379	631	907	1187	1483	1777	2087	2389	2711	3037	3371	3691	4019	35
151	383	641	911	1193	1487	1783	2089	2393	2713	3041	3373	3697	4021	36
157	389	643	919	1201	1489	1787	2099	2399	2719	3049	3389	3701	4027	37
163	397	647	929	1213	1493	1789	2111	2411	2729	3061	3391	3709	4049	38
167	401	653	937	1217	1499	1801	2113	2417	2731	3067	3407	3719	4051	39
173	409	659	941	1223	1511	1811	2129	2423	2741	3079	3413	3727	4057	40

# 11 Anhang

## 11.1 Griechisches Alphabet

A	$\alpha$	Alpha	N	$\nu$	Ny
B	$\beta$	Beta	$\Xi$	$\xi$	Xi
$\Gamma$	$\gamma$	Gamma	O	$o$	Omikron
$\Delta$	$\delta$	Delta	$\Pi$	$\pi$	Pi
E	$\varepsilon$	Epsilon	R	$\varrho$	Rho
Z	$\zeta$	Zeta	$\Sigma$	$\sigma$	Sigma
H	$\eta$	Eta	T	$\tau$	Tau
$\Theta$	$\theta$	Theta	Y	$\upsilon$	Ypsilon
I	$\iota$	Jota	$\Phi$	$\varphi$	Phi
K	$\kappa$	Kappa	X	$\chi$	Chi
$\Lambda$	$\lambda$	Lambda	$\Psi$	$\psi$	Psi
M	$\mu$	My	$\Omega$	$\omega$	Omega

## 11.2 Frakturbuchstaben

A a	$\mathfrak{A} \mathfrak{a}$	O o	$\mathfrak{O} \mathfrak{o}$
B b	$\mathfrak{B} \mathfrak{b}$	P p	$\mathfrak{P} \mathfrak{p}$
C c	$\mathfrak{C} \mathfrak{c}$	Q q	$\mathfrak{Q} \mathfrak{q}$
D d	$\mathfrak{D} \mathfrak{d}$	R r	$\mathfrak{R} \mathfrak{r}$
E e	$\mathfrak{E} \mathfrak{e}$	S s	$\mathfrak{S} \mathfrak{s}$
F f	$\mathfrak{F} \mathfrak{f}$	T t	$\mathfrak{T} \mathfrak{t}$
G g	$\mathfrak{G} \mathfrak{g}$	U u	$\mathfrak{U} \mathfrak{u}$
H h	$\mathfrak{H} \mathfrak{h}$	V v	$\mathfrak{V} \mathfrak{v}$
I i	$\mathfrak{I} \mathfrak{i}$	W w	$\mathfrak{W} \mathfrak{w}$
J j	$\mathfrak{J} \mathfrak{j}$	X x	$\mathfrak{X} \mathfrak{x}$
K k	$\mathfrak{K} \mathfrak{k}$	Y y	$\mathfrak{Y} \mathfrak{y}$
L l	$\mathfrak{L} \mathfrak{l}$	Z z	$\mathfrak{Z} \mathfrak{z}$
M m	$\mathfrak{M} \mathfrak{m}$		
N n	$\mathfrak{N} \mathfrak{n}$		

## 11.3 Mathematische Konstanten

- Kreiszahl  
 $\pi = 3,14159\ 26535\ 89793\ 23846\ 26433\ 83279 \dots$
- Eulersche Zahl  
 $e = 2,71828\ 18284\ 59045\ 23536\ 02874\ 71352 \dots$
- Euler-Mascheroni-Konstante  
 $\gamma = 0,57721\ 56649\ 01532\ 86060\ 65120\ 90082 \dots$
- Goldener Schnitt,  $(1 + \sqrt{5})/2$   
 $\varphi = 1,61803\ 39887\ 49894\ 84820\ 45868\ 34365 \dots$
1. Feigenbaum-Konstante  
 $\delta = 4,66920\ 16091\ 02990\ 67185\ 32038\ 20466 \dots$
2. Feigenbaum-Konstante  
 $\alpha = 2,50290\ 78750\ 95892\ 82228\ 39028\ 73218 \dots$

## 11.4 Physikalische Konstanten

- Lichtgeschwindigkeit im Vakuum  
 $c = 299\ 792\ 458\ \text{m/s}$
- Elektrische Feldkonstante  
 $\varepsilon_0 = 8,854\ 187\ 817\ 620\ 39 \times 10^{-12}\ \text{F/m}$
- Magnetische Feldkonstante  
 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{H/m}$
- Elementarladung  
 $e = 1,602\ 176\ 6208\ (98) \times 10^{-19}\ \text{C}$
- Gravitationskonstante  
 $G = 6,674\ 08\ (31) \times 10^{-11}\ \text{m}^3/(\text{kg s}^2)$
- Avogadro-Konstante  
 $N_A = 6,022\ 140\ 857\ (74) \times 10^{23}/\text{mol}$
- Boltzmann-Konstante  
 $k_B = 1,380\ 648\ 52\ (79) \times 10^{-23}\ \text{J/K}$
- Universelle Gaskonstante  
 $R = 8,314\ 4598\ (48)\ \text{J}/(\text{mol K})$
- Plancksches Wirkungsquantum  
 $h = 6,626\ 070\ 040\ (81) \times 10^{-34}\ \text{Js}$
- Reduziertes plancksches Wirkungsquantum  
 $\hbar = 1,054\ 571\ 800\ (13) \times 10^{-34}\ \text{Js}$
- Masse des Elektrons  
 $m_e = 9,109\ 383\ 56\ (11) \times 10^{-31}\ \text{kg}$
- Masse des Neutrons  
 $m_n = 1,674\ 927\ 471\ (21) \times 10^{-27}\ \text{kg}$
- Masse des Protons  
 $m_p = 1,672\ 621\ 898\ (21) \times 10^{-27}\ \text{kg}$

## 11.5 Einheiten

### 11.5.1 Vorsätze

Vorsatz	Faktor	Zahlwort
Exa E	$10^{18}$	Trillion
Peta P	$10^{15}$	Billiarde
Tera T	$10^{12}$	Billion
Giga G	$10^9$	Milliarde
Mega M	$10^6$	Million
Kilo k	$10^3$	Tausend
Hekto h	$10^2$	Hundert
Deka da	$10^1$	Zehn
Dezi d	$10^{-1}$	Zehntel
Zenti c	$10^{-2}$	Hunderstel
Milli m	$10^{-3}$	Tausenstel
Mikro $\mu$	$10^{-6}$	Millionstel
Nano n	$10^{-9}$	Milliardenstel
Pico p	$10^{-12}$	Billionstel
Femto f	$10^{-15}$	Billiardenstel
Atto a	$10^{-18}$	Trillionstel

#### Binärpräfixe

Vorsatz	Faktor
Yobi Yi	$2^{80}$
Zebi Zi	$2^{70}$
Exbi Ei	$2^{60}$
Pebi Pi	$2^{50}$
Tebi Ti	$2^{40}$
Gibi Gi	$2^{30}$
Mebi Mi	$2^{20}$
Kibi Ki	$2^{10}$

### 11.5.2 SI-System

Newton (Kraft):

$$N = \text{kg m/s}^2. \quad (11.1)$$

Watt (Leistung):

$$W = \text{kg m}^2/\text{s}^3 = \text{VA}. \quad (11.2)$$

Joule (Energie):

$$J = \text{kg m}^2/\text{s}^2 = \text{Nm} = \text{Ws} = \text{VAs}. \quad (11.3)$$

Pascal (Druck):

$$\text{Pa} = \text{N/m}^2 = 10^{-5} \text{ bar}. \quad (11.4)$$

Hertz (Frequenz):

$$\text{Hz} = 1/\text{s}. \quad (11.5)$$

Coulomb (Ladung):

$$C = \text{As}. \quad (11.6)$$

Volt (Spannung):

$$V = \text{kg m}^2/(\text{A s}^3) \quad (11.7)$$

Tesla (magnetische Flussdichte):

$$T = \text{N}/(\text{A m}) = \text{Vs/m}^2. \quad (11.8)$$

### 11.5.3 Nicht-SI-Einheiten

Einheit	Symbol	Umrechnung
<b>Zeit:</b>		
Minute	min	= 60 s
Stunde	h	= 60 min = 3600 s
Tag	d	= 24 h = 86 400 s
Jahr	a	= 356,25 d
<b>Druck:</b>		
bar	bar	= $10^5$ Pa
mmHg	mmHg	= 133,322 Pa
<b>Fläche:</b>		
Ar	a	= $100 \text{ m}^2$
Hektar	ha	= 100 a = $10\,000 \text{ m}^2$
<b>Masse:</b>		
Tonne	t	= 1000 kg
<b>Länge:</b>		
Liter	L	= $10^{-3} \text{ m}^3$

### 11.5.4 Britische Einheiten

Einheit	Abk.	Umrechnung
inch	in.	= 2,54 cm
foot	ft.	= 12 in. = 30,48 cm
yard	yd.	= 3 ft. = 91,44 cm
chain	ch.	= 22 yd. = 20,1168 m
furlong	fur.	= 10 ch. = 201,168 m
mile	mi.	= 1760 yd. = 1609,3440 m

## 11.6 Abkürzungsverzeichnis

### 11.6.1 Alphabetisches Verzeichnis

Abb.	Abbildung
abs	absolut
Aut	Automorphismus
AWP	Anfangswertproblem
Def.	Definition
det	Determinante
Dgl.	Differentialgleichung
dim	Dimension
DNF	disjunktive Normalform
FFT	fast fourier transform
Fkt.	Funktion
GDG	gewöhnliche Differentialgleichung
gcd	greatest common divisor
gdw.	genau dann, wenn
ggT	größter gemeinsamer Teiler
Gl.	Gleichung
glm.	gleichmäßig
grad	Gradient
hom	Homomorphismen
IA	Induktionsanfang
imp.	impliziert
IS	Induktionsschritt
IV	Induktionsvoraussetzung
kgV	kleinstes gemeinsames Vielfaches
KNF	konjunktive Normalform
lcm	least common multiple
LGS	lineares Gleichungssystem
lin.	linear
Ma.	Mathematik
ma.	mathematisch
max	Maximum
Mfkt.	Mannigfaltigkeit
min	Ninimum
NAND	not and
NOR	not or
NB	Nebenbedingung
NR	Nebenrechnung
o.B.d.A.	ohne Beschränkung der Allgemeinheit
ONB	Orthonormalbasis
ONS	Orthonormalsystem
Op.	Operator
PDG	partielle Differentialgleichung
pktw.	punktweise
q. e. d.	quot erat demonstrandum
S.	Seite
s.	siehe
s. a.	siehe auch
Ungl.	Ungleichung
VR	Vektorraum
w.z.b.w.	was zu beweisen war
XOR	exclusive or

### 11.6.2 Thematisches Verzeichnis

#### Allgemeine Abkürzungen

Def.	Definition
Subs.	Substitution
Abb.	Abbildung
Fkt.	Funktion
Trafo.	Transformation
Gl.	Gleichung
Ungl.	Ungleichung
NR	Nebenrechnung
imp.	impliziert
gdw.	genau dann, wenn
IA	Induktionsanfang
IS	Induktionsschritt
IV	Induktionsvoraussetzung
Ma.	Mathematik
ma.	mathematisch
Add.	Addition
Mul.	Multiplikation

#### Lineare Algebra

lin.	linear
LGS	lineares Gleichungssystem
VR	Vektorraum
dim	Dimension
hom	Homomorphismen
det	Determinante
ONS	Orthonormalsystem
ONB	Orthonormalbasis

#### Analysis

Fkt.	Funktion
lim	Limes
pktw.	punktweise
glm.	gleichmäßig
min	Minimum
max	Maximum
Mfkt.	Mannigfaltigkeit

#### Differentialgleichungen

Dgl.	Differentialgleichung
GDG	gewöhnliche Differentialgleichung
PDG	partielle Differentialgleichung
ODG	ordinary differential equation
PDG	partial differential equation
AWP	Anfangswertproblem
RWP	Randwertproblem
FEM	Finite Elemente Methode

#### Zahlentheorie

ggT	größter gemeinsamer Teiler
kgV	kleinstes gemeinsames Vielfaches
gcd	greatest common divisor
lcm	least common multiple
mod	modulo

#### Logik und Schaltalgebra

gdw.	genau dann, wenn
imp.	impliziert
NAND	not and
NOR	not or
XOR	exclusive or
KNF	konjunktive Normalform
DNF	disjunktive Normalform



# Index

- Ableitung, 18
- absolut konvergent, 18
- Additionstheoreme, 15
- allgemeine lineare Gruppe, 25
- Alternator, 26
- Aussagenlogik, 7
- äußere Algebra, 26
- Automorphismus
  - auf einem Vektorraum, 25
- Bahn, 34
- Bahnenraum, 34
- Bahnformel, 34
- Banachraum, 17
- Bestimmungsgleichung, 6
- Betrag
  - einer komplexen Zahl, 7
- bijektiv, 11
- Bild, 12
- Binomialkoeffizient, 32
  - Tabelle, 35
- binomische Formeln, 6
- binomischer Lehrsatz, 6
- boolesche Algebra, 7
- Cauchy Hauptwert, 20
- Cauchy-Folge, 17
- Cauchy-Produkt, 18
- charakteristisches Polynom, 26
- Christoffel-Symbole, 29
- Cosinus, 15
- Determinante, 25
- Differentialquotient, 18
- Differentialrechnung, 18
- differenzierbar, 18
- direktes Produkt, 34
- Disjunktion, 7
- dynamisches System, 31
- Ebene, 27
- Eigenraum, 26
- Eigenwert, 25
- Einschränkung, 11
- Einsetzungshomomorphismus, 34
- Endomorphismus
  - auf einem Vektorraum, 25
- erweiterte Koeffizientenmatrix, 26
- Euler-Lagrange-Gleichung, 21
- Faktorielle, 32
- Fakultät, 32
- Fixgruppe, 34
- Fourier-Koeffizient, 22
- Fourierreihe, 22
- Fundamentallemma, 21
- geometrische Vielfachheit, 26
- Gerade, 27
- Gleichungssystem, 6
- Gradient, 20
- Grenzwert, 17
- Gruppenaktion, 34
- Gruppenhomomorphismus, 34
- Häufungspunkt, 17
- Hauptsatz der Analysis, 19
- holomorph, 30
- injektiv, 11
- inverse Matrix, 25
- Isomorphismus
  - zwischen Gruppen, 34
- Iteration, 11
- Jacobi-Matrix, 21
- komplexe Zahl, 7
- Komposition, 11
- Kompositionsoperator, 31
- Konjugation
  - einer komplexen Zahl, 7
- Konjunktion, 7
- Kontraposition, 8
- Kontravalenz, 7
- konvergente Folge, 17
- Konvergenzkriterium, 18
- Kosekans, 15
- Kosinus, 15
- Kotangens, 15
- Kotangentialbündel, 29
- Kurve, 28
- Lemma von Burnside, 34
- lineares Gleichungssystem, 26
- Matrix, 25
  - quadratische, 25
- Matrizenring, 25
- natürliche Projektion, 29
- Nonterminalsymbol, 13
- Norm, 23
- Orbit
  - unter einem dynamischen System, 31
  - unter einer Gruppenaktion, 34
- Orthogonal, 23
- Orthogonalbasis, 23
- Orthogonalsystem, 23
- Orthonormalbasis, 23
- Orthonormalsystem, 23
- Parameterdarstellung
  - einer Ebene, 27
  - einer Geraden, 27
- Partialsumme, 17
- partielle Ableitung, 20
- Polarkoordinaten, 28
- Primzahlen
  - Tabelle, 37
- principal value, 20
- Produktionsregel, 13
- Punktrichtungsform, 27

- quadratische Matrix, 25
- Quotientenkriterium, 18
  
- reelle Funktion, 18
- Regelfunktion, 19
- Reihe, 17
- Ring, 34
  - Matrizenring, 25
  
- Sekans, 15
- Sinus, 15
- Skalarfeld
  - auf dem Koordinatenraum, 20
- Skalarprodukt, 23
- Spektrum, 26
- Stabilisator, 34
- Startsymbol, 13
- Stirling-Zahlen
  - Tabelle, 36
- Streichungsmatrix, 25
- surjektiv, 11
- symmetrische Bilinearform, 25
- symmetrische Matrix, 25
  
- Tangens, 15
- Tangentialbündel, 29
- Teleskopsumme, 18
- Terminalsymbol, 13
- Treppenfunktion, 19
  
- Umgebung, 17
- Umkehrfunktion, 11
- unbedingt konvergent, 18
- Urbild, 12
  
- Variationsrechnung, 21
- Vektorfeld
  - auf dem Koordinatenraum, 21
- vollständig, 17
  
- Weg, 28
- Widerspruch, 8
- Winkelfunktion, 15
  
- Zustand, 31
- Zustandsraum, 31
- Zwischenwertsatz, 18