

## Integral (Aufleitung)

### unbestimmtes Integral:

$F(x) \rightarrow$  Stammfunktion wenn  $F'(x) = f(x)$

Versch. Stammfunktionen können selbe Funktion haben:

$$f(x) = 3x + 2 \rightarrow F(x) = \frac{3}{2}x^2 + 2x + c \rightarrow \text{y-Offset}$$

$$\int f(x) dx = F(x) \quad dx \rightarrow \text{nach x Variabel}$$

### bestimmtes Integral:

DEF: Fläche unter Kurve

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

**Erster Hauptsatz der Integralrechnung:**  $\rightarrow$  Variabel Obergrenze

$f(x) \rightarrow [a, b] \rightarrow F_a(x)$  von  $f(x)$  differenzierbar

$$F'_a(x) = \frac{d}{dx} \left( \int_a^x f(t) dt \right) = f(x)$$

**Zweiter Hauptsatz der Integralrechnung:**  $\rightarrow$  Fläche

$f(x) \rightarrow [a, b] \rightarrow F(x)$  Stammfunktion

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

## Rechenregeln

unbestimmtes Integral:

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c$$

$$\int \lambda_1 \cdot f(x) + \lambda_2 \cdot g(x) dx = \lambda_1 F(x) + \lambda_2 G(x) + C$$

$$\int f(k \cdot x) dx = \frac{1}{k} \cdot F(k \cdot x) + C \rightarrow k \text{ Stauchung}$$

### Integrationsregeln:

$$\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C$$

Potenzregeln

$$\int \frac{1}{x} dx = 1 \cdot \ln(|x|) + C$$

$$\int \frac{1}{x+a} dx = \ln(|x+a|) + c$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

Exponential, Logarithmus

$$\int a_1 e^{bx} dx = a_2 e^{bx} + C$$

$\rightarrow (a_2 = a_1 \cdot \frac{1}{b})$

$$\int \ln(x) dx = x \cdot \ln(x) - x + C$$

$$\int \log_a(x) dx = \frac{x \cdot \ln(x) - x}{\ln(a)} + C$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

Trigonometrische Funktionen

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int \tan(x) dx = -\ln(|\cos(x)|) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C$$

Elementare Funktionen

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin(x) + C$$

$$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos(x) + C$$

## Spezielle Integrale

$$\int \cos(x) \cdot \cos(x) dx = \frac{1}{2} \cdot (\cos(x) \cdot \sin(x) + x) + c$$

### Substitution/Partielle Integration

Wenn nicht  $f(x)$  in folgendem Format:

$f(x)$	$F(x)$
$X^n, n \neq -1$	$\frac{1}{n+1} X^{n+1}$
$X^{-1} = \frac{1}{X}$	$\ln X $
$e^x, a^x$	$e^x, \frac{1}{\ln(a)} \cdot a^x$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x)$
$\frac{1}{1+X^2}$	$\arctan(x)$

## Integral Rechnungen

$$\int_a^b \sqrt{x} dx = \int_a^b x^{\frac{1}{2}} dx = \left[ \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_a^b = F_b - F_a$$


Rechenregeln:

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$\int_0^0 f(x) dx = 0$$

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$


Negative Flächen:



$$A = \left| \int_a^{x_1} f(x) dx \right| + \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| + \dots$$

## Integral berechnen zwischen zwei Funktionen

Zwischen zwei Funktionen interhalb Intervall:



$$f(x) = x - x^3 \quad g(x) = x^3 \quad I = [-1, 1]$$

Schnittpunkte von  $f(x)$  und  $g(x)$ :

$$f(x) - g(x) = x - 2x^3 \rightarrow 0 = x - 2x^3 = x \cdot (1 - 2x^2)$$

$$\rightarrow x_1 = 0, \quad x_{2,3} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Fläche:

$$A = \left| \int_{-1}^{-\frac{1}{\sqrt{2}}} x - 2x^3 dx \right| + \left| \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^0 x - 2x^3 dx \right| + \dots$$