

## CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA VACUNACIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO:

### Lineamientos de Vacunación contra el virus del Papiloma Humano (VPH).

- La vacuna contra el virus del VHP cumple los lineamientos de la OMS.
- La vacuna contra el virus del VPH tiene autorización de uso en los niños/as de 9 años de edad.
- La población objeto serán los niños y niñas desde los 9 años hasta los 9 años 11 meses y 29 días.
- La vacuna contra el virus del VPH se encuentra dentro del esquema regular de vacunación.

### Ventajas de la vacunación contra el VPH.

- Las vacunas reducen el riesgo de que una persona se infecte por el virus del VPH tipos 6,11,16 y 18. Los tipos de VPH 16 y 18 puede provocar cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de la boca, cáncer de oro faringe entre otros.
- La inmunización que proporcionará la vacunación de toda a gran parte de la población pueda reducirse de forma notable y duradera la transmisión del virus del VPH.
- La OMS, acreditan la seguridad y la efectividad de la vacuna contra el VPH.

### Reacciones adversas de la vacuna VPH.

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden producir reacciones adversas. La mayoría son leves y de breve duración y no siempre aparecen.

Tabla No. 1. Reacciones adversas vacuna contra el virus VPH

Eventos adversos sistémicos y del sitio de la inyección relacionados con a la vacuna
Evento adverso 1 a 5 días posvacunación
Dolor en sitio de la punción 61%
Hinchazón 24 %
Eritema 24%
Picazón 2%
Evento adverso 1 a 15 días posvacunación
Fiebre 10%

Fuente: Gardasil MSD (1)

Elaborado por: Dirección Nacional de Inmunizaciones.

Una vez que he entendido claramente el procedimiento de vacunación y las posibles consecuencias de la NO ADMINISTRACIÓN de la vacuna, en ejercicio de la autonomía de manera libre y voluntaria **ACEPTO** recibir la vacuna contra el VPH.

Padre

Madre

Tutor Legal