

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Jona Koltaj

# **ELIMINACIJA REZOV V LINEARNI LOGIKI**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: prof. dr. Andrej Bauer

Ljubljana, 2025



# Kazalo

<b>1</b>	<b>Uvod</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Sekventni račun</b>	<b>1</b>
2.1	Sekvent in formula . . . . .	2
2.2	Pravila sekventnega računa . . . . .	3
2.2.1	Pravilo aksioma . . . . .	3
2.2.2	Logična pravila . . . . .	3
2.2.3	Strukturna pravila . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Linearna logika</b>	<b>5</b>
3.1	Izjavni vezniki . . . . .	6
3.2	Izjavne konstante . . . . .	7
3.3	Kvantifikatorja . . . . .	8
3.4	EkspONENTA . . . . .	9
3.5	Nekaj opomb o zapisu . . . . .	9
3.5.1	Poimenovanje veznikov . . . . .	10
3.5.2	Intuicionistična linearna logika . . . . .	10
<b>4</b>	<b>Izrek o eliminaciji rezov</b>	<b>11</b>
4.1	Potrebne definicije . . . . .	11
4.2	Dokaz izreka o eliminaciji rezov . . . . .	13
4.2.1	Eliminacija glavnega reza . . . . .	14
4.2.2	Glavni rez eksponentov ter posplošeno pravilo reza . . . . .	16
4.2.3	Eliminacija reza, ki ni glaven . . . . .	20
4.2.4	Eliminacija posplošenega reza, ki ni glaven . . . . .	24
4.2.5	Baza indukcije . . . . .	26



## Eliminacija rezov v linearni logiki

### POVZETEK

Vpeljemo sekventni račun, njegova strukturna pravila ter pravili vpeljave za veznik  $\wedge$ , nato pa se omejimo na linearno logiko ter veznik  $\wedge$  razdelimo na dva. Vpeljemo še vse ostale veznike v linearni logiki ter razložimo njihov pomen, nato vpeljemo pravilo reza. Formuliramo izrek o eliminaciji reza ter ga dokažemo z dvojno strukturno indukcijo, zunanjo na strukturi drevesa izpeljave, notranjo na strukturi rezane formule. Definiramo glavni rez in ga eliminiramo za vsak veznik posebej, pri eksponentih pa definiramo in nato eliminiramo še posplošeni rez. Rez (in posplošeni rez) eliminiramo tudi, ko ni glaven, nato pa opravimo še korak baze indukcije. Po končanem dokazu izreka dokažemo še Grishinovo vložitev nelinearnega sekventnega računa v linearni sekventni račun.

## Cut elimination in linear logic

### ABSTRACT

We introduce sequent calculus, its structural rules and the introduction rules for the logical connective  $\wedge$ . We then limit the sequent calculus to linear logic nad split  $\wedge$  into two connectives. We further introduce all other connectives in linear logic and explain their interpretations, then we introduce the cut rule. We formulate the cut elimination theorem and prove it with double structural induction, the outer induction on the structure of the proof tree and the inner induction on the structure of the cut formula. We define the principal cut and eliminate it for each connective separately. We define and eliminate the generalised cut rule for the exponentials. We eliminate the cut rule (and the generalised cut rule) when it is not principal as well and then proceed to the induction base. After the proof of the cut elimination theorem we also prove the Grishin embedding of the non-linear sequent calculus into the linear one.

**Math. Subj. Class. (2020):** 03B47,03F05

**Ključne besede:** sekventni račun, linearna logika, eliminacija rezov, Grishinova vložitev

**Keywords:** sequent calculus, linear logic, cut elimination, Grishin embedding



# 1 Uvod

Ko preučujemo trditve in izreke, nas velikokrat bolj od izrekov samih zanimajo njihovi dokazi, saj ti držijo bistvo izreka samega. Ker bi torej želeli bolj preučiti strukturo teh dokazov, bi pomagalo, če bi lahko kako formalizirali to dokazovanje. Tu nastopijo formalni sistemi dokazovanja, ki – kot pove že ime – formalizirajo dokaze. Takih sistemov je več, najbolj poznani izmed njih pa so Hilbertov sistem, naravna dedukcija ter sekventni račun. Prvi Hilbertov sistem dokazovanja je bil predstavljen v letu 1879 s strani Gottloba Frege, nemškega filozofa in matematika. V tem sistemu je vsak korak dokaza ali aksiom, ali pa je dobljen iz aksioma z enim izmed dveh pravil sklepanja. Karakteriziran je tudi s tem, da uporablja le dva veznika, namreč implikacijo in negacijo, kar ga sicer naredi minimalističnega in neodvečnega, a je velikokrat bistvo dokaza težko izluščiti. Sekventni račun in naravna dedukcija pa sta bila vpeljana v istem članku, leta 1934, ki ga je objavil nemški matematik Gerhard Gentzen. Te dva sistema vključujeta več veznikov in tudi več pravil sklepanja. Sekventni račun temelji na levih in desnih pravilih vpeljave veznikov, naravna dedukcija pa ima pravila vpeljave ter pravila eliminacije. Oba sistema sta torej veliko manj minimalistična od Hilbertovega sistema, a sta v nekaterih pogledih bolj berljiva. V tem delu bomo preučevali sekventni račun, ki ga bomo bolj natančno vpeljali v poglavju 2.

V članku, kjer sta bila sekventni račun in naravna dedukcija vpeljana, je poleg tega Gentzen dokazal enega izmed pomembnejših izrekov, kar se tiče sistemov dokazovanja, namreč izrek o eliminaciji rezov. Ta sistemu dokazovanja na formalen način zagotavlja konsistentnost. V poglavju 4 bomo tudi mi ta izrek formulirali ter dokazali, le da bomo to naredili za podzvrst sekventnega računa, imenovano linearna logika. Slednjo je prvič v članku iz leta 1987 opisal Jean-Yves Girard, francoski matematik, ki je ugotovil, da z omejitvijo določenih strukturnih pravil v formalnem sistemu dokazovanja lahko bolj natančno preučujemo *koliko* predpostavk smo porabili v dokazu. Linearno logiko je možno obravnavati tako v naravni dedukciji kot sekventnem računu, a se bomo v tem delu omejili na sekventni račun.

Glavna motivacija za linearno logiko je zavedanje, koliko „surovin“ smo porabili in pridelali, torej kolikokrat smo tekom dokaza predpostavko uporabili, katere predpostavke smo zavrgli ter katere sklepe smo dokazali večkrat. Omejitev podvajanja in odvečnih predpostavk pomembno vpliva tudi na veznike, ki jih uporabljamo. Več o tem bomo povedali v poglavju 3. Želimo pa tudi vedeti, kako linearna logika modelira nelinearno logiko in kako se ti dve primerjata med seboj, kar pa bomo nazadnje obravnavali v poglavju ??.

## 2 Sekventni račun

Sekventni račun je formalni sistem dokazovanja, ki sestoji iz t. i. sekventov in vnaprej določenih pravil, kako jih smemo preoblikovati. Vsak korak dokaza torej uporabi enega izmed teh pravil, dokler začetnega sekventa ali sekventov ne preoblikujemo v tistega, ki smo ga želeli dokazati.

Korake ločimo s horizontalno črto, nad katero so vsi sekventi, ki jih pravilo uporabljeno na tem koraku sprejme, velikokrat pomimeno *hipoteze*, pod njo

pa je novo dobljeni sekvent, navadno imenovan *zaključek*. Označimo hipoteze s  $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ , zaključek pa s  $\mathcal{Z}$ . Korak izpeljave bo torej izgledal takole:

$$\frac{\mathcal{H}_0 \quad \mathcal{H}_1 \quad \dots \quad \mathcal{H}_n}{\mathcal{Z}} \text{ Pravilo}$$

Na desni ponavadi označimo, katero pravilo smo uporabili na tem koraku, zavoljo preglednosti.

## 2.1 Sekvent in formula

Sekvent sestoji iz *logičnih formul*, ki jih je torej potrebno definirati preden lahko definiramo sekvent. Definicija je induktivna, kar pomeni, da se formule gradijo iz podformul, te iz svojih podformul in tako dalje, na dnu pa so t. i. osnovne formule. Te pa so zgrajene iz termov, ki so prav tako induktivno definirani.

**Definicija 2.1.** *Term* je izraz, ki je lahko oblike:

- spremenljivka,
- konstanta,
- $f(t_1, \dots, t_n)$ , kjer je  $t_i$  term za vsak  $i \in [n]$  in je  $f$  nek funkcijski simbol, ki sprejme  $n \in \mathbb{N}$  termov.

**Primer 2.2.** Na voljo imamo denimo naravna števila, na katerih je definiran funkcijski simbol  $+$ , ki sprejme dva terma. Možni termi, ki jih lahko tvorimo, so torej lahko npr. spremenljivka  $x$ , konstanta 3 ali pa izraz  $x + 3$ .

**Definicija 2.3.** *Formula* je izraz oblike:

- *osnovna formula*;  $R(t_1, \dots, t_n)$ , kjer je  $t_i$  term za vsak  $i \in [n]$  in je  $R$  nek *relacijski simbol*, ki sprejme  $n \in \mathbb{N}$  termov,
- *sestavljena formula*, ki je – kot pove ime – sestavljena iz ene ali več podformul, med seboj povezanih z veznikom ali kvantifikatorjem.

**Primer 2.4.** Imamo denimo terma  $t_1$  in  $t_2$  in relacijski simbol  $\geq$ , ki sprejme dva terma. Tvorimo torej lahko osnovno formulo  $t_1 \geq t_2$ .

**Primer 2.5.** Če imamo formuli  $A$  in  $B$ , so npr.  $A \wedge B$ ,  $\neg A$ ,  $A \vee B$  ali  $\forall x A$ , kjer je  $x$  neka prosta spremenljivka v  $A$ , tudi formule.

Katere sestavljene formule lahko tvorimo je odvisno od tega, s kakšnimi vezniki želimo delati. Če na primer nimamo veznika  $\wedge$ ,  $A \wedge B$  ne more biti formula. Specifične veznike, ki jih bomo uporabljali pri linearni logiki, bomo natančneje definirali v poglavju 3.

**Definicija 2.6.** Naj bodo  $A_0, \dots, A_n$  ter  $B_0, \dots, B_m$  neke logične formule. *Sekvent* je izraz oblike  $A_0, \dots, A_n \Rightarrow B_0, \dots, B_m$ .



Formulam na levi strani sekventa navadno pravimo *predpostavke*, formulam na desni pa *sklepi*, obojemu pa lahko rečemo tudi *kontekst*. Predpostavke navadno označujemo z  $\Gamma$ , sklepe pa z  $\Delta$ , kjer tako  $\Gamma$  kot  $\Delta$  predstavljata *multimnožici* logičnih formul.

**Definicija 2.7.** *Multimnožica* je funkcija  $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ , ki vsakemu elementu iz končne množice  $A$  priredi naravno število. Drugače povedano je to množica, kjer se elementi lahko ponavljajo.

Pomembno je omeniti še, da simbol  $\Rightarrow$  v sekventu ne predstavlja običajne implikacije in ga raje beremo kot „dokaže”. Vejice na levi strani sekventa se bere kot „in”, vejice na desni strani pa kot „ali”. Sekvent  $A, B \Rightarrow C, D$  bi se torej razumel kot „predpostavki  $A$  in  $B$  dokažeta sklep  $C$  ali sklep  $D$ ”.

## 2.2 Pravila sekventnega računa

Pravila sekventnega računa delimo na *pravilo aksioma*, *logična pravila*, ki nam povedo kako z različnimi vezniki tvorimo nove formule in pa *strukturna pravila*, ki nam povedo kako ravnati s poljubnimi multimnožicami formul.

### 2.2.1 Pravilo aksioma

**Definicija 2.8.** *Aksiom* je vsak sekvent oblike  $A \Rightarrow A$ , *pravilo aksioma*, krajše  $Ax$ , pa pravi:

$$\frac{}{A \Rightarrow A} Ax$$

Aksiom lahko interpretiramo kot „formula dokaže samo sebe”, kar pa seveda vedno velja. Zato pravilo aksioma pove, da lahko take vrste sekvent vedno tvorimo t. j. da zanj ne potrebujemo predhodnih sekventov.

### 2.2.2 Logična pravila

Logična pravila praviloma sestojijo iz *levega pravila* in *desnega pravila*. Prvo nam pove kako veznik uporabiti med predpostavkami, drugo pa kako dani veznik dokazati. Oglejmo si kot primer logični pravili za veznik  $\wedge$ .

**Definicija 2.9.** *Levo pravilo za veznik  $\wedge$* , krajše  $L\wedge$ :

$$\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \wedge B \Rightarrow \Delta} L\wedge \quad \text{in} \quad \frac{\Gamma, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \wedge B \Rightarrow \Delta} L\wedge$$

To pomeni da če znamo nekaj dokazati iz formule  $A$ , znamo isto dokazati iz  $A \wedge B$  za poljubno formulo  $B$ . Ker je veznik  $\wedge$  simetričen, je tudi to pravilo simetrično.

**Definicija 2.10.** *Desno pravilo za veznik  $\wedge$* , krajše  $R\wedge$ :

$$\frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma \Rightarrow B, \Delta}{\Gamma \Rightarrow A \wedge B, \Delta} R\wedge$$

To pa pomeni da če znamo iz nekih predpostavk dobiti formulo  $A$  in iz istih predpostavk dobiti formulo  $B$ , znamo iz teh predpostavk dobiti tudi formulo  $A \wedge B$ .

### 2.2.3 Strukturna pravila

Običajno je sekventni račun opremljen z dvema strukturnima praviloma.

**Definicija 2.11.** *Ošibitev*, krajše  $W$ , nam pove, da lahko tako predpostavke kot sklepe „ošibimo“ z dodatno formulo:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \Rightarrow \Delta} W \quad \text{in} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A} W$$

Levo pravilo pomeni, da smemo med predpostavke dodati odvečne formule, ki jih nikjer ne uporabimo. Ker na desni vejice beremo kot „ali“, je dovolj da dokažemo vsaj enega izmed sklepov, ne pa nujno vse. To pa je ravno bistvo desnega pravila, saj če smo namreč iz  $\Gamma$  že dokazali  $\Delta$ , znamo seveda dokazati tudi  $\Delta$  ali  $A$ .

**Definicija 2.12.** *Skrčitev*, krajše  $C$ , nam pove, da število ponovitev formule tako med predpostavkami kot sklepi ni pomembno:

$$\frac{\Gamma, A, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \Rightarrow \Delta} C \quad \text{in} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A} C$$

Če torej znamo dokazati  $\Delta$  iz dveh ponovitev formule  $A$ , znamo isto dokazati iz le ene kopije. Prav tako nam je vseeno koliko kopij formule imamo na desni, saj je potrebno dokazati le eno izmed njih.

**Opomba 2.13.** Kot smo omenili, predstavljata  $\Gamma$  in  $\Delta$  multimnožici formul. Če bili to raje množici, pravila skrčitve ne bi potrebovali, saj bi sledilo že iz same strukture sekventa. Vendar nam bo število predpostavk in sklepov v nadaljnjih poglavjih pomembno, zato  $\Gamma$  in  $\Delta$  ostaneta multimnožici.

Preden preidemo specifično na linearno logiko je potrebno še omeniti, da pri sekventnem računu dokazujemo „od spodaj navzgor“. Začnemo torej s sekventom, ki bi ga želeli dokazati in poiščemo katera pravila, strukturna ali logična, so nam na voljo. Analogija pri dokazovanju v vsakdanji matematiki je, da začnemo s problemom, ki ga želimo dokazati, in ga razčlenimo na manjše podprobleme, dokler ne dobimo nečesa, kar lahko zagotovo dokažemo. Podobno pri sekventnem računu sekvente postopoma prevajamo na aksiome.

Tudi pravila si zato lahko interpretiramo drugače. Pravilo  $L\wedge$  iz definicije 2.9 lahko sedaj razumemo kot; če želimo iz  $A \wedge B$  dokazati neke sklepe  $\Delta$  je dovolj da  $\Delta$  dokažemo že iz ene izmed formul  $A$  ter  $B$ . Pravilo  $R\wedge$  iz definicije 2.10 pa sedaj pravi; če želimo iz predpostavk  $\Gamma$  dokazati  $A \wedge B$ , je dovolj da iz  $\Gamma$  dokažemo  $A$  ter da iz  $\Gamma$  dokažemo  $B$ .

Za enostaven primer dokaza v sekventnem računu si oglejmo malodane trivialen dokaz komutativnosti veznika  $\wedge$ .

$$\frac{\frac{\overline{B \Rightarrow B}^{Ax}}{A \wedge B \Rightarrow B}^{L\wedge} \quad \frac{\overline{A \Rightarrow A}^{Ax}}{A \wedge B \Rightarrow A}^{L\wedge}}{A \wedge B \Rightarrow B \wedge A}^{R\wedge}$$

V besedah lahko ta dokaz razumemo sledeče. Želimo izpeljati, da  $A \wedge B$  dokaže  $B \wedge A$ . Dovolj je, da pokažemo, da  $A \wedge B$  dokaže  $A$  ter da  $A \wedge B$  dokaže  $B$ , po desnem pravilu za  $\wedge$ . Na levi je potem dovolj pokazati, da že  $B$  dokaže  $B$ , po levem pravilu za  $\wedge$ , kar pa je ravno aksiom, torej velja. Na desni se zgodi podobno.

Od tu dalje bomo vsa pravila in dokaze brali od spodaj navzgor.

### 3 Linearna logika

Linearna logika je različica logike sekventnega računa, kjer zavržemo pravili ošibitve in skrčitve iz definicij 2.11 in 2.12. To pomeni, da moramo vsako predpostavko uporabiti in vsak sklep dokazati natanko enkrat.

To dejstvo znatno vpliva tudi na same veznike. Za primer si oglejmo še eno možno definicijo veznika  $\wedge$ , poleg 2.9 ter 2.10, označimo ga v tem primeru z  $\wedge'$ .

**Definicija 3.1.** *Levo pravilo za veznik  $\wedge'$ , krajše  $L\wedge'$ , enostavno prevede vejico na levi v konjunkcijo:*

$$\frac{\Gamma, A, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \wedge' B \Rightarrow \Delta} L\wedge'$$

**Definicija 3.2.** *Desno pravilo za veznik  $\wedge'$ , krajše  $R\wedge'$ :*

$$\frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow B, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A \wedge' B, \Delta, \Delta'} R\wedge'$$

To pravilo pove, da če želimo  $A \wedge' B$  dokazati, lahko predpostavke ločimo na dva dela ter z enim delom dokažemo  $A$ , z drugim pa  $B$ . Obratno gledano, če znamo iz  $\Gamma$  dokazati  $A$  ter iz  $\Gamma'$  dokazati  $B$ , lahko predpostavke združimo in dokažemo  $A \wedge' B$ .

**Lema 3.3.** *Če dopustimo uporabo ošibitve in skrčitve, sta levi in desni pravili za  $\wedge$  ter  $\wedge'$  medsebojno izpeljivi.*

*Dokaz.* Začnimo z dokazom medsebojne izpeljivosti levih pravil za veznika  $\wedge$  iz definicije 2.9 ter  $\wedge'$  iz definicije 3.1. To pomeni, da lahko s pomočjo  $L\wedge$  dokažemo  $L\wedge'$  in obratno.

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma, A, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \wedge B, B \Rightarrow \Delta} L\wedge}{\Gamma, A \wedge B, A \wedge B \Rightarrow \Delta} L\wedge}{\Gamma, A \wedge B \Rightarrow \Delta} C$$

Najprej torej predpostavko  $A \wedge B$  „podvojimo”, s pomočjo skrčitve, nato pa dvakrat uporabimo  $L\wedge$ , vsakič ne eni izmed podvojenih predpostavk. Obratna izpeljava pa poteka tako, da najprej uporabimo  $L\wedge'$ , nato pa odvečno izmed predpostavk odstranimo s pomočjo ošibitve.

$$\frac{\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A, B \Rightarrow \Delta} W}{\Gamma, A \wedge' B \Rightarrow \Delta} L\wedge'$$

Podobno dokažemo medsebojno izpeljivost  $R\wedge$  iz definicije 2.10 ter  $R\wedge'$  iz definicije 3.2.

$$W \times |\Gamma' \cup \Delta'| \frac{\frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A, \Delta, \Delta'} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow B, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow B, \Delta, \Delta'}}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A \wedge B, \Delta, \Delta'} R\wedge W \times |\Gamma \cup \Delta|$$

Najprej torej uporabimo  $R\wedge$ , kar pomeni da predpostavk (in sklepov) ne razdelimo, zato se s pomočjo ošibitve na levi „znebimo” predpostavk  $\Gamma'$  in sklepov  $\Delta'$ . To naredimo tako, da ošibitev iteriramo tolikokrat, kolikor je velikost multimnožice  $\Gamma' \cup \Delta'$ . Enako naredimo z odvečnimi  $\Gamma$  ter  $\Delta$  na desni. Ko pa iz  $R\wedge'$  izpeljujemo  $R\wedge$ , najprej „podvojimo” vse predpostavke v  $\Gamma$  in vse sklepe v  $\Delta$ , nato pa uporabimo  $R\wedge'$  in podvojena konteksta spet razpolovimo.

$$\frac{\frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma \Rightarrow B, \Delta}{\Gamma, \Gamma \Rightarrow A \wedge' B, \Delta, \Delta} R\wedge'}{\Gamma \Rightarrow A \wedge' B, \Delta} C \times |\Gamma \cup \Delta|$$

□

Kot smo v zgornjem dokazu lahko videli, se za dokaz medsebojne izpeljivosti  $\wedge$  ter  $\wedge'$  na bistven način uporabi tako skrčitev kot ošibitev. Brez teh dveh pravil veznika pravzaprav nista medsebojno izpeljiva, zato se ju v linearni logiki obravnava kot ločena veznika.

### 3.1 Izjavni vezniki

**Definicija 3.4.** Veznik  $\wedge$  se še vedno glasi *in*, zapišemo pa ga s simbolom  $\sqcap$ . Zapišimo še enkrat njegovo levo in desno pravilo, tokrat s pravnimi simboli:

$$\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \sqcap B \Rightarrow \Delta} L\sqcap \quad \frac{\Gamma, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \sqcap B \Rightarrow \Delta} L\sqcap \quad \frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma \Rightarrow B, \Delta}{\Gamma \Rightarrow A \sqcap B, \Delta} R\sqcap$$

**Definicija 3.5.** Veznik  $\wedge'$  pa preimenujemo v *tenzor* ter ga zapišemo s simbolom  $\star$ :

$$\frac{\Gamma, A, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \star B \Rightarrow \Delta} L\star \quad \frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow B, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A \star B, \Delta, \Delta'} R\star$$

Zakaj te dva veznika v kontekstu linearne logike nista enaka, je razvidno že če primerjamo njuni levi in desni pravili. Pomembno nam je namreč, koliko „informacij” vsebujejo z vezniki zgrajene formule, saj nam je pomembno koliko predpostavk smo za njih porabili in pa koliko sklepov lahko z njimi dokažemo. Veznik  $\sqcap$  med predpostavkami na nek način vsebuje le eno izmed predpostavk, ki ju združuje, medtem ko veznik  $\star$  vsebuje obe. Ko torej uporabimo  $A \sqcap B$ , da dokažemo neki  $\Delta$ , uporabimo le  $A$  ali  $B$ , medtem ko pri  $A \star B$  uporabimo tako  $A$  kot  $B$ . Če pa želimo dokazati, da velja  $A \sqcap B$ , pa je dovolj, da iz istih predpostavk dokažemo tako  $A$  kot  $B$ , kar spet namiguje, da  $A \sqcap B$  vsebuje enako število informacij kot le  $A$  ali  $B$ . Če pa dokazujemo  $A \star B$ , pa moramo posebej dokazati  $A$ , nato pa iz ločenega sklopa predpostavk dokazati  $B$ , kar pomeni da vsebuje  $\star$  informacij tako za  $A$  kot  $B$ .

Oglejmo si sedaj še preostale veznike, začenši z veznikom  $\vee$ . V linearni logiki se ta spet razdeli na dvoje, intuicija za to pa je simetrična intuiciji za veznik  $\wedge$ , zato jo prepustimo bralcu.

**Definicija 3.6.** Veznik *ali*  $\sqcup$ , ima sledeče levo in desno pravilo:

$$\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \sqcup B \Rightarrow \Delta} L\sqcup \quad \frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta}{\Gamma \Rightarrow A \sqcup B, \Delta} R\sqcup \quad \frac{\Gamma \Rightarrow B, \Delta}{\Gamma \Rightarrow A \sqcup B, \Delta} R\sqcup$$

Kot vidimo sta obe pravili popolnoma simetrični praviloma za veznik  $\sqcup$ .

**Definicija 3.7.** Veznik *plus*  $+$  pa je analogno simetričen vezniku  $\star$ :

$$\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma', B \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A + B \Rightarrow \Delta, \Delta'} L_+ \quad \frac{\Gamma \Rightarrow A, B, \Delta}{\Gamma \Rightarrow A + B, \Delta} R_+$$

Vsi nadaljni vezniki imajo v linearni logiki enaka pravila kot v navadnem sekventnem računu in se ne delijo na dva dela, še vseeno pa so to *linearni* vezniki, že samo zaradi pogojev pod katerimi so vpeljeni. Če na primer  $A$  linearno implicira  $B$  to pomeni, da natanko en  $A$  implicira natanko en  $B$ , linearna negacija formule  $A$  pa negira natanko en  $A$ .

Za vpeljavo implikacije zopet potrebujemo drugačen simbol kot smo ga vajeni, saj se  $\Rightarrow$  že uporablja v strukturi sekventa samega. Običajni sekventni račun v ta namen uporablja  $\rightarrow$ , linearna implikacija pa, da se loči od nelinearne, spet uporabi svoj simbol.

**Definicija 3.8.** *Implikacija*  $\multimap$ , je definirana z naslednjimi pravili:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma', B \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A \multimap B \Rightarrow \Delta, \Delta'} L_{\multimap} \quad \frac{\Gamma, A \Rightarrow B, \Delta}{\Gamma \Rightarrow A \multimap B, \Delta} R_{\multimap}$$

Kot lahko vidimo je desno pravilo dokaj jasno za interpretacijo. Če dokazujemo  $A \multimap B$ , je dovolj da pod predpostavko  $A$  dokažemo  $B$ . Levo pravilo pa je morda lažje brati od zgoraj navzdol. Če torej z  $\Gamma$  dokažemo  $A$  ter neke druge sklepe  $\Delta$ , iz  $\Gamma'$  in  $B$  pa dokažemo  $\Delta'$ , lahko iz združenih predpostavk  $\Gamma, \Gamma'$  ter dejstva, da  $A$  implicira  $B$  dokažemo združene sklepe  $\Delta, \Delta'$ .

**Definicija 3.9.** *Negacija*, označena s simbolom  $\sim$ , ima naslednji pravili:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta}{\Gamma, \sim A \Rightarrow \Delta} L_{\sim} \quad \frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \sim A, \Delta} R_{\sim}$$

Tudi interpretacija veznika  $\sim$  je lažja od zgoraj navzdol, pomembno pa je tudi dejstvo, da vejice na desni interpretiramo kot „ali“, vejice na levi pa kot „in“. Levo pravilo nam pove, da če znamo iz predpostavk  $\Gamma$  dokazati  $A$  *ali*  $\Delta$ , lahko preprosto predpostavimo, da ne velja  $A$  in dokažemo  $\Delta$ . Desno pravilo pa pravi, da če znamo iz  $\Gamma$  *in*  $A$  dokazati  $\Delta$ , lahko iz  $\Gamma$  dokažemo ali da  $A$  ne velja, ali pa da velja  $\Delta$ .

## 3.2 Izjavne konstante

V običajnem sekventnem računu imamo dvoje konstant; resnico in neresnico, ki pa se v linearni logiki spet razdelita. Resnici se delita na enoto za  $\star$  ter enoto za  $\sqcap$ , neresnici pa na enoto za  $+$  ter enoto za  $\sqcup$ .

**Definicija 3.10.** *Enota 1*, ima levo in desno pravilo:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma, 1 \Rightarrow \Delta} L_1 \quad \frac{}{\Rightarrow 1} R_1$$

Lahko jo brez predpostavk dokažemo, kar nam pove desno pravilo, levo pravilo pa pove, da če pa vemo da enota velja je to trivialna informacija.

**Definicija 3.11.** *Resnica*  $\top$ , ima le desno pravilo:

$$\frac{}{\Gamma \Rightarrow \top, \Delta} R_{\top}$$

Ker levega pravila nima, je med predpostavkami ne moremo uporabiti. Kar pa nam desno pravilo pove, je da resnica vedno velja.

**Lema 3.12.** *Konstanta  $\mathbf{1}$  je enota za za veznik  $\star$ , konstanta  $\top$  pa je enota za veznik  $\sqcap$ .*

*Dokaz.* Za dokaz leme nam je potrebno izpeljati sekvente  $A \star \mathbf{1} \Rightarrow A$ ,  $A \Rightarrow A \star \mathbf{1}$ ,  $A \sqcap \top \Rightarrow A$  ter  $A \Rightarrow A \sqcap \top$ :

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{\overline{A \Rightarrow A} \text{ Ax}}{A, \mathbf{1} \Rightarrow A} \text{ L1}}{A \star \mathbf{1} \Rightarrow A} \text{ L}\star \quad \frac{\text{Ax} \frac{\overline{A \Rightarrow A}}{A \Rightarrow A \star \mathbf{1}} \frac{\overline{\Rightarrow \mathbf{1}} \text{ R1}}{\text{R}\star} \end{array}$$

$$\frac{\frac{\overline{A \Rightarrow A} \text{ Ax}}{A \sqcap \top \Rightarrow A} \text{ L}\sqcap \quad \frac{\text{Ax} \frac{\overline{A \Rightarrow A}}{A \Rightarrow A \sqcap \top} \frac{\overline{A \Rightarrow \top} \text{ R}\top}{\text{R}\sqcap}$$

□

**Definicija 3.13.** *Ničla  $\mathbf{0}$  ima levo in desno pravilo:*

$$\frac{}{\mathbf{0} \Rightarrow} \text{L}\mathbf{0} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \mathbf{0}, \Delta} \text{R}\mathbf{0}$$

**Definicija 3.14.** *Neresnica  $\perp$  ima levo pravilo, kar pomeni, da ne more biti uporabljena kot sklep:*

$$\frac{}{\Gamma, \perp \Rightarrow \Delta} \text{L}\perp$$

Kot lahko vidimo, so zgornja pravila za ničlo in neresnico simetrična pravilom za enoto in resnico, prav tako pa je simetričen dokaz naslednje leme dokazu leme 3.12, zato ga bomo opustili.

**Lema 3.15.** *Konstanta  $\mathbf{0}$  je enota za za veznik  $+$ , konstanta  $\perp$  pa je enota za veznik  $\sqcup$ .*

### 3.3 Kvantifikatorja

**Definicija 3.16.** *Univerzalni kvantifikator  $\forall$  je definiran z naslednjima praviloma:*

$$\frac{\Gamma, A[t/x] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \forall x A \Rightarrow \Delta} \text{L}\forall \quad \frac{\Gamma \Rightarrow A[y/x], \Delta}{\Gamma \Rightarrow \forall x A, \Delta} \text{R}\forall \quad ; y \text{ ni prost v } \Gamma \text{ in } \Delta$$

Zapis  $A[a/x]$  pomeni, da vsako prosto pojavitev spremenljivke  $x$  zamenjamo s termom  $a$ . V  $\text{L}\forall$  s  $t$  označujemo specifičen term  $t$ , v  $\text{R}\forall$  pa z  $y$  označujemo poljubno spremenljivko. Levo pravilo nam torej pravi, da če želimo iz dejstva, da za vsak  $x$  velja formula  $A$ , dokazati  $\Delta$ , je dovolj, da spremenljivko  $x$  v  $A$  nadomestimo z nekim specifičnim termom in s tem dokažemo  $\Delta$ . Desno pravilo pa je ekvivalentno temu, da pri dokazovanju tega, da za vsak  $x$  velja  $A$ , fiksiramo poljuben  $y$  in dokazujemo  $A$ .

**Definicija 3.17.** *Eksistenčni kvantifikator  $\exists$  je simetričen univerzalnemu kvantifikatorju:*

$$\frac{\Gamma, A[y/x] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \exists x A \Rightarrow \Delta} L\exists \quad \frac{\Gamma \Rightarrow A[t/x], \Delta}{\Gamma \Rightarrow \exists x A, \Delta} R\exists \quad ; y \text{ ni prost v } \Gamma \text{ in } \Delta$$

Tokrat levo pravilo vsebuje prosto spremenljivko  $y$ , desno pa specifičen term  $t$ . Če torej želimo uporabiti dejstvo, da obstaja  $x$ , da velja  $A$ , je dovolj da  $\Delta$  dokažemo pri poljubnem  $y$  na mestu spremenljivke  $x$ , če pa želimo dokazati, da obstaja  $x$ , da velja  $A$ , le poščemo nek specifičen term  $t$ , da  $A$  velja.

### 3.4 Eksponenta

Da bi lahko določene stvari dokazali, si želimo v linearni logiki modelirati tudi običajen sekventni račun, vključno torej z ošibitvijo ter skrčitvijo. A to nelinearnost želimo omejiti na specifične formule. Namen teh „nelinearnih“ formul je, da nam dovolijo v linearni logiki dokazati vse, kar je možno dokazati tudi v običajnem sekventnem računu, a da je iz dokaza takoj razvidno, kateri deli sekventa so bili dokazani linearno in kateri ne. Ker želimo označiti formulo kot nelinearno, jo modificiramo v novo formulo z veznikom. Imamo dva takšna veznika, ki ju imenujemo *eksponenta*.

**Definicija 3.18.** Veznik *seveda* je označen s simbolom  $!$  in označuje nelinearnost na levi strani sekventa, veznik *zakaj ne* pa je označen s simbolom  $?$  in označuje nelinearnost na desni strani:

$$\begin{array}{cccc} \frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !A \Rightarrow \Delta} L! & \frac{!\Gamma \Rightarrow A, ?\Delta}{!\Gamma \Rightarrow !A, ?\Delta} R! & \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !A \Rightarrow \Delta} W! & \frac{\Gamma, !A, !A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !A \Rightarrow \Delta} C! \\ \frac{!\Gamma, A \Rightarrow ?\Delta}{!\Gamma, ?A \Rightarrow ?\Delta} L? & \frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta}{\Gamma \Rightarrow !A, \Delta} R? & \frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta}{\Gamma \Rightarrow ?A, \Delta} W? & \frac{\Gamma \Rightarrow ?A, ?A, \Delta}{\Gamma \Rightarrow ?A, \Delta} C? \end{array}$$

Za oba veznika veljajo štiri pravila. Oba lahko vpeljemo na levi ali desni strani, lahko pa na ustrezni strani uporabimo tudi skrčitev in ošibitev. Zapis  $!\Gamma$  (ali  $?\Delta$ ) označuje, da je vsaka formula v  $\Gamma$  (ali  $\Delta$ ) predznačena z veznikom  $!$  (ali  $?$ ).

Z eksponenti označimo, da imamo na voljo "poljubno mnogo" kopij predpostavke ali sklepa. Ker vejice na levi beremo kot „in“, vejice na desni pa kot „ali“, je za to treba podati dva različna veznika. Formula  $!A$  torej označuje „ $A$  in  $A$  in ...  $A$ “, kolikor kopij pač potrebujemo, formula  $?A$  pa označuje „ $A$  ali  $A$  ali ...  $A$ “.

Interpretacija  $L!$  je dokaj enostavna. Pove le, da se kadarkoli v procesu dokazovanja lahko odločimo formulo označiti kot nelinearno. Ker pa se med sklepi  $!$  ne pojavi naravno, morajo za vpeljavo na desni veljati strožji pogoji, namreč, da je že celoten sekvent nelinearen. Interpretacija  $L?$  ter  $R?$  je simetrična.

### 3.5 Nekaj opomb o zapisu

Na koncu tega poglavja je potrebnih še nekaj opomb glede zapisa veznikov ter strukture sekventov.

### 3.5.1 Poimenovanje veznikov

Zapis, uporabljen v tem diplomskem delu, je črpan iz vira ??daj vir??, ni pa najbolj standarden. Jean-Yves Girard, ki se je prvi ukvarjal z linearno logiko je veznike in konstante označil drugače, ta zapis pa se je tudi ohranil. Razlog za spremembo zapisa v mojem delu je bolj slogoven kot zgodovinski. Načini kako je zapis spremenjen ter standardna imena veznikov v angleščini so prikazana v spodnji tabeli. ??Daj also vir??

Simbol veznika	Simbol v standardnem zapisu	Ime
$\sqcap$	$\&$	with
$\star$	$\otimes$	tensor
$\sqcup$	$\oplus$	plus
$+$	$\wp$	par
$\top$	$\top$	top
<b>1</b>	<b>1</b>	one
$\perp$	<b>0</b>	zero
<b>0</b>	$\perp$	bottom

Kot lahko vidimo so v standardnem zapisu parni drugačni vezniki kot v našem. Razlog za to je, da veznik  $+$  distribuira čez veznik  $\sqcap$ , veznik  $\star$  pa distribuira čez  $\sqcup$ . Velja torej ??cite troelstra str 21 22??:

$$A + (B \sqcap C) \equiv (A + B) \sqcap (A + C)$$

$$A \star (B \sqcup C) \equiv (A \star B) \sqcup (A \star C)$$

Toda če veznik  $+$  negiramo, ne dobimo veznika  $\sqcap$ , ampak  $\star$ , če negiramo veznik  $\sqcap$  pa dobimo  $\sqcup$  in seveda obratno. Dualna para sta torej  $(\star, +)$  ter  $(\sqcap, \sqcup)$ , kar je veliko bolj razvidno pri naših oznakah. Poleg tega sta si že sami pravili za veznika  $\star$  ter  $+$ , iz definicij 3.5 in 3.7, simetrični, kot sta si pravili za  $\sqcap$  ter  $\sqcup$ , iz definicij 3.4 in 3.6. Zdi se mi, da sta to dovolj pomembna razloga za razumevanje veznikov, da sem se odločila za nestandarden zapis.

### 3.5.2 Intuicionistična linearna logika

Članki o linearni logiki pogosto omenajo tudi intuicionistično linearno logiko, zato se mi zdi pomembno slednje vsaj predstaviti tudi v mojem delu.

Intuicionistična logika je logika brez principa izključene tretje možnosti. To je aksiom, ki pravi, da za poljubno trditev  $P$  velja  $P \vee \neg P$ . V sekventnem računu kot smo ga predstavili do sedaj, se da to pravilo izpeljati iz pravila aksioma. V linearni logiki ta princip velja le za veznik  $+$ , ne pa za veznik  $\sqcup$ .??citiraj??

$$\frac{\frac{\overline{A \Rightarrow A} \text{ Ax}}{\Rightarrow A, \sim A} \text{ R}\sim}{\Rightarrow A + (\sim A)} \text{ R}+$$

V običajnem sekventnem računu je pravilo za negacijo enako, linearnost je ne spremeni, veznika  $+$  in  $\sqcap$  pa sta si ekvivalentna in sta oba reprezentaciji veznika  $\vee$ . To pomeni, da izpeljava principa izključene tretje možnosti v nelinearnem poteka enako kot zgoraj.



Če torej želimo delati z intuicionistično linearno logiko, moramo strukturo sekventnega računa nekoliko spremeniti. Dovolj je, da na desni strani sekventov ne dopustimo več kot ene formule. Kot lahko hitro vidimo, zgornja izpeljava ne deluje več, saj sekvent  $\Rightarrow \sim A, A$  ne more obstajati.

Intuicionistična logika daje poudarek na tem *kako* dokazujemo izreke in trditve, ne le da jih dokažemo. A ker je linearna logika že zelo strukturirana, poleg tega pa bi dopuščanje le ene formule na desni strani sekventa uničilo simetrijo pravil, saj na primer ne bi smeli imeti desnega pravila za  $+$ , sem se odločila v tem delu uporabljati klasično – torej neintuicionistično – logiko.

## 4 Izrek o eliminaciji rezov

Poslednje pravilo, ki ga je potrebno vpeljati, je *pravilo reza*. To pravilo obstaja tudi v običajnem sekventnem računu in formalizira koncept dokazovanja s pomočjo leme.

**Definicija 4.1.** *Pravilo reza, krajše Rez:*

$$\frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma', A \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{ Rez}$$

To pravilo pravi, da če znamo pod določenimi predpostavkami dokazati formulo  $A$ , potem pa iz te formule dokažemo nekaj drugega, lahko  $A$  enostavno režemo iz procesa.

**Opomba 4.2.** Sekventni račun brez uporabe pravila reza ima pomembno lastnost, namreč da vsak dokaz sekventa  $\Gamma \Rightarrow \Delta$  v svoji izpeljavi uporabi le podformule formul, ki nastopajo v  $\Gamma$  in  $\Delta$ . To je osnova za mnoge algoritme, ki iščejo dokaze, pa tudi sicer ima ta lastnost mnogo koristnih posledic.??lahko dam to tukaj??. Ko vpeljemo pravilo reza, se ta lastnost izgubi, saj lahko na vsakem koraku „vrinemo“ poljubno formulo.

Če pravilo reza res interpretiramo kot uporabo leme, bi imelo smisel sklepati, da z uporabo rezov ne moremo pridelati sekventov, ki jih brez tega pravila nismo mogli dokazati. Ravno temu služi naslednji izrek.

**Izrek 4.3** (Izrek o eliminaciji rezov). *Vsak sekvent, izpeljan z uporabo reza, lahko izpeljemo tudi brez uporabe reza.*

### 4.1 Potrebne definicije

Dokaz zgornjega izreka poteka s pomočjo indukcije na drevesih izpeljave nad rezom ter na kompleksnosti formul, ki jih režemo. Zavrholo tega moramo tako na drevesih kot formulah vpeljati nekakšno mero, glede na katero bomo potem izvalali proces indukcije. Formula je induktivno definirana v definiciji 2.3, zato je tudi kompleksnost formule definirana induktivno.

**Definicija 4.4.** Naj bosta  $A$  in  $B$  poljubni formuli,  $P$  pa naj bo neka osnovna formula. *Rang formule*, označen s simbolom  $\mathfrak{R}$ , je definiran sledeče:

- $\mathfrak{R}(P) = \mathfrak{R}(\top) = \mathfrak{R}(\perp) = \mathfrak{R}(1) = \mathfrak{R}(0) = 1$

- $\mathfrak{R}(\sim A) = \mathfrak{R}(\forall x A) = \mathfrak{R}(\exists x A) = \mathfrak{R}(A) + 1$
- $\mathfrak{R}(A * B) = \max\{\mathfrak{R}(A), \mathfrak{R}(B)\} + 1$  ; kjer je  $*$  poljuben veznik, ki sprejme dve formuli.

Podobno je definirana višina drevesa. Imejmo naslednji dve drevesi, levo označeno z  $\mathcal{D}$ , desno pa z  $\mathcal{D}'$ :

$$\frac{\mathcal{D}_0 \quad \mathcal{D}_1 \quad \dots \quad \mathcal{D}_n}{\mathcal{S}} \text{Pravilo} \quad \frac{}{\mathcal{S}'} \text{Pravilo}'$$

Tu je  $n \in \mathbb{N}$ , Pravilo je poljubno pravilo, ki sprejme  $n$  sekventov, Pravilo' pa je poljubno pravilo, ki jih ne sprejme nič. Slednje je na primer pravilo aksioma ali nekatera izmed pravil za konstante:

**Definicija 4.5.** Višina drevesa izpeljave je označena s simbolom  $\mathfrak{h}$  in je enaka:

- $\mathfrak{h}(\mathcal{D}) = \max\{\mathfrak{h}(\mathcal{D}_0), \mathfrak{h}(\mathcal{D}_1), \dots, \mathfrak{h}(\mathcal{D}_n)\} + 1$
- $\mathfrak{h}(\mathcal{D}') = 1$

Sedaj ko imamo mero tako na formulah kot na drevesih izpeljave, lahko defniramo skupno mero vsakega reza. Oglejmo si poljubno pravilo reza:

$$\frac{\begin{array}{c} \mathcal{D}_0 \\ \Gamma, A \Rightarrow \Delta \end{array} \quad \begin{array}{c} \mathcal{D}_1 \\ \Gamma' \Rightarrow A, \Delta' \end{array}}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}$$

Tu  $\mathcal{D}_0$  in  $\mathcal{D}_1$  označujeta drevesi izpeljav, ki sta vodili do sekventov pod njima.

**Definicija 4.6.** Stopnja reza je par števil  $(\mathfrak{R}, \mathfrak{h})$ , kjer je  $\mathfrak{R}$  rang rezane formule,  $\mathfrak{h}$  pa višina samega drevesa. Z zgornjimi oznakami je stopnja reza torej enaka:

$$(\mathfrak{R}, \mathfrak{h}) = (\mathfrak{R}(A), \max\{\mathfrak{h}(\mathcal{D}_0), \mathfrak{h}(\mathcal{D}_1)\} + 2)$$

Stopnja reza je urejena *leksikografsko*, kar pomeni, da relacijo  $<$  na paru  $(\mathfrak{R}, \mathfrak{h})$  definiramo sledeče:

$$(\mathfrak{R}, \mathfrak{h}) < (\mathfrak{R}', \mathfrak{h}') \Leftrightarrow (\mathfrak{R} < \mathfrak{R}') \text{ ali } ((\mathfrak{R} = \mathfrak{R}') \text{ in } (\mathfrak{h} < \mathfrak{h}'))$$

**Definicija 4.7.** Rezu bomo rekli *najnižji rez*, če se nad njim ne pojavi nobeno drugo pravilo reza. To seveda ne pomeni nujno, da ima najnižjo stopnjo ali da je v drevesu izpeljave le en takšen rez.

Preden začnemo z dokazom je nazadnje potrebno definirati še eno vrsto reza, in sicer glavni rez.

**Definicija 4.8.** Če je rezana formula vpeljana v obeh poddrevesih nad pravilom reza, to imenujemo *glavni rez*.


**Primer 4.9.** Glavni rez za formulo  $A \sqcap B$ .

$$\text{L}\sqcap \frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \sqcap B \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow A, \Delta' \quad \Gamma' \Rightarrow B, \Delta'}{\Gamma' \Rightarrow A \sqcap B, \Delta'} \text{R}\sqcap \quad \frac{}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}$$

## 4.2 Dokaz izreka o eliminaciji rezov

Izrek 4.3 imenujemo izrek o *eliminaciji* rezov, ker v njegovem dokazu postopoma odstranjujemo (eliminiramo) reze iz drevesa izpeljave, dokler nam na koncu ne ostane drevo izpeljave brez rezov. Dokaz poteka z dvojno indukcijo, zunanjo na številu rezov v dokazu, notranjo pa na stopnji reza, kot je definirana v 4.6.

Začnimo z indukcijo na številu rezov. Če je drevo brez rezov, smo dokaz končali. Bazi indukcije, torej primeru ko je  $n = 0$ , smo tako avtomatično zadostili. Sedaj denimo, da imamo v drevesu izpeljave  $n + 1$  rezov. Ker je to drevo končno, si lahko izberemo enega izmed najnižjih rezov, denimo mu  $\text{Rez}_0$ . Oglejmo si poddrevo, ki se konča z  $\text{Rez}_0$ :



Drevesi  $\mathcal{D}$  in  $\mathcal{D}'$  ne vsebujeta pravila rez. Če znamo torej eliminirati rez iz takšnega poddrevesa, lahko zgornje drevo izpeljave prevedemo na drevo, ki vsebuje le  $n$  rezov. Po indukcijski predpostavki znamo sedaj eliminirati še ostale reze. Dokaz eliminacije rezov smo tako prevedli na dokaz eliminacije rezov iz drevesa, kjer je zadnje pravilo rez, nad njim pa ni drugih rezov.

Za eliminacijo zgoraj opisanega reza pa potrebujemo indukcijo na stopnjo reza. Indukcijski korak poteka tako, da drevo, ki se konča z rezom stopnje  $(\mathfrak{R}, h)$  preobrazimo v drevo, ki vsebuje končno mnogo – lahko tudi nobenega – rezov stopenj  $(\mathfrak{R}_0, h_0), (\mathfrak{R}_1, h_1), \dots, (\mathfrak{R}_n, h_n)$ , kjer je  $(\mathfrak{R}_i, h_i) < (\mathfrak{R}, h)$  za vsak  $i \in [n]$ . Ker vsakič „pridelamo“ le končno mnogo rezov, vsak izmed katerih je strogo nižje stopnje od začetnega, se bo proces zaključil v končno mnogo korakih. Če res pridelamo več rezov in je kateri izmed njih nad drugim, zopet nadaljujemo indukcijo na najnižjem izmed njih. Baza indukcije je primer, ko je  $(\mathfrak{R}, h) = (1, h)$ , za poljuben  $h \in (N)$ .

**Oris dokaza.** Ko imamo poljubno drevo izpeljave, iz njega eliminiramo reze tako, da si izberemo poddrevo izpeljave, ki se konča z rezom in nad katerim ni drugih rezov. Nato preobrazimo omenjeno poddrevo v drevo, ki vsebuje reze kvečjemu nižje stopnje in to ponavljamo, dokler rezov iz drevesa ne eliminiramo.

Pri tem postopku pa moramo ločiti primere glede na to, kakšne vrste rez je bil na dnu našega poddrevesa, namreč če je bil rez glaven, kot definirano v 4.8, ali če ni bil. Začnimo z eliminacijo glavnega reza.

#### 4.2.1 Eliminacija glavnega reza

Kaj pomeni, da je rez glaven, je odvisno od vsake rezane formule posebej. Eliminacijo glavnega reza je torej potrebno ločiti na vse možne veznike. Začnimo kar z veznikom  $\sqcap$ , ki smo ga že uporabili v primeru 4.9.

$$\begin{array}{c}
\text{L}\sqcap \frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \sqcap B \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow A, \Delta' \quad \Gamma' \Rightarrow B, \Delta'}{\Gamma' \Rightarrow A \sqcap B, \Delta'} \text{R}\sqcap \\
\hline
\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta' \quad \text{Rez} \\
\downarrow \\
\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow A, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}
\end{array}$$

Izpeljava pred puščico in po njej je enaka, saj iz istih poddreves dokažemo isti sekvent. Tako smo lahko pravilo, ki reže  $A \sqcap B$  zamenjali s pravilom, ki reže le  $A$ , zato je korak indukcije opravljen. Podobno lahko naredimo za glavni rez  $A \star B$ .

$$\begin{array}{c}
\text{L}\star \frac{\Gamma, A, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \star B \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow A, \Delta' \quad \Gamma'' \Rightarrow B, \Delta''}{\Gamma', \Gamma'' \Rightarrow A \star B, \Delta', \Delta''} \text{R}\star \\
\hline
\Gamma, \Gamma', \Gamma'' \Rightarrow \Delta, \Delta', \Delta'' \quad \text{Rez} \\
\downarrow \\
\text{Rez} \frac{\Gamma, A, B \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow A, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', B \Rightarrow \Delta, \Delta'} \quad \frac{\Gamma'' \Rightarrow B, \Delta''}{\Gamma, \Gamma', \Gamma'' \Rightarrow \Delta, \Delta', \Delta''} \text{Rez}
\end{array}$$

Tokrat smo sicer prvotni rez prevedli na dva, a oba novonastala reza režeta podformuli, zato zopet zadostimo indukcijski predpostavki. Zelo podobno kot zgornje dva primera izvedemo korak indukcije za  $A \sqcup B$  ter  $A + B$ .

$$\begin{array}{c}
\text{L}\sqcup \frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \sqcup B \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow A, \Delta'}{\Gamma' \Rightarrow A \sqcup B, \Delta'} \text{R}\sqcup \\
\hline
\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta' \quad \text{Rez} \\
\downarrow \\
\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow A, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}
\end{array}$$

Kot vidimo je zgornji korak indukcije popolnoma simetričen koraku indukcije za  $A \sqcap B$ , saj sta tudi veznika sama popolnoma simetrična. Prav tako je korak indukcije za  $A + B$  popolnoma simetričen koraku indukcije za  $A \star B$ .

$$\begin{array}{c}
\text{L+} \frac{\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma', B \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A + B \Rightarrow \Delta, \Delta'} \quad \frac{\Gamma'' \Rightarrow A, B, \Delta''}{\Gamma'' \Rightarrow A + B, \Delta''}}{\Gamma, \Gamma', \Gamma'' \Rightarrow \Delta, \Delta', \Delta''} \text{R+} \\
\downarrow \\
\text{Rez} \frac{\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma'' \Rightarrow A, B, \Delta''}{\Gamma, \Gamma'' \Rightarrow B, \Delta, \Delta''} \quad \Gamma', B \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma', \Gamma'' \Rightarrow \Delta, \Delta', \Delta''} \text{Rez}
\end{array}$$

Naslednja eliminacija glavnega reza, ki jo je potrebno obravnavati je eliminacija glavnega reza implikacije. Zopet se rez prevede na dva manj kompleksna reza.

$$\begin{array}{c}
\text{L-}\multimap \frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma', B \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A \multimap B \Rightarrow \Delta, \Delta'} \quad \frac{\Gamma'', A \Rightarrow B, \Delta''}{\Gamma'' \Rightarrow A \multimap B, \Delta''} \text{R-}\multimap \\
\hline
\Gamma, \Gamma', \Gamma'' \Rightarrow \Delta, \Delta', \Delta'' \\
\downarrow \\
\text{Rez} \frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma'', A \Rightarrow B, \Delta''}{\Gamma, \Gamma'' \Rightarrow B, \Delta, \Delta''} \quad \Gamma', B \Rightarrow \Delta' \\
\hline
\Gamma, \Gamma', \Gamma'' \Rightarrow \Delta, \Delta', \Delta'' \text{Rez}
\end{array}$$

Poslednji izmed veznikov, ki ga potrebujemo obravnavati je negacija.

$$\begin{array}{c} \text{L}\sim \frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta}{\Gamma, \sim A \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma', A \Rightarrow \Delta'}{\Gamma' \Rightarrow \sim A, \Delta'} \text{R}\sim \\ \hline \Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta' \\ \text{Rez} \\ \downarrow \\ \frac{\Gamma \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma', A \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez} \end{array}$$

Pri eliminaciji glavnega reza, kjer rečemo propozicijsko konstanto, lahko obravnavamo le konstanti **1** ter **0**, saj za  $\top$  levo pravilo vpeljave ne obstaja, za  $\perp$  pa ni desnega. Glavni rez, kjer rečemo  $\top$  ali  $\perp$  se torej ne more zgoditi.

$$\begin{array}{ccc}
\text{L1} \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \mathbf{1} \Rightarrow \Delta} & \frac{}{\Rightarrow \mathbf{1}} \text{R1} & \text{L0} \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\mathbf{0} \Rightarrow} & \frac{}{\Gamma \Rightarrow \mathbf{0}, \Delta} \text{R0} \\
\frac{}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Rez} & & \frac{}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{Rez} & \\
\downarrow & & \downarrow & \\
\Gamma \Rightarrow \Delta & & \Gamma \Rightarrow \Delta & 
\end{array}$$

Kot lahko vidimo sta te dva primera dokaj trivialna, saj sam rez ničesar ne naredi. Sedaj si oglejmo eliminacijo glavnega reza obeh kvantifikatorjev. Zopet s  $t$  označimo specifičen term, z  $y$  pa poljubno spremenljivko.

$$\text{L}\forall \frac{\frac{\Gamma, A[t/x] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \forall x A \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow A[y/x], \Delta'}{\Gamma' \Rightarrow \forall x A, \Delta'} \text{R}\forall}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}$$

↓

$$\frac{\Gamma, A[t/x] \Rightarrow \Delta \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow A[y/x], \Delta'}{\Gamma' \Rightarrow A[t/x], \Delta'} y := t}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}$$

Kar naredimo v desnem poddrevesu novonastalega drevesa izpeljave je, da spremenljivko  $y$  nadomestimo s specifičnim termom  $t$ . Ker je bil  $y$  res poljuben, to lahko naredimo in tako res dobimo enako formulo kot na koncu levega poddrevesa, to pa nato režemo. Formula  $A[t/x]$  je pravzaprav le formula  $A$ , kjer je  $x$  substituiran za nek bolj specifičen term, zato podformula formule  $\forall x A$ . Tako je induksijski predpostavki zopet zadoščeno in korak indukcije je opravljen. Podobno naredimo za eksistenčni kvantifikator. Postopek je popolnoma simetričen postopku za univerzalni kvantifikator.

$$\text{L}\exists \frac{\frac{\Gamma, A[y/x] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \exists x A \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow A[t/x], \Delta'}{\Gamma' \Rightarrow \exists x A, \Delta'} \text{R}\exists}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}$$

↓

$$y := t \frac{\frac{\Gamma, A[y/x] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A[t/x] \Rightarrow \Delta} \quad \Gamma' \Rightarrow A[t/x], \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}$$

#### 4.2.2 Glavni rez eksponentov ter splošeno pravilo reza

Lotimo se sedaj eksponentov. Ker imata oba eksponenta štiri pravila, moramo ločiti glavni rez na več primerov. Pri vezniku  $!$  imamo tri pravila, ki veznik vpeljejo na levi ter eno pravilo, ki veznik vpelje na desni. Zato moramo ločiti glavni rez formule  $!A$  na tri primere, po en primer za vsako levo pravilo. Ogljemo si naprej glavni rez, kjer je  $!A$  na levi vpeljan s skrčitvijo, na desni pa z desnim pravilom vpeljave.

$$\text{C}! \frac{\frac{\Gamma, !A, !A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !A \Rightarrow \Delta} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R}!}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{Rez}$$

Mikalo nas bi zgornje drevo izpeljave zamenjati s sledečim.

$$\begin{array}{c}
\text{Rez} \frac{\Gamma, !A, !A \Rightarrow \Delta \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!}}{\Gamma, !\Gamma', !A \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!} \\
\hline
\frac{\Gamma, !\Gamma', !\Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta', ? \Delta'}{\Gamma, !\Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta', ? \Delta'} \text{C!} \times |\Gamma'| \\
\hline
\frac{\Gamma, !\Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'}{\Gamma, !\Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{C?} \times |\Delta'| \\
\hline
\text{Rez}
\end{array}$$

Vendar s tem ne zadostimo indukcijski predpostavki, saj nobeno izmed dreves nad spodnjim izmed novo pridelanih rezov ni poddrevo prvotnih dveh dreves nad rezom, poleg tega pa se je ohranila tudi kompleksnost rezane formule, saj še vedno rešemo  $!A$ . Zavrlojo tega, da lahko ta korak indukcije vseeno opravimo, potrebujemo pomožno razširjeno pravilo reza.

**Definicija 4.10.** *Posplošeni pravili reza, označeni z  $\text{Rez!}_n$  ter  $\text{Rez?}_n$ , sta definirani za vsak  $n \in \mathbb{N}$ .*

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow !A, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez!}_n \\
\\
\frac{\Gamma, ?A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow (?A)^n, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez?}_n
\end{array}$$

**Opomba 4.11.** Formula  $(!A)^n$  v definiciji predstavlja  $n$  formul  $!A$ , ločenih z vejico. Pravili  $\text{Rez!}_1$  ter  $\text{Rez?}_1$  sta torej le pravilo Rez, kjer rešemo ali formulo  $!A$ , ali pa formulo  $?A$ .

**Lema 4.12.** *Pravili  $\text{Rez!}_n$  ter  $\text{Rez?}_n$  sta dopustni, kar pomeni, da ju lahko izpeljemo iz že definiranih pravil linearne logike.*

*Dokaz.* Lemo dokažemo z indukcijo na številu  $n$ . Primer ko je  $n = 1$  je seveda le običajno pravilo reza, kot omenjeno že v zgornji opombi. Če predpostavimo, da pravilo  $\text{Rez!}_n$  že znamo izpeljati, lahko izpeljemo  $\text{Rez!}_{n+1}$  na naslednji način.

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma, (!A)^{n+1} \Rightarrow \Delta}{\Gamma, (!A)^{n-1}, !A, !A \Rightarrow \Delta} \text{C!} \\
\hline
\frac{\Gamma, (!A)^{n-1}, !A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta} \\
\hline
\frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow !A, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez!}_n
\end{array}$$

Pri indukcijskem koraku iz  $n = 1$  na  $n = 2$  moramo paziti, saj se v drugi vrstici dokaza pojavi izraz  $(!A)^0$ . To enostavno interpretiramo kot prazen nabor formul. Indukcijski korak za  $\text{Rez?}_n$  je simetričen.  $\square$

Sedaj izrek 4.3, ki ga dokazujemo, preoblikujmo, tako da bo namesto le navedenega pravila reza vseboval tudi posplošeno pravilo reza.

**Izrek 4.13.** *Vsak sekvent, dokazan z uporabo pravila reza ali posplošenega pravila reza, lahko dokažemo tudi brez uporabe pravila reza ali posplošenega pravila reza.*

Ker je posplošeno pravilo reza dopustno, je novo formulirani izrek ekvivalenten izreku 4.3. Vendar si sedaj v dokazu lahko pomagamo s posplošenim pravilom reza. Med indukcijskim korakom torej lahko drevo izpeljave preobrazimo tako, da bo zadoščalo indukcijski predpostavki za kateregakoli izmed rezov, navadnega ali posplošenega. A sedaj je potrebno znati eliminirati tudi slednjega. To pomeni, da je potrebno obravnavati korak indukcije tako za pravilo Rez, kot za pravili  $\text{Rez}^!_n$  in  $\text{Rez}^?_n$ , vsakič ko obravnavamo rez veznika  $!$  ali  $?$ . V določenih primerih lahko obravnavamo tako posplošeno pravilo reza kot navadno hkrati, saj korak indukcije za  $\text{Rez}^!_n$  lahko izgleda enako tudi pri  $n = 1$ .

Lotimo se še enkrat drevesa izpeljave, kjer na levi  $!A$  vpeljemo s skrčitvijo, tokrat s posplošenim pravilom reza v žepu.

$$\begin{array}{c}
\text{C!} \frac{\frac{\Gamma, (!A)^{n+1} \Rightarrow \Delta}{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!}}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{Rez}^!_n \\
\downarrow \\
\frac{\Gamma, (!A)^{n+1} \Rightarrow \Delta \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!}}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{Rez}^!_{n+1}
\end{array}$$

Zgornje seveda velja tudi za  $n = 1$ , torej za navadno pravilo reza. Pri novem drevesu izpeljave je sedaj levo drevo nad rezom poddrevo levega drevesa nad prejšnjim rezom in korak indukcije je opravljen. Oglejmo si sedaj še glavni rez, kjer je formula  $!A$  na levi vpeljana z ošibitvijo. Tu korak indukcije za posplošeni rez, kjer  $n \neq 1$ , ter navadni rez ni združljiv, zato primera ločimo.

$$\begin{array}{c}
\text{W!} \frac{\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !A \Rightarrow \Delta} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!}}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{Rez} \\
\downarrow \\
\text{W!} \times |\Gamma'| \frac{\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta}}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{W?} \times |\Delta'|
\end{array}$$

Tako smo v tem primeru korak indukcije opravili za navadni rez, za  $\text{Rez}^!_n$ , kjer je  $n \geq 2$  pa je postopek sledeč.

$$\begin{array}{c}
\text{W!} \frac{\frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta}{\Gamma, (!A)^{n+1} \Rightarrow \Delta} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!}}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{Rez}^!_{n+1} \\
\downarrow
\end{array}$$



$$\frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!}}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{Rez!}_n$$

Pri obravnavi glavnega reza formule  $!A$  z levim pravilom vpeljave na levi je zopet potrebno ločiti  $\text{Rez!}_n$  na primer ko je  $n = 1$  ter ko  $n \neq 1$ . Ogljemo si zopet najprej navadno pravilo reza.

$$\text{L!} \frac{\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !A \Rightarrow \Delta} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!}}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{Rez}$$

↓

$$\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad ! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{Rez}$$

Za eliminacijo pravila  $\text{Rez!}_n$ , ko je  $n \geq 2$ , pa bo korak indukcije spet malce bolj zahteven.

$$\text{L!} \frac{\frac{\Gamma, (!A)^{n-1}, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!}}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{Rez!}_n$$

↓

$$\begin{array}{c} \text{Rez!}_{n-1} \frac{\Gamma, (!A)^{n-1}, A \Rightarrow \Delta \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!}}{\Gamma, ! \Gamma', A \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{\Gamma, ! \Gamma', ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta', ? \Delta'} \text{Rez} \\ \frac{\Gamma, ! \Gamma', ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta', ? \Delta'}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta', ? \Delta'} \text{C!} \times |\Gamma'| \\ \frac{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta', ? \Delta'}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow \Delta, ? \Delta'} \text{C?} \times |\Delta'| \end{array}$$

Novonastalo drevo izpeljave bi nas lahko spominjalo na problem iz začetka tega podpoglavja, a smo tu za spremembo res zadostili indukcijski predpostavki, saj je desno poddrevo nad najnižjim izmed rezov res poddrevo desnega izmed dreves nad prvotnim rezom.

Eliminacija glavnega reza, ki reže formulo  $?A$ , je popolnoma simetrična in sledi natanko vsem korakom, opisanim v procesu eliminacije glavnega reza, ki reže formulo  $!A$ , zato je v tem delu ne bomo posebej obravnavali.

### 4.2.3 Eliminacija reza, ki ni glaven

Če rez ni bil glaven, se je moralo na levi ali desni strani tik pred rezom zgoditi pravilo, ki ni vpeljalo ravnokar rezane formule. Denimo, da je bil na levi ravnokar vpeljan veznik  $\sqcap$ , nato pa smo rezali z veznikom nepovezano formulo  $C$ .

$$\text{L}\sqcap \frac{\Gamma, A, C \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \sqcap B, C \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A \sqcap B \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}$$

To lahko, ne glede na to kakšna je formula  $C$  in ne glede na to ali je bila na desni vpeljana kakšna druga formula ali ne, preobrazimo tako, da bo zadoščalo indukcijski predpostavki.

$$\frac{\Gamma, A, C \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\ \frac{\Gamma, \Gamma', A \Rightarrow \Delta, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A \sqcap B \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{L}\sqcap$$

Rez smo res premaknili višje v drevesu izpeljave in kot lahko vidimo sama formula  $C$  za indukcijski korak ni bila pomembna. Zato namesto glede na rezano formulo, ločimo primere glede na ravnokar vpeljano formulo, ki ni  $C$ . Seveda tudi ni pomembno, ali se ta vpeljava zgodi v levem ali desnem poddrevesu nad rezom, saj je to asimetrično le če obravnavamo rezano formulo. Pomembno pa je, ali je bil veznik vpeljan z levim pravilom vpeljave ali je bil vpeljan z desnim, zato si oglejmo še drugi primer, ko je vpeljana formula  $A \sqcap B$ .

$$\text{R}\sqcap \frac{\Gamma, C \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma, C \Rightarrow B, \Delta}{\Gamma, C \Rightarrow A \sqcap B, \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A \sqcap B, \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\ \downarrow$$

$$\text{Rez} \frac{\Gamma, C \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A, \Delta, \Delta'} \quad \frac{\Gamma, C \Rightarrow B, \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow B, \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\ \frac{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A, \Delta, \Delta' \quad \Gamma, \Gamma' \Rightarrow B, \Delta, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A \sqcap B, \Delta, \Delta'} \text{R}\sqcap$$

Tu smo sicer pridelali dva reza, a sta oba višje v drevesu izpeljave, zato zadostimo indukcijski predpostavki. Poglejmo si še, kaj se zgodi če na levi vpeljemo veznik  $\star$ .

$$\text{L}\star \frac{\Gamma, A, B, C \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \star B, C \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A \star B \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\ \downarrow$$

$$\frac{\Gamma, A, B, C \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A, B \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\ \frac{\Gamma, \Gamma', A, B \Rightarrow \Delta, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A \star B \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{L}\star$$

Kot pri primeru levega pravila vpeljave za veznik  $\sqcap$ , pravilo reza ter pravilo vpeljave le zamenjamo, zato enostavno zadostimo indukcijski predpostavki.

$$\begin{array}{c}
\text{R}\star \frac{\Gamma, C \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow B, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', C \Rightarrow A \star B, \Delta, \Delta'} \quad \frac{\Gamma'' \Rightarrow C, \Delta''}{\Gamma, \Gamma', \Gamma'' \Rightarrow A \star B, \Delta, \Delta', \Delta''} \text{Rez} \\
\downarrow \\
\text{Rez} \frac{\Gamma, C \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma'' \Rightarrow C, \Delta''}{\Gamma, \Gamma'' \Rightarrow A, \Delta, \Delta''} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow B, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', \Gamma'' \Rightarrow A \star B, \Delta, \Delta', \Delta''} \text{R}\star
\end{array}$$

Pri zgornjem koraku indukcije je pomembno, da se formula  $C$ , ki jo režemo, kot predpostavka dodatno pojavi le v enem izmed skventov  $\Gamma \Rightarrow A, \Delta$  ter  $\Gamma' \Rightarrow B, \Delta'$ , ne v obeh, saj desno pravilo vpeljave veznika  $\star$  združi konteksta in bi morali drugače  $C$  iz sekventa rezati dvakrat. To pa nam tudi omogoči zelo enostaven korak indukcije, kot je izveden zgoraj. Primeri za veznika  $\sqcup$  ter  $+$  so popolnoma simetrični prejšnjim štirim primerom, zato jih prepustimo bralcu. Oglejmo si sedaj primer, ko na levi tik pred rezom vpeljemo implikacijo.

$$\begin{array}{c}
\text{L}\multimap \frac{\Gamma, C \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma', B \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma', C, A \multimap B \Rightarrow \Delta, \Delta'} \quad \frac{\Gamma'' \Rightarrow C, \Delta''}{\Gamma, \Gamma', \Gamma'', A \multimap B \Rightarrow \Delta, \Delta', \Delta''} \text{Rez} \\
\downarrow \\
\text{Rez} \frac{\Gamma, C \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma'' \Rightarrow C, \Delta''}{\Gamma, \Gamma'' \Rightarrow A, \Delta, \Delta''} \quad \frac{\Gamma', B \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma', \Gamma'', A \multimap B \Rightarrow \Delta, \Delta', \Delta''} \text{L}\multimap
\end{array}$$

Kot lahko vidimo, je ta primer zelo podoben primeru, ko tik nad rezom vpeljemo  $\star$  z desnim pravilom vpeljave. Prav tako je primer, ko je  $\multimap$  vpeljan na desni, zelo podoben primeru, ko je  $\star$  vpeljan na levi.

$$\begin{array}{c}
\text{R}\multimap \frac{\Gamma, C, A \Rightarrow B, \Delta}{\Gamma, C \Rightarrow A \multimap B, \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A \multimap B, \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\
\downarrow \\
\frac{\Gamma, C, A \Rightarrow B, \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A \Rightarrow B, \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\
\frac{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A \multimap B, \Delta, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A \multimap B, \Delta, \Delta'} \text{R}\multimap
\end{array}$$

Zadnji izmed propozicijskih veznikov je zopet negacija. Obravnavali bomo le levo pravilo vpeljave, saj je desno popolnoma simetrično in je zato tudi postopek eliminacije take vrste reza simetričen.

$$\begin{array}{c}
\text{L}\sim \frac{\Gamma, C \Rightarrow A, \Delta}{\Gamma, C, \sim A \Rightarrow \Delta} \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta' \\
\hline
\Gamma, \Gamma', \sim A \Rightarrow \Delta, \Delta' \quad \text{Rez} \\
\downarrow \\
\frac{\Gamma, C \Rightarrow A, \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow A, \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\
\hline
\Gamma, \Gamma', \sim A \Rightarrow \Delta, \Delta' \quad \text{L}\sim
\end{array}$$

Oglejmo si še konstante. Tokrat seveda obravnavamo tudi konstanti  $\top$  ter  $\perp$ , saj rez ni glaven in nimamo več težave z dejstvom, da imata vsaka le po eno pravilo vpeljave.

$$\begin{array}{c}
\text{R}\top \frac{\overline{\Gamma, C \Rightarrow \top, \Delta} \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \top, \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\
\downarrow \\
\text{R}\top \overline{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \top, \Delta, \Delta'}
\end{array}$$

Ker lahko  $\top$  med sklepi vedno dokažemo, lahko končni sekvent dobimo tudi ne da bi rezali formulo  $C$ , saj je ta že od začetka med predpostavkami nastala „umetno“. Korak indukcije za konstanto  $\perp$  izvedemo popolnoma simetrično, saj zanjo velja ista lastnost, le da velja med predpostavkami. Pri obravnavi konstante  $\mathbf{1}$  desnega pravila vpeljave ne moremo obravnavati, saj ob formuli  $\mathbf{1}$  v sekventu ni nobene druge formule, ki bi jo lahko rezali. Zato obravnavamo le levo pravilo vpeljave.

$$\begin{array}{c}
\text{L}\mathbf{1} \frac{\Gamma, C \Rightarrow \Delta}{\Gamma, C, \mathbf{1} \Rightarrow \Delta} \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta' \\
\hline
\Gamma, \Gamma', \mathbf{1} \Rightarrow \Delta, \Delta' \quad \text{Rez} \\
\downarrow \\
\frac{\Gamma, C \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\
\hline
\Gamma, \Gamma', \mathbf{1} \Rightarrow \Delta, \Delta' \quad \text{L}\mathbf{1}
\end{array}$$

Korak indukcije pri konstanti  $\mathbf{0}$  je simetričen, obravnavamo pa le njeno desno pravilo vpeljave, iz enakih razlogov. Pri kvantifikatorjih je ta korak spet precej enostaven in simetričen za vse štiri primere, zato bomo prikazali le enega, namreč primer, ko na levi tik pred rezom vpeljemo formulo  $\forall xA$ .

$$\text{L}\forall \frac{\Gamma, C, A[t/x] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, C, \forall x A \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', \forall x A \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}$$

↓

$$\frac{\Gamma, C, A[t/x] \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', A[t/x] \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\ \frac{\Gamma, \Gamma', A[t/x] \Rightarrow \Delta, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', \forall x A \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{L}\forall$$

Lotimo se sedaj eksponentov. Začnimo s primerom, kjer je bila nad rezom ravnokar vpeljana formula  $!A$ , s skrčitvijo, ošibitvijo ali levim pravilom vpeljave. Vsi ti primeri so si enaki, zato obravnavajmo le skrčitev.

$$\text{C}! \frac{\Gamma, C, !A, !A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, C, !A \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', !A \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez}$$

↓

$$\frac{\Gamma, C, !A, !A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', !A, !A \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez} \\ \frac{\Gamma, \Gamma', !A, !A \Rightarrow \Delta, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', !A \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{C}!$$

Primeri, ko je bila vpeljana formula  $?A$  s skrčitvijo, ošibitvijo ali desnim pravilom vpeljave, so prav tako enaki, zato jih ne bomo obravnavali. Pri desnem pravilu vpeljave formule  $!A$  ter pri levem pravilu vpeljave formule  $?A$  pa se je treba malce bolj potruditi. Primera sta zopet simetrična, zato si oglejmo le desno pravilo vpeljave formule  $!A$ . Da smo lahko kot sklep sploh vpeljali formulo  $!A$ , je morala biti formula  $C$ , ki jo režemo, oblike  $!C$ .

$$\text{R}! \frac{! \Gamma, !C \Rightarrow A, ?\Delta}{! \Gamma, !C \Rightarrow !A, ?\Delta} \quad \frac{\Gamma' \Rightarrow !C, \Delta'}{! \Gamma, \Gamma' \Rightarrow !A, ?\Delta, \Delta'} \text{Rez}$$

Tu pa nastopi težava, saj drevesa izpeljave ne moremo preoblikovati, ne da bi vedeli kaj več o desnem poddrevesu nad rezom.

$$\frac{! \Gamma, !C \Rightarrow A, ?\Delta \quad \Gamma' \Rightarrow !C, \Delta'}{! \Gamma, \Gamma' \Rightarrow A, ?\Delta, \Delta'} \text{Rez} \\ ?$$

Če namreč  $\Gamma'$  ni oblike  $! \Gamma'$  in  $\Delta'$  ni oblike  $? \Delta'$ , desnega pravila vpeljave za veznik  $!$  ne moremo več uporabiti. Ločiti je treba primera, ko je bila formula  $!C$  na desni ravnokar vpeljana z desnim pravilom vpeljave veznika  $!$  in ko ni bila. Če formula  $!C$  ni bila ravnokar vpeljana, je moral biti vpeljan nek drug veznik, vse take primere, razen seveda  $\text{R}!$ , pa smo že obravnavali, ne da bi nam bilo pomembno, kaj se dogaja v drugem poddrevesu. Vendar pa se primer, ko na desni uporabimo pravilo  $\text{R}!$ , a z njim ne upeljemo formule  $!C$ , ne more zgoditi. Drevo izpeljave bi namreč želelo izgledati tako:

$$\text{R!} \frac{\frac{! \Gamma, !C \Rightarrow A, ?\Delta}{! \Gamma, !C \Rightarrow !A, ?\Delta} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow !C, B, ?\Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !C, ?B, ?\Delta'} \text{R!}}{! \Gamma, !\Gamma' \Rightarrow !A, ?B, ?\Delta, ?\Delta'} \text{Rez}$$

Toda se rdeče obarvano pravilo R! ni moglo zgoditi, saj kontekst na desni ni bil v celoti predznačen z veznikom ?. Tako je v resnici treba obravnavati le primer, ko je na desni vpeljana prav formula !C.

$$\text{R!} \frac{\frac{! \Gamma, !C \Rightarrow A, ?\Delta}{! \Gamma, !C \Rightarrow !A, ?\Delta} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow C, ?\Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !C, ?\Delta'} \text{R!}}{! \Gamma, !\Gamma' \Rightarrow !A, ?\Delta, ?\Delta'} \text{Rez}$$

↓

$$\frac{! \Gamma, !C \Rightarrow A, ?\Delta \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow C, ?\Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !C, ?\Delta'} \text{R!}}{! \Gamma, !\Gamma' \Rightarrow A, ?\Delta, ?\Delta'} \text{Rez} \text{R!}$$

Enak problem nastane, če je formula !A vpeljana z desnim pravilom vpeljave v desnem poddrevesu nad rezom. V tem primeru je morala formula C biti oblike ?C in je bila v levem poddrevesu vpeljana kot predpostavka. To ima seveda enako rešitev kot primer zgoraj.

#### 4.2.4 Eliminacija posplošenega reza, ki ni glaven

Kot smo že omenili, ko smo vpeljali posplošeni pravili reza, je potrebno vse korake indukcije opraviti tudi zanj. Pravili  $\text{Rez!}_n$  ter  $\text{Rez?}_n$  sta si simetrični, zato bomo zopet obravnavali le pravilo  $\text{Rez!}_n$ . Drevo izpeljave, ki ga torej obravnavamo v tem poglavju je sledeče.

$$\frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta \quad \Gamma' \Rightarrow !A, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'} \text{Rez!}_n$$

Posplošeni glavni rez smo že obravnavali, zato nam zopet preostane primer, ko smo v enem izmed poddreves tik nad rezom ravnokar vpeljali neko drugo formulo. Za razliko od prejšnjega poglavja, je tokrat pomembno, ali se je to zgodilo na levem ali desnem poddrevesu, saj ti nista več simetrični. Če je bila nova formula vpeljana na desni strani nad rezom, je to ne glede na veznik, ki je bil vpeljan, popolnoma enako primerom iz prejšnjega poglavja. Tam smo namreč rezali le eno formulo C, za katero nam ni bilo pomembno, ali je oblike !C ali ne, prav tako pa ni bilo pomembno, kakšne oblike ali kako je bil vpeljan C v drugem poddrevesu nad rezom. Edino pravilo vpeljave, ki je bilo na to pozorno, je bilo pravilo R! (ter seveda L?), ki pa se zopet ne moreta pojaviti kot zadnji pravili v desnem poddrevesu, saj nabor sklepov v sekventu  $\Gamma' \Rightarrow !A, ?\Delta'$  ni oblike  $?\Delta''$ .

Preostane nam torej preveriti, kaj se zgodi, ko je formula !A na v desnem poddrevesu ravnokar vpeljana. Obravnavamo torej naslednje drevo izpeljave.

$$\frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow A, ? \Delta'}{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'} \text{R!}}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow ? \Delta, \Delta'} \text{Rez!}_n$$

Sedaj moramo ločiti primere glede na to, kaj je bilo zadnje pravilo uporabljeno v levem poddrevesu nad rezom. Obravnavali bomo le nekaj nazornih primerov, začenši z desnim pravilom za veznik  $\sqcap$ . Desnega pravila vpeljave formule  $!A$  ne bomo pisali vsakič posebej, saj ni relevantno za korak indukcije. Kar je pomembno pri tem, da je bilo to pravilo ravnokar uporabljeno, sta le konteksta  $! \Gamma$  ter  $? \Delta$ , kot bomo videli pri nekaterih izmed obravnavanih primerov.

$$\begin{array}{c} \text{R}\sqcap \frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow B, \Delta \quad \Gamma, (!A)^n \Rightarrow C, \Delta}{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow B \sqcap C, \Delta} \quad \frac{! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow B \sqcap C, \Delta, ? \Delta'} \text{Rez!}_n \\ \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Rez!}_n \frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow B, \Delta \quad ! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow B, \Delta, ? \Delta'} \quad \frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow C, \Delta \quad ! \Gamma' \Rightarrow !A, ? \Delta'}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow C, \Delta, ? \Delta'} \text{Rez!}_n \\ \text{R}\sqcap \frac{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow B, \Delta, ? \Delta' \quad \Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow C, \Delta, ? \Delta'}{\Gamma, ! \Gamma' \Rightarrow B \sqcap C, \Delta, ? \Delta'} \end{array}$$

Kot lahko vidimo je korak indukcije, kjer formule  $(!A)^n$  ostanejo nespremenjene, čisto enak primerom, kjer obravnavamo navadni rez, saj dejstvo, da je bilo rezanih več formul naenkrat ne pride v poštev. Zato bomo obravnavali le še primer, kjer se predpostavke v pravilu vpeljave razdelijo na dva dela. Dober primer takega pravila je  $\text{R}\star$ .

$$\text{R}\star \frac{\Gamma, (!A)^p \Rightarrow B, \Delta \quad \Gamma', (!A)^q \Rightarrow C, \Delta'}{\Gamma, \Gamma', (!A)^{p+q} \Rightarrow B \star C, \Delta, \Delta'} \quad \frac{! \Gamma'' \Rightarrow !A, ? \Delta''}{\Gamma, \Gamma', ! \Gamma'' \Rightarrow B \star C, \Delta, \Delta', ? \Delta''} \text{Rez!}_{p+q}$$

$\downarrow$

$$\begin{array}{c} \text{Rez!}_p \frac{\Gamma, (!A)^p \Rightarrow B, \Delta \quad ! \Gamma'' \Rightarrow !A, ? \Delta''}{\Gamma, ! \Gamma'' \Rightarrow B, \Delta, ? \Delta''} \quad \frac{\Gamma', (!A)^q \Rightarrow C, \Delta' \quad ! \Gamma'' \Rightarrow !A, ? \Delta''}{\Gamma', ! \Gamma'' \Rightarrow C, \Delta', ? \Delta''} \text{Rez!}_q \\ \text{R}\star \frac{\Gamma, \Gamma', ! \Gamma'', ! \Gamma'' \Rightarrow B \star C, \Delta, \Delta', ? \Delta'', ? \Delta''}{\Gamma, \Gamma', ! \Gamma'' \Rightarrow B \star C, \Delta, \Delta', ? \Delta'', ? \Delta''} \text{C!} \times |\Gamma''| \\ \frac{\Gamma, \Gamma', ! \Gamma'' \Rightarrow B \star C, \Delta, \Delta', ? \Delta'', ? \Delta''}{\Gamma, \Gamma', ! \Gamma'' \Rightarrow B \star C, \Delta, \Delta', ? \Delta''} \text{C?} \times |\Delta''| \end{array}$$

Tu je bilo res pomembno, da so bile predpostavke v desnem poddrevesu oblike  $! \Gamma''$ , sklepi pa oblike  $? \Delta''$ , saj smo jih tako lahko dvakrat uporabili.

Z zgornjim poddrevesom smo prikazali, kako bi korak indukcije potekal za vsa pravila, kjer je število formul, ki jih režemo naenkrat, pomembno, torej pravila, kjer se predpostavke delijo na dva. S tem pa smo tudi obdelali vse možne korake indukcije tega dokaza.

#### 4.2.5 Baza indukcije

Začnimo z bazo indukcije na navadnem rezu. Vrnimo se k opisu indukcije, kot je definirana na začetku tega podpoglavja, torej 4.2 in se zopet nanašajmo na poddrevesi nad rezom s simboloma  $\mathcal{D}_0$  in  $\mathcal{D}_1$ . Baza zunanje indukcije v tem kontekstu pomeni, da je vsaj eden izmed  $\mathcal{D}_0$  ter  $\mathcal{D}_1$  list, torej pravilo aksioma, ter da tisto pravilo, ki ni list, že ne vsebuje pravila rez. Potrebno je dokazati, da lahko take vrste drevo izpeljave preobrazimo v drevo izpeljave brez rezov. Oglejmo si torej primer, ko je  $\mathcal{D}_0$  list,  $\mathcal{D}_1$  pa ni. Obratno je seveda simetrično.

$$\frac{\frac{}{A \Rightarrow A} \text{Ax} \quad \Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \Rightarrow \Delta} \text{Rez}$$

$$\downarrow$$

$$\Gamma, A \Rightarrow \Delta$$

Kot lahko vidimo je to precej trivialen korak, saj rezanje formule, ki je bila ravnokar vpeljana z aksiomom, ne spremeni ničesar.

**Opomba 4.14.** Baze notranje indukcije nam ni treba posebej obravnavati, saj je bila pravzaprav obravnavana že v podpoglavju 4.2.3. Če je namreč rezana formula osnovna formula, ni bila vpeljana v nobenem poddrevesu nad rezom, saj lahko vpeljemo le sestavljene formule. Pokazali smo, da lahko vsak tak rez premaknemo višje in s tem zadostimu koraku zunanje indukcije, kar pa je ravno baza notranje indukcije.

Oglejmo si še bazo indukcije pri posplošenem rezu, zopet le pri pravilu  $\text{Rez}!_n$ . Tokrat se je aksiom kot zadnje pravilo lahko seveda pojavil le v desnem poddrevesu nad rezom, saj je na levi nujno več kot ena predpostavka v sekventu, drugače bi to bil le navadni rez.

$$\frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta \quad \frac{}{!A \Rightarrow !A} \text{Ax}}{\Gamma, !A \Rightarrow \Delta} \text{Rez}!_n$$

$$\downarrow$$

$$\frac{\Gamma, (!A)^n \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !A \Rightarrow \Delta} \text{C!} \times (n-1)$$

Tudi ta korak dokaza je dokaj enostaven, saj je bistvo veznika  $!$  ravno to, da je število formul  $!A$  – na levi strani sekventa – nepomembno.

S tem smo dokaz izreka o eliminaciji rezov zaključili, saj smo obdelali vse primere koraka indukcije ter bazni primer za obe vrsti rezov.