

Escadinha

Nome do arquivo: “**escadinha.x**”, onde **x** deve ser **cpp**, **pas**, **java**, **js**, **py2** ou **py3**

Dizemos que uma sequência de números é uma *escadinha*, se a diferença entre números consecutivos é sempre a mesma. Por exemplo, “2, 3, 4, 5” e “10, 7, 4” são escadinhas. Note que qualquer sequência com apenas um ou dois números também é uma escadinha!

Neste problema estamos procurando escadinhas em uma sequência maior de números. Dada uma sequência de números, queremos determinar quantas escadinhas existem. Mas só estamos interessados em escadinhas tão longas quanto possível. Por isso, se uma escadinha é um pedaço de outra, consideramos somente a maior. Por exemplo, na sequência “1, 1, 1, 3, 5, 4, 8, 12” temos 4 escadinhas diferentes: “1, 1, 1”, “1, 3, 5”, “5, 4” e “4, 8, 12”.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N indicando o tamanho da sequência de números. A segunda linha contém N inteiros definindo a sequência.

Saída

Imprima uma linha contendo um inteiro representando quantas escadinhas existem na sequência

Restrições

- $1 \leq N \leq 1000$
- O valor dos números da sequência está entre -10^6 e 10^6 inclusive.

Exemplo de entrada 1 8 1 1 1 3 5 4 8 12	Exemplo de saída 1 4
Exemplo de entrada 2 1 112	Exemplo de saída 2 1
Exemplo de entrada 3 5 11 -106 -223 -340 -457	Exemplo de saída 3 1