


Sistema de Partículas

Tenemos N partículas puntuales




Cada partícula está sometida a interacciones con las otras partículas del sistema y con el exterior.

La Fuerza neta sobre cada partícula genera la aceleración que ésta siente.

$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i$$


Esta fuerza neta la descomponemos en fuerzas externas e internas.

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(ext)} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ij} \quad (1)$$



Donde $\vec{F}_i^{(ext)}$ es la resultante de las interacciones con el exterior y \vec{F}_{ij} es la fuerza que siente la partícula i debido a su interacción con la partícula j .

Sistema de Partículas: Centro de masa



Definimos el Centro de Masa (CM) como un punto que representa el promedio de las posiciones de los elementos, pesados por su masa.

$$\vec{R}_{CM} \equiv \frac{1}{M_T} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \quad \text{donde} \quad M_T = \sum_{i=1}^N m_i$$

El CM es un punto singular, ya que visto de otro sistema de referencia, el vector \vec{R}_{CM} apunta al mismo lugar.

Como $\vec{r}_i^{(1)} = \vec{R}_{O_2O_1} + \vec{r}_i^{(2)}$, resulta entonces que

$$\vec{R}_{CM}^{(1)} = \frac{1}{M_T} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i^{(1)} = \frac{1}{M_T} \sum_{i=1}^N m_i (\vec{R}_{O_2O_1} + \vec{r}_i^{(2)}) = \frac{1}{M_T} \sum_{i=1}^N m_i \vec{R}_{O_2O_1} + \frac{1}{M_T} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i^{(2)}$$



$$\vec{R}_{CM}^{(1)} = \vec{R}_{O_2O_1} + \vec{R}_{CM}^{(2)}$$

Como los dos vectores \vec{R}_{CM} se relacionan entre sí como cualquier par de vectores Vistos desde cada SR, entonces apuntan al mismo lugar.

Sistema de Partículas: momento lineal

Definimos, para cada partícula del sistema, un vector llamado momento o impulso lineal o cantidad de movimiento.

$$\vec{p}_i \equiv m_i \vec{v}_i \quad 1 \leq i \leq N$$

Su derivada temporal es igual a la fuerza neta aplicada para cada partícula.

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i$$

Para un sistema de partículas, la definición se extiende de un modo natural:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

Si definimos velocidad del Centro de Masa como:

$$\vec{V}_{CM} = \frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M_T} \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{M_T} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i \quad \text{nos queda que} \quad \longrightarrow \quad \vec{P} = M_T \vec{V}_{CM}$$

Sistema de Partículas: momento lineal

Por lo tanto, la derivada temporal del momento lineal podemos calcularla por dos caminos:

Por un lado, $\frac{d\vec{P}}{dt} = M_T \frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} = M_T \vec{A}_{CM}$ donde \vec{A}_{CM} es la aceleración del Centro de Masa


Y también, $\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$

Usando la ec. (1) tenemos
$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \underbrace{\sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{(ext)}}_{\vec{F}^{(ext)}} + \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ij} = \vec{F}^{(ext)} + \underbrace{\sum_{\substack{i,j \\ i < j}}^N (\vec{F}_{ij} + \vec{F}_{ji})}_{= 0, \text{ por la 3ra ley}} = \vec{F}^{(ext)}$$

Por lo tanto,
$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^{(ext)} = M_T \vec{A}_{CM}$$

El momento lineal de un sistema solo es afectado por las fuerzas exteriores.

Sistema de Partículas: momento lineal




El sistema de referencia con origen en el Centro de Masa (S_{CM}) es un sistema de referencia singular.

En el S_{CM} el CM, por definición, está siempre en el origen, y esa posición es constante en el tiempo.

$$\vec{R}'_{CM} = \frac{1}{M_T} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}'_i = 0 \quad \forall t$$

$$\therefore \vec{V}'_{CM} = 0, \quad \vec{A}'_{CM} = 0 \quad \forall t$$

Sistema de Partículas: energía cinética



La energía cinética de un sistema de partículas es la extensión natural de su definición para muchos cuerpos.

$$E_C = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i^2 \quad (2)$$


En el sistema S_{CM} , esta expresión será

$$E'_C = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i'^2 \quad \text{donde} \quad \vec{v}_i = \vec{V}_{CM} + \vec{v}'_i$$

Si queremos relacionar las dos expresiones de la energía cinética, veamos que

$$v_i^2 = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i = (\vec{V}_{CM} + \vec{v}'_i) \cdot (\vec{V}_{CM} + \vec{v}'_i) = V_{CM}^2 + 2\vec{V}_{CM} \cdot \vec{v}'_i + v_i'^2$$

Sistema de Partículas: energía cinética



Por lo tanto, la ec. (2) puede escribirse como

$$\begin{aligned}
 E_C &= \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i V_{CM}^2}_{= \left(\sum_{i=1}^N m_i \right) V_{CM}^2 = M_T V_{CM}^2} + \underbrace{\sum_{i=1}^N m_i \vec{V}_{CM} \cdot \vec{v}_i'}_{= \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' \right) \cdot \vec{V}_{CM} = M_T \vec{V}_{CM}' \cdot \vec{V}_{CM} = 0} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_i'^2}_{= E'_C} \\
 &= \left(\sum_{i=1}^N m_i \right) V_{CM}^2 = M_T V_{CM}^2 + E'_C
 \end{aligned}$$

$$\therefore E_C = \frac{1}{2} M_T V_{CM}^2 + E'_C$$

La energía de un sistema de partículas tiene dos contribuciones: una es la energía que tendría una partícula puntual ubicada en el CM, con la velocidad del CM, y otra es la energía cinética vista desde el CM.