

Manual de Fichas Técnicas para Cultivo de Cannabis

1. Fungicidas y Biofungicidas

1.1. Antrasín®

- **Tipo:** Fungicida inorgánico
- **Ingrediente Activo:** Sulfato de cobre y calcio
- **Formulación:** Polvo Mojable (WP)
- **Modo de Acción:** Contacto y preventivo. Actúa multisitio inhibiendo la germinación de esporas.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Fase vegetativa y plantas madre*).
- **Blanco Biológico:** Oídio (Mildeo polvoso), prevención de *Botrytis*.
- **Dosis Recomendada:** 1.5 - 2.0 kg/ha o 1.5 g/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 30 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 24 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar con gota fina para buena cobertura.
- **Compatibilidad:** Incompatible con productos alcalinos.
- **Recomendaciones:** **No aplicar en floración.** El cobre puede manchar las hojas y dejar residuos indeseables en las inflorescencias que arruinarían pruebas de laboratorio (metales pesados).
- **Advertencias:** Altamente tóxico para organismos acuáticos. Evitar en sistemas hidropónicos recirculantes.

1.2. Azimut®

- **Tipo:** Fungicida químico
- **Ingrediente Activo:** Azoxystrobin + Tebuconazole
- **Formulación:** Suspensión Concentrada (SC)
- **Modo de Acción:** Sistémico y translaminar. Efecto preventivo y curativo.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Estrictamente fase vegetativa inicial*).
- **Blanco Biológico:** *Fusarium* spp., *Alternaria*, Mancha foliar (*Septoria*).
- **Dosis Recomendada:** 0.3 - 0.5 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 45 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 12 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar.
- **Compatibilidad:** Compatible con mayoría de insumos, hacer prueba de jarra.
- **Recomendaciones:** Por ser químico sistémico, sus trazas permanecen en la planta. Usar solo en caso de emergencia en plantas madre o clones recién enraizados. Prohibido en cultivo medicinal en floración.
- **Advertencias:** Categoría Toxicológica II. Requiere equipo de protección completo.

1.3. Benomyl®

- **Tipo:** Fungicida químico
- **Ingrediente Activo:** Benomyl
- **Formulación:** Polvo Mojable (WP)
- **Modo de Acción:** Sistémico con acción preventiva y curativa.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Plantas madre, propagación*).
- **Blanco Biológico:** *Fusarium oxysporum*, *Pythium*, *Botrytis* temprana.
- **Dosis Recomendada:** 0.5 g/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 35 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 24 horas.
- **Forma de Aplicación:** Inmersión de esquejes o drench al sustrato.
- **Compatibilidad:** No mezclar con micorrizas ni Trichoderma (las eliminará).
- **Recomendaciones:** Usar exclusivamente para rescatar genéticas (plantas madre) afectadas por marchitez vascular. No usar en plantas destinadas a floración.
- **Advertencias:** Riesgo de toxicidad residual alta.

1.4. EcoSwing®

- **Tipo:** Fungicida de origen botánico
- **Ingrediente Activo:** Alcaloides de rutáceas
- **Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)
- **Modo de Acción:** Contacto. Altera la pared celular de los hongos patógenos.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Vegetativo y primeras semanas de floración*).
- **Blanco Biológico:** Oídio (Peste blanca), Mildeo velloso.
- **Dosis Recomendada:** 1.5 - 2.0 cc/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar al atardecer o con luces apagadas (*indoor*).
- **Compatibilidad:** Compatible con aceites de Neem.
- **Recomendaciones:** Excelente herramienta orgánica para brotes de Oídio. Suspende su uso en la semana 5 de floración para evitar que la humedad de la aspersión propicie Botrytis en los cogollos densos.
- **Advertencias:** Producto seguro, categoría IV.

1.5. Pilzeraz®

- **Tipo:** Fungicida químico
- **Ingrediente Activo:** Prochloraz
- **Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)
- **Modo de Acción:** Penetrante y erradicante.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Cultivos de fibra o semillas, exterior*).
- **Blanco Biológico:** Podredumbre del tallo, Mancha foliar.
- **Dosis Recomendada:** 0.5 - 1.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 30 días.

- **Período de Reingreso (P.R.):** 12 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar.
- **Compatibilidad:** Compatible con insecticidas neutros.
- **Recomendaciones:** Muy útil en cultivos de cáñamo industrial a gran escala sometidos a alta humedad. No recomendado para cannabis medicinal por sus residuos químicos.
- **Advertencias:** Peligroso si se inhala.

1.6. Rhapsody®

- **Tipo:** Biofungicida
- **Ingrediente Activo:** *Bacillus subtilis*
- **Formulación:** Suspensión Concentrada (SC)
- **Modo de Acción:** Colonización competitiva de la rizosfera y filósfera.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Todas las fases, ideal en floración*).
- **Blanco Biológico:** Damping-off (*Pythium, Rhizoctonia*), Oídio foliar.
- **Dosis Recomendada:** 1.0 - 2.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Drench radicular (suelo/coco) o aspersión foliar preventiva.
- **Compatibilidad:** Incompatible con peróxido de hidrógeno (FyBAC 5) o fungicidas químicos.
- **Recomendaciones:** Aplicar desde semilla o clon. En floración, ayuda a proteger las brácteas de infecciones fúngicas sin dejar residuos químicos.
- **Advertencias:** Almacenar a menos de 25°C para mantener la viabilidad de la bacteria.

1.7. Serenade®

- **Tipo:** Biofungicida
- **Ingrediente Activo:** *Bacillus amyloliquefaciens*
- **Formulación:** Suspensión Acuosa (AS)
- **Modo de Acción:** Antagonismo y producción de antibióticos naturales.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Todas las etapas*).
- **Blanco Biológico:** *Botrytis cinerea* (Pudrición del cogollo), Oídio.
- **Dosis Recomendada:** 2.0 - 3.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar fina.
- **Compatibilidad:** Mezclar con un humectante suave orgánico.
- **Recomendaciones:** Es la línea de defensa principal contra *Botrytis* en las últimas semanas de floración cuando los químicos están prohibidos. Asegurar excelente ventilación tras la aplicación para secar los cogollos rápidamente.
- **Advertencias:** No exponer el envase a luz UV directa.

1.8. Timorex Gold®

- **Tipo:** Biofungicida botánico
- **Ingrediente Activo:** Extracto de *Melaleuca alternifolia* (Árbol de té)
- **Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)
- **Modo de Acción:** Curativo temprano. Rompe la membrana celular de los hongos.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Fase vegetativa y pre-flora*).
- **Blanco Biológico:** Oídio resistente.
- **Dosis Recomendada:** 1.0 - 1.5 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días (técnicamente), pero suspender 21 días antes de cosecha.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar con luces apagadas.
- **Compatibilidad:** Orden de mezcla cuidadoso debido a su naturaleza oleosa.
- **Recomendaciones:** Tiene un fuerte olor a terpenos naturales (Tea Tree). No aplicar en floración avanzada porque puede alterar drásticamente el perfil organoléptico (sabor y aroma) final de las flores.
- **Advertencias:** Puede quemar pistilos jóvenes si se aplica a alta concentración.

1.9. Trombo®

- **Tipo:** Biofungicida
- **Ingrediente Activo:** *Trichoderma spp.*
- **Formulación:** Polvo Mojable (WP)
- **Modo de Acción:** Micoparasitismo radicular.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (Aplicación exclusiva al sustrato/raíz).
- **Blanco Biológico:** Hongos patógenos del suelo (*Fusarium, Pythium, Rhizoctonia*).
- **Dosis Recomendada:** 1.0 - 2.0 g/L de agua de riego.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Inoculación inicial del sustrato, riego (drench).
- **Compatibilidad:** Compatible con micorrizas. Incompatible con ácidos fuertes o fungicidas de suelo.
- **Recomendaciones:** Fundamental para proteger el sistema radicular, promover pelos absorbentes y asegurar la absorción máxima de nutrientes. Aplicar en cada trasplante.
- **Advertencias:** Es un hongo vivo; no usar agua con cloro (dejar reposar el agua 24h antes de mezclar).

2. Insecticidas y Bioinsecticidas

2.1. CapsiAlil®

- **Tipo:** Insecticida botánico
- **Ingrediente Activo:** Extractos de ajo-aji
- **Formulación:** Concentrado Soluble (SL)
- **Modo de Acción:** Repelencia y disuasión de la alimentación por irritación.

- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Exterior y vegetativo en indoor*).
- **Blanco Biológico:** Araña roja, Trips, Mosca blanca.
- **Dosis Recomendada:** 2.0 - 4.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días de toxicidad, 15 días organolépticos.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión cubriendo bien el envés de la hoja.
- **Compatibilidad:** Compatible con jabón potásico.
- **Recomendaciones:** Excelente barrera perimetral. **Prohibido en floración** ya que los compuestos de azufre del ajo y la capsaicina arruinarán el sabor y olor de los cogollos de forma irreversible.
- **Advertencias:** Usar mascarilla, extremadamente irritante al respirar la neblina.

2.2. Cipermetrina / Ciperex®

- **Tipo:** Insecticida piretroide químico
- **Ingrediente Activo:** Cipermetrina
- **Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)
- **Modo de Acción:** Contacto e ingestión (Choque nervioso).
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Solo cáñamo industrial exterior o fase de plantines*).
- **Blanco Biológico:** Orugas, Gusanos medidores, Chinchas, Escarabajos.
- **Dosis Recomendada:** 0.5 - 1.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 30 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 24 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar terrestre.
- **Compatibilidad:** Evitar mezclas complejas.
- **Recomendaciones:** Usar solo ante plagas incontrolables en fases muy tempranas. Los piretroides degradan lentamente bajo techo y pueden exceder los límites máximos de residuos (LMR) en dispensarios medicinales.
- **Advertencias:** Altamente tóxico para predadores naturales (crisopas, ácaros depredadores).

2.3. Dipel®

- **Tipo:** Bioinsecticida
- **Ingrediente Activo:** *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* (Btk)
- **Formulación:** Gránulos Dispersables (WG)
- **Modo de Acción:** Ingestión. Destrucción del tracto digestivo de las larvas.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Principalmente cultivos Outdoor/Invernadero*).
- **Blanco Biológico:** Orugas perforadoras (Spodoptera, Heliothis) que causan pudrición de cogollos.
- **Dosis Recomendada:** 0.5 - 1.0 g/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar garantizando cubrimiento total.
- **Compatibilidad:** Mantener pH del tanque entre 6.0 y 7.0.

- **Recomendaciones:** Las orugas al perforar el cogollo abren la puerta a la *Botrytis*. Aplicar preventivamente cuando se observen mariposas volando en el cultivo exterior. Es seguro en floración.
- **Advertencias:** Se degrada rápidamente con luz UV; aplicar al final de la tarde.

2.4. Kandar® / Sistoato®

- **Tipo:** Insecticida organofosforado
- **Ingrediente Activo:** Dimetoato
- **Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)
- **Modo de Acción:** Sistémico (viaja por la savia).
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Estricto: Solo madres de rescate*).
- **Blanco Biológico:** Micro-ácaros severos, Pulgones de raíz, Trips tenaces.
- **Dosis Recomendada:** 1.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 60 días en cannabis.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 48 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión o riego dirigido.
- **Compatibilidad:** No mezclar con bioestimulantes.
- **Recomendaciones: Uso restringido.** Solo para salvar genéticas valiosas en etapa vegetativa que estén al borde de la muerte por plagas sistémicas. Totalmente prohibido en el ciclo productivo de flores debido a la altísima toxicidad residual.
- **Advertencias:** Extremadamente peligroso. Categoría II.

2.5. Max Control®

- **Tipo:** Insecticida químico
- **Ingrediente Activo:** Derivados de trifenilcarbinol
- **Formulación:** Suspensión Concentrada (SC)
- **Modo de Acción:** Afecta el metabolismo energético (acaricida específico).
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Fase vegetativa y transición*).
- **Blanco Biológico:** Araña roja (*Tetranychus urticae*), microácaros.
- **Dosis Recomendada:** 0.5 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 21 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 12 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar empapando el envés de la hoja.
- **Compatibilidad:** Funciona mejor solo, ajustando el agua a pH 6.0.
- **Recomendaciones:** La Araña Roja es la plaga #1 en *indoor*. Usar para romper el ciclo de la plaga antes de cambiar a fotoperiodo 12/12. No pulverizar sobre tricomas desarrollados.
- **Advertencias:** Si se abusa de la dosis, puede causar deformación en los ápices de crecimiento.

2.6. NeemAzal®

- **Tipo:** Bioinsecticida botánico
- **Ingrediente Activo:** Azadiractina (Extracto puro de Neem)

- **Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)
- **Modo de Acción:** Inhibidor de muda (regulador de crecimiento) y antialimentario.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Todas las etapas, preferible veg*).
- **Blanco Biológico:** Mosca del sustrato (Fungus gnats), Pulgones, Araña roja.
- **Dosis Recomendada:** 1.5 - 2.5 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Foliar para ácaros/trips, riego (drench) para mosca del sustrato.
- **Compatibilidad:** Altamente compatible. Mezclar con jabón potásico para emulsionar mejor.
- **Recomendaciones:** Fundamental en el manejo integrado (MIP) del cannabis. Usar en riegos preventivos cada 15 días mantiene el sustrato limpio de larvas de *Sciaridae* (Mosca del sustrato).
- **Advertencias:** El aceite puede tapar los estomas; no sobre-aplicar foliarmente.

2.7. Rutinal®

- **Tipo:** Insecticida botánico
- **Ingrediente Activo:** Extracto de ruda
- **Formulación:** Concentrado Soluble (SL)
- **Modo de Acción:** Repelencia de contacto.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Vegetativo y esquejes*).
- **Blanco Biológico:** Mosca blanca, pulgones.
- **Dosis Recomendada:** 2.0 - 3.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar ligera.
- **Compatibilidad:** No usar con aceites densos.
- **Recomendaciones:** Ideal para mantener limpios los armarios de esquejado (clonación). Como con el ajo, no usar en floración para evitar sabores amargos en la resina.
- **Advertencias:** Puede causar fitotoxicidad a plántulas menores a 10 días.

2.8. Sáfer SL®

- **Tipo:** Insecticida botánico
- **Ingrediente Activo:** Extractos vegetales de asteráceas (Piretrinas naturales)
- **Formulación:** Concentrado Soluble (SL)
- **Modo de Acción:** Choque nervioso por contacto (derribe rápido).
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Vegetativo y primera mitad de flora*).
- **Blanco Biológico:** Trips, Mosca blanca, adultos voladores.
- **Dosis Recomendada:** 2.0 - 3.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 3 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión directa sobre las plagas.
- **Compatibilidad:** Evitar luz directa durante aplicación.

- **Recomendaciones:** Las piretrinas naturales se degradan muy rápido (en 24h con luz), lo que las hace muy seguras para limpiar un cuarto *indoor* antes de entrar a floración pesada.
- **Advertencias:** Es tóxico para insectos benéficos; apagar ventiladores durante la aplicación y esperar 24h antes de liberar ácaros depredadores (ej. *Phytoseiulus*).

2.9. Sparta®

- **Tipo:** Bioinsecticida
- **Ingrediente Activo:** Spinosad (Fermentación de *Saccharopolyspora spinosa*)
- **Formulación:** Suspensión Concentrada (SC)
- **Modo de Acción:** Ingestión y contacto. Parálisis nerviosa.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Todas las etapas*).
- **Blanco Biológico:** Trips (*Frankliniella occidentalis*), Minadores, Orugas.
- **Dosis Recomendada:** 0.5 - 1.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 7 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 12 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión foliar fina.
- **Compatibilidad:** Compatible con mayoría de biológicos.
- **Recomendaciones:** El estándar de oro orgánico para el control de trips en cannabis. Altamente eficaz. Se puede usar hasta pocas semanas antes de la cosecha ya que sus residuos son mínimos y orgánicos.
- **Advertencias:** Agitar vigorosamente antes de dosificar.

3. Acción Mixta, Nematicidas y Desinfectantes

3.1. Alisín®

- **Tipo:** Insecticida / Fungicida botánico
- **Ingrediente Activo:** Extractos de ajo-aji + compuestos azufrados.
- **Formulación:** Líquido Soluble (SL)
- **Modo de Acción:** Repelente e irritante multipropósito.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Exclusivo para fase de crecimiento exterior*).
- **Blanco Biológico:** Prevención general de ácaros y oídio temprano.
- **Dosis Recomendada:** 3.0 - 5.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 21 días (por sabor/olor).
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión preventiva semanal.
- **Compatibilidad:** No mezclar con bacterias beneficiosas foliares.
- **Recomendaciones:** Solo usar en exterior durante el periodo vegetativo (primavera/verano). Crea una película disuasoria para casi todo tipo de plaga voladora.
- **Advertencias:** El olor en un cultivo *indoor* será insoportable y puede transferirse a los filtros de carbón.

3.2. FyBAC 5™

- **Tipo:** Desinfectante / Fungicida / Oxigenador
- **Ingrediente Activo:** Peróxido de hidrógeno (H₂O₂) + ácido peroxiacético
- **Formulación:** Solución Acuosa (AS)
- **Modo de Acción:** Oxidación severa de membranas. Se descompone en agua y oxígeno puro.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Hidroponía, limpieza de instalaciones, lavado de raíces*).
- **Blanco Biológico:** Algas en tanques, bacterias patógenas, desinfección de tijeras, *Botrytis* en flor de emergencia.
- **Dosis Recomendada:** 1.0 - 2.0 ml/L (Riego/Hidro), 5.0 ml/L (Desinfección de cuartos).
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 1 hora.
- **Forma de Aplicación:** Recirculación en tanque, aspersión a paredes y macetas, lavado post-cosecha ("Bud washing").
- **Compatibilidad:** **Destruye instantáneamente micorrizas, Trichoderma, y Bacillus.** Aplicar solo.
- **Recomendaciones:** Esencial en *indoor* para mantener líneas de riego por goteo limpias de biofilm. También se usa a dosis muy bajas para oxigenar raíces asfixiadas por exceso de riego.
- **Advertencias:** Altamente reactivo en su forma pura. Puede causar quemaduras en la piel al dosificar.

3.3. L'EcoMix®

- **Tipo:** Insecticida / Fungicida botánico
- **Ingrediente Activo:** Extractos vegetales y aceites esenciales cítricos/canela.
- **Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)
- **Modo de Acción:** Asfixia física de huevos y disolución de exoesqueletos blandos.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Vegetativo*).
- **Blanco Biológico:** Huevos de araña roja, Fumagina, limpieza de melaza de pulgones.
- **Dosis Recomendada:** 2.0 - 4.0 ml/L.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Lavado a presión media (Ducha foliar).
- **Compatibilidad:** No usar con iluminación LED al 100% (causa efecto lupa y quema hojas).
- **Recomendaciones:** Útil como "lavado" físico cuando las plantas están llenas de polvo o telarañas en estadios tempranos. **Nunca aplicar sobre cogollos** ya que disolverá los tricomas (las glándulas de resina son liposolubles y los aceites las destruyen).
- **Advertencias:** Apagar lámparas durante la aplicación hasta que la planta esté seca.

3.4. Nemaquil®

- **Tipo:** Nematicida botánico
- **Ingrediente Activo:** Extractos de lamiáceas y quillay.
- **Formulación:** Suspensión Concentrada (SC)

- **Modo de Acción:** Contacto e inmovilización de nematodos fitopatógenos.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Cultivo en suelo madre, exterior o invernadero rústico*).
- **Blanco Biológico:** Nematodos agalladores de la raíz (*Meloidogyne spp.*).
- **Dosis Recomendada:** 5.0 ml/L en riego.
- **Período de Carencia (P.C.):** 0 días.
- **Período de Reingreso (P.R.):** 4 horas.
- **Forma de Aplicación:** Drench radicular abundante para saturar el perfil del suelo.
- **Compatibilidad:** Compatible con enraizadores.
- **Recomendaciones:** Si se cultiva en sustratos inertes (coco, lana de roca), este producto es innecesario. Su uso se limita a cultivos orgánicos de exterior donde el suelo nativo presenta agallas en las raíces.
- **Advertencias:** Mantener humedad alta en el suelo por 48 horas post-aplicación.

3.5. Polycal®

- **Tipo:** Fungicida / Acaricida inorgánico
- **Ingrediente Activo:** Polisulfuro de calcio (Azufre calcáreo)
- **Formulación:** Líquido Soluble (SL)
- **Modo de Acción:** Efecto cáustico extremo sobre esporas e insectos. Emisión de gases sulfurosos.
- **Cultivos Recomendados:** Cannabis (*Solo desinfección de instalaciones vacías o madres muy leñosas*).
- **Blanco Biológico:** Erradicación total de Ácaros y Oídio resistente.
- **Dosis Recomendada:** 2.0 - 5.0 ml/L (Depende de si hay tejido vegetal vivo).
- **Período de Carencia (P.C.):** N/A (No aplicar a plantas en producción).
- **Período de Reingreso (P.R.):** 24 - 48 horas.
- **Forma de Aplicación:** Aspersión al cuarto de cultivo vacío o pincelado a tallos principales gruesos.
- **Compatibilidad:** Altamente incompatible con absolutamente todo.
- **Recomendaciones:** Es una herramienta de "botón nuclear". Se utiliza para fumigar carpas (*grow tents*) o cuartos enteros *después* de una cosecha que sufrió una infestación grave de Araña Roja u Oídio, antes de meter el siguiente ciclo de plantas.
- **Advertencias:** Altamente fitotóxico para follaje tierno de cannabis. Olor a huevo podrido intenso. Corrosivo para metales (reflectores, ventiladores).