

Medidas de tendencia central

■ Esperanza

La esperanza, media o valor esperado de una variable aleatoria discreta X es el promedio ponderado de los valores del rango de X según las probabilidades de que X tome cada uno de estos valores. Así, se define la esperanza como:

$$E(X) = \mu_X = \sum_{k \in R_X} k \cdot f_X(k)$$

■ Varianza

Si X es una variable aleatoria discreta tal que $E(X^2)$ converge y $E(X) = \mu_X$, se define la varianza de X como:

$$Var(X) = \sigma_X^2 = E[(X - \mu_X)^2]$$

Este parámetro indica qué tanto varían los valores de la variable con respecto a su esperanza y permite medir la variabilidad de la distribución.

Sea X una variable aleatoria discreta, entonces se cumple que:

donde

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

\downarrow Esperanza normal \downarrow Esperanza al cuadrado

$$E(X^2) = \sum_{k \in R_X} k^2 \cdot f_X(k)$$

o sea, los $E(X^2)$ no es esperanza al cuadrado, sino todas las k al cuadrado

■ Desviación estándar

Sea X es una variable aleatoria discreta. Se define la desviación estándar de X como:

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)}$$

Sea X una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad f_X está dada por la siguiente

tabla:

X	0	1	2	3	4
$f_X(x)$	$\frac{7}{17}$	$\frac{1}{17}$	$\frac{2}{17}$	$\frac{3}{17}$	$\frac{4}{17}$

su suma debe ser 1

a) Calcule $E(X)$

R/ $\frac{30}{17}$

$$E(X) = \sum x \cdot f(x) \quad \text{o sea}$$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{7}{17} + 1 \cdot \frac{1}{17} + 2 \cdot \frac{2}{17} + 3 \cdot \frac{3}{17} + 4 \cdot \frac{4}{17}$$

$$\boxed{\frac{30}{17}}$$

b) Calcule $Var(X)$

R/ $\frac{800}{289}$

$$\left[0^2 \cdot \frac{7}{17} + 1^2 \cdot \frac{1}{17} + 2^2 \cdot \frac{2}{17} + 3^2 \cdot \frac{3}{17} + 4^2 \cdot \frac{4}{17} \right] - \left(\frac{30}{17} \right)^2$$

$$\boxed{\frac{800}{289}}$$

c) Calcule σ_X

$$R/\frac{20\sqrt{2}}{17}$$

$$\sqrt{\frac{800}{289}} = \frac{20\sqrt{2}}{17}$$

Función de distribución

Representación mediante arreglo

En forma de arreglo, una función de distribución de probabilidad puede verse como:

$$\begin{cases} P(X_i = x) & \text{si } x = a \\ P(X_i = x) & \text{si } x = b \\ \vdots & \\ P(X_i = x) & \text{si } x = n \end{cases}$$

con $a, b, \dots, n \in R_X$ e $i = 0, 1, 2, \dots$

ES como la tabla de la forma

Sea X una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad f_X está dada por la siguiente tabla:

X	0	1	2	3	4
$f_X(x)$	$\frac{7}{17}$	$\frac{1}{17}$	$\frac{2}{17}$	$\frac{3}{17}$	$\frac{4}{17}$

Handwritten notes: $x=0 \uparrow$, $x=1 \uparrow$, $x=2 \uparrow$, $x=3 \uparrow$, $x=4 \uparrow$

Función de distribución acumulada

Representación mediante arreglo

En forma de arreglo, una función de distribución acumulada puede verse como:

$$\begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ P(X_i = x) & \text{si } a \leq x < b \\ P(X_i = x) & \text{si } b \leq x < c \\ \vdots & \\ 1 & \text{si } x \geq n \end{cases}$$

con $a, b, c, \dots, n \in R_X$ e $i = 0, 1, 2, \dots$

Se tiene una tarjeta con un 100 marcado, dos con un 200 marcado y tres con un 300 marcado. Una persona saca aleatoriamente tres tarjetas. Si X es el total que suman las tres tarjetas:

a) Determine la función de distribución.

Casos posibles:

1 de cada una: $1 \cdot 100 + 1 \cdot 200 + 1 \cdot 300 = 600$

1 de 100 y 2 de 200: 500

1 de 100 y 2 de 300: 700

1 de 200 y 2 de 300: 800

2 de 200 y 1 de 300: 700

3 de 300: 900

Espacio muestral

x	500	600	700	800	900
$f_X(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

\rightarrow Rango

\rightarrow Probabilidad $\frac{CF}{CT}$

\uparrow Hay 2 que dan 700

b) Calcule $E(X)$

$$500 \cdot \frac{1}{6} + 600 \cdot \frac{1}{6} + 700 \cdot \frac{2}{6} + 800 \cdot \frac{1}{6} + 900 \cdot \frac{1}{6}$$

$$\boxed{700}$$

c) Calcule $Var(X)$

$$\left[500^2 \cdot \frac{1}{6} + 600^2 \cdot \frac{1}{6} + 700^2 \cdot \frac{2}{6} + 800^2 \cdot \frac{1}{6} + 900^2 \cdot \frac{1}{6} \right] - (700)^2$$

$$= \boxed{\frac{50000}{3}}$$

d) Halle la función acumulada

x	500	600	700	800	900
$f_x(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

F mayúscula
= Acumulada

$F_x(x)$

$$\begin{cases} 0 & \text{si } x < 500 \\ \frac{1}{6} & \text{si } 500 \leq x < 600 \\ \frac{1}{6} + \frac{1}{6} & 600 \leq x < 700 \\ \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} & 700 \leq x < 800 \\ \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} & 800 \leq x < 900 \\ \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} & x \geq 900 \end{cases}$$

Aquí siempre empieza en 0
y se van sumando o
"acumulando" los valores

el último es todos
sumados y deber dar 1

Una persona paga 400 colones por jugar el juego Azules. Este consiste en sacar sucesivamente, sin devolver, dos bolas de una canasta con cinco bolas blancas y tres azules. Por cada bola azul obtenida, gana 300 colones. Sea X el número de bolas azules obtenidas en las dos extracciones.

a) Determine el rango de X .

$R/ \{0, 1, 2\}$

5 Blancas 3 Azules, 8 en total

Puedo sacar 0, 1, 2 Azules como máximo

$R/ \{0, 1, 2\}$

b) Determine la función de distribución de probabilidad. $X =$ (cantidad) de bolas azules

$x = 0 \rightarrow BB$

$x = 1 \rightarrow BA, AB$

$x = 2 \rightarrow AA$

x	0	1	2
$f_x(x)$	$\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$	$\frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{28}$	$\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{28}$

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{5}{14} & \text{si } x = 0 \\ \frac{15}{28} & \text{si } x = 1 \\ \frac{3}{28} & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

c) Determine $E(X)$

x	0	1	2
$P_x(x)$	$\frac{5}{17}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$

$$0 \cdot \frac{5}{17} + 1 \cdot \frac{15}{28} + 2 \cdot \frac{3}{28} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

d) Determine $Var(X)$

$$\left[0^2 \cdot \frac{5}{17} + 1^2 \cdot \frac{15}{28} + 2^2 \cdot \frac{3}{28} \right] - \left(\frac{3}{4} \right)^2 = \boxed{\frac{45}{112}}$$

e) Sea G la ganancia al jugar Azules. Expresa G en términos de X . R/ $300X - 400$

Segun enunciado: Por cada Bola Azul, gana 300 y paga 400 por jugar

Entonces sea x la cantidad de bolas azules obtenidas

$$\therefore \boxed{G = 300x - 400} \leftarrow \begin{array}{l} \text{Precio por jugar} \\ \text{Por cada Azul} \end{array}$$

Por cada Azul Cantidad de Azules obtenidas

Promedio

f) Determine la ganancia esperada del juego ¿es justo?

R/ -175, no

Para determinar algo esperado se aplica $E(X)$ a ambos lados

$$\begin{aligned} G &= 300x - 400 \\ E(G) &= E(300x - 400) \\ &= E(300x) + E(-400) \\ &= 300 E(x) - 400 \\ &= 300 \cdot \frac{3}{4} - 400 \quad \text{Ingreso } C \\ &= -175 \end{aligned}$$

N/ -175, no es justo

Formulas importantes

$$E(x \pm y) = E(x) + E(\pm y)$$

$$E(c \cdot x) = c \cdot E(x)$$

$$E(c) = c$$

c Constante $\in \mathbb{R}$

g) Determine la varianza de G .

$$R/\frac{253125}{7}$$

Para determinar Var de algo
se aplica $\text{Var}(x)$ a ambos lados

$$G = 300X - 700$$

$$\text{Var}(G) = \text{Var}(300X - 700)$$

$$= \text{Var}(300X) + \text{Var}(-700)$$

$$= 300^2 \text{Var}(X) + 0$$

$$= 300^2 \cdot \frac{75}{112}$$

$$= \frac{253125}{7}$$

Formulas importantes

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(\pm Y)$$

$$\text{Var}(cX) = c^2 \text{Var}(X)$$

$$\text{Var}(c) = 0$$

$$c \text{ constante} \in \mathbb{R}$$

Propiedades de la esperanza

Sea c una constante y sea X una variable aleatoria discreta tal que $E(X)$ existe, entonces, se tiene que:

1. $E(c) = c$
2. $E(X + c) = E(X) + c$
3. $E(cX) = c \cdot E(X)$
4. Si $E(X)$ y $E(Y)$ existen, entonces $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

Propiedades de la varianza

Sea c una constante y sean X, Y variables aleatorias discretas, entonces, se tiene que:

1. $\text{Var}(c) = 0$
2. $\text{Var}(X + c) = \text{Var}(X)$
3. $\text{Var}(cX) = c^2 \cdot \text{Var}(X)$
4. Si X y Y son variables independientes, entonces $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

Sean X, Y dos variables aleatorias discretas tales que $\text{Var}(3X + 7) = 10$, $E(4X + 2) = 9$.

Calcule $E(X^2)$

R/ $\frac{601}{144}$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

$$E(X^2) = \text{Var}(X) + \{E(X)\}^2$$

Este parámetro indica qué tanto varían los valores de la variable con respecto a su esperanza y permite medir la variabilidad de la distribución.

Sea X una variable aleatoria discreta, entonces se cumple que:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

donde

$$E(X^2) = \sum_{k \in R_X} k^2 \cdot f_X(k)$$

$$E(4X + 2) = 9 \quad \text{Var}(3X + 7) = 10$$

$$E(4X) + E(2) = 9 \quad \text{Var}(3X) + \text{Var}(7) = 10$$

$$4 \cdot E(X) + 2 = 9 \quad 3^2 \text{Var}(X) + 0 = 10$$

$$4E(X) = 7 \quad \text{Var}(X) = \frac{10}{9}$$

$$E(X) = \frac{7}{4}$$

$$E(X^2) = \text{Var}(X) + \{E(X)\}^2 \quad \text{Volviendo}$$

$$\frac{10}{9} + \left(\frac{7}{4}\right)^2$$

$$= \frac{601}{144}$$

Determine la varianza de la variable $Y = \frac{X}{4} - 7$ si $E(Y) = -6$ y $E(X^2) = 17$

R/ $\frac{1}{16}$

Se pide $\text{Var}(Y)$, así si $Y = \frac{X}{4} - 7$, entonces

el truco es aplicar Var a ambos lados

$$Y = \frac{X}{4}$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}\left(\frac{X}{4} - 7\right)$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}\left(\frac{1}{4}X\right) + \text{Var}(-7)$$

$$\text{Var}(Y) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \text{Var}(X) + 0$$

$$\text{Var}(Y) = \frac{1}{16} \text{Var}(X)$$

Ahora saquemos E

a ambos lados

$$Y = \frac{X}{4} - 7$$

$$E(Y) = E\left(\frac{X}{4} - 7\right)$$

$$-6 = E\left(\frac{1}{4}X\right) + E(-7)$$

$$-6 = \frac{1}{4}E(X) - 7$$

$$\frac{1}{4}E(X) = 1$$

$$E(X) = 4$$

Recordando

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

$$17 - 4^2$$

$$\text{Entonces } \text{Var}(X) = 1$$

$$\text{Var}(Y) = \frac{1}{16} \text{Var}(X)$$

$$\frac{1}{16} \cdot 1 = \frac{1}{16}$$