

Teorema de Moivre

$$z_1 \cdot z_2$$

$$r_1 \cdot (i s(\theta_1)) \cdot r_2 \cdot (i s(\theta_2))$$

$$r_1 \cdot r_2 \cdot (i s(\theta_1 + \theta_2))$$

$$\text{Ya que } (i s(\theta_1)) \cdot (i s(\theta_2)) = (i s(\theta_1 + \theta_2))$$

$$r_1 \cdot e^{i\theta_1} \cdot r_2 \cdot e^{i\theta_2}$$

$$= r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$\text{Ya que } e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$\frac{r_1 \cdot (i s(\theta_1))}{r_2 \cdot (i s(\theta_2))} = \frac{r_1}{r_2} \cdot (i s(\theta_1 - \theta_2))$$

$$\text{Ya que } \frac{(i s(\theta_1))}{(i s(\theta_2))} = (i s(\theta_1 - \theta_2))$$

$$\frac{r_1 \cdot e^{i\theta_1}}{r_2 \cdot e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} \cdot e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

$$\text{Ya que } \frac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}} = e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

$$(r \cdot (i s(\theta)))^h = r^h \cdot (i s(h \cdot \theta))$$

$$(r \cdot e^{i\theta})^h = r^h \cdot e^{i\theta h} \quad \text{multiplicación}$$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$(i s(\theta)) = (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

1) Realice las operaciones que se indiquen y exprese el resultado en forma rectangular.

$$a) \frac{(1-i)^6 (1-i\sqrt{3})^3}{(2i-2\sqrt{3})^7}$$

Notas

1) Cuando hay muchos exponentes es mejor pasarlo y trabajarlo en forma polar

2) Cuando la parte real es negativa

Se le agrega π o 180° →

Para log principal

Cuadrante	a	b	Resultado de $\tan^{-1}(b/a)$	¿Qué hacer para obtener Arg principal?
I	+	+	Ya está en $(0, \pi/2)$	Nada
II	-	+	Cae en IV → negativo	+ Sumar π (para que quede entre 0 y π)
III	-	-	Cae en I → positivo	- Restar π (para que quede en $(-\pi, \pi]$)
IV	+	-	Ya está en $(-\pi/2, 0)$	Nada

Radianes para teorema de Moivre

Resolviendo el ejercicio

z_1

z_2

