

Primer Examen Parcial

Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **6** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
 2. Tiene dos horas y treinta minutos para contestar los ítems del examen.
 3. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 4. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} -x + 2y = -z \\ 3x + 2z = y \\ y + pz = 0 \end{cases}$$

donde x, y, z son incógnitas y $p \in \mathbb{R}$. Utilice el método de Gauss-Jordan para:

- a) **[4 puntos]** Determinar el o los valores de la constante p de tal forma que el sistema de ecuaciones tenga solución única.
- b) **[2 puntos]** Determinar el o los valores de la constante p de tal forma que el sistema de ecuaciones tenga infinitas soluciones.

Solución:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & p & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{-3F_1 + \overline{F}_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & p & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\dots} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & p-1 & 0 \end{array} \right) (*)$$

$$\text{Caso: } p \neq 1 \text{ se tiene al resolver en } (*) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & p-1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{p-1}F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{-F_3 + \overline{F}_1; -F_3 + \overline{F}_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right), \text{ de donde tendría solución única } x = y = z = 0.$$

Caso: $p = 1$ se tiene al sustituir en $(*) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & p-1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{p=1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, de donde

$$\begin{cases} x = -z \\ y = -z \\ z = z \end{cases}$$

y por tanto, para $p = 1$, el sistema tiene infinitas soluciones dependiendo de un parámetro.

2. [3 puntos] Si se sabe que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix} = 4$ Calcule $\begin{vmatrix} a & x & 3p+x \\ b & y & 3q+y \\ c & z & 3r+z \end{vmatrix}$

Solución

$$\begin{vmatrix} a & x & 3p+x \\ b & y & 3q+y \\ c & z & 3r+z \end{vmatrix} \xrightarrow{-C_2+C_3} \begin{vmatrix} a & x & 3p \\ b & y & 3q \\ c & z & 3r \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} a & x & p \\ b & y & q \\ c & z & r \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 = 12$$

3. Sean A y C dos matrices invertibles que cumplen la siguiente igualdad $(A^{-1} \cdot X)^T \cdot C - B = D$.
- a) [3 puntos] Utilizando propiedades matriciales exprese la matriz X en términos de las matrices A, B, C, D .
- b) [2 puntos] Si se sabe que $A \cdot (C^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $D^T + B^T = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, determine la matriz X .

Solución:

$$\begin{aligned} (A^{-1} \cdot X)^T \cdot C - B &= D \implies (A^{-1} \cdot X)^T \cdot C = D + B \\ &\implies (A^{-1} \cdot X)^T = (D + B) \cdot C^{-1} \\ &\implies A^{-1} \cdot X = ((D + B) \cdot C^{-1})^T \\ &\implies X = A \cdot ((D + B) \cdot C^{-1})^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X &= A \cdot ((D + B) \cdot C^{-1})^T \implies X = A \cdot (C^{-1})^T \cdot (D + B)^T \\ &\implies X = A \cdot (C^T)^{-1} \cdot (D^T + B^T) \\ &\implies X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \\ &\implies X = \begin{pmatrix} 7 & 6 & -2 \\ -4 & 3 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. [5 puntos] Sea k un número real diferente de 0. Calcule la inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & -2 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Sugerencia: Puede ser útil aplicar primero la inversa de un producto.

Solución

$$A^{-1} = \left[\begin{pmatrix} k & 1 & -2 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} k & 1 & -2 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix} \text{ Ahora}$$

calculamos la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-f_2 + f_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\text{Entonces } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 1 & -2 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 1 & -2 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -k-1 & k \end{pmatrix}.$$

5. [4 puntos] Calcule y exprese el número complejo $w = \frac{3e^{-\frac{\pi}{2}i}}{16 + i^{2023}} + i^{-i}$ en la forma rectangular.

Solución:

$$\begin{aligned} w &= \frac{3e^{-\frac{\pi}{2}i}}{16 + i^{2023}} + i^{-i} \\ w &= \frac{3\text{cis}\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{16 + i \cdot (i^2)^{1011}} + e^{\text{Ln}(i^{-i})} \\ w &= \frac{-3i}{16 - i} + e^{-i\text{Ln}(i)} \\ w &= \frac{-3i}{16 - i} + e^{-i\text{Ln}(\text{cis}(\pi/2))} \\ w &= \frac{-3i}{16 - i} \cdot \frac{16 + i}{16 + i} + e^{\frac{\pi}{2}} \\ w &= \frac{-48i + 3}{257} + e^{\frac{\pi}{2}} \approx 4,8221 + \frac{-48i}{257} \end{aligned}$$

6. [5 puntos] Resuelva la ecuación $z^3 + 2i = -2\sqrt{3}$ en \mathbb{C} y represente gráficamente las soluciones en el plano complejo.

Solución:

Note resolver $z^3 + 2i = -2\sqrt{3}$ es equivalente a calcular las raíces cúbicas de $-2\sqrt{3} - 2i$, de ahí que se utilizará el teorema de De Moivre la raíz n-ésima de un número complejo. Antes se debe transformar dicho número complejo en su forma polar, de donde puede comprobarse que $-2\sqrt{3} - 2i = \dots = 4\text{cis}\left(\frac{-5\pi}{6}\right)$, luego de esta forma las raíces o soluciones de la ecuación dada son:

$$\begin{aligned} z_0 &= 4^{\frac{1}{3}}\text{cis}\left(\frac{\frac{-5\pi}{6} + 2\pi \cdot 0}{3}\right) = 4^{\frac{1}{3}}\text{cis}\left(\frac{-5\pi}{18}\right) \approx \\ z_1 &= 4^{\frac{1}{3}}\text{cis}\left(\frac{\frac{-5\pi}{6} + 2\pi \cdot 1}{3}\right) = 4^{\frac{1}{3}}\text{cis}\left(\frac{7\pi}{18}\right) \approx \end{aligned}$$

$$z_2 = 4^{\frac{1}{3}} cis \left(\frac{\frac{-5\pi}{6} + 2\pi \cdot 2}{3} \right) == 4^{\frac{1}{3}} cis \left(\frac{19\pi}{18} \right) \approx$$

7. Sea $N(x) = x^3 + kx^2 + 7x - 2k$. Si se sabe que $x = i$ es una raíz doble de $N(x)$.

a) [2 puntos] Determine el valor de k .

b) [2 puntos] Factorice en \mathbb{C} completamente el polinomio $N(x)$.

Solución:

Note que i al ser raíz de $N(x)$ se cumple $N(i) = 0$, es decir, $-i - k + 7i - 2k = 0 \Rightarrow k = 2i$, luego $N(x) = x^3 + 2ix + 7x - 4i$ y realizando la división sintética se obtiene:

1	$2i$	7	$-4i$	i
	i	-3	$4i$	
1	$3i$	4	0	
	i	-4		i
1	$4i$	0		

$$N(x) = (x - i)^2(x + 4i)$$