

## I Examen Parcial Ordinario

### MA-1103: Cálculo y álgebra lineal

08 de setiembre 2018

(Guía de solución)

---

**Indicaciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz, lapiceros de tinta borrable o presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

---

1. Considere la siguiente igualdad:

$$1 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5^3 + \cdots + n \cdot 5^n = \frac{5 + (4n - 1) \cdot 5^{n+1}}{16}$$

a) Demuestre, usando inducción matemática que dicha igualdad es válida para toda  $n \geq 1$ .  
(5 puntos)

Solución:

i) Para  $k = 1$ :

$$5 = \frac{5 + 3 \cdot 5^2}{16} \Rightarrow 5 = 5 \quad \checkmark$$

ii) Suponga que es verdadero para  $n$ , es decir:

$$1 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5^3 + \cdots + n \cdot 5^n = \frac{5 + (4n - 1) \cdot 5^{n+1}}{16}$$

iii) Hay que demostrar la validez para  $n + 1$ , esto implica demostrar:

$$1 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5^3 + \cdots + n \cdot 5^n + (n + 1) \cdot 5^{n+1} = \frac{5 + (4n + 3) \cdot 5^{n+2}}{16}$$

Ahora, por H.I.

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5^3 + \cdots + n \cdot 5^n + (n + 1) \cdot 5^{n+1} \\ &= \frac{5 + (4n - 1) \cdot 5^{n+1}}{16} + (n + 1) \cdot 5^{n+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{5 + (4n - 1) \cdot 5^{n+1} + 16 \cdot (n + 1) \cdot 5^{(n+1)}}{16} \\
&= \frac{5 + 5^{n+1} [4n - 1 + 16 \cdot (n + 1)]}{16} \\
&= \frac{5 + 5^{n+1} (20n + 15)}{16} \\
&\quad \frac{5 + 5^{n+1} \cdot 5 (4n + 3)}{16} \\
&= \frac{5 + 5^{n+2} (4n + 3)}{16}, \text{ que es a lo que se quiere llegar.}
\end{aligned}$$

Luego, es verdadero que:

$$1 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5^3 + \cdots + n \cdot 5^n = \frac{5 + (4n - 1) \cdot 5^{n+1}}{16}, \quad \forall n \geq 1$$

b) Si  $\{S_n\} = \left\{ \frac{5 + (4n - 1) \cdot 5^{n+1}}{16} \right\}$  corresponde a la sucesión de sumas parciales asociada

a la serie  $\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 5^k$ , determine si dicha serie converge o diverge. **(2 puntos)**

Solución:

Si  $\{S_n\} = \left\{ \frac{5 + (4n - 1) \cdot 5^{n+1}}{16} \right\}$  entonces se cumple que:

$$\sum_{k=1}^n k \cdot 5^k = \frac{5 + (4n - 1) \cdot 5^{n+1}}{16}$$

Esto implica que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + (4n - 1) \cdot 5^{n+1}}{16} = \infty$$

$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 5^k$  diverge.

2. Determine todos los valores de  $b$  para que de la serie  $\sum_{n=5}^{\infty} \left( \frac{n}{b^n} - \frac{n+1}{b^{n+1}} \right)$  converja y su suma sea igual a  $\frac{5}{b^5}$ . **(3 puntos)**

Solución:

La serie dada corresponde a una telescópica, por lo que:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} S_k &= \frac{5}{b^5} - \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1}{b^{k+1}} \\ &= \frac{5}{b^5} - \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(b) \cdot b^{k+1}} \end{aligned}$$

Para que el límite anterior exista es necesario que  $b > 1$ , por lo que la serie converge a  $\frac{5}{b^5}$  si  $b \in ]1, \infty[$ .

3. Determine el intervalo de convergencia (NO incluya el análisis de los extremos) de la serie siguiente. **(4 puntos)**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot (n+2)! \cdot (x-3)^n}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)}$$

Solución:

Sea:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\frac{4^{n+1} (n+3)! (x-3)^{n+1}}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2) (3n+5)}}{\frac{4^n (n+2)! (x-3)^n}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)}} \\ \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4 (n+3)! (x-3)}{(n+2)! (3n+5)} = \frac{4 (n+3) (x-3)}{(3n+5)} \end{aligned}$$

Por el criterio del cociente:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4 (n+3) (x-3)}{(3n+5)} \right| &< 1 \\ \Rightarrow \left| \frac{4(x-3)}{3} \right| &< 1 \Rightarrow -1 < \frac{4(x-3)}{3} < 1 \\ &\Rightarrow \frac{9}{4} < x < \frac{15}{4} \end{aligned}$$

$\therefore$  La serie converge absolutamente si  $x \in \left] \frac{9}{4}, \frac{15}{4} \right[$ .

4. Determine si cada una de las siguientes series convergen o divergen. Debe indicar los criterios aplicados en cada caso.

$$a) \sum_{k=5}^{\infty} \frac{\arctan k + 4}{(k-4)^2} \quad (4 \text{ puntos})$$

Solución:

Por comparación directa:

$$-\frac{\pi}{2} < \arctan k < \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{-\frac{\pi}{2} + 4}{(k-4)^2} < \frac{\arctan k + 4}{(k-4)^2} < \frac{\frac{\pi}{2} + 4}{(k-4)^2}$$

Sea:

$$\sum_{k=5}^{\infty} \frac{\frac{\pi}{2} + 4}{(k-4)^2} \Rightarrow \left(\frac{\pi}{2} + 4\right) \sum_{k=5}^{\infty} \frac{1}{(k-4)^2} \Rightarrow \left(\frac{\pi}{2} + 4\right) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

Esta última es una  $p$  serie,  $p > 1$ , entonces converge, luego:

$$\left(\frac{\pi}{2} + 4\right) \sum_{k=5}^{\infty} \frac{1}{(k-4)^2} \text{ converge}$$

$\therefore \sum_{k=5}^{\infty} \frac{\arctan k + 4}{(k-4)^2}$  también converge por el criterio de comparación directa.

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \left(2 + \frac{1}{n}\right)^{2n}}{e^n} \quad (4 \text{ puntos})$$

Solución:

Por el criterio de la raíz se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^n \left(2 + \frac{1}{n}\right)^{2n}}{e^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^2}{e} = \frac{4}{e} > 1$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \left(2 + \frac{1}{n}\right)^{2n}}{e^n}$  es divergente.

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^{3n} \cdot n^2}{n^3 + 1} - \frac{1}{3^{-n+4}} \right] \quad (5 \text{ puntos})$$

Solución:

Se analiza la serie separándola en dos, asumiendo que es válido.

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{3n} \cdot n^2}{n^3 + 1}$$

- Probar que  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^3 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^3 \left( 1 + \frac{1}{n^3} \right)} = 0 \quad \checkmark$$

- Probar que:  $f(x) = \frac{x^2}{x^3 + 1}$  es decreciente sobre  $[1, +\infty[$ .

$$f'(x) = \frac{x(2 - x^3)}{(x^3 + 1)^2} \quad \text{y se tiene que: } f'(x) < 0, \forall x \in ]\sqrt[3]{2}, \infty[, \text{ es decir, } f(x) \text{ es decreciente sobre } [1, +\infty[.$$

Luego:

La sucesión  $\left\{ \frac{n^2}{n^3 + 1} \right\}$  es decreciente  $\forall n \geq 1$ .

Así,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{3n} \cdot n^2}{n^3 + 1}$ , converge.

$$ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{-n+4}}$$

Observe que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{-n+4}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{3^4} = \frac{1}{81} \sum_{n=1}^{\infty} 3^n$$

Como  $|r| = |3| > 1$ , la serie diverge.

$\therefore$  Por i) y ii) la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^{3n} \cdot n^2}{n^3 + 1} - \frac{1}{3^{-n+4}} \right]$  es divergente.

5. Si la función  $f : [2, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f(x) = \frac{1}{x (\ln x)^2}$  es continua, positiva y decreciente, determine si la serie  $\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{k (\ln k)^2}$  diverge, converge absolutamente o converge condicionalmente. **(4 puntos)**

Solución:

Para probar si es absolutamente convergente:

$$\sum_{k=2}^{\infty} \left| (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{k (\ln k)^2} \right| = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k (\ln k)^2}$$

Utilizando el criterio de la integral, pues cumple con las condiciones, se tiene que:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^2(x)} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x \ln^2(x)} dx$$

Sea:

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{1}{x \ln^2(x)} dx = \int \frac{1}{u^2} dx = -\frac{1}{u} + C = -\frac{1}{\ln x} + C$$

Entonces:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x \ln^2(x)} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ -\frac{1}{\ln b} + \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{2}$$

La integral impropia converge, por lo tanto  $\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{k (\ln k)^2}$  converge absolutamente.

6. Asuma que la serie  $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 4^k}{(2k+1) \cdot (2k+1)!}$  es convergente. Determine el menor valor para  $n$  de manera que  $S_n$  aproxime a  $S$  con un error menor a  $10^{-6}$ . **(3 puntos)**

Solución:

Se debe cumplir que:  $a_{n+1} < 10^{-6}$ , es decir:

$$\frac{4^{n+1}}{(2n+3) \cdot (2n+3)!} < 10^{-6} \Rightarrow 1\,000\,000 < \frac{(2n+3) \cdot (2n+3)!}{4^{n+1}}$$

Al probar a partir de  $n = 1$ , se llega que cuando  $n = 6$ , se cumple que:

$$1\,000\,000 < 19\,763\,493,75$$

Por lo tanto,  $S_6 = \sum_{k=1}^6 \frac{(-1)^k \cdot 4^k}{(2k+1) \cdot (2k+1)!}$  cumple que  $E < 10^{-6}$ .