

Examen Parcial III

Extraordinario
26 de noviembre 2018


Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma ordenada, clara y utilice bolígrafo para resolver el examen, en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable, ni el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. El examen consta de **7 preguntas** con un puntaje máximo de **31 puntos**. Dispone de **2 horas y 30 minutos** para realizar el examen.

- #1 Si la matriz B se define de modo que $B = P^{-1}AP$, con A y $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y además P es una matriz que posee inversa. Pruebe que $|A| = |B|$. **(3 puntos)**

Solución:

$$\begin{aligned} B = P^{-1}AP &\implies |B| = |P^{-1}AP| \\ &\implies |B| = |P^{-1}| \cdot |A| \cdot |P| \\ &\implies |B| = \frac{1}{|P|} \cdot |A| \cdot |P| \\ &\implies |B| = |A| \end{aligned}$$

- #2 Considere el paralelogramo de vértices A, B, C, D . Si los vértices A, B, C son tales que $A(-1, 2, 3)$, $B(-1, 1, 5)$ y $C(-1, -3, 8)$. Determinar las coordenadas del vértice D . **(4 puntos)**



Solución:

Por regla del paralelogramo se cumple que: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Entonces

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} &\iff (0, -5, 5) = (0, -1, 2) + (a + 1, b - 2, c - 3) \\ &\iff (0, -5, 5) = (a + 1, b - 3, c - 1)\end{aligned}$$

Luego: $a = -1$, $b = -2$ y $c = 6$.

#3 Considere los vectores $\mathbf{u} = (1, -1, 0)$ y $\mathbf{v} = (-1, 1, 2)$ en \mathbb{R}^3 . Además del vector $\mathbf{w} = \mathbf{u} - \mathbf{r}$. Determine el o los vectores \mathbf{r} en \mathbb{R}^3 , de modo que se cumpla simultáneamente las siguientes condiciones: **(5 puntos)**

- $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$
- $\|\mathbf{r}\| = 6$
- $\text{Proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{w} = 2\mathbf{u}$

Solución:

Sea $\mathbf{r} = (x, y, z)$. Entonces:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{r} = 0 \implies (-1, 1, 2) \cdot (x, y, z) = 0 \implies -x + y + 2z = 0$$

De la segunda condición:

$$\|\mathbf{r}\| = 6 \implies x^2 + y^2 + z^2 = 36$$

Por la tercera condición:

$$\begin{aligned}\text{Proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{w} = 2\mathbf{u} &\implies \frac{\mathbf{w} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|^2} \cdot \mathbf{u} = 2\mathbf{u} \\ &\implies \frac{(1-x, -1-y, -z) \cdot (1, -1, 0)}{2} \cdot (1, -1, 0) = (2, -2, 0) \\ &\implies \frac{1-x+1+y}{2} \cdot (1, -1, 0) = (2, -2, 0) \\ &\implies \left(\frac{2-x+y}{2}, \frac{x-y-2}{2}, 0 \right) = (2, -2, 0)\end{aligned}$$

Se deduce que $x = y - 2$, esto implica:

$$-x + y + 2z = 0 \implies 2 - y + y + 2z = 0 \implies z = -1$$

por lo que:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 36 \implies (y-2)^2 + y^2 + 1 = 36 \implies 2y^2 - 4y - 31 = 0$$

cuyas soluciones están dadas por: $y = \frac{\sqrt{66} \pm 2}{2}$.

Por lo tanto, $\mathbf{r} = \left(\frac{\sqrt{66} \pm 2}{2} - 2, \frac{\sqrt{66} \pm 2}{2}, -1 \right)$.

#4 Considere los puntos $A(1, 2 - k, -1)$, $B(1, -1, k)$ y $C(1, 1 - k, k)$. Determine el valor de k para que estos sean colineales. **(5 puntos)**

Solución:

Sea L la recta que contiene los puntos A y B . Además, considere \mathbf{v} un vector director de L , donde:

$$\mathbf{v} = (0, -3 + k, k + 1)$$

Entonces:

$$L : (x, y, z) = (1, 2 - k, -1) + t\langle 0, k - 3, k + 1 \rangle; t \in \mathbb{R}$$

Luego para que $C \in L$ debe darse que:

$$x = 1, \quad y = 2 - k + (k - 3)t, \quad z = -1 + (k + 1)t$$

Así:

$$\begin{aligned} 1 &= 1; & 1 - k &= 2 - k + (k - 3)t; & k &= -1 + (k + 1)t \\ && \implies -1 &= (k - 3)t \implies t &= \frac{-1}{k - 3} \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$k + 1 = (k + 1)t \implies t = \frac{k + 1}{k + 1} = 1$$

Esto implica:

$$\frac{-1}{k - 3} = 1 \iff k - 3 = -1 \iff k = 2.$$

#5 Considere $\mathbf{n} = (a, b, c)$ un vector normal del plano Π . Determine la ecuación cartesiana de un plano Π de modo que se cumpla simultáneamente las condiciones siguientes:

- a) La norma de su vector normal es $\sqrt{14}$.
- b) Su vector normal forma un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ con la recta

$$L : (x, y, z) = (1, 0, 1) + t(3, 2, 1); t \in \mathbb{R}$$

- c) Los puntos $P(-2, 0, -1)$ y $Q(0, 4, -1)$ pertenecen al plano Π .

(5 puntos)

Solución:

Sea $\mathbf{n} = (a, b, c)$ el vector normal del plano Π . Se cumple:

- $a^2 + b^2 + c^2 = 14$
- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{(a, b, c) \cdot (3, 2, 1)}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} \implies \frac{1}{2} = \frac{3a + 2b + c}{14} \implies 3a + 2b + c = 7$
- $\overrightarrow{PQ} \perp \mathbf{n} \implies (2, 4, 0) \cdot (a, b, c) = 0 \implies 2a + 4b = 0 \implies a = -2b$

Sustituyendo se tiene: $-6b + 2b + c = 7 \implies c = 4b + 7$. Luego:

$$\begin{aligned} 4b^2 + b^2 + (4b + 7)^2 &= 14 \implies 5b^2 + 16b^2 + 56b + 49 = 14 \\ &\implies 21b^2 + 56b + 35 = 0 \\ &\implies b_1 = -1; b_2 = \frac{-5}{3} \end{aligned}$$

Así, existen dos planos que satisfacen las condiciones:

$$\Pi_1 : 2(x + 2) - y + 3(z + 1) = 0$$

$$\Pi_1 : 2x - y + 3z = -7$$

$$\Pi_2 : \frac{10}{3}(x + 2) - \frac{5}{3}y + \frac{1}{3}(z + 1) = 0$$

$$\Pi_2 : \frac{10}{3}x - \frac{5}{3}y + \frac{z}{3} = -7$$



#6 Determine la distancia entre los planos π y θ definidos por: (4 puntos)


$$\pi : 3x - 2y + 5z = -5$$

$$\theta : -3x + 2y - 5z = 4$$

Debe incluir un esquema geométrico como parte de la justificación de su procedimiento de cálculo.

Solución:

Considere los puntos $P(0, 0, -1)$ y $Q(1, 1, -1)$ de los planos π y θ respectivamente.



Entonces: $\overrightarrow{PQ} = (1, 1, 0)$ y $\mathbf{n} = (3, -2, 5)$. Calculando la proyección del vector \overrightarrow{PQ} sobre \mathbf{n} se tiene:

$$\begin{aligned} \text{Proy}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ} &= \frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \cdot \mathbf{n} \\ &= \frac{(1, 1, 0) \cdot (3, -2, 5)}{38} \cdot (3, -2, 5) \\ &= \frac{1}{38} \cdot (3, -2, 5) \\ &= \left(\frac{3}{38}, -\frac{1}{19}, \frac{5}{38} \right) \end{aligned}$$

Por lo tanto, la distancia entre ambos planos está dada por:

$$\|\text{Proy}_{\mathbf{n}} \overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{\left(\frac{3}{38}\right)^2 + \left(-\frac{1}{19}\right)^2 + \left(\frac{5}{38}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{38}} \approx 0.16222$$

└

#7 Considere las rectas L y M y el plano $\rho : 2x + y - z = 19$, donde:

$$L : \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4}, z = 1 \quad M : \begin{cases} x+2r = 1 \\ 2y = 4, \\ z-r = 0 \end{cases} \quad r \in \mathbb{R}$$

Determine la ecuación del plano π que contiene al punto de intersección entre ρ y M , y que contiene también a la recta L . **(5 puntos)**

Solución:

$$L : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 + 4t, \\ z = 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad M : \begin{cases} x = 1 - 2r \\ y = 2, \\ z = r \end{cases} \quad r \in \mathbb{R}$$

Para encontrar el punto P tenemos:

$$2(1 - 2r) + 2 - r = 19 \implies 2 - 4r + 2 - r = 19 \implies r = -3$$

Entonces, $P(7, 2, -3)$ está contenido en el plano π . Tomando $Q(1, -3, 1)$ un punto sobre L , se cumple:

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = (1, -3, 1) - (7, 2, -3) = (-6, -5, 4)$$

Esto implica que:

$$\mathbf{n}_\pi = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ -6 & -5 & 4 \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix} = (-16, 8, -14)$$

Finalmente:

$$\pi : 8x - 4y + 7z - 27 = 0$$

└