

1. [3 pts] Calcule $\overline{(i+3)} \cdot \frac{5i}{2-i}$.

$$3-i \cdot \frac{5i}{2-i} \cdot \frac{2+i}{2+i}$$

$$3-i \cdot \frac{(5i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} \quad \int \begin{matrix} a^2 - b^2 \\ (a-b)(a+b) \\ 4^2 - i^2 \end{matrix}$$

$$3-i \cdot \frac{10i + 5i^2}{4 - i^2}$$

$$3-i \cdot \frac{10i - 5}{4 - -1}$$

$$3-i \cdot \frac{10i - 5}{5}$$

$$3-i \cdot \frac{\cancel{5}(2i-1)}{\cancel{5}}$$

$$\overbrace{(3-i)(2i-1)}$$

$$6i - 3 - 2i^2 + i$$

$$7i - 3 - -2$$

$$\boxed{7i - 1}$$

2. Sean $x = 3 \operatorname{cis}(110^\circ)$, $y = 2 \operatorname{cis}(85^\circ)$, $z = xy$.

(a) [2 pts] Calcule z en forma rectangular.

$$3 \operatorname{cis}(110^\circ) \cdot 2 \operatorname{cis}(85^\circ)$$

$$3 \cdot 2 \operatorname{cis}(110^\circ + 85^\circ)$$

$$6 \operatorname{cis}(195^\circ)$$

$$6 \{ \cos(195^\circ) + i \sin(195^\circ) \}$$

$$\boxed{\frac{-3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{6} - 3\sqrt{2}}{2} i}$$

(b) [1 pts] Encuentre el argumento principal de z .

$$z = \frac{-3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{6} - 3\sqrt{2}}{2} i$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{\frac{-3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{2}}{\frac{-3\sqrt{6} - 3\sqrt{2}}{2}} \right) = \boxed{15}$$

3. [3 pts] Considere el polinomio $P(x) = x^5 - 3x^4 + 4x^3 - 4x^2 + 3x - 1$. Si se sabe que $P(i) = 0$, factorice completamente en \mathbb{C} el polinomio $P(x)$.

$$P(i) = 0 \rightarrow x - i = 0 \quad x = i \quad 2 - i$$

$$2 + i$$

$$x^5 - 3x^4 + 4x^3 - 4x^2 + 3x - 1$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & -3 & 4 & -4 & 3 & -1 \\ & i & -3i-1 & 3+3i & -3-i & 1 \end{array} \quad i$$

$$1 \quad -3+i \quad -3i+3 \quad -1+3i \quad -i \quad 0 \quad (x-i)$$

$$x^4 + x^3(-3+i) + x^2(-3i+3) + x(-1+3i) + (-i)$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & -3+i & 3-3i & -1+3i & -i \\ & -i & 3i & -3i & i \end{array} \quad -i$$

$$1 \quad -3 \quad 3 \quad -1 \quad 0 \quad (x-(-i)) \quad (x+i)$$

$$x^3 \quad -3x^2 \quad +3x \quad -1$$

$$x=1$$

$$(x-1) = 0$$

$$(x-1)^3 = 0$$

$$(x-i)(x+i)(x-1)^3$$

4. [4 pts] Escriba en la forma $a + ib$ el número complejo $(2+i)^{1-i}$.

$$z = (2+i)^{1-i}$$

$$\ln(z) = \ln(2+i)^{1-i}$$

$$= (1-i) \ln(2+i) \quad \begin{matrix} \nearrow r = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \\ \searrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \end{matrix}$$

$$= (1-i) \left[\ln(\sqrt{5} \cdot e^{i \arctan(\frac{1}{2})}) \right] \quad z = \sqrt{5} \cdot e^{i \arctan(\frac{1}{2})}$$

$$= (1-i) \left[\ln(\sqrt{5}) + \cancel{\ln(e)}^{i \arctan(\frac{1}{2})} \right]$$

$$= (1-i) \left[\ln(\sqrt{5}) + i \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \right]$$

$$\ln(\sqrt{5}) + i \arctan\left(\frac{1}{2}\right) - \ln(\sqrt{5})i - i^2 \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\ln(\sqrt{5}) + i \arctan\left(\frac{1}{2}\right) - \ln(\sqrt{5})i + \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\left[\ln(\sqrt{5}) + \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \right] + \left[-\ln(\sqrt{5}) + \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \right]i$$

$$e^{\ln(\sqrt{5}) + \arctan(\frac{1}{2})} \operatorname{cis}\left(-\ln(\sqrt{5}) + \arctan\left(\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$e^{\ln(\sqrt{5}) + \arctan(\frac{1}{2})} \left\{ \cos\left(-\ln(\sqrt{5}) + \arctan\left(\frac{1}{2}\right)\right) + \right. \\ \left. \sin\left(-\ln(\sqrt{5}) + \arctan\left(\frac{1}{2}\right)\right)i \right\}$$

$$\boxed{3.350259315 - 1.189150222i}$$

5.) [3 pts] Sea a una constante real no nula y sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{a+3}{2} & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & a \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Compruebe que $A + \frac{1}{2}(BC)^T = I_2$.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & a \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot C = \begin{pmatrix} 0+0+0 & -3+0-a \\ 0+2+0 & 6+0+0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot C = \begin{pmatrix} 0 & -3-a \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(B \cdot C)^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3-a & 6 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \cdot (B \cdot C)^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-3-a}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$A + \frac{1}{2} \cdot (B \cdot C)^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{a+3}{2} & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-3-a}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. [3 pts] Considere matrices A, B y C de orden $n \times n$ y $A^T - 2B$ invertible, tales que

$$(AX^T)^T = C^T + 2(XB)$$

Si se sabe que C es una matriz simétrica, use las operaciones con matrices y sus propiedades para demostrar que

$$X = C(A^T - 2B)^{-1}$$

$$A^T - 2B = (A^T - 2B)^{-1} \quad C^T = C$$

$$(AX^T)^T = C^T + 2(XB)$$

$$(X^T)^T \cdot A^T = C^T + 2XB$$

$$X \cdot A^T = C^T + 2XB$$

$$XA^T - 2XB = C^T$$

$$X(A^T - 2B) = C^T$$

$$X(A^T - 2B) = C$$

$$X = C(A^T - 2B)^{-1}$$

7. [5 pts] Use el método de Gauss-Jordan para determinar el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ 2x + 2y + 2z = 12 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 14 \\ 2 & 2 & 2 & 12 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{c} x \quad y \quad z \\ -2 \cdot F_1 + \widetilde{F}_2 \\ -2 \cdot F_1 + \widetilde{F}_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} x \quad y \quad z \\ -F_2 + \widetilde{F}_1 \\ -\frac{1}{3} \cdot \widetilde{F}_2 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{20}{3} \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & \frac{-2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{cases} x + \frac{4}{3}z = \frac{20}{3} \Rightarrow x = \frac{20}{3} - \frac{4}{3}z \\ y - \frac{1}{3}z = \frac{-2}{3} \Rightarrow y = \frac{-2}{3} + \frac{1}{3}z \end{cases}$$

$$S = \left\{ x = \frac{20}{3} - \frac{4}{3}z, y = \frac{-2}{3} + \frac{1}{3}z, z \right\}, z \in \mathbb{R}$$

8. [4 pts] Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} -7 & 5 & 4 \\ 2 & -1 & -1 \\ 4 & -3 & -2 \end{pmatrix}$ y determine A^{-1} .

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -7 & 5 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} -\frac{1}{7} \cdot \widetilde{F1} \\ -2 \cdot \widetilde{F1} + \widetilde{F2} \\ -4 \cdot \widetilde{F1} + \widetilde{F3} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{5}{7} & \frac{4}{7} & \frac{1}{7} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{7} & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} & \frac{4}{7} & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \frac{5}{7} \cdot \widetilde{F2} + \widetilde{F1} \\ \frac{1}{3} \cdot \widetilde{F2} \\ \frac{1}{7} \cdot \widetilde{F2} + \widetilde{F3} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} 0 \\ 1 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \frac{1}{3} \cdot \widetilde{F3} + \widetilde{F1} \\ -\frac{1}{3} \cdot \widetilde{F3} + \widetilde{F2} \\ 3 \cdot \widetilde{F3} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right) \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 1 \end{array}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$