

Regresión lineal múltiple

Se tiene un sistema de ecuaciones

$y = Xb \vee Xb = y$, X una matriz de coeficientes
y se toman n muestras

Número de Muestra i	Muestra
1	$(x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots, x_{1k}, y_1)$
2	$(x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots, x_{2k}, y_2)$
\vdots	\vdots
n	$(x_{n1}, x_{n2}, x_{n3}, \dots, x_{nk}, y_n)$

Modelo de RLM:

$$\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \dots + \beta_k x_k = y$$

Objetivo: estimar los diferentes parámetros β_i , con $i=0, \dots, k$, a partir de b_i , con $i=0, \dots, k$.

$$b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + \dots + b_k x_k = \hat{y}$$

Evaluamos cada muestra en el modelo:

Sistema de ecuaciones lineales con " n " ecuaciones y " k " incógnitas

$$\begin{cases} b_0 + x_{11}b_1 + x_{12}b_2 + \dots + x_{1k}b_k = y_1 \\ b_0 + x_{21}b_1 + x_{22}b_2 + \dots + x_{2k}b_k = y_2 \\ \vdots \\ b_0 + x_{n1}b_1 + x_{n2}b_2 + \dots + x_{nk}b_k = y_n \end{cases}$$

Tamaño: $n \times k$

Forma aumentada del sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Matriz asociada al sistema

Vector de incógnitas

Vector solución



$n \times (k+1)$

$(k+1) \times 1$

$n \times 1$

⇓
 $n \times 1$

$$X \cdot b = y$$

Sistema $Xb=y$

Modelos de regresión lineal múltiple

Se calculan las derivadas parciales de SS_E con respecto a cada b_i , se igualan a cero y se resuelve el sistema. El siguiente teorema muestra una forma de calcular estos estimadores:

TEOREMA: los estimadores por el método de mínimos cuadrados de los parámetros $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_k$, a partir de la muestra $(\underline{x}_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$, son los siguientes:

$$b = (X^t \cdot X)^{-1} \cdot (X^t \cdot y)$$

Las operaciones se pueden resolver en la calculadora

Ejemplo 100 Se tienen las siguientes observaciones

x_1	0	1	1	0	-1
x_2	1	0	-1	0	1
Y	1	4	6	3	0

1. Estime la ecuación de regresión de Y como función lineal de x_1, x_2 .

x_1	x_2	y
0	1	1
1	0	4
1	-1	6
0	0	3
-1	1	0

Modelo

$y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2$ a partir de

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$$

Se debe agregar una columna de 1's al principio y luego los demás e igualar a y

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 6 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$b = (X^T X)^{-1} \cdot (X^T y) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

R/ El modelo de RLM

es $\hat{y} = 3 + 1 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2$

La calcul solo

permite 889 max.

Regresion NO lineal multiple

Ejemplo 1: Se tienen las siguientes observaciones en la tabla adjunta:

- Estime los coeficientes en la ecuación

$$z = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 y + \beta_3 y^2$$

- Determine z cuando $x = 2$ y $y = 7$

x	y	z
3	5	-46
8	9	-110
13	4	10
16	6	-12
20	2	69

Se deben estimar los coeficientes de:

$$z = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 y + \beta_3 y^2$$

Sea $x_1 = x$, $x_2 = y$, $x_3 = y^2$

Reemplazamos en z usando b y las x_n

$$z = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3$$

Construyendo nueva tabla

x	y	y^2	z
x_1	x_2	x_3	
3	5	5 ²	-46
8	9	9 ²	-110
13	4	4 ²	10
16	6	6 ²	-12
20	2	2 ²	69

Recordar los 1

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 5^2 \\ 1 & 8 & 9 & 9^2 \\ 1 & 13 & 4 & 4^2 \\ 1 & 16 & 6 & 6^2 \\ 1 & 20 & 2 & 2^2 \end{pmatrix}$$

$$b = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot (X^T \cdot y)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ -7 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$y = \begin{pmatrix} -46 \\ -110 \\ 10 \\ -12 \\ 69 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

El modelo de RNLS es $z = 2 + 9x - 7y - y^2$

Determine z cuando $x = 2$ y $y = 7$

$$z = 2 + 9x - 7y - y^2$$

$$z = 2 + 9 \cdot 2 - 7 \cdot 7 - 7^2$$

$$z = -88$$

Ejemplo 2: Dadas las siguientes observaciones estime los coeficientes de la ecuación

$$z = \beta_0 x^{\beta_1} y^{\beta_2}$$

▪ Determine z cuando $x = 2$ y $y = 7$

X	Y	Z
1	0,5	0,06
1,5	1	6,7
2	2	512
1	2	64

$$z = \beta_0 x^{\beta_1} y^{\beta_2}$$

$$\ln(z) = \ln(\beta_0 x^{\beta_1} y^{\beta_2})$$

$$\ln(z) = \ln(\beta_0 \cdot x^{\beta_1}) + \ln(y)^{\beta_2}$$

$$\begin{array}{cccccc} \ln(z) = & \ln(\beta_0) & + & \beta_1 \ln(x) & + & \beta_2 \ln(y) \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ z_1 & b_0 & & b_1 x_1 & & b_2 x_2 \end{array}$$

Modelo de estimación para $z = \beta_0 \cdot x^{\beta_1} y^{\beta_2}$

$$z_1 = b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2$$

Construyendo nueva tabla

$$\ln(z) = \ln(\beta_0) + \beta_1 \ln(x) + \beta_2 \ln(y)$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ z_1 & \beta_0 & \beta_1 & x_1 & \beta_2 & x_2 \end{matrix}$$

x	y	z
1	0,5	0,06
1,5	1	6,7
2	2	512
1	2	64

$x_1 = \ln(x)$	$x_2 = \ln(y)$	$z_1 = \ln(z)$
$\ln(1)$	$\ln(0,5)$	$\ln(0,06)$
$\ln(1,5)$	$\ln(1)$	$\ln(6,7)$
$\ln(2)$	$\ln(2)$	$\ln(512)$
$\ln(1)$	$\ln(2)$	$\ln(64)$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & \ln(1) & \ln(0,5) \\ 1 & \ln(1,5) & \ln(1) \\ 1 & \ln(2) & \ln(2) \\ 1 & \ln(1) & \ln(2) \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} \ln(0,06) \\ \ln(6,7) \\ \ln(512) \\ \ln(64) \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

$$b = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot (X^T \cdot Y)$$

$$= \begin{pmatrix} 0,6798 \\ 3,0078 \\ 5,0260 \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$$

$$\ln(z) = 0,6798 + 3,0078 \ln(x) + 5,0260 \ln(y)$$

Volviendo al modelo original

$$\ln(z) = \ln(\beta_0) + \beta_1 \ln(x) + \beta_2 \ln(y)$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$
 $z_1 \quad \quad \beta_0 \quad \quad \beta_1 \quad \quad x_1 \quad \quad \beta_2 \quad \quad x_2$

$$\ln(z) = 0,6799 + 3,0078 \ln(x) + 5,0260 \ln(y)$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$
 $z_1 \quad \quad \beta_0 \quad \quad \beta_1 \quad \quad x_1 \quad \quad \beta_2 \quad \quad x_2$

$$z = \beta_0 x^{\beta_1} \cdot y^{\beta_2}$$

El β_0 es el resultado de $\ln(\beta_0)$, entonces hay que volver hacia atras

$$\ln(\beta) = 0,6799$$
$$e^{\beta} = 0,6799$$
$$e \approx 1,9628$$

Finalmente

$$z = \beta_0 x^{\beta_1} \cdot y^{\beta_2}$$

$$z = 1,9628 \cdot x^{3,0078} \cdot y^{5,0260}$$

Determine z cuando $x = 2$ y $y = 7$

$$z = 1,9628 \cdot x^{3,0078} \cdot y^{5,0260}$$

$$z = 1,9628 \cdot 2^{3,0078} \cdot 7^{5,0260} = 279130,9193$$