





농작업일정






■ 유망품종

품종	숙기 (나주)	과중 (g/개)	당도 (°Bx)	저장력 (일)
조이스킨	9 월 상순	320	15.2	15
황금배	9 월 중순	430	14.9	30
그린시스	9 월 하순	470	12.4	80
화 산	9 월 하순	543	12.9	80
신 화	9 월 중순	626	13.0	80

■ 열매숙기

1 차		2 차	
시기	남기는 과실수	시기	남기는 과실수
꽃이 진 후 10 일경 (5 월 상중순)	1 개 열매 송이에 1 과 (3~4 번과)	꽃이 진 후 20 일경 (5 월 중하순)	3~4 개 열매 송이에 1 개

■ 열매가지의 배치 간격과 교체방법



- 열매가지는 5-6 년 사용 가능 ('신고' 배는 6 년 이상).
- 웃자람 가지가 있는 3 년생 가지는 갱신 필요.
- 열매가지와 버금가지는 직각으로 배치, 1~5 년생 열매가지를 고루 배치

재배적 특성

학 명	<i>Pyrus pyrifolia</i> NAKAI var.			분류		장미과
생육온도	생육적온		20℃ 내외	지온	최고	26~27℃
	언피해 온도	휴면기	-25~-30℃		최적	20℃
		개화기	-1.7~-2.8℃		최저	-
재배적지	○ 토심이 깊고 유기물 함량이 많으며 토양산도 pH5.5~6.5 가 적당함 ○ 바람이 세지 않으며 배수가 잘 되고 늦가을 ○ 표적온도가 적당함 경사지는 15° 이하가 적당함					
생리적 특성	○ 개화후 5~8 개의 꽃이 밑에서 차례로 피어 올라가는데 3~4 번째 꽃에서 열린 과실이 좋음 ○ 개화후 6 월 중순~8 월이며, 수분수를 20% 이상 섞어 심음. ○ ‘시라노’ 배를 개화후 가루가					
주요기술	○ 사탕배 : 열매 맺음 및 품질향상 ○ 개화후 7~10 일 간격 20~30mm ○ 개화후 3~4 열매 송이에 1 과씩 남김 ○ 개화후 7 월 상중순, 수평에 대해 10~40°로 눕힘 ○ 토양파쇄, 깊이갈기, 유기물, 석회시용 등 ○ 개화후 배를 개화후 : 기상 자료 및 페로몬 트랩을					

숙기별 출하시기

숙 기	수확기	출하기	성출하기	저장출하기
조생종	8 월중순~9 월상순	8 월중순~9 월중순	8 월하순~9 월상순	-
중생종	9 월중순~10 월중순	9 월하순~10 월중순	10 월하순~2 월하순	10 월중순~6 월중순
만생종	10 월중순~11 월상순	10 월중순~11 월중순	10 월하순~2 월하순	11 월중순~8 월중순

기상재해 및 생리장해 대책

항목	내용
서 리	- 서리방지 방상팬, 미세 살수장치 설치, 연소법 - 달린 열매가 부족할 때 수세 안정 위해 불량과도 달음
가 물	- 나무뿌리 주위에 퇴비, 짚, 풀 및 비닐 덮기 - 물주기 시설 설치 - 가물 때 7~10 일 간격 물주기
장 마	- 겉도랑 및 속도랑 배수로 설치 - 토양유실 방지
태 풍	- 덕 설치 및 느슨한 가지 유인선 단단히 유인 - 숙기가 된 과실은 5~7 일 앞당겨 수확 - 피해과실 및 부러진 가지 정리
바람들이	- 전정법 개선, 원가지 솎음, 가지유인, 약전정 - 토양개량 : 깊이갈이, 퇴비, 석회사용 - 너무 익기전 수확
과일껍질 흑변	투광량이 많은 봉지 사용, 조기 수확 및 수확 후 예비 건조, 저장고 환기 및 적량 적재
열매터짐(열과)	토양 개량, 칼슘제 엽면 살포, 토양수분의 극단적 변화 억제
과일 속 갈변	적숙기 수확, 서늘한 곳에서 과실고르기, 장기저장 지양