
Final checkpoints: all six solves; A = P + 0.3 P²
Raw quadratic term / K2 increment
Best boxed clock after fixed A
Original clock after fixed A
Thin / Original K2
Thin / Input frame K2
Thin / Global frame K2
Thick / Original K2
Thick / Input frame K2
Thick / Global frame K2
24.63 23.22 19.06 19.03 20.66 23.91
18.95 16.85 17.22 17.05 20.84 17.82
21.81 20.01 18.77 18.76 20.01 20.28
25.31 23.14 34.69 24.22 31.50 30.62
14.08 18.42 18.46 22.15 26.44 27.05
18.55 26.72 27.21 25.65 31.07 30.63
2.73 5.24 2.16 1.30 2.95 5.91
0.22 0.68 0.18 0.24 1.05 0.61
1.97 2.83 1.59 1.24 2.93 4.49
7.34 5.36 10.82 8.70 5.45 11.23
0.18 0.71 0.71 1.55 3.83 3.23
1.22 6.51 9.32 7.68 7.62 10.78
5.04 6.82 2.80 1.69 3.88 7.34
0.33 0.79 0.21 0.28 1.52 0.75
3.30 3.71 2.05 1.65 3.63 4.80
8.11 5.52 12.06 9.46 9.58 12.02
0.22 0.76 1.01 3.37 5.34 8.56
1.36 7.13 9.61 9.38 8.61 11.89
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2
Block.solve
Relative RMS (%)
0 5 10 15 20 25 30
0 2 4 6 8 10
0 2 4 6 8 10 12