

Kandi

Joni Hanski

13.5.2016

Sisältö

1	Johdanto	2
2	Topologia	3
3	Metrinen avaruus	5
4	Sulkeuman karakterisointi jonojen avulla	6
5	Erikoinen ei-metrinen avaruus	7
6	Verkko	9

Luku 1

Johdanto

Kandissamme haluamme osoittaa metrisissä avaruuksissa sulkeuman karakterisoinnin jonojen raja-arvojen avulla yleistyvän yleisiin topologisiin avaruuksiin käyttämällä jonojen sijaan konstruktiota **suunnattu verkko**. Kandi kuuluu topologian alaan, ja suurimmaksi osaksi sisältyy kurssiin Topologia II.

Osoitamme aluksi miten metrisessä avaruudessa sulkeuma voidaan karakterisoida jonojen raja-arvojen avulla, ja tämän jälkeen tutkimme ei-metrisen avaruuden tapausta jossa sama tulos ei enää päde. Tämän jälkeen johdamme suunnattuja verkkoja käyttävän tuloksen yleisiin topologisiin avaruuksiin, ja näytämme kuinka tämä määrittely johtaa eri lopputulokseen esimerkkitapauksessamme.

Luku 2

Topologia

Topologian avulla voidaan puhua avaruuden rakenteesta. Tietyllä tapaa topologia kuvaa sitä, kuinka lähellä tai kaukana pisteet ovat toisistaan.

Määritelmä 2.1. *Topologia.* Olkoon X avaruus ja $\mathcal{T} \subset \mathbb{P}(X)$ joukon X osajoukkojen joukko. Sanomme, että \mathcal{T} on joukon X *topologia*, mikäli seuraavat ehdot pätevät:

(T1) \mathcal{T} sisältää osajoukkojensa mielivaltaiset yhdisteet

(T2) Jos $A, B \in \mathcal{T}$, niin $A \cap B \in \mathcal{T}$

(T3) $X, \emptyset \in \mathcal{T}$

Jos joukolle X on määrätty topologia \mathcal{T} , sanomme että X on *topologinen avaruus*.

Jos joukko $A \subset X$ kuuluu avaruuden X topologiaan \mathcal{T} , sanomme että joukko A on *\mathcal{T} -avoin*, tai lyhyesti *avoin*, mikäli topologia on asiayhteydestä selvä. Mikäli joukon $A \subset X$ komplementti $X \setminus A$ on avoin, sanomme että A on *suljettu*. Joukko voi olla avoin, suljettu, molemmat tai ei kumpikaan. Esimerkiksi koko avaruus X on aina sekä avoin että suljettu.

Oletamme tästä, että X on topologinen avaruus.

Määritelmä 2.2. *Ympäristö.* Olkoon $x \in X$ ja $A \subset X$. Sanomme että A on pisteen x *ympäristö*, mikäli A on avoin ja $x \in A$.

Määritelmä 2.3. *Sulkeuma.* Joukon $A \subset X$ *sulkeuma*, merkitään \overline{A} , määritellään niiden pisteiden joukkona, joiden jokainen ympäristö leikkaa joukon A .

$$(2.4) \quad \overline{A} = \{x \in X \mid \text{jos } U \text{ on pisteen } x \text{ ympäristö, niin pätee } U \cap A \neq \emptyset\}$$

Joukon A sulkeuma on suljettu, ja sisältyy jokaiseen suljettuun joukkoon joka sisältää joukon A . Intuitiivisesti tämä seuraa siitä, että sulkeuman komplementti on yhdiste kaikista avoimista joukoista jotka eivät leikkaa joukkoa A .

Määritelmä 2.5. *Kanta.* Käytännössä voi olla hankala listata jokainen tietyn topologian avoin joukko määritellessä topologiaa. Tämän sijaan usein puhutaan rajatumasta joukosta avoimia joukkoja, jotka yksikäsitteisesti määräävät topologian. Joukko $\mathcal{B} \subset \mathbb{P}(X)$ on topologian *kanta* joukossa X , mikäli seuraavat ehdot pätevät:

(K1) $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = X$.

(K2) Jos $x \in B_1 \cap B_2$ ja $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, tällöin on olemassa $B \in \mathcal{B}$ siten, että $x \in B \subset B_1 \cap B_2$.

Joukko $U \subset X$ on avoin kannan \mathcal{B} määräämässä topologiassa jos ja vain jos U on jokin yhdiste kannan alkioista.

Luku 3

Metriten avaruus

Metriten avaruuden keskeinen käsite on metriikka, joka pyrkii formalisoimaan etäisyyden käsitteen. Kandin aiheen kannalta erityisen huomionarvoista on se, että metriikka indusoi avaruudelle topologian, ja metriikan indusoimilla topologioilla on monia hyödyllisiä erityisominaisuuksia.

Määritelmä 3.1. *Metriikka.* Joukossa X määritelty funktio $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ on *metriikka* joukossa X , jos pätee

- (M1) Kaikilla $a, b \in X$ pätee $d(a, b) \geq 0$.
- (M2) $d(a, b) = 0$ jos ja vain jos $a = b$.
- (M3) (Kolmioepäyhtälö) Kaikilla $a, b, c \in X$ pätee $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$.

Määritelmä 3.2. *Palloympäristö.* Pisteen $x \in X$ r -säteinen *palloympäristö* on joukko $B(x, r) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$.

Metriselle avaruudelle on hyvin luonnollista määrätä topologia käyttämällä kantana avaruuden eri palloympäristöjä. Jos siis X on metriten avaruus, sen kannaksi valitaan $\mathcal{B} = \{B(x, r) \mid x \in X, r \in \mathbb{R}\}$. Kutsumme kannan \mathcal{B} määräämää topologiaa nyt *metriikan indusoimaksi topologiaksi* joukossa X .

Luku 4

Sulkeuman karakterisointi jonojen avulla

Palautetaan ensin mieleen jonon määritelmä. Sanomme, että kuvaus $x : \mathbb{N} \rightarrow X$ on jono avaruudessa X , ja merkitsemme $x_n := x(n)$. Erityisesti jonon suppeneminen ja raja-arvo on työmme kannalta keskeistä.

Määritelmä 4.1. *Jonon suppeneminen.* Olkoon X topologinen avaruus, ja olkoon a jono avaruudessa X . Sanomme, että jono *suppenee* kohti pistettä x , mikäli jokaista pisteen x ympäristöä $U \subset X$ kohti voidaan valita jonon a indeksi n_U siten, että kaikilla $n > n_U$ pätee $a_n \in U$. Tiettyjen ehtojen pätiessä avaruuden jono voi supeta vain yhtä pistettä kohti. Tällöin jos jono suppenee kohti pistettä x , voimme sanoa että x on jonon *raja-arvo*.

Todistamatta mainitsemme että metrisessä avaruudessa jono voi supeta vain yhtä pistettä kohti.

Lause 4.2. *Olkoon $A \subset X$ joukko. Tällöin pätee*

$$(4.3) \quad \overline{A} = \{x \in X \mid \text{Löytyy jono } n : \mathbb{N} \rightarrow A \text{ joka suppenee kohti pistettä } x\}$$

Toisin sanoen, joukon jonojen raja-arvojen joukko on sama, kuin joukon sulkeuma.

Todistus.

Kohta 1. Osoitetaan, että jos jono $a : \mathbb{N} \rightarrow A$ suppenee kohti pistettä $x \in X$, piste x kuuluu joukon A sulkeumaan.

Sulkeuman määritelmän perusteella riittää osoittaa että jokaiselle pisteen x ympäristölle $U \subset X$ pätee, että $U \cap A \neq \emptyset$.

TODO

Luku 5

Erikoinen ei-metrinen avaruus

Aiemmin huomasimme että metrisessä avaruudessa jonon raja-arvojen avulla voidaan määrittää sulkeuma. Nyt tutkimme ei-metristä avaruutta jossa tämä karakterisointi ei päde.

Olkoon \mathbb{R} avaruus, jossa topologian \mathcal{T} määrittelee seuraava ehto:

$$(5.1) \quad \mathcal{T} = \{U \subset \mathbb{R} \mid \mathbb{R} \setminus U \text{ on numeroituva}\} \cup \{\emptyset\}$$

Osoitamme ensin että \mathcal{T} määrää topologian.

Ehdot T1 ja T2 voidaan osoittaa De Morganin laeilla, eli

$$(5.2) \quad (A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

$$(5.3) \quad (A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

Ehdon T1 kohdalla huomaamme että jos joukon A komplementti on numeroituva, tällöin yhdisteen $A \cup B$ komplementti sisältyy joukon A komplementtiin. Toisaalta ehto T2 toteutuu kun huomaamme että kahden numeroituvan joukon yhdiste on yhä numeroituva, eli kahden joukon leikkauksen komplementti on yhä numeroituva jos molempien alkuperäisten joukkojen komplementti oli numeroituva.

Ehto T3 toteutuu selvästi.

Tutkitaan erityisesti yksikköväliä $I = [0, 1]$. Joukon I sulkeuma osoittautuu olevan koko avaruus X . Tämän osoittamiseksi teemme vastaoletuksen, eli oletamme että löytyy $x \in X$ joka ei kuulu joukon I sulkeumaan. Tällöin pisteellä x on ainakin yksi ympäristö $U \subset X$ joka ei leikkaa joukkoa I . Tällöin $I \subset U^C$. Koska tästä seuraisi että U^C on ylinumeroituva, tämä on ristiriita joukon U avoimuuden kanssa, eli vastaoletuksemme oli väärä.

Toisaalta voimme osoittaa että jos $x \in \mathbb{R}$ ja $x \notin I$, mikään joukon I jono ei suppene kohti pistettä x . Teemme jälleen vastaoletuksen, eli että löytyy jono a joukossa I joka suppenee kohti pistettä x .

Nyt voimme valita pisteelle x ympäristön $U \subset \mathbb{R}$ siten, että

$$(5.4) \quad U = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid a_i = x \text{ jollain } i \in \mathbb{N}\}$$

Selvästi tämä joukko on avoin, koska tämän joukon komplementti on jonon arvojoukko, joka on selvästi numeroituva. Selvästi joukko U myös sisältää pisteen x , sillä jonon arvot jäävät joukkoon I mutta $x \notin I$. Täten U on pisteen x ympäristö, ja toisaalta myös selvästi jonon alkioit eivät ikinä sisälly tähän joukkoon. Koska jonon suppeneminen vaatii että jokaiselle pisteen x ympäristölle pätee että ennen pitkään jono saa arvonsa tässä joukossa, saamme ristiriidan, eli mikään yksikkövälin I jono ei suppene kohti pistettä x .

Täten sulkeuma on merkittävässä avaruudessamme laajempi kuin jonojen suppenemispisteet. Jotta saisimme kuvailtua sulkeumaa suppenemisen kautta, meidän on käytettävä jonoja yleisempää käsitettä.

Luku 6

Verkko

Suunnattu verkko yleistää verkon käsitettä. Isolta osin verkon määritelmä vastaa jonon määritelmää, joten mainitsemme erikseen mikäli verkon ominaisuus poikkeaa jonosta.

Jono on kuvaus luonnollisilta luvuilta \mathbb{N} kohdeavaruuteen X . Verkko sen sijaan ottaa lähtöavaruudekseen jonkin *suunnatun joukon*. Suunnattu joukko on määritelty seuraavasti:

Määritelmä 6.1. *Suunnattu joukko.* Olkoon joukko X jokin joukko, jossa on määritelty relaatio \leq joka toteuttaa seuraavat ehdot:

(V1) Jos $a, b, c \in X$, ja $a \leq b \leq c$, tällöin $a \leq c$ (transitiivisuus)

(V2) Jos $a \in X$, tällöin $a \leq a$.

(V3) Jos $a, b \in X$, tällöin on olemassa $c \in X$ siten, että $a \leq c$ ja $b \leq c$.

Kutsumme paria (X, \leq) *suunnatuksi joukoksi*

Ehto V3 erottaa tämän jonon määritelmästä. Toisin kuin luonnollisilla luvuilla, järjestyksemme on vain osittainen. Jos $a, b \in X$, ei välttämättä päde $a \leq b$ eikä $b \leq a$. Ehto V3 kuitenkin antaa meille keinon puhua suppenemisestä liki identtisesti samalla tavoin kuin jonoilla.

Määritelmä 6.2. *Verkko.* Olkoon \mathcal{D} suunnattu joukko, X avaruus, ja $n : \mathcal{D} \rightarrow X$ kuvaus suunnatusta joukosta \mathcal{D} avaruuteen X . Tällöin sanomme että n on avaruuden X *verkko*. Mikäli kaikki verkon n arvot kuuluvat avaruuden X osajoukkoon A , sanomme että n on verkko joukossa A .

Osoittautuu että aiemmin käyttämämme määritelmä jonon suppenemiselle kelpaa lähes sellaisenaan verkon suppenemisen määrittelemiselle, korvaamalla jonon verkolla.

Määritelmä 6.3. *Verkon suppeneminen.* Olkoon X topologinen avaruus, ja n avaruuden X verkko. Sanomme, että verkko *suppenee* kohti pistettä x mikäli jokaiselle pisteen x ympäristölle U löytyy joukon \mathcal{D} alkio $d_U \in \mathcal{D}$ siten, että jos $d_U \leq d$, tällöin $n(d) \in U$.

Nyt voimme osoittaa että mielivaltaisessa topologisessa avaruudessa, piste kuuluu joukon sulkeumaan jos ja vain jos jokin tämän joukon verkko suppenee kohti tätä pistettä.

Lause 6.4. *Olkoon X avaruus, ja $A \subset X$ tämän avaruuden osajoukko. Jos piste $x \in X$ kuuluu joukon A sulkeumaan, löytyy verkko $n : \mathcal{D} \rightarrow A$ joka suppenee kohti pistettä x , ja kääntäen, mikäli on olemassa verkko $n : \mathcal{D} \rightarrow A$ joka suppenee kohti pistettä x , tällöin $x \in \overline{A}$.*

Todistus.

Suunta \leftarrow

Olkoon X avaruus, $A \subset X$ joukko ja $n : \mathcal{D} \rightarrow A$ verkko joka suppenee kohti pistettä $x \in X$. Osoitamme että piste x kuuluu joukon A sulkeumaan.

Olkoon $U \subset X$ jokin pisteen x ympäristö. Koska verkko n suppenee kohti pistettä x , löytyy verkon lähtöavaruuden alkio d_U jolle pätee, mikäli $d_u \leq d$, tällöin $n(d) \in U$. Täten siis $n(d_U) \in U$, mutta toisaalta myös verkon määritelmän perusteella $n(d_U) \in A$, eli $n(d_U) \in U \cap A \neq \emptyset$

Suunta \rightarrow

Olkoon X avaruus, $A \subset X$ joukko ja $x \in \overline{A}$ joukon A sulkeuman piste. Osoitamme että löytyy verkko $n : \mathcal{D} \rightarrow A$ joka suppenee kohti pistettä x .

Määritellään joukko \mathcal{D} seuraavasti:

$$(6.5) \quad \mathcal{D} = \{U \cap A \mid U \text{ on pisteen } x \text{ ympäristö}\}$$

Koska piste x kuuluu joukon A sulkeumaan, jokainen pisteen x ympäristö leikkaa joukon A , eli jokainen joukon \mathcal{D} alkio on epätyhjä joukko. Voimme siis liittää jokaiseen joukon \mathcal{D} alkioon jonkin pisteen $a_U \in A \cap U$. Voimme siis rakentaa kuvauksen $n : \mathcal{D} \rightarrow A, n(U) \in A \cap U$. Emme määrittele funktiota tuon tarkemmin, meille riittää tietää että jokaiselle alkioille voidaan tämän ehdon toteuttava funktion arvo määrätä.

Nyt voimme suunnata joukon \mathcal{D} relaatiolla \supset . Relaatio \supset tunnetusti toteuttaa transitiivisuuden ja refleksiivisyyden, eli ehdot V1 ja V2. Ehden V3 toteutumiseksi huomaamme, että mikäli valitsemme kaksi mielivaltaista avaruuden \mathcal{D} jäsentä $D_1, D_2 \in \mathcal{D}$, tällöin D_n on muotoa $A \cap U_n$, jossa U_n on pisteen x ympäristö. Topologian määritelmän ehdon T2 mukaan siis leikkaus $U_1 \cap U_2 =: U$ on myös avoin joukko. Toisaalta koska joukko U sisältää pisteen x , on U myös pisteen x ympäristö, eli $A \cap U$ sisältyy joukkoon \mathcal{D} . Toisaalta $D_1 = U_1 \cap A \supset U \cap A$ ja $D_2 = U_2 \cap A \supset U \cap A$. Täten joukon \mathcal{D} alkio $U \cap A$ toteuttaa ehtomme.

Funktio $n : \mathcal{D} \rightarrow A$ on siis verkko. Jäljellä on enää osoittaa että n suppenee kohti pistettä x .

Olkoon U jokin pisteen x ympäristö. Meidän on löydettävä joukon \mathcal{D} alkio d_U jolle pätee

$$(6.6) \quad \text{jos } d_U \supset d, \text{ tällöin } n(d) \in U$$

Tällainen alkio löytyy muodossa $d_U = A \cap U$. Jos jokin joukon \mathcal{D} alkio d sisältyy alkioon d_U , eli pätee $d \supset d_U$, tällöin piste d on muotoa $d = V \cap A$, joten $V \subseteq U$. Täten $n(d) \in V \subset U$. Täten n suppenee kohti pistettä x .

Kirjallisuutta

[1] Jussi Väisälä: Topologia II