

Пластическая хирургия

1. Укажите, какой принцип является основополагающим при организации пластической хирургической помощи в стоматологии?

A) Максимальное сокращение времени операции

B) Централизация всех видов помощи

C) Этапность и преемственность лечения

D) Использование только стационарных методов

E) Исключение амбулаторного этапа

2. Отметьте, какой уровень оказания помощи обеспечивает выполнение сложных реконструктивных операций челюстно-лицевой области?

A) Первичный уровень

B) Амбулаторный уровень

C) Вторичный уровень

D) Третичный уровень

E) Доврачебный уровень

3. Укажите, что является основным критерием направления пациента на стационарное лечение?

A) Желание пациента

B) Наличие косметического дефекта

C) Сложность вмешательства и необходимость круглосуточного наблюдения

D) Возраст пациента

E) Отсутствие амбулаторных условий

4. Отметьте, какая форма организации помощи наиболее эффективна для первичного выявления пациентов с челюстно-лицевыми деформациями?

A) Стационар

B) Частная клиника

C) Поликлиника

D) Реабилитационный центр

Е) Санаторий

5. Укажите, какой специалист играет ключевую роль в мультидисциплинарной команде при пластических операциях лица?

А) Терапевт

В) Челюстно-лицевой хирург

С) Ортопед

Д) Рентгенолог

Е) Фармацевт

6. Укажите, какой документ регламентирует объем и порядок оказания специализированной помощи?

А) Личный план врача

В) Международные рекомендации

С) Клинические протоколы и стандарты

Д) Запрос пациента

Е) Страховой полис

7. Укажите, какой этап организации помощи включает восстановительное

лечение и социальную адаптацию пациента?

А) Диагностический

В) Хирургический

С) Реабилитационный

Д) Подготовительный

Е) Экстренный

8. Отметьте, что является основным показателем эффективности организации хирургической помощи?

А) Количество операций

В) Длительность госпитализации

С) Уровень функционального и эстетического восстановления

Д) Стоимость лечения

Е) Количество персонала

9. Укажите, какая структура отвечает за координацию специализированной челюстно-лицевой помощи на региональном

уровне?

A) Аптека

B) Частный кабинет

C) Центр челюстно-лицевой хирургии

D) Школа

E) Лаборатория

10. Укажите, какой фактор наиболее важен при планировании пластической операции в стоматологии?

A) Время года

B) Пол пациента

C) Цвет кожи

D) Социальный статус

E) Анатомо-функциональные особенности дефекта

11. Укажите, какой принцип является ключевым при выборе метода пластики дефекта лица с учётом эстетических единиц?

A) Минимизация времени операции

B) Замещение дефекта тканями аналогичной структуры и цвета

C) Использование только местных тканей

D) Приоритет линейного закрытия раны

E) Применение синтетических материалов

12. Укажите, что является решающим фактором жизнеспособности кожно-фасциального лоскута на лице при его планировании:

A) Толщина кожи

B) Направление кожных складок

C) Тип кровоснабжения

D) Цвет кожи

E) Возраст пациента

13. Укажите, какой метод является предпочтительным при реконструкции сквозного дефекта щеки? A) Свободная кожная пластика

B) Линейное ушивание

C) Местные лоскуты без учета слоев

D) Послойная реконструкция с восстановлением слизистой, мышц и кожи

E) Использование только аллопластических материалов

14. Укажите, что является главным ограничением применения свободных кожных трансплантатов в области лица?

A) Высокая стоимость

B) Длительность операции

C) Отсутствие собственной васкуляризации

D) Сложность фиксации

E) Болезненность

15. Отметьте, какой тип лоскута обладает независимым сосудистым пучком и может быть перемещён на значительное расстояние?

A) Случайный кожный лоскут

B) Ротационный лоскут

C) Свободный микрохирургический лоскут

D) Z-пластика

E) Треугольный лоскут

16. Укажите, какой принцип лежит в основе Z-пластики?

A) Уменьшение площади дефекта

B) Удлинение рубца и изменение его направления

C) Увеличение толщины тканей

D) Усиление кровоснабжения

E) Закрытие дефекта трансплантатом

17. Отметьте, что является ключевым фактором при выборе метода реконструкции дефекта нижней челюсти:

A) Цвет кожи пациента

B) Состояние зубов

C) Размер и локализация дефекта

D) Пол пациента

Е) Время суток операции

18. Укажите, какое осложнение наиболее характерно при нарушении венозного оттока в лоскуте?

А) Некроз по типу сухой гангрены

В) Отек и цианоз тканей

С) Атрофия кожи

Д) Образование рубца

Е) Гиперемия без последствий

19. Какой метод является золотым стандартом при реконструкции обширных костных дефектов челюсти?

А) Свободная кожная пластика

В) Аллопластика без фиксации

С) Аутотрансплантация васкуляризированного костного лоскута D) Протезирование без операции

Е) Линейное ушивание

20. Отметьте, какой фактор наиболее критичен для успешной микрохирургической трансплантации лоскута?

А) Длительность предоперационного периода

В) Точность сосудистого анастомоза

С) Цвет тканей

Д) Размер операционного поля

Е) Температура тела пациента

21. Укажите, какой путь является наиболее опасным при распространении гнойного процесса из области верхней губы:

А) Через лицевую вену в подключичную вену

В) Через угловую вену в кавернозный синус

С) Через яремную вену в сердце

Д) Через лимфатические сосуды в грудной проток

Е) Через артерии лица

22. Укажите, какое анатомическое образование ограничивает подвисочную ямку латерально?

- A) Крыловидный отросток
- B) Латеральная крыловидная мышца
- C) Скуловая дуга
- D) Височная кость
- E) Ветвь нижней челюсти**

23. Отметьте, повреждение какого нерва приведёт к утрате чувствительности кожи подбородка?

- A) N. mentalis**
- B) N. alveolaris inferior
- C) N. lingualis
- D) N. buccalis
- E) N. auriculotemporalis

24. Укажите, какое пространство шеи является основным путём распространения инфекции в средостение?

- A) Поднижнечелюстное

B) Заглоточное

- C) Предтрахеальное
- D) Окологлоточное
- E) Позадипищеводное

25. Укажите, какое анатомическое образование проходит через foramen ovale?

- A) N. maxillaris

B) N. mandibularis

- C) N. ophthalmicus
- D) A. meningea media
- E) V. jugularis interna

26. Укажите, какое анатомическое образование наиболее вероятно будет повреждено при переломе в области foramen spinosum?

- A) N. facialis
- B) Sinus cavernosus

C) N. glossopharyngeus

D) A. meningea media

E) A. carotis interna

27. Отметьте, какое анатомическое образование разделяет передний и задний треугольники шеи?

A) M. sternocleidomastoideus

B) M. digastricus

C) M. omohyoideus

D) M. platysma

E) M. mylohyoideus

28. Укажите, какое последствие наблюдается при повреждении n. hypoglossus:

A) Потеря чувствительности языка

B) Отклонение языка в здоровую сторону

C) Спазм жевательных мышц

D) Потеря вкуса

E) Отклонение языка в сторону поражения

29. Укажите, какой из нижеперечисленных артерий проходит в сонном треугольнике шеи?

A) A. vertebralis

B) A. facialis

C) A. subclavia

D) A. carotis communis

E) A. lingualis

30. Укажите, какое анатомическое образование является медиальной границей окологлоточного пространства?

A) Ветвь нижней челюсти

B) Медиальная крыловидная мышца

C) Позвоночник

D) Стенка глотки

Е) Подъязычная кость

31. Укажите, какое анатомическое образование служит ориентиром при анестезии нижнего альвеолярного нерва:

А) Скуловая дуга

В) Язычная кость

С) Вырезка нижней челюсти

Д) Подбородочное отверстие

Е) Язычок нижней челюсти

32. Укажите, какой нерв проходит через canalis facialis?

А) N. trigeminus

В) N. vagus

С) N. facialis

Д) N. glossopharyngeus

Е) N. accessorius

33. Отметьте, на каком уровне происходит деление a. carotis communis?

А) На уровне C2

В) На уровне C1

С) На уровне C5

Д) На уровне C6

Е) На уровне C3–C4

34. Отметьте, какое пространство связано с крылонёбной ямкой?

А) Орбита

В) Полость носа

С) Подвисочная ямка

Д) Все перечисленные

Е) Ни одно

35. Отметьте, какой нерв отвечает за чувствительность передних 2/3 языка?

А) N. glossopharyngeus

В) N. vagus

C) N. lingualis

D) N. hypoglossus

E) N. facialis

36. Укажите, травма какого нерва возможна при повреждении околоушной железы:

A) N. trigeminus

B) N. glossopharyngeus

C) N. vagus

D) N. hypoglossus

E) N. facialis

37. Отметьте, какое образование проходит через fissura orbitalis superior?

A) N. oculomotorius

B) N. opticus

C) A. ophthalmica

D) N. maxillaris

E) N. mandibularis

38. Укажите, какое анатомическое образование является основным венозным коллектором лица:

A) V. facialis

B) V. retromandibularis

C) V. subclavia

D) V. jugularis interna

E) V. angularis

39. Отметьте, в какой области локализуется крылонёбный узел?

A) В орбите

B) В подвисочной ямке C) В полости носа

D) В крылонёбной ямке

E) В околоушной железе

40. Отметьте, какой нерв иннервирует жевательные мышцы лица?

A) N. facialis

B) N. mandibularis

C) N. maxillaris

D) N. glossopharyngeus

E) N. vagus

41. Укажите область, являющуюся наиболее вероятным источником при тромбозе кавернозного синуса:

A) Затылочная область

B) Нижнечелюстная область

C) Область верхней губы и носогубный треугольник

D) Область шеи

E) Ушная область

42. Отметьте, какое анатомическое образование проходит в canalis caroticus?

A) A. carotis externa

B) N. hypoglossus

C) V. jugularis interna

D) N. vagus

E) A. carotis interna

43. Отметьте, в какой основной лимфатический узел происходит отток от языка:

A) Подбородочные узлы

B) Поднижнечелюстные узлы

C) Глубокие шейные лимфоузлы

D) Затылочные узлы

E) Околоушные узлы

44. Укажите, какое пространство ограничено поверхностной и глубокой пластинками собственной фасции шеи?

A) Поднижнечелюстное

B) Заглоточное

C) Окологлоточное

D) Надгрудинное межапоневротическое

E) Подподбородочное

45. Укажите, какое пространство наиболее часто вовлекается при распространении инфекции из зубов нижней челюсти:

A) Подъязычное пространство

B) Поднижнечелюстное пространство

C) Заглоточное пространство

D) Околоушное пространство

E) Позвоночное пространство

46. Укажите, какой сосуд является основным источником кровоснабжения твёрдой мозговой оболочки в височной области?

A) Лицевая артерия

B) Затылочная артерия

C) Поверхностная височная артерия

D) Глазная артерия

E) Средняя менингеальная артерия

47. Укажите, за счет чего частично сохраняется кровоснабжение лица при перевязке наружной сонной артерии:

A) Только позвоночных артерий

B) Венозных коллатералей

C) Только подключичной артерии

D) Анастомозов с внутренней сонной артерией

E) Лимфатической системы

48. Укажите, какой нерв обеспечивает двигательную иннервацию мимических мышц?

A) Тройничный нерв

B) Языкоглоточный нерв

C) Лицевой нерв

D) Подъязычный нерв

E) Блуждающий нерв

49. Отметьте, поражение какого нерва связано с нарушением вкуса на передних двух третях языка:

A) Лицевого нерва

B) Язычного нерва

C) Языкоглоточного нерва

D) Подъязычного нерва

E) Блуждающего нерва

50. Отметьте, какой сосуд кровоснабжает щитовидную железу снизу?

A) Верхняя щитовидная артерия

B) Затылочная артерия

C) Лицевая артерия

D) Язычная артерия

E) Нижняя щитовидная артерия

51. Отметьте, какой нерв наиболее уязвим при операции на околоушной железе?

A) Подъязычный нерв

B) Блуждающий нерв

C) Лицевой нерв

D) Языкоглоточный нерв

E) Тройничный нерв

52. Укажите, какой сосуд участвует в формировании поверхностной височной артерии?

A) Подключичная артерия

B) Позвоночная артерия C) Внутренняя сонная артерия

D) Наружная сонная артерия

E) Основная артерия

53. Укажите, при повреждении какого нерва нарушается чувствительность кожи нижней губы?

A) Щёчный нерв

B) Подглазничный нерв

С) Язычный нерв

D) Ушно-височный нерв

E) Подбородочный нерв

54. Укажите, какой нерв регулирует секрецию околоушной слюнной железы?

A) Лицевой нерв

B) Тройничный нерв

C) Языкоглоточный нерв

D) Подъязычный нерв

E) Блуждающий нерв

55. Отметьте, какая артерия является основным источником кровоснабжения языка:

A) Лицевая артерия

B) Верхняя щитовидная артерия

C) Восходящая глоточная артерия

D) Затылочная артерия

E) Язычная артерия

56. Укажите, какой нерв обеспечивает общую чувствительность передних двух третей языка?

A) Лицевой нерв

B) Язычный нерв

C) Языкоглоточный нерв

D) Подъязычный нерв

E) Блуждающий нерв

57. Укажите, какой сосуд кровоснабжает орбиту?

A) Лицевая артерия

B) Глазная артерия

C) Поверхностная височная артерия

D) Верхнечелюстная артерия

E) Затылочная артерия

58. Отметьте, повреждение какого нерва приведёт к параличу жевательных мышц?

- A) Лицевой нерв
- B) Языкоглоточный нерв
- C) Верхнечелюстной нерв
- D) Нижнечелюстной нерв**
- E) Подъязычный нерв

59. Отметьте, какой сосуд участвует в кровоснабжении твёрдого нёба? A) Восходящая нёбная артерия

- B) Нисходящая нёбная артерия**
- C) Язычная артерия
- D) Лицевая артерия
- E) Затылочная артерия

60. Отметьте, какой нерв иннервирует мышцы языка?

- A) Язычный нерв
- B) Языкоглоточный нерв
- C) Подъязычный нерв**
- D) Лицевой нерв
- E) Блуждающий нерв

61. Отметьте, какой процесс опасен при повреждение внутренней яремной вены из-за травмы шеи:

- A) Артериального кровотечения
- B) Повреждения костей
- C) Потери иннервации
- D) Лимфатического отёка
- E) Риска воздушной эмболии**

62. Укажите, какой нерв участвует в образовании шейного сплетения?

- A) Лицевой нерв
- B) Тройничный нерв
- C) Спинномозговые нервы шеи**
- D) Блуждающий нерв

Е) Языкоглоточный нерв

63. Укажите, какой сосуд формирует основной приток крови к головному мозгу?

А) Затылочная артерия

В) Язычная артерия

С) Лицевая артерия

D) Внутренняя сонная артерия

Е) Наружная сонная артерия

64. Укажите, какой нерв отвечает за иннервацию гортани?

А) Подъязычный нерв

В) Язычный нерв

С) Лицевой нерв

Д) Тройничный нерв

Е) Блуждающий нерв

65. Отметьте, какая артерия участвует в кровоснабжении губ?

А) Лицевая артерия

В) Затылочная артерия

С) Позвоночная артерия

Д) Основная артерия

Е) Внутренняя сонная артерия

66. Укажите, повреждение какого нерва вызывает нарушение подъёма плеча? А) Подъязычный нерв

В) Языкоглоточный нерв

С) Лицевой нерв

Д) Добавочный нерв

Е) Тройничный нерв

67. Укажите, какой сосуд кровоснабжает задние отделы мозга?

А) Внутренняя сонная артерия

В) Верхнечелюстная артерия

С) Лицевая артерия

D) Язычная артерия

E) Позвоночная артерия

68. Укажите, какой нерв обеспечивает чувствительность кожи щеки?

A) Подглазничный нерв

B) Язычный нерв

C) Подбородочный нерв

D) Щёчный нерв

E) Ушной нерв

69. Укажите, какой сосуд участвует в формировании артериального круга мозга?

A) Внутренняя сонная артерия

B) Лицевая артерия

C) Затылочная артерия

D) Верхняя щитовидная артерия

E) Язычная артерия

70. Укажите, при повреждении какого нерва нарушается глотание?

A) Лицевой нерв

B) Подглазничный нерв

C) Подъязычный нерв

D) Щёчный нерв

E) Языкоглоточный нерв

71. Укажите, какое осложнение произошло: у пациента после удаления 3.8 развилась стойкое анемение нижней губы и подбородка?

A) Повреждение n. lingualis на уровне spina spixii

B) Повреждение ramus marginalis n. facialis

C) Компрессия n. buccalis в regio retromolaris

D) Травма n. alveolaris inferior в canalis mandibulae

E) Ишемия n. mentalis без структурного повреждения

72. Укажите, повреждение какого нерва наиболее вероятно, если у пациента после травмы лица наблюдается невозможность смыкания

век.?

- A) N. trigeminus
- B) N. trochlearis
- C) N. oculomotorius
- D) N. abducens

E) N. facialis

73. Укажите, расположение какого нерва необходимо учитывать при выполнении разреза в поднижнечелюстной области:

- A) N. auricularis magnus
- B) N. occipitalis minor
- C) Ramus buccalis n. facialis

D) Ramus marginalis mandibulae n. facialis

E) N. transversus colli

74. Укажите, какой нерв повреждён, если после травмы нижней челюсти пациент потерял чувствительность языка с одной стороны.

- A) N. alveolaris inferior
- B) N. vagus
- C) N. hypoglossus
- D) N. glossopharyngeus

E) N. lingualis

75. Укажите, с повреждением какого анатомического образования связана основная опасность при операции на околоушной железе:

- A) A. carotis interna
- B) V. jugularis interna
- C) N. trigeminus

D) N. facialis

E) N. hypoglossus

76. Отметьте, какое анатомическое образование служит ориентиром при перевязке язычной артерии:

A) Cornu majus ossis hyoidei

- B) Angulus mandibulae
- C) Processus mastoideus
- D) Arcus zygomaticus
- E) Clavicula

77. Укажите, какое анатомическое образование критически важно сохранить при формировании слизисто-надкостничного лоскута:

- A) Только эпителий
- B) Нервные окончания
- C) Мышечные волокна
- D) Надкостницу для кровоснабжения**
- E) Лимфатические сосуды

78. Укажите, повреждение какой артерии чаще связано с кровотечением при операции на нижней челюсти:

- A) A. maxillaris
- B) A. facialis
- C) A. temporalis superficialis
- D) A. alveolaris inferior**
- E) A. carotis interna

79. Укажите, через какие анатомические образования проходит путь распространения инфекции из верхней челюсти в орбиту: A) Foramen mentale

- B) Foramen spinosum
- C) Foramen ovale
- D) Canalis mandibulae

E) Fissura orbitalis inferior

80. Укажите, при прижатии какой артерии возможна временная остановка при травме лица с массивным кровотечением:

- A) A. carotis externa к позвоночнику
- B) A. facialis к нижней челюсти**
- C) A. carotis communis к поперечному отростку
- D) A. temporalis superficialis к височной кости

Е) A. lingualis к подъязычной кости

81. Отметьте важнейшее условие при пластике дефекта нёба:

А) Герметичное разделение полости рта и носа

В) Только косметический результат

С) Минимальная длительность операции

Д) Использование синтетических материалов

Е) Исключение швов

82. Укажите, какой метод обезболивания является оптимальным с точки зрения контроля мягких тканей и минимальной деформации при операции эстетической пластики десны во фронтальном отделе верхней челюсти?

А) Проводниковая анестезия подглазничного нерва

В) Инфильтрационная анестезия с вестибулярной стороны

С) Интралигаментарная анестезия

Д) Нёбная инфильтрационная анестезия

Е) Аппликационная анестезия

83. Укажите, какой фактор наиболее критичен при выполнении эстетической рецессии десны чтобы избежать ишемии тканей?

А) Объем анестетика

В) Скорость введения

С) Температура раствора

Д) Концентрация вазоконстриктора

Е) Тип иглы

84. Укажите причину выраженной асимметрии у пациента после инфильтрационной анестезии в области верхней губы:

А) Повреждение лицевой артерии

В) Блокада ветвей лицевого нерва

С) Спазм жевательных мышц

Д) Повреждение тройничного нерва

Е) Аллергическая реакция

85. Отметьте, какой анестетик предпочтителен при длительных эстетических вмешательствах?

- A) Мепивакаин с адреналином
- B) Мепивакаин без адреналина
- C) Лидокаин без вазоконстриктора
- D) Новокаин

E) Артикаин

86. Укажите основной фактор боли при проведении нёбной анестезии:

- A) Тип раствора
- B) Температура анестетика
- C) Длина иглы

D) Высокое давление при введении

E) Концентрация анестетика

87. Укажите, какой метод обезболивания наиболее целесообразен при пластике уздечки верхней губы?

A) Инфильтрационная анестезия с двух сторон

- B) Только аппликационная анестезия
- C) Проводниковая анестезия нижнечелюстного нерва
- D) Общая анестезия
- E) Интралигаментарная анестезия

88. Отметьте основную цель добавления вазоконстриктора в анестетик при его использовании:

- A) Уменьшение боли
- B) Ускорение действия

C) Снижение кровоточивости и пролонгация эффекта

- D) Предотвращение аллергии
- E) Увеличение диффузии

89. Отметьте, какой нерв блокируется при туберальной анестезии?

- A) Подглазничный нерв
- B) Язычный нерв
- C) Нижний альвеолярный нерв

D) Верхние задние альвеолярные нервы

E) Щёчный нерв

90. Укажите, какой фактор важно учитывать при эстетических вмешательствах во фронтальном отделе:

A) Деформацию мягких тканей от раствора

B) Только глубину анестезии

C) Длину иглы

D) Цвет раствора

E) Скорость метаболизма

91. Отметьте, какое осложнение наиболее характерно для нёбной анестезии при высокой концентрации адреналина?

A) Кровотечение

B) Отёк нёба

C) Некроз слизистой

D) Тризм

E) Парез языка

92. Отметьте фактор, из-за которого снижается эффективность анестетика при проведении инфильтрационной анестезии на нижней челюсти: **A) Плотной кортикальной пластинки**

B) Повышенной иннервации

C) Высокой васкуляризации

D) Толстой слизистой

E) Низкого давления

93. Укажите, какой фактор важно учитывать при выборе метода обезболивания у пациента с сердечно-сосудистой патологией:

A) Цвет кожи

B) Концентрацию вазоконстриктора

C) Длину иглы

D) Температуру раствора

E) Скорость введения

94. Укажите, какой метод обезболивания обеспечит контроль боли без

выраженной деформации тканей в зоне операции пластики рецессии десны в области 1.1–2.1 с использованием соединительнотканного трансплантата?

А) Инфильтрационная анестезия вестибулярно в зоне операции с артикаином с адреналином

В) Проводниковая анестезия подглазничного нерва с минимальной инфильтрацией в зоне операции

С) Интралигаментарная анестезия всех фронтальных зубов

Д) Нёбная инфильтрационная анестезия в области резцов

Е) Аппликационная анестезия в сочетании с внутривульварной

95. Укажите, какой вариант анестезии наиболее безопасен при операции эстетической гингивопластики у пациента с ишемической болезнью сердца?

А) Артикаин с адреналином 1:100 000 в стандартной дозе

В) Лидокаин с адреналином 1:50 000

С) Мепивакаин без вазоконстриктора

Д) Артикаин с адреналином 1:200 000 в максимальной дозе

Е) Новокаин с адреналином

96. Укажите основную причину возникновения выраженного отёка, искажающего контур десны после инфильтрации при эстетической операции во фронтальном отделе:

А) Неправильный выбор иглы

В) Слишком медленное введение

С) Низкая концентрация раствора

Д) Отсутствие вазоконстриктора

Е) Чрезмерный объём анестетика

97. Отметьте, какой подход наиболее рационален при выборе анестезии для эстетической операции для минимизирования кровоточивости?

А) Использование анестетика без вазоконстриктора

В) Применение высокой концентрации вазоконстриктора без

ограничений

C) Использование анестетика с вазоконстриктором в контролируемой концентрации

D) Только аппликационная анестезия

E) Исключительно проводниковая анестезия без инфильтрации

98. Укажите наиболее вероятную причину возникновения тахикардии и тревожности после анестезии:

A) Повреждение нерва

B) Инфекция

C) Некроз тканей

D) Системное действие вазоконстриктора

E) Неправильная техника шва

99. Укажите, какой шовный материал наиболее предпочтителен для минимизации воспалительной реакции при проведении пластики рецессии десны в эстетически значимой зоне у пациента с тонким биотипом тканей?

A. Полигликолевая кислота

B. Шёлк

C. Полипропилен

D. Кетгут простой

E. Полиэстер

100. Укажите, какой уровень фиксации тканей обеспечивает наиболее долговременный результат при выраженном птозе средней зоны лица, углубление носогубных складок у пациентки 58 лет?

A. Кожный

B. Подкожно-жировой

C. SMAS

D. Надкостничный

E. Дермальный

101. Укажите наиболее критичную зону риска повреждения лицевого нерва при выполнении SMAS-лифтинга:

- A. Подподбородочная область
- B. Щёчная область
- C. Височная область
- D. Область угла нижней челюсти

E. Зона проекции скуловой дуги

102. Укажите, какая техника является оптимальной у пациента с выраженными «брылями» и сниженным тонусом нижней трети лица:

- A. Изолированный кожный лифтинг
- B. Липосакция

C. SMAS-пликация

- D. Блефаропластика
- E. Резекция платизмы без лифтинга

103. Отметьте, какой метод является наиболее эффективным при коррекции возрастных изменений шеи с выраженной медиальной платизмальной бандажностью:

- A. Латеральная платизмопластика

B. Медиальная платизмопластика

- C. Липофилинг
- D. Подкожная подтяжка
- E. Инъекционная коррекция

104. Укажите наиболее вероятную причину у пациентки после лифтинга наблюдается асимметрия мимики.:

- A. Гематома
- B. Отёк тканей

C. Повреждение ветви лицевого нерва

- D. Серома
- E. Рубцовая контрактура

105. Отметьте, какая основная анатомическая структура подлежит мобилизации при глубоком лифтинге средней зоны лица:

- A. Жевательная мышца

B. SMAS-комплекс

C. Периост

D. Круговая мышца рта

E. Подкожная клетчатка

106. Отметьте, какое хирургическое вмешательство предпочтительно у пациента с избыточным жировым отложением в подподбородочной области и сохранённым тонусом кожи:

A. Цервикопластика

B. Липосакция

C. SMAS-лифтинг

D. Платизмопластика

E. Кожная резекция

107. Отметьте процесс, являющийся основным показанием к изолированной цервикопластике:

A. Возрастные изменения шеи без выраженного птоза лица

B. Выраженные носогубные складки

C. Деформация овала лица

D. Птоз средней зоны лица

E. Птоз бровей

108. Отметьте основную цель при выполнении височного лифтинга:

A. Подтяжка шеи

B. Коррекция нижней трети лица

C. Подъём латеральной части брови

D. Устранение носогубных складок

E. Уменьшение подбородка

109. Отметьте, какой метод хирургической коррекции наиболее обоснован при выраженных носослёзных бороздах у пациентки?

A. Липосакция

B. Блефаропластика с репозицией жира

C. Платизмопластика D. SMAS-лифтинг

Е. Кожная резекция

110. Отметьте важнейший фактор профилактики некроза кожных лоскутов при выполнении лифтинга лица:

А. Использование толстых нитей

В. Применение дренажей

С. Увеличение длины разреза

Д. Глубокая анестезия

Е. Минимизация натяжения кожи

111. Отметьте наиболее эффективную технику при выраженном птозе тканей средней зоны лица техника:

А. Мини-лифтинг

В. Эндоскопический лифтинг

С. Кожная подтяжка

Д. Липофилинг

Е. Инъекционная терапия

112. Укажите предпочтительное хирургическое вмешательство у пациента с тонкой кожей и минимальным птозом:

А. Глубокий лифтинг

В. Агрессивная резекция тканей

С. Минимально инвазивные методы

Д. Платизмопластика

Е. Резекция SMAS

113. Отметьте, какая кость является важным ориентиром для предотвращения повреждения нервов при хирургической коррекции шеи:

А. Подъязычная кость

В. Ключица

С. Скуловая кость

Д. Край нижней челюсти

Е. Носовая кость

114. Укажите повреждение какого нерва наиболее вероятно, если у пациента после лифтинга отмечается длительная гипестезия кожи.:

A. Двигательных ветвей лицевого нерва

B. Тройничного нерва

C. Чувствительных ветвей шейного сплетения

D. Блуждающего нерва

E. Подъязычного нерва

115. Отметьте, какой фактор является ключевым при выборе метода лифтинга:

A. Цвет кожи

B. Возраст пациента

C. Пол пациента

D. Степень птоза тканей

E. Время года

116. Укажите, какая комбинация является оптимальной при выраженной платизмальной бандажностью и избытком кожи:

A. Липосакция + филлеры

B. Платизмопластика + кожная резекция

C. SMAS-лифтинг+ филлеры

D. Блефаропластика+ филлеры

E. Липофилинг+ филлеры

117. Отметьте основное преимущество эндоскопического лифтинга:

A. Минимальная инвазивность

B. Высокая травматичность

C. Большие разрезы

D. Длительная реабилитация

E. Высокий риск осложнений

118. Отметьте основную причину, если после операции отмечается «перетянутое» лицо:

A. Недостаточная фиксация SMAS

В. Чрезмерное натяжение кожи

С. Отек тканей

Д. Гематома

Е. Инфекция

119. Укажите наиболее обоснованную тактику при посттравматической деформации скуловой области с нарушением проекции и сохранённой подвижностью костных фрагментов:

А. Остеотомия и репозиция с фиксацией

В. Контурная пластика филлерами

С. Липофилинг

Д. Резекция скуловой кости

Е. Только мягкотканная коррекция

120. Отметьте ключевой фактор при планировании реконструкции асимметрии лица после перелома нижней челюсти:

А. Цвет кожи

В. Толщина кожи

С. Возраст пациента

Д. Тип шовного материала

Е. Состояние зубного ряда и окклюзия

121. Укажите наиболее рациональный метод коррекции рубцовой контрактуры щеки с ограничением открывания рта:

А. Липосакция

В. Z-пластика

С. Филлеры

Д. SMAS-лифтинг

Е. Дермабразия

122. Отметьте оптимальную тактику при посттравматической деформации носа с выраженным смещением перегородки:

А. Только ринопластика мягких тканей В. Липофилинг

С. Контурная пластика

D. Септоринопластика

E. Наблюдение

123. Укажите основной принцип коррекции посттравматической асимметрии мягких тканей лица:

A. Удаление избыточной ткани

B. Только подтяжка кожи

C. Восстановление объёма и анатомических ориентиров

D. Использование рассасывающихся нитей

E. Минимизация разрезов

124. Отметьте наиболее предпочтительный метод при дефиците мягких тканей в подбородочной области после травмы:

A. Липофилинг

B. Липосакция

C. Резекция кости

D. Дермабразия

E. Блефаропластика

125. Укажите правильную тактику при выраженной деформации орбитальной области после травмы с диплопией:

A. Липофилинг

B. Наблюдение

C. Кожная подтяжка

D. Инъекции ботулотоксина

E. Реконструкция стенок орбиты

126. Отметьте фактор, определяющий выбор остеотомии при коррекции скуловой деформации:

A. Цвет кожи

B. Время года

C. Пол пациента

D. Локализация и степень смещения

E. Тип анестезии

127. Укажите оптимальную тактику при гипертрофическом рубце в области лица:

А. Немедленная резекция

В. Липосакция

С. Комбинированная терапия (инъекции + хирургия)

Д. Только массаж

Е. Наблюдение

128. Отметьте наиболее важный этап при планировании реконструктивной операции лица:

А. Выбор шовного материала

В. Анализ симметрии и пропорций

С. Определение цвета кожи Д. Подбор инструментов

Е. Выбор перевязочного материала

129. Укажите метод коррекции западения мягких тканей после травмы:

А. Липофилинг

В. Резекция кожи

С. Лазерная терапия

Д. Дермабразия

Е. Пилинг

130. Отметьте правильную тактику при дефекте мягких тканей лица значительного объёма:

А. Филлеры

В. Пилинг

С. Липосакция

Д. Локальные или свободные лоскуты

Е. Наблюдение

131. Укажите основное осложнение при несвоевременной коррекции перелома скуловой дуги:

А. Гематома

В. Отёк

C. Инфекция кожи

D. Аллергия

E. Стойкая асимметрия лица

132. Отметьте оптимальный подход при деформации нижней челюсти с нарушением прикуса:

A. Липофилинг

B. Инъекции

C. Дермабразия

D. SMAS-лифтинг

E. Ортогнатическая хирургия

133. Укажите ключевой критерий успешной коррекции косметической диспропорции лица:

A. Минимальный разрез

B. Быстрая операция

C. Восстановление гармонии пропорций

D. Использование дорогих материалов

E. Отсутствие швов

134. Отметьте наиболее эффективный метод коррекции втянутого рубца:

A. Субцизия с липофилингом

B. Пилинг

C. Лазер

D. Массаж

E. Инъекции ботулотоксина

135. Укажите правильную тактику при асимметрии губ после травмы:

A. Только филлеры

B. Пилинг C. Липосакция

D. Хирургическая коррекция с учётом анатомии

E. Наблюдение

136. Отметьте главный риск при коррекции посттравматических деформаций:

A. Потеря волос

B. Повреждение нервов

C. Изменение цвета кожи

D. Потеря зубов

E. Аллергия

137. Укажите метод выбора при дефиците костной ткани лица:

A. Липофилинг

B. Костная пластика

C. Пилинг

D. Лазер

E. Инъекции

138. Отметьте важнейший фактор при коррекции асимметрии:

A. Освещение операционной

B. Трёхмерная оценка лица

C. Тип перчаток

D. Время операции

E. Цвет инструментов

139. Укажите оптимальную тактику при деформации после неправильного сращения перелома:

A. Реконструктивная остеотомия

B. Наблюдение

C. Липосакция

D. Пилинг

E. Инъекции

140. Отметьте правильный подход к коррекции врождённой асимметрии лица:

A. Только мягкотканная коррекция

B. Наблюдение

C. Пилинг

D. Лазер

Е. Комплексный подход (кость + мягкие ткани)

141. Укажите наиболее рациональный метод коррекции деформации подбородка:

- А. Липосакция
- В. Лазер
- С. Пилинг

Д. Гениопластика

Е. Филлеры

142. Отметьте ключевую цель реконструктивной хирургии лица:

- А. Уменьшение времени операции
- В. Минимизация затрат

С. Восстановление функции и эстетики

Д. Использование новых технологий

Е. Быстрая выписка

143. Укажите наиболее сложный аспект коррекции посттравматических деформаций лица:

- А. Выбор шовного материала
- В. Длительность операции
- С. Подбор анестезии

Д. Восстановление симметрии

Е. Выбор повязки

144. Укажите наиболее обоснованную тактику при врождённой расщелине носа с деформацией хрящевого каркаса у ребёнка:

- А. Только наблюдение до совершеннолетия
- В. Лазерная коррекция
- С. Липофилинг
- Д. Контурная пластика

Е. Ранняя хирургическая коррекция с моделированием хрящей

145. Отметьте ключевой анатомический элемент, определяющий форму кончика носа при врождённых деформациях:

- А. Носовая кость

- B. Верхние латеральные хрящи
- C. Лобный отросток
- D. Перегородка носа

E. Нижние латеральные хрящи

146. Укажите оптимальную тактику при врождённой искривлённой перегородке носа, вызывающей нарушение дыхания у подростка:

A. Септопластика

- B. Отсрочка лечения
- C. Только медикаментозная терапия
- D. Липофилинг
- E. Резекция кожи

147. Отметьте основной принцип коррекции врождённой деформации носа:

A. Восстановление анатомических структур

- B. Удаление тканей
- C. Увеличение разрезов
- D. Минимизация вмешательства любой ценой
- E. Использование только филлеров

148. Укажите наиболее рациональный метод коррекции врождённого седловидного носа:

- A. Липосакция
- B. Дермабразия

C. Аугментационная ринопластика

- D. Пилинг
- E. Наблюдение

149. Отметьте фактор, определяющий выбор времени хирургической коррекции врождённых деформаций носа у детей:

A. Степень нарушения дыхания и роста структур

- B. Цвет кожи
- C. Время года
- D. Желание родителей

Е. Тип шовного материала

150. Укажите оптимальную тактику при врождённой асимметрии крыльев носа:

А. Только филлеры

В. Лазер

С. Хирургическая коррекция хрящей

Д. Пилинг

Е. Наблюдение

151. Отметьте наиболее значимое осложнение при несвоевременной коррекции врождённой деформации носа:

А. Отёк

В. Синяк

С. Гематома

Д. Аллергия

Е. Стойкое нарушение дыхания

152. Укажите метод выбора при врождённой гипоплазии носа:

А. Липофилинг

В. Лазер

С. Пилинг

Д. Реконструктивная ринопластика с трансплантатами

Е. Инъекции

153. Отметьте ключевую цель хирургической коррекции врождённых деформаций носа:

А. Уменьшение времени операции

В. Восстановление функции дыхания и эстетики

С. Минимизация затрат

Д. Быстрая выписка

Е. Использование новых технологий

154. Укажите, к какой группе по классификации врождённых деформаций относится полное отсутствие наружного носа (ариния):

A. Гиперпластические деформации носа

B. Дислокационные деформации носа

C. Гипопластические деформации носа

D. Комбинированные деформации носа

E. Травматические деформации носа

155. Отметьте клинический признак врождённой гипоплазии наружного носа:

A. Увеличение размеров всех отделов носа

B. Уменьшение объёма и недоразвитие структур

C. Смещение носа относительно средней линии

D. Избыточное разрастание мягких тканей

E. Деформация только костной части носа

156. Укажите, какой тип деформации характеризуется отклонением носа от средней линии лица:

A. Гипопластический тип деформации носа

B. Гиперпластический тип деформации носа

C. Дислокационный тип деформации носа

D. Атрофический тип деформации носа

E. Рубцовый тип деформации носа

157. Отметьте наиболее характерное клиническое проявление врождённой седловидной деформации носа:

A. Западение спинки носа в средней трети

B. Выраженное увеличение кончика носа

C. Смещение носа в латеральную сторону

D. Утолщение мягких тканей носа

E. Удлинение перегородки носа

158. Укажите, какая форма врождённой деформации относится к гиперпластическим изменениям:

A. Недоразвитие перегородки носа

B. Нарушение проходимости хоан

C. Смещение носа после родовой травмы

D. Западение спинки носа

E. Увеличение отдельных анатомических структур

159. Отметьте основной клинический симптом врождённой атрезии хоан:

A. Косметическая асимметрия наружного носа

B. Изменение формы кончика носа

C. Нарушение носового дыхания с рождения

D. Утолщение крыльев носа

E. Увеличение длины носа

160. Укажите, к какой категории относится сочетание гипоплазии носа и его смещения:

A. Изолированные деформации носа

B. Комбинированные деформации носа

C. Гиперпластические деформации носа

D. Функциональные нарушения носа

E. Приобретённые деформации носа

161. Отметьте клиническую особенность врождённой деформации перегородки носа:

A. Всегда сопровождается гиперплазией тканей

B. Не влияет на функцию дыхания

C. Проявляется только косметическим дефектом

D. Может приводить к нарушению носового дыхания

E. Характерна только для взрослых пациентов

162. Укажите признак, характерный для врождённой расщелины носа:

A. Увеличение толщины кожи носа

B. Нарушение целостности анатомических структур

C. Смещение носа без дефекта тканей

D. Изолированная гиперплазия хрящей

E. Удлинение спинки носа

163. Отметьте основной принцип клинической оценки врождённых

деформаций носа:

A. Комплексная оценка функции и анатомии

- B. Оценка только внешнего вида носа
- C. Анализ только костных структур носа
- D. Учет только жалоб пациента
- E. Оценка состояния кожи носа

164. Укажите основной патогенетический механизм формирования седловидной деформации носа:

A. Избыточное развитие нижних латеральных хрящей

B. Дефицит опорных структур перегородки носа

- C. Гипертрофия мягких тканей спинки носа
- D. Смещение костей носа латерально
- E. Утолщение кожи в области переносицы

165. Отметьте ключевую цель операции по методике Г.И. Паковича:

- A. Уменьшение длины наружного носа
- B. Сужение основания крыльев носа
- C. Резекция избыточных мягких тканей носа

D. Восстановление опорной функции спинки носа

E. Устранение гипертрофии кончика носа

166. Укажите оптимальный материал для восстановления спинки носа при данной методике:

- A. Только синтетические имплантаты
- B. Жировая ткань пациента
- C. Коллагеновые инъекционные материалы

D. Аутокостный или аутохрящевой трансплантат

E. Аллогенные кожные трансплантаты

167. Отметьте основной этап операции по Паковичу:

- A. Удаление кожи спинки носа
- B. Иссечение рубцовой ткани кожи
- C. Резекция крыльев носа

D. Липосакция мягких тканей носа

E. Формирование кармана и укладка трансплантата

168. Укажите показание к применению данной методики:

A. Седловидное западение спинки носа

B. Гипертрофия кончика носа

C. Расширение основания носа

D. Искривление только костной части носа

E. Изолированная деформация крыльев

169. Отметьте ключевое условие успешной фиксации трансплантата:

A. Минимальный размер трансплантата

B. Отсутствие кожного разреза

C. Использование только рассасывающихся нитей

D. Плотное прилегание к окружающим тканям

E. Применение местной анестезии

170. Укажите возможное осложнение при данной операции:

A. Гипертрофия ушной раковины

B. Смещение или резорбция трансплантата

C. Увеличение длины нижней челюсти

D. Атрофия жевательной мышцы

E. Деформация ушной перегородки

171. Отметьте анатомическую структуру, играющую ключевую роль в поддержке спинки носа:

A. Перегородка носа и её хрящевая часть

B. Нижние латеральные хрящи носа

C. Крыльные хрящи носа

D. Мягкие ткани носогубной области

E. Кожа спинки носа

172. Укажите принцип моделирования трансплантата при операции:

A. Создание максимально крупного фрагмента

B. Формирование плоской структуры без изгиба

C. Использование только стандартных заготовок

D. Придание формы, соответствующей анатомии носа

E. Уменьшение толщины до минимального уровня

173. Отметьте основной критерий эффективности операции:

A. Сокращение времени вмешательства

B. Быстрая выписка пациента

C. Минимальное количество швов

D. Восстановление профиля и функции носа

E. Отсутствие послеоперационного отёка

174. Укажите основной принцип эстетической ринопластики при планировании вмешательства:

A. Максимальное уменьшение размеров носа

B. Стандартизация формы носа у пациентов

C. Полное устранение всех анатомических неровностей

D. Восстановление гармонии пропорций лица

E. Минимизация длительности операции

175. Отметьте ключевой анатомический ориентир при оценке профиля носа:

A. Носолобный угол лица пациента

B. Угол нижней челюсти пациента

C. Длина ушной раковины пациента

D. Высота скуловой дуги лица

E. Ширина ротовой щели пациента

176. Укажите показание к открытой ринопластике:

A. Незначительная коррекция кончика носа

B. Поверхностные кожные изменения носа

C. Минимальное утолщение кожи носа

D. Лёгкая асимметрия крыльев носа

E. Сложная деформация хрящевого каркаса

177. Отметьте наиболее важный фактор при коррекции кончика носа:

A. Толщина кожи и её эластичность

В. Цвет кожи в области носа

С. Длина волос пациента

Д. Размер глазной щели пациента

Е. Форма подбородка пациента

178. Укажите оптимальный метод коррекции горбинки носа:

А. Липофилинг мягких тканей носа

В. Инъекции филлеров в спинку носа

С. Дермабразия поверхности кожи носа

Д. Остеотомия и резекция костно-хрящевой части

Е. Лазерная коррекция мягких тканей

179. Отметьте возможное осложнение после ринопластики:

А. Нарушение носового дыхания

В. Гипертрофия ушной раковины

С. Увеличение размеров глазницы

Д. Атрофия жевательной мышцы

Е. Деформация скуловой дуги

180. Укажите основной принцип коррекции широкого носа:

А. Удаление всей костной ткани носа

В. Инъекционная коррекция объёма

С. Увеличение толщины мягких тканей

Д. Сужение костного каркаса с остеотомией

Е. Только кожная резекция тканей

181. Отметьте ключевую цель коррекции кончика носа:

А. Увеличение длины носа пациента

В. Смещение носа в сторону лица

С. Полное удаление хрящевых структур

Д. Уменьшение толщины кожи носа

Е. Формирование чёткой анатомической формы

182. Укажите фактор, определяющий выбор техники ринопластики:

А. Время проведения операции

В. Тип используемых инструментов

С. Цвет кожи лица пациента

Д. Пол пациента и возраст

Е. Анатомические особенности пациента

183. Отметьте основной критерий успешной эстетической ринопластики:

А. Минимальное количество разрезов кожи

В. Использование современных материалов С. Быстрое выполнение операции

Д. Полное отсутствие послеоперационного отёка

Е. Гармоничное сочетание формы и функции

184. Укажите наиболее обоснованную тактику при посттравматической деформации носа с выраженной асимметрией и нарушением дыхания:

А. Контурная пластика мягких тканей носа

В. Дермабразия кожных покровов носа

С. Липофилинг области спинки носа

Д. Комплексная риносептопластика с остеотомией

Е. Наблюдение без хирургического лечения

185. Отметьте ключевой фактор при выборе метода коррекции приобретённой деформации носа:

А. Цвет кожи в области носа

В. Характер и степень анатомических изменений

С. Время проведения хирургического вмешательства

Д. Предпочтения пациента по форме носа

Е. Тип используемого шовного материала

186. Укажите оптимальную тактику при седловидной деформации носа после травмы:

А. Аугментационная ринопластика с трансплантатом

В. Удаление мягких тканей спинки носа

С. Лазерная шлифовка поверхности кожи

Д. Инъекционная коррекция филлерами

Е. Изолированная резекция крыльев носа

187. Отметьте наиболее вероятную причину вторичной деформации носа после ринопластики:

A. Недостаточная поддержка хрящевого каркаса

B. Избыточная толщина кожи лица

C. Цвет кожи пациента в области носа

D. Возраст пациента старше сорока лет

E. Использование рассасывающихся нитей

188. Укажите показание к ревизионной ринопластике:

A. Незначительный послеоперационный отёк тканей

B. Сохранение выраженной деформации носа

C. Временное нарушение чувствительности кожи

D. Лёгкая гиперемия кожных покровов

E. Незначительный дискомфорт пациента

189. Отметьте основной принцип коррекции посттравматической деформации носа:

A. Уменьшение размеров всех структур носа

B. Минимизация времени операции любой ценой

C. Исключительно косметическое моделирование

D. Восстановление анатомии и функции дыхания

E. Использование только инъекционных методов

190. Укажите оптимальный метод коррекции деформации кончика носа после травмы:

A. Липосакция мягких тканей кончика

B. Инъекционная терапия филлерами

C. Лазерное воздействие на кожу носа

D. Хирургическая коррекция хрящевых структур

E. Дермабразия поверхности кожи

191. Отметьте наиболее частое осложнение после повторной ринопластики:

A. Увеличение размеров носовой полости

B. Усиление кровоснабжения тканей

C. Улучшение носового дыхания пациента

D. Увеличение эластичности кожи носа

E. Формирование рубцовых изменений тканей

192. Укажите фактор, осложняющий выполнение ревизионной ринопластики:

A. Наличие тонкой кожи носа

B. Отсутствие жалоб у пациента

C. Молодой возраст пациента

D. Небольшая деформация спинки носа

E. Выраженные рубцовые изменения тканей

193. Отметьте ключевой критерий успешной коррекции приобретённых деформаций носа:

A. Сокращение времени хирургического вмешательства

B. Гармоничное восстановление формы и функции

C. Минимальное количество кожных разрезов

D. Использование современных инструментов

E. Быстрое исчезновение отёка тканей

194. Укажите, к какой группе по классификации относятся дефекты носа с утратой части мягких тканей:

A. Частичные тканевые дефекты носа

B. Функциональные деформации носа

C. Изолированные костные деформации

D. Гиперпластические изменения носа

E. Дислокационные деформации носа

195. Отметьте основной клинический признак полного дефекта наружного носа:

A. Увеличение размеров носа

B. Гипертрофия мягких тканей лица

C. Смещение носа относительно средней линии

D. Полное отсутствие анатомических структур

Е. Изолированное искривление перегородки

196. Укажите ключевой принцип устранения обширных дефектов носа:

А. Только инъекционная коррекция мягких тканей

В. Резекция окружающих тканей лица

С. Восстановление каркаса и кожного покрова

Д. Применение исключительно синтетических материалов

Е. Отсрочка лечения до зрелого возраста

197. Отметьте метод, основанный на использовании кожно-лоскутных пластик при реконструкции носа:

А. Метод Ф.М. Хитрова

В. Метод К.П. Сулова

С. Метод Г.В. Кручинского

Д. Метод закрытой ринопластики

Е. Метод контурной пластики

198. Укажите основной этап реконструкции носа по методу К.П. Сулова:

А. Липосакция мягких тканей лица

В. Дермабразия кожных покровов

С. Лазерная обработка поверхности кожи

Д. Инъекционная коррекция объёма тканей

Е. Формирование кожного лоскута и его перемещение

199. Отметьте ключевую особенность метода Г.В. Кручинского:

А. Использование только инъекционных техник

В. Резекция всех деформированных структур

С. Комбинированная реконструкция тканей носа

Д. Отказ от формирования кожных лоскутов

Е. Применение исключительно аллотрансплантатов

200. Укажите наиболее частое клиническое проявление дефектов носа:

А. Изменение цвета кожи лица

В. Атрофия жевательных мышц

С. Увеличение размеров глазной щели

D. Нарушение дыхания и эстетики

Е. Изменение формы ушной раковины

201. Отметьте фактор, определяющий выбор метода реконструкции носа:

А. Время суток проведения операции

В. Пол пациента и его возраст

С. Цвет перевязочного материала

D. Тип используемых инструментов

E. Размер и локализация дефекта

202. Укажите возможное осложнение после реконструкции носа лоскутами:

А. Увеличение длины нижней челюсти

В. Некроз перемещённого лоскута

С. Гипертрофия скуловой кости

D. Атрофия жевательной мышцы

Е. Деформация ушной раковины

203. Отметьте основной критерий успешности реконструкции дефектов носа:

А. Минимальное время операции

В. Использование новых технологий

С. Отсутствие кожных разрезов D. Быстрая выписка пациента

E. Восстановление формы и функции носа

204. Укажите основное показание к верхней блефаропластике:

А. Гипертрофия жевательной мышцы лица

В. Избыток кожи верхнего века с нависанием

С. Увеличение размеров глазного яблока

D. Смещение скуловой дуги латерально

Е. Нарушение формы нижней челюсти

205. Отметьте ключевой анатомический ориентир при разметке верхнего века:

А. Скуловая дуга лица пациента

В. Складка верхнего века пациента

- C. Угол нижней челюсти лица
- D. Носогубная складка пациента
- E. Контур ушной раковины пациента

206. Укажите наиболее обоснованную тактику при выраженных жировых грыжах нижнего века:

- A. Лазерная шлифовка поверхности кожи
- B. Дермабразия кожных покровов
- C. Инъекционная коррекция филлерами
- D. Удаление или перераспределение жировых пакетов**

E. Только массаж периорбитальной области

207. Отметьте возможное осложнение нижней блефаропластики:

- A. Эктропион нижнего века глаза**
- B. Увеличение размеров носа пациента
- C. Деформация ушной раковины
- D. Атрофия жевательной мышцы лица
- E. Удлинение верхней губы пациента

208. Укажите основной принцип коррекции возрастных изменений века:

- A. Удаление всех мягких тканей века
- B. Минимизация длительности операции

C. Сохранение функции и анатомии века

- D. Использование только лазерных методов
- E. Полное устранение жировых пакетов

209. Отметьте показание к трансконъюнктивальной блефаропластике:

- A. Избыток кожи нижнего века
- B. Рубцовая деформация кожи века
- C. Птоз верхнего века выраженный
- D. Асимметрия бровей выраженная

E. Жировые грыжи без избытка кожи

210. Укажите ключевой фактор риска развития эктропиона:

- A. Молодой возраст пациента

В. Применение местной анестезии

С. Тонкая кожа верхнего века D. Использование тонких шовных нитей

E. Избыточная резекция кожи века

211. Отметьте оптимальную тактику при птозе бровей:

A. Только блефаропластика верхнего века

В. Инъекционная терапия филлерами

С. Дермабразия кожи лба пациента

D. Лифтинг бровей хирургическим методом

E. Липосакция височной области

212. Укажите основной клинический признак дерматохалазиса:

A. Избыток и провисание кожи век

В. Увеличение толщины кожи лица

С. Смещение глазного яблока

D. Гипертрофия круговой мышцы глаза

E. Уменьшение размеров глазной щели

213. Отметьте ключевую цель блефаропластики:

A. Увеличение размеров глазницы

В. Минимизация разрезов кожи

С. Удаление всех жировых пакетов

D. Восстановление эстетики и функции век

E. Быстрое выполнение операции

214. Укажите фактор, влияющий на выбор метода блефаропластики:

A. Цвет кожи пациента

В. Степень избытка кожи и жира

С. Время проведения операции

D. Тип используемых инструментов

E. Пол пациента и его возраст

215. Отметьте возможное осложнение после верхней блефаропластики:

A. Увеличение длины носа пациента

В. Деформация скуловой кости лица

С. Лагофталм в послеоперационном периоде

- D. Атрофия жевательной мышцы
- E. Изменение формы подбородка

216. Укажите оптимальную тактику при рубцовой деформации века:

- A. Только инъекционная коррекция
- B. Дермабразия кожных покровов
- C. Лазерная шлифовка поверхности

D. Хирургическая пластика тканей века

- E. Наблюдение без лечения

217. Отметьте основной принцип коррекции асимметрии век:

A. Индивидуальный симметричный подход

- B. Удаление тканей только с одной стороны
- C. Использование стандартной техники
- D. Минимизация объёма операции

E. Применение только нитевых методов 218. Укажите ключевой критерий успешной пластики век:

- A. Сокращение времени операции
- B. Быстрое исчезновение отёка
- C. Минимальное количество швов

D. Гармоничное восстановление формы век

- E. Использование современных технологий

219. Укажите наиболее частую причину приобретённого птоза верхнего века:

A. Врожденное недоразвитие мышц века

- B. Апоневротическое ослабление леватора века
- C. Гипертрофия круговой мышцы глаза
- D. Увеличение объема жировых пакетов
- E. Избыточное развитие кожи века

220. Отметьте характерный клинический признак истинного птоза:

A. Опускание края века с уменьшением глазной щели

- B. Избыток кожи верхнего века

- C. Увеличение объема орбитальной клетчатки
- D. Смещение брови кверху латерально
- E. Утолщение кожи периорбитальной области

221. Укажите основную причину развития эктропиона нижнего века:

- A. Гипертрофия мягких тканей лица
- B. Утолщение круговой мышцы глаза
- C. Увеличение жировых пакетов века
- D. Смещение глазного яблока вперед

E. Рубцовое укорочение кожных структур

222. Отметьте ключевой клинический симптом энтропиона:

- A. Выворот края века наружу
- B. Избыток кожи нижнего века
- C. Увеличение размеров глазной щели
- D. Смещение брови латерально вверх

E. Заворот края века внутрь глаза

223. Укажите оптимальную тактику при рубцовом эктропионе:

- A. Инъекционная терапия филлерами
- B. Лазерная шлифовка поверхности кожи

C. Пластика с удлинением передней пластинки

- D. Дермабразия кожных покровов
- E. Наблюдение без хирургического лечения

224. Отметьте наиболее частую причину дерматохалазиса:

- A. Врожденная гипоплазия тканей века

B. Возрастные изменения кожи и связок

- C. Увеличение размеров глазного яблока
- D. Смещение костей орбиты латерально
- E. Гипертрофия жевательной мышцы

225. Укажите основной принцип устранения дефектов век:

- A. Максимальное удаление тканей века
- B. Использование только инъекционных методов
- C. Минимизация времени операции

D. Восстановление функции и анатомии века

E. Полное устранение жировых пакетов

226. Отметьте показание к кантопексии:

A. Увеличение толщины кожи века

B. Гипертрофия жировых пакетов века

C. Избыток кожи верхнего века

D. Слабость латерального кантального сухожилия

E. Смещение брови вверх латерально

227. Укажите основной клинический признак птоза брови:

A. Увеличение размеров глазницы

B. Утолщение кожи верхнего века

C. Смещение брови ниже орбитального края

D. Гипертрофия круговой мышцы глаза

E. Увеличение жировых пакетов орбиты

228. Отметьте оптимальный метод коррекции птоза брови:

A. Только верхняя блефаропластика

B. Дермабразия кожных покровов

C. Лазерная шлифовка кожи лба

D. Хирургический лифтинг бровей

E. Инъекционная терапия филлерами

229. Укажите фактор риска развития лагофтальма:

A. Тонкая кожа верхнего века

B. Избыточная резекция тканей века

C. Увеличение жировых пакетов орбиты

D. Смещение брови кверху латерально

E. Гипертрофия круговой мышцы глаза

230. Отметьте основной клинический признак лагофтальма:

A. Полное смыкание век при закрытии глаз

B. Смещение брови вниз медиально

C. Увеличение размеров глазной щели

D. Неполное смыкание век при закрытии глаз

Е. Утолщение кожи периорбитальной зоны

231. Укажите оптимальную тактику при врождённом птозе:

- А. Наблюдение без лечения
- В. Дермабразия кожных покровов
- С. Лазерная шлифовка поверхности кожи
- D. Инъекционная коррекция филлерами

E. Хирургическая коррекция функции леватора

232. Отметьте основной критерий выбора метода лечения дефектов век:

- А. Цвет кожи пациента
- В. Пол пациента и его возраст
- С. Время проведения операции
- D. Тип используемых инструментов

E. Этиология и выраженность деформации

233. Укажите ключевой критерий успешной коррекции дефектов век и бровей:

- А. Сокращение времени операции

В. Восстановление функции и эстетики

- С. Минимальное количество разрезов
- D. Быстрое исчезновение отёка
- Е. Использование современных технологий

234. Укажите основное показание к отопластике:

- А. Увеличение размеров мочки уха
- В. Изменение цвета кожи уха

С. Оттопыренность ушных раковин

- D. Гипертрофия жевательной мышцы
- Е. Смещение нижней челюсти

235. Отметьте ключевую анатомическую причину оттопыренных ушей:

- А. Гипертрофия мочки уха
- В. Избыточное развитие волос
- С. Увеличение толщины кожи уха

D. Смещение ушной раковины вниз

E. Недоразвитие противозавитка

236. Укажите наиболее частую причину деформации ушной раковины:

A. Врожденные особенности хряща

B. Изменение цвета кожи уха

C. Увеличение размеров головы

D. Смещение нижней челюсти

E. Гипертрофия жевательной мышцы

237. Отметьте основной принцип отопластики:

A. Удаление всей ушной раковины

B. Использование только нитевых методов

C. Минимизация времени операции

D. Формирование правильной анатомической формы

E. Полное удаление хрящевой ткани

238. Укажите оптимальный возраст для выполнения отопластики:

A. До одного года жизни пациента

B. После завершения роста уха

C. В возрасте пяти–семи лет

D. Только в пожилом возрасте

E. В любом возрасте без ограничений

239. Отметьте ключевой этап операции при коррекции оттопыренных ушей:

A. Липосакция тканей уха

B. Лазерная обработка кожи

C. Моделирование хряща ушной раковины

D. Дермабразия поверхности уха

E. Инъекционная коррекция формы

240. Укажите возможное осложнение после отопластики:

A. Увеличение размеров носа

B. Атрофия жевательной мышцы

C. Деформация нижней челюсти

D. Гематома ушной раковины

Е. Смещение глазного яблока

241. Отметьте фактор риска развития рецидива деформации:

А. Молодой возраст пациента

В. Короткая длительность операции

С. Тонкая кожа ушной раковины

Д. Использование местной анестезии

Е. Недостаточная фиксация хряща

242. Укажите основной клинический признак оттопыренных ушей:

А. Увеличение угла между ухом и головой

В. Увеличение длины мочки уха

С. Изменение цвета кожи уха

Д. Утолщение хрящевой ткани

Е. Смещение уха книзу

243. Отметьте цель формирования противозавитка:

А. Увеличение размеров ушной раковины

В. Придание естественной формы уху

С. Удаление избыточной кожи

Д. Снижение чувствительности уха

Е. Изменение цвета кожи

244. Укажите оптимальную тактику при деформации мочки уха:

А. Липосакция тканей уха

В. Инъекционная терапия

С. Лазерная шлифовка кожи

Д. Хирургическая пластика мочки

Е. Дермабразия поверхности

245. Отметьте основной критерий успешной отоластики:

А. Сокращение времени операции

В. Симметричное и естественное положение ушей

С. Минимальное количество швов

Д. Быстрое исчезновение отёка

Е. Использование современных инструментов

246. Укажите фактор, определяющий выбор метода отопластики:

А. Цвет кожи пациента

В. Пол пациента и его возраст

С. Время проведения операции

Д. Тип используемых инструментов

Е. Анатомические особенности хряща

247. Отметьте возможное позднее осложнение отопластики:

А. Формирование грубого рубца

В. Увеличение размеров глазницы С. Смещение нижней челюсти

Д. Атрофия жевательной мышцы

Е. Изменение формы носа

248. Укажите ключевой принцип коррекции деформаций ушной раковины:

А. Удаление максимального объёма тканей

В. Минимизация длительности операции

С. Сохранение функции и анатомии уха

Д. Использование только нитевых методов

Е. Полное удаление хряща уха

249. Укажите наиболее вероятную причину выраженной оттопыренности ушной раковины при сохранённой глубине раковины:

А. Гипертрофия мочки ушной раковины

В. Недоразвитие противозавитка

С. Избыточная толщина кожи уха

Д. Смещение ушной раковины книзу

Е. Гиперплазия завитка ушной раковины

250. Отметьте оптимальную тактику при сочетании гипертрофии раковины и отсутствия противозавитка:

А. Только иссечение кожи задней поверхности

В. Лазерная коррекция формы ушной раковины

С. Комбинация швов и резекции хряща

D. Инъекционная коррекция мягких тканей

E. Полное удаление деформированного хряща

251. Укажите ключевой фактор, определяющий стабильность результата отопластики:

A. Качество моделирования хряща

B. Цвет кожи пациента

C. Длительность хирургического вмешательства

D. Тип используемых инструментов

E. Время проведения операции

252. Отметьте наиболее вероятную причину рецидива оттопыренности уха:

A. Недостаточная фиксация швов

B. Тонкая кожа ушной раковины

C. Молодой возраст пациента

D. Использование местной анестезии

E. Короткая длительность операции

253. Укажите оптимальный угол между ушной раковиной и поверхностью головы после операции:

A. Более сорока пяти градусов

B. Менее десяти градусов

C. Около двадцати–тридцати градусов

D. Равный сорока градусам

E. Более пятидесяти градусов

254. Отметьте основной принцип формирования противозавитка при отопластике: A. Полное иссечение хряща

B. Увеличение толщины кожи уха

C. Ослабление и моделирование хряща

D. Смещение мочки уха книзу

E. Удаление задней поверхности кожи

255. Укажите наиболее обоснованную тактику при изолированной гипертрофии раковины:

- A. Только наложение швов на хрящ
- B. Наблюдение без вмешательства
- C. Лазерная коррекция формы уха
- D. Инъекционная терапия тканей

E. Резекция избыточного хряща раковины

256. Отметьте наиболее частое раннее осложнение после отопластики:

- A. Деформация нижней челюсти
- B. Увеличение размеров носа
- C. Атрофия жевательной мышцы

D. Гематома в области уха

- E. Смещение глазного яблока

257. Укажите анатомическую структуру, формирующую основной рельеф ушной раковины:

- A. Подкожная жировая клетчатка уха
- B. Мышечные волокна уха
- C. Кожный покров ушной раковины

D. Хрящевой каркас ушной раковины

- E. Сосудистая сеть ушной раковины

258. Отметьте критерий эстетически успешной отопластики:

- A. Минимальное количество разрезов
- B. Полное отсутствие послеоперационного отёка
- C. Быстрое выполнение операции

D. Симметрия и естественная форма ушей

- E. Использование современных технологий

259. Укажите наиболее сложную для коррекции форму деформации:

- A. Изолированная деформация мочки уха
- B. Утолщение кожи ушной раковины
- C. Незначительная асимметрия ушей

D. Комбинированная деформация хряща

- E. Лёгкое увеличение угла отстояния

260. Отметьте ключевой этап профилактики гематомы после операции:

A. Использование толстых шовных нитей

B. Применение местной анестезии

C. Минимизация времени операции

D. Тщательный гемостаз и компрессия

E. Увеличение объёма резекции тканей

261. Укажите фактор, осложняющий моделирование хряща:

A. Молодой возраст пациента B. Небольшой размер уха пациента

C. Тонкая кожа ушной раковины

D. Высокая упругость хрящевой ткани

E. Короткая длительность операции

262. Отметьте основную причину асимметрии после отоластики:

A. Различие в цвете кожи ушей

B. Время проведения операции

C. Использование разных инструментов

D. Неравномерная коррекция хряща

E. Толщина перевязочного материала

263. Укажите ключевой принцип эстетической отоластики:

A. Восстановление анатомической гармонии

B. Максимальное уменьшение размеров уха

C. Минимизация длительности операции

D. Использование только нитевых методов

E. Полное удаление хрящевой ткани

264. Укажите морфологический тип рубца, характеризующийся разрастанием за пределы исходной раны:

A. Нормотрофический рубец кожи

B. Атрофический рубец кожи

C. Келоидный рубец кожи

D. Гипотрофический рубец кожи

E. Линейный послеоперационный рубец

265. Отметьте основной клинический признак гипертрофического рубца:

- A. Распространение за границы раны
- B. Возвышение в пределах раны**
- C. Полное отсутствие рельефа кожи
- D. Выраженная пигментация кожи
- E. Углубление относительно поверхности

266. Укажите оптимальную тактику при келоидном рубце лица:

- A. Только хирургическое иссечение
- B. Дермабразия поверхности кожи
- C. Липосакция рубцовой ткани

D. Комбинированное лечение с инъекциями

- E. Наблюдение без лечения

267. Отметьте основной механизм формирования рубцовой контрактуры:

- A. Избыточное образование эпидермиса
- B. Атрофия мышечной ткани лица
- C. Увеличение сосудистой сети кожи

D. Сокращение соединительной ткани рубца

- E. Утолщение подкожной клетчатки

268. Укажите метод хирургической коррекции линейного рубца с натяжением тканей:

A. Z-пластика кожного рубца

- B. Липофилинг мягких тканей лица
- C. Лазерная шлифовка кожи
- D. Инъекционная терапия филлерами
- E. Дермабразия поверхности кожи

269. Отметьте показание к применению кортикостероидных инъекций:

- A. Атрофический рубец кожи
- B. Свежая рана без рубца
- C. Нормотрофический рубец кожи
- D. Линейный послеоперационный рубец

E. Келоидный рубец кожи

270. Укажите основной принцип хирургической коррекции рубцов лица:

A. Максимальное удаление тканей

B. Перераспределение натяжения кожи

C. Увеличение площади рубца

D. Использование только лазера

E. Минимизация времени операции

271. Отметьте наиболее эффективный метод коррекции втянутых рубцов:

A. Лазерная шлифовка поверхности

B. Дермабразия кожных покровов

C. Инъекционная терапия ботулотоксином

D. Субцизия с восстановлением объёма

E. Поверхностный химический пилинг

272. Укажите фактор риска формирования келоидного рубца:

A. Низкое натяжение тканей

B. Тонкая кожа лица пациента

C. Генетическая предрасположенность

D. Молодой возраст пациента

E. Поверхностное повреждение кожи

273. Отметьте ключевой принцип профилактики грубых рубцов:

A. Увеличение длины разреза

B. Увеличение глубины разреза

C. Использование толстых нитей

D. Удаление подкожной клетчатки

E. Минимизация натяжения тканей

274. Укажите оптимальную тактику при рубцовой деформации, ограничивающей подвижность:

A. Инъекционная терапия филлерами

B. Лазерная шлифовка поверхности

C. Хирургическое высвобождение тканей

D. Дермабразия кожных покровов

Е. Наблюдение без лечения

275. Отметьте основной клинический признак атрофического рубца:

А. Возвышение над поверхностью кожи

В. Утолщение кожного покрова

С. Распространение за границы раны

Д. Углубление относительно кожи

Е. Выраженная гиперемия кожи

276. Укажите показание к лазерной терапии рубцов:

А. Грубая контрактура тканей

В. Полный дефект кожи лица

С. Поверхностные рубцовые изменения

Д. Выраженное натяжение тканей

Е. Келоидный рубец крупного размера

277. Отметьте основной принцип выбора метода лечения рубца:

А. Цвет кожи пациента

В. Тип используемых инструментов

С. Время проведения процедуры

Д. Пол пациента и возраст

Е. Тип и стадия рубца

278. Укажите возможное осложнение хирургической коррекции рубца:

А. Рецидив рубцовой деформации

В. Увеличение размеров носа

С. Атрофия жевательной мышцы

Д. Деформация ушной раковины

Е. Смещение глазного яблока

279. Отметьте метод, направленный на уменьшение натяжения рубца:

А. Липосакция тканей лица

В. Перемещение кожных лоскутов

С. Лазерная шлифовка поверхности

Д. Инъекционная терапия филлерами

Е. Дермабразия кожных покровов

280. Укажите оптимальную тактику при гипертрофическом рубце на лице:

А. Только хирургическое иссечение

В. Только массаж рубцовой зоны

С. Липосакция рубцовой ткани

Д. Наблюдение без вмешательства

Е. Комбинированная терапия лечения

281. Отметьте ключевой механизм действия силиконовых покрытий:

А. Увеличение толщины кожи

В. Удаление рубцовой ткани

С. Усиление кровоснабжения тканей

Д. Снижение трансэпидермальной потери влаги

Е. Стимуляция роста волос

282. Укажите основной критерий эффективности лечения рубца:

А. Сокращение времени лечения

В. Использование новых технологий

С. Минимальное количество процедур

Д. Улучшение функции и внешнего вида

Е. Быстрое исчезновение покраснения 283. Отметьте ключевую цель коррекции рубцов лица и шеи:

А. Полное удаление всех тканей

В. Минимизация времени вмешательства

С. Восстановление анатомии и эстетики

Д. Использование только хирургии

Е. Исключение консервативных методов

284. Укажите основной принцип рассечения рубцовой контрактуры:

А. Полное удаление рубцовой ткани

В. Использование только консервативных методов

С. Увеличение площади рубцовой поверхности

Д. Высвобождение тканей с устранением натяжения

Е. Минимизация глубины разреза тканей

285. Отметьте показание к иссечению рубца с первичным закрытием:

A. Обширный дефект тканей лица

B. Линейный рубец малой ширины

C. Келоидный рубец большого размера

D. Глубокая рубцовая контрактура

E. Атрофический множественный рубец

286. Укажите оптимальный метод закрытия дефекта при недостатке тканей:

A. Первичное натяжение краёв раны

B. Лазерная шлифовка поверхности

C. Инъекционная терапия филлерами

D. Перемещение местных кожных лоскутов

E. Дермабразия кожных покровов

287. Отметьте основной принцип формирования кожных лоскутов:

A. Удаление всей подкожной клетчатки

B. Увеличение натяжения тканей

C. Минимизация длины кожного разреза

D. Использование только тонких нитей

E. Сохранение адекватного кровоснабжения

288. Укажите метод, позволяющий изменить направление рубца и снизить натяжение тканей:

A. Липосакция мягких тканей лица

B. Z-пластика кожного рубца

C. Лазерная шлифовка кожи

D. Инъекционная терапия филлерами

E. Поверхностный химический пилинг

289. Отметьте фактор, ограничивающий возможность первичного закрытия раны:

A. Высокое натяжение тканей

B. Цвет кожи пациента

C. Время проведения операции

D. Тип используемых инструментов

E. Пол пациента и его возраст 290. Укажите оптимальную тактику при глубоком втянутом рубце:

A. Лазерная шлифовка поверхности

B. Инъекционная терапия ботулотоксином

C. Иссечение с пластикой дефекта

D. Дермабразия кожных покровов

E. Наблюдение без вмешательства

291. Отметьте возможное осложнение после иссечения рубца:

A. Увеличение размеров носа

B. Смещение глазного яблока

C. Атрофия жевательной мышцы

D. Деформация ушной раковины

E. Рецидив рубцовой деформации

292. Укажите основной критерий выбора метода закрытия дефекта:

A. Цвет кожи пациента

B. Размер и локализация дефекта

C. Время проведения операции

D. Тип используемых инструментов

E. Пол пациента и его возраст

293. Отметьте ключевую цель хирургической коррекции рубца:

A. Увеличение длины рубца

B. Использование только консервативных методов

C. Минимизация времени операции

D. Восстановление функции и эстетики

E. Исключение кожных разрезов

294. Укажите основную цель физиотерапии в раннем послеоперационном периоде:

A. Увеличение объёма рубцовой ткани

B. Полное исключение медикаментозной терапии

C. Ускорение формирования грубого рубца

D. Уменьшение чувствительности кожи

E. Снижение отёка и улучшение микроциркуляции

295. Отметьте наиболее рациональный срок начала ЛФК после пластических операций на лице:

A. После стабилизации состояния тканей

B. В первые часы после операции

C. Через несколько месяцев после операции

D. Только после полного заживления

E. Независимо от состояния пациента

296. Укажите ключевой принцип реабилитации после пластических операций:

A. Максимальная иммобилизация тканей

B. Использование только физиотерапии

C. Индивидуальный и поэтапный подход

D. Полное исключение физической активности

E. Минимизация длительности восстановления 297. Отметьте метод физиотерапии, направленный на профилактику грубых рубцов:

A. Ультрафиолетовое облучение кожи

B. Глубокий тепловой прогрев тканей

C. Применение силиконовых покрытий

D. Интенсивный механический массаж

E. Полное отсутствие местного лечения

298. Укажите возможное осложнение при неправильной реабилитации:

A. Улучшение микроциркуляции тканей

B. Ускорение заживления раны

C. Уменьшение отёка мягких тканей

D. Повышение эластичности кожи

E. Формирование рубцовой контрактуры

299. Отметьте основной критерий эффективности реабилитации:

A. Сокращение времени лечения

- В. Быстрое исчезновение отёка тканей
- С. Минимальное количество процедур
- Д. Использование современных аппаратов

Е. Восстановление функции и эстетики

300. Укажите наиболее обоснованную тактику физиотерапевтического воздействия при сохраняющемся плотном послеоперационном инфильтрате мягких тканей лица:

А. Интенсивное тепловое воздействие высокой мощности

В. Умеренное физиотерапевтическое рассасывающее лечение

- С. Полное исключение любых процедур воздействия
- Д. Немедленное хирургическое вмешательство
- Е. Только медикаментозная терапия без физио