

함수의 극한과 연속성

1.5절~1.8절

함수의 극한

(정의) $y = f(x)$, $x = a$ ($x = a$ 에서 정의되지 않아도 됨)

$x \rightarrow a$ 일 때 $f(x) \rightarrow L$ 이면 L 를 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 극한값.

$$(\text{표현}) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Ⓜ Cauchy 의 정의

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ such that } 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

- ☞ 1. 극한의 개념은 어떤 점에서의 함수값을 알아보는 것이 아니라 그 점 근방에서 함수값의 움직임을 알아보는 것이다.
- 2. 극한값이 존재하기 위한 필요충분조건은 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 그 값이 같아야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

함수의 극한을 구하는 방법

예1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = 0.5$

M1) 수치적으로 구하는 방법

$x < 1$	$f(x)$	$x > 1$	$f(x)$
0.5	0.666667	1.5	0.400000
0.9	0.526316	1.1	0.476190
0.99	0.502513	1.01	0.497512
0.999	0.500250	1.001	0.499750
0.9999	0.500025	1.0001	0.499975


↓
1

↓
0.5

↓
1

↓
0.5

M2) 그래프로 구하는 방법




함수의 극한을 구하는 방법(2)

예2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

M1) 수치적으로 구하는 방법

x	$\frac{\sin x}{x}$
± 1.0	0.84147098
± 0.5	0.95885108
± 0.4	0.97354586
± 0.3	0.98506736
± 0.2	0.99334665
± 0.1	0.99833417
± 0.05	0.99958339
± 0.01	0.99998333
± 0.005	0.99999583
± 0.001	0.99999983

M2) 그래프로 구하는 방법



함수의 극한을 구하는 방법(3)

예5) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi}{x}$

$$f(1) = \sin \pi = 0$$


$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sin 2\pi = 0$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \sin 3\pi = 0$$

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \sin 4\pi = 0$$

$$f(0.1) = \sin 10\pi = 0$$


$$f(0.01) = \sin 100\pi = 0$$




무한 극한과 수직 점근선

1. 무한 극한


$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$




(a) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$



(b) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$



(c) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$



(d) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$

2. 수직 점근선

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow x = a$ 를 $f(x)$ 의 수직점근선

극한에 관한 성질

극한 법칙 c 가 상수이고 다음 극한이 존재하면 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$1. \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$3. \lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$$4. \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$5. \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \quad \text{단, } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

$$6. \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n, \quad n \text{은 양의 정수}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}, \quad n \text{은 양의 정수}$$

[n 이 짝수일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$ 이라 가정한다.]

극한값 구하기

1. 직접 대입해서 극한값을 구한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$x \neq a$ 일 때 $f(x) = g(x)$ 이고 극한이 존재한다면, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

2. 한쪽 극한을 이용하여 구한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ 이기 위한 필요충분조건은 } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

3. 압축정리(Squeeze Theorem)

$$f(x) \leq g(x) \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

함수의 체계

함수의 체계

대수함수

유리함수

다항함수

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

유리함수

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$

무리함수

$$f(x) = \sqrt[n]{f(x)}$$

초월함수

지수함수

$$f(x) = a^x / f(x) = e^x$$

로그함수

$$f(x) = \log_a x / f(x) = \ln x$$

삼각함수

$$f(x) = \sin x, \cos x, \tan x, \sec x, \csc x, \cot x$$

함수의 연속성

(정의) $y = f(x) : x = a$ 에서 연속

\Leftrightarrow ① 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 정의되어야 한다, 즉, $\exists f(a)$

② $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$


① Cauchy의 정의

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t. } |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon$$


(정의) $f(x) : \text{연속 on } [a, b]$

① $f(x)$ 는 연속 on (a, b)


② $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$




(a) 제거 가능한 불연속



(b) 제거 가능한 불연속



(c) 무한 불연속



(d) 도약 불연속

연속성의 성질

$f(x), g(x)$: 연속 on $x = a$, $c \in R$

1. $cf(x)$: 연속 on $x = a$

2. $f(x) \pm g(x)$: 연속 on $x = a$

3. $f(x)g(x)$: 연속 on $x = a$

4. $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(a) \neq 0$) : 연속 on $x = a$

5. $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, $f(y)$: 연속 on $y = b \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b)$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow a} g(x))$$

6. $g(x)$: 연속 on $x = a$, $f(y)$: 연속 on $y = g(a) \Rightarrow f \circ g$: 연속 on $x = a$

함수의 체계

함수의 체계

대수함수

유리함수

다항함수

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

유리함수

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$

무리함수

$$f(x) = \sqrt[n]{f(x)}$$

초월함수

지수함수

$$f(x) = a^x / f(x) = e^x$$

로그함수

$$f(x) = \log_a x / f(x) = \ln x$$

삼각함수

$$f(x) = \sin x, \cos x, \tan x, \sec x, \csc x, \cot x$$

관련된 정리들

정의) 함수 f 에서 $\forall x \in D_f, \exists a \in D_f$ s.t. $f(x) \leq f(a) (f(x) \geq f(a))$
 $f(a)$ 을 f 의 최대값 (최소값)이라 한다.

정리) 중간값 정리

함수 $f(x) : I=[a, b]$ 위에서 연속

$f(a) < k < f(b)$ or $f(b) < k < f(a)$ 인 k 에 대하여

$\exists x_0 \in (a, b)$ such that $f(x_0) = k$

정리) 최대 · 최소정리

$f(x) : I=[a, b]$ 에서 연속이면 I 위에서 $f(x)$ 의 최대값과 최소값을 갖는다.