

Realizar los siguientes ejercicios aplicando **Naive-Bayes** con los siguientes conjuntos de datos:

1.

$x_1$ # ? $j$	$x_2$ # HTML	$c$ Y
2	2	1
0	0	0
1	0	0

Ejemplo nuevo nuevo de (1,1)

2.

$x_1$ # ? $j$	$x_2$ # HTML	$x_3$ #X	$c$ Y
1	2	7	0
0	0	8	0
5	6	9	1
1	1	1	0

Ejemplo nuevo de (3,1,7)

3.

$x_1$ # ? $j$	$x_2$ # HTML	$x_3$ #X	$x_4$ #)(	$c$ Y
1	2	7	1	0
0	0	8	0	0
5	6	9	1	1
6	6	4	2	1
1	1	1	1	1

Ejemplo nuevo de (2,3,4,0)

4.

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_5$	$c$
# ? i	# HTML	#X	#)(	#aa	Y
1	2	7	1	6	0
0	0	8	0	8	0
5	6	9	1	3	1
2	3	6	7	5	1
5	9	1	1	2	1
0	2	0	0	0	0
1	1	1	1	2	1

Ejemplo nuevo de (2,1,1,4,6)