

UPUTSTVO ZA LEK

Pulmicort[®], 0,25 mg/mL, suspenzija za raspršivanje
Pulmicort[®], 0,50 mg/mL, suspenzija za raspršivanje

budesonid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Pulmicort i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Pulmicort
3. Kako se primenjuje lek Pulmicort
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Pulmicort
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Pulmicort i čemu je namenjen

Lek Pulmicort, suspenzija za raspršivanje sadrži aktivnu supstancu budesonid. On pripada grupi lekova koji se nazivaju „kortikosteroidi”. Deluje tako što smanjuje i sprečava oticanje i zapaljenje u Vašim plućima.

- Lek Pulmicort se koristi za lečenje astme. Takođe se koristi za lečenje krupa kod odojčadi i dece.
- Lek Pulmicort, suspenzija za raspršivanje se nalazi u malom plastičnom kontejneru koji sadrži tečnost. Tečnost se stavlja u mašinu koja se naziva raspršivač. Ovaj aparat pretvara lek u fine kapljice nalik magli koju zatim udišete kroz masku ili nastavak za usta.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Pulmicort

Lek Pulmicort ne smete primenjivati:

Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na budesonid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Pulmicort, suspenzija za raspršivanje ako:

- Imate infekciju pluća.
- Prehladeni ste ili imate infekciju grudnog koša.
- Imate oštećenje funkcije jetre.

Obavestite Vašeg lekara, ako osetite zamućenje vida ili neke druge poremećaje vida.

Drugi lekovi i lek Pulmicort

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Dejstvo leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje može biti izmenjeno ili on može menjati efikasnost drugih lekova. Takođe, možda će Vaš lekar želeti dodatno da prati Vaše zdravstveno stanje.

Posebno, obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate bilo koji od navedenih lekova:

- Steroidne lekove.
- Lekove za lečenje gljivičnih infekcija (kao što su itrakonazol i ketokonazol).
- Lekove za terapiju HIV (kao što su ritonavir ili lekovi koji sadrže kobicistat).

Trudnoća, dojenje i plodnost

- Ukoliko ste trudni, ili planirate trudnoću, posavetujte se sa Vašim lekarom pre primene leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje - nemojte koristiti lek Pulmicort osim ukoliko Vam ga lekar propiše.
- Ukoliko zatrudnite tokom primene leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje, nemojte prestajati sa primenom leka Pulmicort, već se odmah posavetujte sa Vašim lekarom.
- Ukoliko dojite posavetujte se sa Vašim lekarom pre primene leka Pulmicort.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Malo je verovatno da će primena leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje uticati na Vašu sposobnost da upravljate vozilima ili mašinama.

3. Kako se primenjuje lek Pulmicort

- Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni kako se lek Pulmicort, suspenzija za raspršivanje primenjuje pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.
- Tečnost leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje mora se staviti u raspršivač kako bi se pretvorio u fine kapljice magle pre udisanja, a zatim se udiše kroz masku ili nastavak za usta. Uputstvo za primenu raspršivača možete naći u odeljku „Koliko leka uzeti”.

Napomena: Nemojte koristiti ultrasonični raspršivač za primenu leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje.

- Vaše disanje se može popraviti u roku od 2 dana, međutim, da bi lek dostigao svoje puno dejstvo potrebno je da prođe i do 4 nedelje. Veoma je važno da koristite lek Pulmicort, suspenzija za raspršivanje svakog dana, čak i kada ne osećate simptome astme.

Koliko leka uzeti

Astma

Vaš lekar će Vam propisati odgovarajuću dozu leka. Doza zavisi od težine Vašeg oboljenja, tj. astme. Vaš lekar može smanjiti dozu leka kada se stanje Vaše astme poboljša.

- Uobičajena početna doza za odrasle i decu stariju od 12 godina je 1 mg do 2 mg (miligrama) dva puta dnevno.
- Deci mlađoj od 12 godina obično se propisuju niže doze od 0,5 mg do 1 mg dva puta dnevno.

Krup

Kod odojčadi i dece koja boluju od krupa uobičajena doza je 2 mg dnevno. Doza se može dati odjednom ili se može dati 1mg, a nakon 30 minuta još 1mg.

Uputstvo za upotrebu leka Pulmicort

1. Odvojiti doznu jedinicu (ampulu) iz stripa. Preostale ampule ostavite u zaštitnom omotaču od folije.
2. Pažljivo promućkajte ampulu.
3. Držite ampulu uspravno. Uvrnite vrh ampule kako bi se otvorila.
4. Otvorenu ampulu pričvrstite u posudu raspršivača. Pažljivo pritisnite da biste istisli tečnost u posudu.
5. Bacite praznu ampulu. Vratite nazad poklopac raspršivača.
6. Povežite jedan kraj posude sa maskom ili nastavkom za usta.
7. Povežite drugi kraj posude sa pumpom za vazduh.
8. Pažljivo promućkajte posudu.
9. Uključite raspršivač i udahnite kapljice magle mirno i duboko uz pomoć maske ili nastavka za usta. Ukoliko koristite masku za lice pobrinite se da maska čvrsto pristanja na lice.
10. Znaćete kada je terapija završena tako što će fine kapljice magle prestati da izlaze kroz Vašu masku ili nastavak za usta.
11. Vreme potrebno za raspršivanje ukupne količine leka zavisi od vrste opreme koji koristite. Takođe, zavisi i od količine leka koju treba primeniti.
12. Isperite usta vodom. Vodu ispljunite. Nemojte gutati vodu. Ako ste koristili masku za lice, operite i lice.
13. Posle svake upotrebe operite posudu raspršivača i nastavak za usta (ili masku za lice) u toploj vodi sa deterdžentom i dobro obrišite. Posle pranja, osušite sve delove u struji vazduha tako što ćete ih povezati sa otvorom za ispuštanje vazduha ili kompresorom.

Važne informacije o Vašim simptomima astme

Ukoliko osetite da ostajete bez daha ili teško dišete dok koristite lek Pulmicort, suspenzija za raspršivanje

treba da nastavite sa primenom leka, ali se obratite Vašem lekaru što je pre moguće, pošto Vam može zatrebati dodatna terapija.

Bez odlaganja kontaktirajte Vašeg lekara ukoliko:

- se Vaše disanje pogoršava ili se tokom noći često budite sa astmom.
- u jutarnjim satima počnete da osećate teskobu u grudima koja traje duže nego uobičajeno.

Ovi znaci mogu da govore da Vaše stanje nije kontrolisano na pravi način i da Vam je bez odlaganja potrebna drugačija ili dodatna terapija.

Ako ste uzeli više leka Pulmicort nego što treba

Veoma je važno da uzimate lek onako kako Vam je lekar savetovao, odnosno farmaceut naznačio na pakovanju. Nemojte smanjivati ni povećavati dozu leka bez prethodne medicinske konsultacije. Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje nego što bi trebalo, posavetujte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Pulmicort

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu, uzmite sledeću dozu prema preporučenom režimu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ukoliko Vam se desi bilo šta od pomenutog, prestanite sa upotrebom leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje i odmah se posavetujte sa Vašim lekarom.

- Otok lica, posebno oko usta (sa mogućim oticanjem usana, jezika, očiju i ušiju), osip, svrab, kontaktni dermatitis (problem sa kožom), koprivnjača i suženje disajnih puteva (stezanje mišića disajnih puteva koje izaziva teško disanje). Ovo može ukazivati da imate alergijsku reakciju. Ovo se retko dešava, kod manje od 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek.
- Nagla pojava teškog disanja posle inhalacije leka. Ovo se dešava veoma retko, kod manje od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek.

Druga moguća neželjena dejstva:

Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- Gljivična infekcija u usnoj duplji. Ovo je manje verovatno ukoliko isperete usta vodom posle primene leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje.
- Blaga iritacija ždrele, kašalj i promuklost.
- Pneumonija (zapaljenje pluća) kod pacijenta sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća.

Ako tokom primene budesonida, osetite neki od sledećih simptoma, javite se Vašem lekaru, jer mogu ukazivati na infekciju pluća:

- Povišenu telesnu temperaturu (groznica) ili drhtavicu
- Povećanu sekreciju sluzi ili promenu boje iste
- Povećanje kašlja ili povećane teškoće sa disanjem

Povremena (mogu se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

- Osećaj zabrinutosti, nemira ili nervoze
- Depresija
- Drhtanje
- Katarakta (zamagljivanje sočiva oka)
- Grčevi mišića

- Zamućen vid

Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

- Osip kože posle primene maske za lice. Ovo se može sprečiti pranjem lica posle upotrebe maske za lice.
- Problemi sa spavanjem, osećaj zabrinutosti ili iritiranost. Veća je verovatnoća da će se ova dejstva javiti kod dece.
- Pojava modrica na koži.
- Gubitak glasa.
- Promuklost (kod dece).

Kortikosteroidi koje udahnete mogu uticati na normalno stvaranje steroidnih hormona u Vašem telu. Posebno ukoliko koristite visoke doze u dužem vremenskom periodu. Promene uključuju:

- Promene mineralne gustine kostiju (krtoš kostiju).
- Glaukom (povećan pritisak u Vašem oku).
- Usporeni rast kod dece i adolescenata (retko). Usled uzimanja visokih doza tokom nekoliko godina, ukupna visina može biti smanjena za oko 1 cm.
- Uticaj na nadbubrežnu žlezdu (mala žlezda koja se nalazi pored bubrega)(retko).

Značajno je manja verovatnoća da će se ove promene desiti pri primeni inhalacionih kortikosteroida u poređenju sa tabletama kortikosteroida.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Pulmicort suspenzija za raspršivanje

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Pulmicort, suspenzija za raspršivanje posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:“, intermedijernom pakovanju (foliji) i ampuli nakon „EXP:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temperaturi do 30°C, zaštićen od svetlosti.

Čuvati u omotaču od zaštitne folije radi zaštite od svetlosti.

Jednodozne kontejnere (ampule) treba čuvati u uspravnom položaju i zaštititi od zamrzavanja.

Rok upotrebe posle otvaranja kesice: 3 meseca na temperaturi do 30°C, zaštićen od svetlosti.

Nakon rekonstitucije lek upotrebiti odmah.

Iako se iskoristi samo 1 mL suspenzije ostatak zapremine leka više nije sterilan i treba ga odmah odložiti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Pulmicort suspenzija za raspršivanje

Aktivna supstanca je budesonid.

Pulmicort, 0,25 mg/mL: Jedna ampula sadrži 0,50 mg aktivne supstance budesonid.

Pulmicort, 0,50 mg/mL: Jedna ampula sadrži 1 mg aktivne supstance budesonid.

Pomoćne supstance su: dinatrijum-edetat, natrijum-hlorid, polisorbit 80, limunska kiselina, bezvodna, natrijum-citrat i voda za injekcije.

Kako izgleda lek Pulmicort i sadržaj pakovanja

Suspenzija bele do skoro bele boje u jednodoznom plastičnom kontejneru (ampula).

Unutrašnje pakovanje leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje je jednodozni kontejner (ampula) od polietilena niske gustine (LDPE). Svaka ampula (dozna jedinica) sadrži 2 mL suspenzije.

Intermedijarno pakovanje leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje je kesica (omotač) od Al-folije u kojoj se nalazi strip, sa pet jednodoznih kontejnera (ampula).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze četiri aluminijumske kesice sa po pet ampula (ukupno 20 ampula) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO ASTRAZENECA UK LIMITED BEOGRAD

Milutina Milankovića 1i, Beograd - Novi Beograd

Proizvođač

ASTRAZENECA AB,

Forskargatan 18, Södertälje, Švedska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2025.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Pulmicort, 0,25 mg/mL, suspenzija za raspršivanje: 001445810 2024 od 19.03.2025.

Pulmicort, 0,50 mg/mL, suspenzija za raspršivanje: 001445854 2024 od 19.03.2025.

Uputstvo za ispravnu upotrebu Pulmicort suspenzije za raspršivanje

Svaki jednodozni kontejner (ampulu) treba odvojiti iz stripa, nežno promućkati i otvoriti uvrtnjem jezička. Sadržaj ampule treba nežno istisnuti u posudu raspršivača. Svaki jednodozni kontejner (ampulu) treba baciti, a vrh posude raspršivača vratiti na mesto.

Lek Pulmicort, suspenzija za raspršivanje se inhalira pomoću aparata-mlaznog raspršivača (nebulizator) opremljenog usnikom ili odgovarajućom maskom za lice. Raspršivač treba povezati sa vazdušnim kompresorom sa adekvatnim protokom vazduha (6-8 L/min), a volumen punjenja bi trebalo da bude 2-4 mL.

Važne napomene:

- Pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu koje se nalazi u pakovanju svakog raspršivača.
- Ultrazvučni raspršivači nisu pogodni za primenu leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje, i da se ne preporučuju za primenu ovog leka.
- Lek Pulmicort, suspenzija za raspršivanje se može mešati sa fiziološkim rastvorom i rastvorima za raspršivanje terbutalina, salbutamola, fenoterola, acetilcisteina, natrijum-kromoglikata i ipratropijum-bromida. Pripremljenu mešavinu treba upotrebiti u roku od 30 minuta.
- Usta isprati vodom posle inhalacije propisane doze kako bi se smanjio na minimum rizik od orofaringealne kandidijaze.
- Vodom oprati lice posle korišćenja maske za lice kako bi se prevenirala iritacija kože lica.
- Na adekvatan način očistiti i održavati raspršivač prema uputstvu proizvođača.

Vaš lekar će Vam prilagoditi dozu leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje prema individualnim potrebama.