

# Notas del teórico

Complementos de análisis matemático - Irene Drelichman 2024

---

BUSTOS JORDI

Bustos Jordi  
jordibustos01@gmail.com

# Contenido

## 9 | Clase I - 23/08

1.1	Repaso de funciones .....	9
1.1.1	Propiedades .....	9
1.1.2	Función inversa .....	10
1.1.3	Composición de funciones .....	11
1.1.4	Familia de funciones .....	11
1.2	Números naturales .....	12
1.3	Cuerpo .....	13
1.3.1	Axiomas de la suma .....	13
1.3.2	Axiomas del producto .....	13
1.3.3	Cuerpos Ordenados .....	13

## 16 | Clase II - 27/08

2.1	Cuerpo Arquimediano .....	16
2.2	Supremo e ínfimo .....	16
2.3	Cuerpo completo .....	18
2.4	Cardinalidad - introducción .....	20

## 22 | Clase III - 30/08

3.1	Conjuntos numerables .....	22
3.2	Cantor - Schröder - Bernstein .....	23
3.3	Los Reales son no numerables .....	24
3.3.1	Principio de encaje de Intervalos .....	24
3.4	Propiedades .....	25

## 28 | Clase IV - 03/09

4.1	Operaciones con cardinales .....	28
4.2	Hipótesis del continuo .....	31
4.3	Construcción de los Reales .....	31

## 34 | Clase V - 06/09

5.1	Construcción de los Reales .....	34
5.2	Cuerpo ordenado .....	35
5.3	$\mathbb{R}$ tiene la propiedad del supremo .....	36

## 40 | Clase VI - 10/09

6.1	Sucesiones .....	40
6.2	Propiedades de límites .....	41
6.3	Ejemplo subsucesiones .....	43
6.4	Punto de acumulación .....	44

## 46 | Clase VII - 13/09

7.1	Límite superior e inferior .....	46
7.2	Sucesiones de Cauchy .....	47
7.3	Límites infinitos .....	47
7.4	Series numéricas .....	48

## 52 | Clase VIII - 24/09

8.1	Ejemplo de convergencia condicional .....	52
8.2	Corolarios de series .....	52
8.3	Criterios de convergencia .....	53
8.3.1	Criterio de la raíz .....	53
8.3.2	Criterio del cociente y D'Alembert .....	53
8.3.3	Criterio de Dirichlet - Abel .....	55
8.4	Parte positiva y negativa .....	56
8.5	Reordenamientos .....	57

**Clase IX - 27/09**

9.1	(Continuación) Reordenamientos .....	60
9.2	Topología Euclídea .....	60
9.2.1	Conjuntos abiertos .....	61
9.2.2	Interior de un conjunto .....	63
9.3	Entorno .....	64
9.4	Conjunto Cerrado .....	64
9.4.1	Clausura .....	65

**68 | Clase X - 01/10**

10.1	(Continuación) Clausura .....	68
10.2	Punto de acumulación .....	68
10.3	Sucesiones en varias dimensiones .....	71
10.4	Conjuntos compactos .....	72

**75 | Clase XI - 04/10**

11.1	(Continuación) Conjuntos Compactos .....	75
11.2	Propiedades de límites .....	78

**82 | Clase XII - 08/10**

12.1	Límites en varias dimensiones .....	82
12.2	Continuidad en un punto .....	82
12.3	Composición de funciones .....	82
12.4	Continuidad global .....	82

**84 | Clase XIII - 15/10**

13.1	Gráficas continuas .....	84
13.2	Teorema de Weierstrass .....	84
13.3	Teorema del valor intermedio .....	84
13.4	Convexidad .....	84

## 86 | Clase XIV - 18/10

14.1	Continuidad uniforme .....	86
14.2	Conjuntos Conexos y Arco-conexos .....	86

## 88 | Parciales

15.1	Primer parcial - Primera fecha - 14/10 .....	88
15.2	Primer parcial - Segunda fecha - 28/10 .....	88
15.3	Segundo parcial - Primera fecha - 20/12 .....	89

*This page is intentionally left blank.*

# Prefacio

“Considero a cada hombre como un deudor  
de su profesión,  
y ya que de ella recibe sustento y provecho,  
así debe procurar,  
mediante el estudio,  
servirle de ayuda y ornato.”

---

Francis Bacon

Este libro recoge las notas tomadas durante el curso de Complementos de Análisis Matemático dictado por Irene Drelichman en el segundo cuatrimestre de 2024.

Las clases 1 a 8, junto con la primera parte de la clase 9, abarcan la primera mitad del curso. Las clases 9 a 22 cubren la segunda mitad, que incluye temas de diferenciación, integración y ecuaciones diferenciales, los cuales no fueron evaluados en la práctica. Se tomaron dos exámenes parciales, uno por cada mitad del curso.

Las clases 9 a 11 (hasta la mitad) cubren los conceptos básicos de Topología. Desde la segunda mitad de la clase 11 hasta la 14 se aborda la continuidad. Los teoremas de la función inversa e implícita se tratan en las clases 15 y 16. La integración se desarrolla en las clases 17 a 19. Las clases 20 a 22 (hasta la mitad) se dedican a las sucesiones de funciones, y finalmente, se introducen las ecuaciones diferenciales.

Estas notas se basan principalmente en material de los libros *Principles of Mathematical Analysis* de Walter Rudin, *Curso de análise vol.1* de Elon Lages Lima y *Calculus* de Tom M. Apostol.

*This page is intentionally left blank.*



# Clase I - 23/08

## 1.1 Repaso de funciones

Una función  $f : A \rightarrow B$  es un objeto que consta de tres partes: un conjunto  $A$  (dominio), un conjunto  $B$  (codominio) y una regla que permite asociar todo elemento de  $A$  a un único elemento de  $B$ . Es decir,  $f(x) \in B$ , donde  $x \in A$ . Además,  $f(x) = y$ , lo que significa que  $f$  asigna a  $x$  el valor  $f(x)$ .

El gráfico de  $f : A \rightarrow B$  es el subconjunto de  $A \times B$  dada por  $(x, f(x))$  con  $x \in A$  y  $f(x) \in B$ . Notamos  $G(f) = \{(x, y) \in A \times B : y = f(x)\}$ .

**Definición 1.1 (Inyectividad).**  $f : A \rightarrow B$  es inyectiva cuando para  $x, y \in A$ ,  $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ .

**Definición 1.2 (Suryectividad).**  $f : A \rightarrow B$  es suryectiva cuando para  $(\forall y \in B)(\exists x \in A)(f(x) = y)$

**Definición 1.3 (Biyectividad).**  $f : A \rightarrow B$  es biyectiva si es inyectiva y suryectiva.

**Definición 1.4 (Imagen).** Dados  $f : A \rightarrow B$  y  $X \subset A$  se llama imagen de  $X$  por  $f$  al conjunto  $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$ .

### 1.1.1. Propiedades

**Proposición 1.5.**  $f(X) \cup f(Y) = f(X \cup Y)$

**Proposición 1.6.**  $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$ . La igualdad vale si y sólo si es inyectiva.

**Demostración.** Sea  $a \in f(X \cap Y) \Rightarrow \exists x \in X \cap Y : f(x) = a \Rightarrow x \in X \Rightarrow f(x) \in f(X)$  y  $y \in Y \Rightarrow f(y) \in f(Y)$ .

Si  $f : A \rightarrow B$  no es inyectiva  $\Rightarrow \exists x \neq y : f(x) = f(y)$ . Si  $X = \{x\}$ ,  $Y = \{y\} \Rightarrow X \cap Y = \emptyset$ .  $f(X) \cap f(Y) = \{f(x)\}$  luego  $f(X \cap Y) = \emptyset$ .

Si  $f$  es inyectiva, sea  $y \in f(X) \cap f(Y) \Rightarrow \exists a \in X, b \in Y$  tal que  $f(a) = f(b) = y$ . Como  $f$  es inyectiva  $a = b \Rightarrow a \in X \cap Y \Rightarrow y = f(a), y \in f(X \cap Y) \Rightarrow f(X) \cap f(Y) \subset f(X \cap Y)$ .  
 $\therefore$  Si  $f$  es inyectiva son iguales.  $\square$

**Proposición 1.7.**  $X \subset Y \Rightarrow f(X) \subset f(Y)$

**Proposición 1.8.**  $f(\emptyset) = \emptyset$

**Definición 1.9.** Dados  $f : A \rightarrow B$  y  $Y \subset B$  se llama preimagen de  $Y$  por  $f$  al conjunto  $f^{-1}(Y) = \{x \in A : f(x) = y, \forall y \in Y\}$ .

### 1.1.2. Función inversa

Sea  $f : A \rightarrow B$ :

**Proposición 1.10.**  $f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y) = f^{-1}(X \cup Y)$

**Proposición 1.11.**  $f^{-1}(X) \cap f^{-1}(Y) = f^{-1}(X \cap Y)$

**Proposición 1.12.**  $f^{-1}(Y^c) = (f^{-1}(Y))^c$

**Proposición 1.13.**  $Y \subset Z \Rightarrow f^{-1}(Y) \subset f^{-1}(Z)$

**Proposición 1.14.**  $f^{-1}(B) = A$

**Proposición 1.15.**  $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$

### 1.1.3. Composición de funciones

Sean  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow C$ , definimos  $g \circ f : A \rightarrow C$  como  $(g \circ f)(x) = g(f(x)) \forall x \in A$ , es suficiente que  $f(A) \subset B$ .

**Proposición 1.16.** Composición de funciones suryectivas/inyectivas es suryectiva/inyectiva.

**Proposición 1.17.**  $(g \circ f)^{-1}(Z) = f^{-1}(g^{-1}(Z))$ .

**Definición 1.18.** La restricción de  $f$  en un subconjunto  $X \subset A$  la notamos  $f|_X : X \rightarrow B$ .

**Definición 1.19.** Dada  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow A$ ,  $g$  es una inversa a izquierda si y sólo si  $g \circ f = \text{id}_A$ .  $\exists g$  si y sólo si  $f$  es inyectiva. Análogamente para la inversa a derecha si  $f$  es suryectiva. Si  $f$  es biyectiva  $\Rightarrow g$  es inversa a ambos lados y es única.

### 1.1.4. Familia de funciones

Sea  $L$  un conjunto de elementos que llamamos índices y representamos genéricamente con  $\lambda$ . Dado un conjunto  $X$ , una familia de elementos de  $X$  con índices en  $L$  es  $X : L \rightarrow x$ . El valor de  $x$  en  $\lambda \in L$  lo notamos  $x_\lambda$  y la familia  $(x_\lambda)_{\lambda \in L}$ .

**Ejemplo.**  $L = \{1, 2\}$  los valores de  $x : \{1, 2\} \rightarrow X$  se representan por  $x_1, x_2$ , es decir que los puedo identificar con pares ordenados  $(x_1, x_2)$  de elementos de  $X$ .

Una familia con elementos en  $\mathbb{N}$  se llama sucesión.  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de elementos de  $X$  es una función de  $x : \mathbb{N} \rightarrow X$  donde  $x_n = x(n)$ .

Las propiedades enunciadas previamente se pueden extender a cualquier familia de conjuntos.

## 1.2 Números naturales

Partimos de un conjunto  $\mathbb{N}$  y una función  $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  que cumple los siguientes axiomas (de Peano):

1. Es inyectiva.
2.  $\mathbb{N} - S(\mathbb{N})$  tiene un solo elemento y lo llamamos 1.
3. Principio de inducción, si  $X \subset \mathbb{N}$  tal que  $1 \in X$  y  $\forall m \in X$  vale  $S(m) \Rightarrow X = \mathbb{N}$ .

El principio de inducción permite definir operaciones

La suma se define como  $m + 1 = S(m)$ ,  $m + S(n) = S(m + n)$ .

**Proposición 1.20.** Asociatividad: sea  $X = \{p \in \mathbb{N} : m + (n + p) = (m + n) + p, \forall n, m \in \mathbb{N}\}$ .

**Demostración.**  $1 \in X, p \in X \Rightarrow$

$$m + (n + S(p)) = m + S(n + p) = S(m + (n + p)) = S((n + m) + p) = (m + n) + S(p) \quad (1.1)$$

$\therefore$  Por inducción  $X = \mathbb{N}$ . □

**Proposición 1.21.** Conmutatividad:  $n + m = m + n$ .

**Proposición 1.22.** Ley de cancelación:  $m + n = m + p \Rightarrow n = p$ .

**Proposición 1.23.** Tricotomía:  $m, n \in \mathbb{N}$ , si  $m > n$ ,  $\exists p : m + p = n$ . Si  $m < n$ ,  $\exists p \in \mathbb{N} : n + p = m$ .

**Definición 1.24.** La multiplicación se define recursivamente como:  $m \times 1 = m$  y  $m \times (n + 1) = m \times n + m$ .

Cumple la asociatividad, conmutatividad, ley de cancelación y monotonía.

**Teorema 1.25 (Principio de buena ordenación).** Todo subconjunto no vacío  $A \subset \mathbb{N}$  tiene un elemento mínimo.

**Demostración.** Llamemos  $I_m = \{p \in \mathbb{N} : 1 \leq p \leq m\} = [[1, m]]$  y  $X = \{m \in \mathbb{N} : I_m \subset \mathbb{N} - A\}$ .

Si  $1 \in A \Rightarrow 1$  es primer elemento. Si  $1 \notin A \Rightarrow 1 \in X$  como  $X \neq \mathbb{N}$  pues  $X \subseteq \mathbb{N} - A$  y  $A \neq \emptyset$ . Por el principio de inducción  $\exists m \in X$  tal que  $m+1 \notin X$ , si no tendríamos que  $X = \mathbb{N}$ . Luego todos los elementos entre 1 y  $m$  están en  $\mathbb{N} - A$  y  $m+1 \in A$ , se sigue que  $a = m+1$  es primer elemento de  $A$ .  $\square$

## 1.3 Cuerpo

Un cuerpo es un conjunto dotado de dos operaciones, suma y producto y se denota por  $\mathbb{K}$ .

### 1.3.1. Axiomas de la suma

- 1) Asociatividad:  $\forall x, y, z \in \mathbb{K}, (x + y) + z = x + (y + z)$ .
- 2) Conmutatividad:  $\forall x, y \in \mathbb{K}, x + y = y + x$ .
- 3) Neutro:  $\exists 0 \in \mathbb{K} : x + 0 = x, \forall x \in X$ .
- 4) Opuesto:  $\forall x \in X, \exists -x \in \mathbb{K} : x + (-x) = 0_{\mathbb{K}}$ .

### 1.3.2. Axiomas del producto

- 1) Asociatividad:  $\forall x, y, z \in \mathbb{K}, (xy)z = x(yz)$ .
  - 2) Conmutatividad:  $\forall x, y \in \mathbb{K}, xy = yx$ .
  - 3) Neutro:  $\exists 1 \in \mathbb{K} - \{0\} : x \cdot 1 = x, \forall x \in X$ .
  - 4) Inverso:  $\forall x \in X, \exists x^{-1} \in \mathbb{K} : x \cdot x^{-1} = 1_{\mathbb{K}}$ .
- Axioma de distributividad:  $\forall x, y, z \in \mathbb{K}, x(y + z) = xy + xz$ .

**Ejemplo.**  $\mathbb{Q}, \mathbb{Z}_2$ .

### 1.3.3. Cuerpos Ordenados

Un cuerpo ordenado es un cuerpo  $\mathbb{K}$  que tiene un subconjunto  $P \subset \mathbb{K}$  llamado conjunto de elementos positivos de  $\mathbb{K}$  que cumplen:

1.  $x, y \in P \Rightarrow x + y \in P, xy \in P$ .
2.  $x \in \mathbb{K} \Rightarrow x \in P \text{ o } -x \in P \text{ o } x = 0$ .

**Ejemplo.**  $\mathbb{Q}$  con  $P = \{p/q : p, q \in \mathbb{N}\}$ ,  $\mathbb{Z}_2$  no es ordenado.

**Proposición 1.26.** Dado un cuerpo ordenado si  $a \neq 0 \Rightarrow a^2 \in P$ .

En un cuerpo ordenado definimos  $x < y$  para significar que  $y - x \in P$ .  
La relación  $<$  tiene las siguientes propiedades:

**Proposición 1.27.** Transitividad:  $x < y$  y  $y < z \Rightarrow x < z$ .

**Proposición 1.28.** Tricotomía:  $x, y \in \mathbb{K} \Rightarrow x = y$  o  $x < y$  o  $x > y$ .

**Proposición 1.29.** Monotonía de la suma  $x < y \Rightarrow x + z < y + z$ .

**Proposición 1.30.** Monotonía del producto  $x < y, 0 < z \Rightarrow xz < yz$ .

En el cuerpo ordenado  $\mathbb{K}$  escribimos  $x \leq y$  para significar  $x < y$  o  $x = y$ . O sea  $y - x \in P \cup \{0\}$ .  
Con esta relación se cumplen todas las propiedades anteriores y la antisimetría.  $x \leq y, y \leq x \Rightarrow x = y$ .

Además tenemos la noción de intervalo, dados  $a, b \in \mathbb{K}$  definimos  $[a, b] = \{x \in \mathbb{K} : a \leq x \leq b\}$ ,  $[a, b)$ ,  $(a, b]$ ,  $(a, b)$ ,  $[a, +\infty)$ ,  $(-\infty, b]$ ,  $(a, +\infty)$ ,  $(-\infty, b)$ ,  $[a, a] = \{a\}$ .

Un subconjunto de  $X \subset \mathbb{K}$  se dice acotado inferiormente, superiormente si tiene cota inferior o cota superior.  $\exists b \in \mathbb{K} : x \leq b, \forall x \in X$ .

*This page is intentionally left blank.*

# Clase II - 27/08

## 2.1 Cuerpo Arquimediano

Si  $\mathbb{K}$  es un cuerpo ordenado,  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{K}$ , pero esto no necesariamente implica que  $\mathbb{N}$  es no acotado.

**Ejemplo.**  $\mathbb{Q}(t)$  : cuerpo de funciones racionales con coeficientes en  $\mathbb{Q}$ ,  $r(t) = p(t)/q(t)$ ,  $p, q \in \mathbb{Q}$ ,  $q \neq 0$ . Este cuerpo puede ser ordenado diciendo que  $r(t)$  es positivo si y sólo si el coeficiente de mayor grado del polinomio  $pq$  es positivo. En este cuerpo observemos que  $p(t) = t = t/1$  cumple que  $\forall n \in \mathbb{N}, p(t) = t - n \in \mathbb{P} \Rightarrow t > n, \forall n \in \mathbb{N}$ . Es decir que en  $\mathbb{Q}(t)$ ,  $\mathbb{N}$  es un conjunto acotado, por ejemplo por  $t$ .

**Teorema 2.1.** En un cuerpo ordenado  $\mathbb{K}$  son equivalentes:

- 1)  $\mathbb{N} \subset \mathbb{K}$  no es acotado superiormente.
- 2) Dados  $a, b \in \mathbb{K}$  con  $a > 0, \exists n \in \mathbb{N} : n \cdot a > b$ .
- 3) Dado cualquier  $0 < a \in \mathbb{K}, \exists n \in \mathbb{N} : 0 < \frac{1}{n} < a$ .

Cuando vale cualquiera decimos que  $\mathbb{K}$  es arquimediano.

**Demostración.** 1)  $\Rightarrow$  2)

Como  $\mathbb{N}$  es no acotado, dados  $a, b \in \mathbb{K}$ ,  $a > 0$ ,  $\exists m \in \mathbb{N} : m > \frac{b}{a}$ , caso contrario  $\frac{b}{a}$  sería cota de  $\mathbb{N} \Rightarrow ma > b$

2)  $\Rightarrow$  3)

Dado  $a > 0, \exists n \in \mathbb{N} : na > 1$  (tomando  $b = 1$  en 2.)  $\Rightarrow a > \frac{1}{n} > 0$

3)  $\Rightarrow$  1)

Dado  $0 < a \in \mathbb{K} \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, 0 < \frac{1}{n} < \frac{1}{a}$ , pues 3. vale para todo  $\mathbb{K} \Rightarrow b < n \Rightarrow$  es no acotado (pues ningún  $b > 0$  puede ser cota superior).  $\square$

## 2.2 Supremo e ínfimo

**Definición 2.2 (Supremo).** Dados un cuerpo ordenado  $\mathbb{K}$  y un subconjunto  $X \subset \mathbb{K}$  acotado superiormente, decimos que  $b \in \mathbb{K}$  es supremo de  $X$  si es la menor de las cotas superiores de  $X$  en  $\mathbb{K}$ .



Es decir, se cumple:

1.  $\forall x \in X, x \leq b$
2. Si  $c \in \mathbb{K}$  y  $x \leq c, \forall x \in X \Rightarrow b \leq c$ .
3. Dado  $c < b$  en  $\mathbb{K}, \exists x \in X : c < x$

**Nota.** 1) El supremo de un conjunto, si existe es único.  
 2) Si un conjunto tiene máximo, es el supremo.  
 3) Si  $X = \emptyset$ , todo  $b \in \mathbb{K}$  es cota superior, como  $\mathbb{K}$  no tiene primer elemento, se sigue que  $\emptyset$  no tiene supremo en  $\mathbb{K}$ .

**Definición 2.3 (Ínfimo).** Dados un cuerpo ordenado  $\mathbb{K}$  y un subconjunto  $X \subset \mathbb{K}$  acotado inferiormente, decimos que  $b \in \mathbb{K}$  es ínfimo de  $X$  si es la mayor de las cotas inferiores de  $X$  en  $\mathbb{K}$ .

Es decir, se cumple:

1.  $\forall x \in X, x \geq b$
2. Si  $c \in \mathbb{K}$  y  $x \geq c, \forall x \in X \Rightarrow b \geq c$ .
3. Dado  $c > b$  en  $\mathbb{K}, \exists x \in X : b < x < c$ .

**Ejemplo.** Dados  $a < b$  en  $\mathbb{K}$ . Si  $X = (a, b) \Rightarrow \inf(X) = a, \sup(X) = b$ .

- 1) Por definición  $a$  es cota inferior y  $b$  superior.
  - 2)  $a < c \in \mathbb{K}$ , no es cota inferior. En efecto, si  $c \geq b$  trivial. Si  $c < b \Rightarrow \frac{a+c}{2} \in X, a < \frac{a+c}{2} < c \Rightarrow a < c \therefore c$  no es cota inferior.
- Luego por 1) y por 2)  $a$  es ínfimo de  $X$ .

**Ejemplo.** Sea  $Y = \{y \in \mathbb{Q} : y = \frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}\}$ . Veamos que  $\inf(Y) = 0, \sup(Y) = \frac{1}{2}$ .

$$\frac{1}{2} \in Y, \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2} \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{1}{2} = \sup(Y) \quad (2.1)$$

Como  $0 < \frac{1}{2^n} (\forall n \in \mathbb{N}) \Rightarrow 0$  es cota inferior. Sea

$$0 < c \in \mathbb{K}, 2^n = (1+1)^n \leq 1+n \leq \frac{1}{c} \Rightarrow n \leq \frac{1}{c} - 1 \Rightarrow \frac{1}{2^n} < c \quad (2.2)$$

$\Rightarrow c$  no puede ser cota inferior por la propiedad 3 de la arquimedianidad  $\therefore 0$  es el ínfimo de  $Y$ .

El problema más serio de los racionales desde el punto de vista del análisis es que algunos conjuntos acotados de números racionales no tienen súpero (o ínfimo) en  $\mathbb{Q}$ .

**Ejemplo.** Sean  $X = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0, x^2 < 2\}$ ,  $Y = \{y \in \mathbb{Q} : y > 0, y^2 > 2\}$ . Notemos que si  $z > 2 \Rightarrow z^2 > 4 \Rightarrow z \notin X \Rightarrow X \subset [0, 2]$  y  $X$  es un conjunto acotado. Además  $Y \subset (0, +\infty)$  por lo que es un conjunto acotado inferiormente. Veamos que  $\nexists$  súpero e ínfimo en  $\mathbb{Q}$ .

1. Quiero ver que  $X$  no tiene máximo. Dado  $x \in X$  quiero encontrar  $r \in \mathbb{Q}$  tal que  $0 < r < 1$  y  $x + r \in X \iff (x + r)^2 = x^2 + 2xr + r^2 < 2$ . Como  $r < 1 \Rightarrow (x + r)^2 < x^2 + 2xr + r = x^2 + r(2x + 1) < 2 \therefore x + r \in X$ .

2. Quiero ver que  $Y$  no tiene elemento mínimo, dado  $y \in Y$  tomo  $r \in \mathbb{Q} : 0 < r < \frac{y^2 - 2}{2y}$ .

$$(y - r)^2 = y^2 - 2yr + r^2 > y^2 - 2yr > 2 \quad (2.3)$$

$$y^2 - 2 > 2yr \quad (2.4)$$

$$\frac{y^2 - 2}{2y} > r \quad (2.5)$$

Es decir que  $y - r \in Y$  e  $y - r < y$ .

3. Si  $x \in X, y \in Y \Rightarrow x < y \Rightarrow x^2 < 2 < y^2 \Rightarrow x^2 < y^2$ .

Veamos que por 1, 2, 3  $\nexists \sup(X), \inf(Y)$ . Supongamos  $0 < \alpha = \sup(X)$ , no puede ser  $\alpha^2 < 2$  porque si no  $\alpha \in X$  y  $X$  no tiene máximo. Tampoco puede ser  $\alpha^2 > 2$  pues estaría en  $Y$  e  $Y$  no tiene mínimo, pues habría un  $\beta \in Y$  con  $\beta < \alpha$  y por 3) sería  $x < \beta < \alpha, \forall x \in X$  lo que contradice que  $\sup(X) = \alpha$ , pues sería  $\beta$  el súpero. En definitiva si existiese  $\sup(X) = \alpha$ , debe ser  $\alpha^2 = 2 \notin \mathbb{Q}$ . Luego  $X$  no tiene súpero en  $\mathbb{Q}$ . Ínfimo, ejercicio (análogo).

## 2.3 Cuerpo completo

**Definición 2.4.** Si  $\mathbb{K}$  es un cuerpo ordenado no Arquimediano,  $\mathbb{N} \subset \mathbb{K}$  es acotado superiormente.

si  $b \in \mathbb{K}$  es una cota superior de  $\mathbb{N} \Rightarrow n + 1 \in \mathbb{N} < b, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow n < b - 1$  o sea  $b - 1$  es cota superior de  $\mathbb{N} \therefore \nexists \sup(\mathbb{N})$  en  $\mathbb{K}$ .

**Definición 2.5 (Cuerpo Completo).** Un cuerpo ordenado  $\mathbb{K}$  se dice completo cuando dado un subconjunto no vacío y acotado superiormente tiene súpero en  $\mathbb{K}$ .

**Nota.** 1) Si el cuerpo es ordenado y completo  $\Rightarrow$  es arquimediano.

2) En un cuerpo ordenado completo  $\mathbb{K}$  todo subconjunto no vacío y acotado inferiormente tiene ínfimo en  $\mathbb{K}$ .

**Demostración.** Sea  $Y \subset \mathbb{K}$ , no vacío y acotado inferiormente. Sea  $X = -Y = \{-y : y \in Y\} \Rightarrow X$  es no vacío y acotado superiormente  $\Rightarrow \exists \sup(X) = a \Rightarrow -a = \inf(Y)$ .  $\square$

Axioma: Existe un cuerpo ordenado llamado  $\mathbb{R}$ .

Ejercicio: Dados  $0 < a \in \mathbb{R}, m \in \mathbb{N} \Rightarrow \exists! 0 < b \in \mathbb{R} : b^m = a$ . Sugerencia Definir  $X = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x^n < a\}$ ,  $Y = \{y \in \mathbb{R} : y > 0, y^n > a\}$  e imitar la demostración anterior. Probar y usar que dado  $x > 0 \exists$  para cada  $m \in \mathbb{N}$  un número real positivo que depende de  $x$  tal que  $(x + d)^m \leq A_n d + x^n, \forall 0 < d < 1$ .

**Definición 2.6 (Conjunto Denso).** Un conjunto  $X \subset \mathbb{R}$  se dice denso en  $\mathbb{R}$  si todo intervalo abierto  $(a, b)$  contiene algún punto de  $X$ .

**Ejemplo.**  $\mathbb{Q}$  es denso en  $\mathbb{R}$ .

**Demostración.** Como  $b - a > 0, \exists p \in \mathbb{N} : 0 < \frac{1}{p} < b - a$ .

Sea  $A = \{m \in \mathbb{Z} : \frac{m}{p} \geq b\}$ . Como  $\mathbb{R}$  es Arquimediano,  $A$  es un conjunto de números enteros no vacío y acotado por  $bp$ . Sea  $m_0$  el menor elemento de  $A$  entonces  $b \leq \frac{m_0}{p}$  y  $\frac{m_0 - 1}{p} < b$ . También  $\frac{m_0 - 1}{p} > 0$ , si no tendríamos que

$$\frac{m_0 - 1}{p} \leq a \leq b \leq \frac{m_0}{p} \quad (2.6)$$

Luego

$$b - a \leq \frac{m_0}{p} - \frac{m_0 - 1}{p} = \frac{1}{p} \quad (2.7)$$

Absurdo!  $\therefore \mathbb{Q}$  es denso en  $\mathbb{R}$ .  $\square$

**Ejemplo.**  $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$  es denso en  $\mathbb{R}$ .

Para ver que  $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$  es denso usamos la misma idea tomando  $p \in \mathbb{N} : 0 < \frac{1}{p} < \frac{b - a}{\sqrt{2}}$  por Arquimediano y  $\frac{\sqrt{2}}{p} < b - a$  por longitud del intervalo. Ejercicio terminar la

demostración.

## 2.4 Cardinalidad - introducción

**Definición 2.7.** Decimos que dos conjuntos  $X, Y$  tienen el mismo cardinal (coordinables o equipotentes) si  $\exists f : X \rightarrow Y$  biyectiva. Notamos  $X \sim Y$  o  $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$  o  $\#X = \#Y$  y  $\sim$  es una relación de equivalencia.

Dado  $n \in \mathbb{N}$  definimos  $\mathbb{I}_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ .

**Teorema 2.8.** Sean  $n, m \in \mathbb{N}$ . Entonces,  $\mathbb{I}_n \sim \mathbb{I}_m \iff n = m$ .

**Demostración.** Sabemos que si  $\mathbb{I}_n \sim \mathbb{I}_m$ , entonces  $\exists f : \mathbb{I}_n \rightarrow \mathbb{I}_m$  biyectiva. Supongamos que  $n < m$ . Esto implica que puedo definir  $g : \mathbb{I}_m \rightarrow \mathbb{I}_{n+1}$  suryectiva como:

$$g(k) = \begin{cases} k & \text{si } 1 \leq k \leq n+1, \\ 1 & \text{si } k > n+1. \end{cases} \quad (2.8)$$

Dada  $g \circ f : \mathbb{I}_n \rightarrow \mathbb{I}_{n+1}$  basta probar que  $\nexists$  funciones  $h : \mathbb{I}_n \rightarrow \mathbb{I}_{n+1}$  suryectivas para probar el absurdo. Por inducción Si  $m = 1$ ,  $h$  no puede ser suryectiva. Supongamos que vale para  $1 \leq k \leq n-1$ . Si  $\exists h : \mathbb{I}_n \rightarrow \mathbb{I}_{n+1}$  suryectiva, entonces  $\exists k : f(n) = k$ . Definimos una permutación  $r$  de  $\mathbb{I}_{n+1}$  tal que  $r(k) = n+1$ . Por lo tanto,  $r \circ h : \mathbb{I}_n \rightarrow \mathbb{I}_{n+1}$  es suryectiva y  $(r \circ f)(n) = r(k) = n+1$ . Esto implica que la restricción

$$r \circ f|_{\mathbb{I}_{n-1}} : \mathbb{I}_{n-1} \rightarrow \mathbb{I}_n$$

es suryectiva. Esto es un absurdo, ya que por la hipótesis inductiva no existen funciones suryectivas de  $\mathbb{I}_{n-1} \rightarrow \mathbb{I}_n$ .

El caso  $\Leftarrow$  es trivial. □

**Definición 2.9.**  $X$  es finito si  $\exists n : X$  es coordinable con  $\mathbb{I}_n$  y escribimos  $\text{card}(X) = n$ . Decimos que  $X$  es infinito si no existe tal  $n$ .

*This page is intentionally left blank.*

# Clase III - 30/08

## 3.1 Conjuntos numerables

**Definición 3.1 (Conjunto numerable).** Un conjunto  $X$  es numerable si  $X \sim \mathbb{N}$ . Cada biyección se llama una enumeración de los elementos de  $X$ .

**Definición 3.2 (Conjunto a lo sumo numerable).** Decimos que un conjunto es a lo sumo numerable (contable) si es finito numerable.

**Ejemplo.** Los números pares,  $P = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$ .

**Demostración.**  $f(n) = 2n$ ,  $f : \mathbb{N} \rightarrow P$  es biyectiva  $\therefore$  es numerable.  $\square$

**Ejemplo.**  $\mathbb{Z}$  es numerable.

**Demostración.** Definimos  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$  como  $f(n) = \begin{cases} 2n & \text{si } n > 0, \\ -2n + 1 & \text{si } n \leq 0. \end{cases}$  y  $f^{-1}$  es una enumeración.  $\square$

**Teorema 3.3.** Sea  $X$  un conjunto y  $P(X) = \{A : A \subset X\} \Rightarrow \text{card}(X) \neq \text{card}(P)$

**Demostración.** Supongamos que  $\exists f : X \rightarrow P(X)$  biyectiva, en particular,  $f$  es suryectiva.

Dado  $x \in X$ , puede pasar que  $x \in f(X)$  o  $x \notin f(X)$ . Definimos  $B = \{x \in X : x \notin f(X)\} \subset X$ . Como  $f$  es suryectiva se tiene que  $\exists y \in Y : f(y) = B$ .

Si  $y \notin B = f(y) \Rightarrow y \notin f(y) \Rightarrow y \in B$ .

Si  $y \in B = f(y) \Rightarrow y \in f(y) \Rightarrow y \notin B$ .

Absurdo en ambos casos, luego  $\Rightarrow \nexists f$  biyectiva  $\therefore \text{card}(X) \neq \text{card}(P)$ .  $\square$

**Definición 3.4.** Decimos que  $\text{card}(X) \leq \text{card}(Y)$  si  $\exists f : X \rightarrow Y$  inyectiva.  
 $\text{card}(X) < \text{card}(Y)$  si  $\text{card}(X) < \text{card}(Y)$ , pero  $\neg(X \sim Y)$ .

**Proposición 3.5.** Es una relación de orden

- Demostración.**
- $\text{card}(X) \leq \text{card}(X)$  porque la identidad es inyectiva.
  - $\text{card}(X) \leq \text{card}(Y), \text{card}(Y) \leq \text{card}(Z) \Rightarrow \text{card}(X) \leq \text{card}(Z)$  pues la composición de funciones es inyectiva.
  - $\text{card}(X) = \text{card}(Y) \Rightarrow X \sim Y$ .

□

## 3.2 Cantor - Schröder - Bernstein

**Teorema 3.6 (Cantor - Schröder - Bernstein).** Si  $\exists f : X \rightarrow Y$  y  $g : Y \rightarrow X$  inyectivas  $\Rightarrow \exists h : X \rightarrow Y$  biyectiva.

**Demostración.** Vamos a probar que existen dos particiones distintas de  $X$  e  $Y$ . Sea  $X = X_1 \cup X_2$  y  $Y = Y_1 \cup Y_2 : f : X_1 \rightarrow Y_1$  y  $g : X_2 \rightarrow Y_2$  son biyectivas. Podemos definir a  $h : X \rightarrow Y$  como

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in X_1, \\ g^{-1}(x) & \text{si } x \in X_2. \end{cases} \quad (3.1)$$

Que es biyectiva. Definimos  $\phi(x) : P(X) \rightarrow P(X)$ ,  $\phi(A) = X - g(Y - f(A))$ . Veamos primero que  $\phi$  es creciente (i.e  $A \subseteq B \Rightarrow \phi(A) \subseteq \phi(B)$ ).

**Demostración.**  $A \subseteq B \iff f(A) \subseteq f(B) \iff y - f(B) \subseteq y - f(A) \iff g(y - f(B)) \subseteq g(y - f(A)) \iff X - \phi(A) \subseteq X - \phi(B)$  □

Sea  $\mathcal{C} = \{C \subset X : \phi(C) \subset C\} \neq \emptyset$  pues  $X \in \mathcal{C}$  y  $A = \bigcap_{C \in \mathcal{C}} C \neq \emptyset$ ,  $A \subset C, \forall C \in \mathcal{C}$  y  $\phi$  es creciente y tenemos que  $\phi(C) \subset C \Rightarrow \phi(A) \subset \phi(C) \subset C \Rightarrow \phi(C) \in \mathcal{C}$ . Además, usando otra vez que  $\phi$  es creciente,  $\phi(\phi(A)) \subset \phi(A) \Rightarrow \phi(A) \in \mathcal{C} \Rightarrow A \subset \phi(A) \Rightarrow A = \phi(A)$ . Sean  $X_1 = A$ ,  $X - X_1 = X_2 = g_2(Y_2)$

$Y_1 = f(A), Y_2 = Y - f(A) \Rightarrow$

$A = \phi(A) = X - g(Y - f(A)) \iff X - A = g(Y - f(A)) \iff X - X_1 = g(Y_2) = X_2 \therefore f : X_1 \rightarrow Y_1$  y  $g : X_2 \rightarrow Y_2$  son biyectivas. □

**Ejemplo.**  $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z} \sim \mathbb{Q}$ .

**Demostración.**  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = x$  es inyectiva.

Sea  $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}, f(\frac{a}{b}) = \text{sign}(a) \cdot 2^a \cdot 3^b$  es inyectiva por Teorema Fundamental de la Aritmética. Luego por el teorema anterior  $\mathbb{Z} \sim \mathbb{Q}$ .  $\square$

**Ejemplo.**  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$  es numerable.

**Demostración.**  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, f(n) = (1, n)$  es inyectiva.  $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f((n, m)) = 2^n \cdot 3^m$  es inyectiva por Teorema Fundamental de la Aritmética  $\therefore$  es numerable.  $\square$

### 3.3 Los Reales son no numerables

**Teorema 3.7.**  $\mathbb{R}$  no es numerable.

**Demostración.** Supongamos que es numerable  $\Rightarrow \exists f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  biyectiva. A cada número real  $x_n$  le asignamos un intervalo centrado en ese punto de longitud  $2^{-n}$ . La unión de todos esos intervalos tiene longitud menor o igual a la suma de las longitudes (se pueden superponer).

$$|\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_{x_n}| \leq \sum_{i=1}^n |I_{x_n}| = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} = 1 \quad (3.2)$$

Se cubrió un intervalo de longitud 1 de toda la recta real, por lo tanto quedan reales afuera y eso es un absurdo  $\therefore \mathbb{R}$  no es numerable.  $\square$

**Ejemplo.**  $A = \{(a_n)_{n \geq 1} : a_n \in \{0, 1\}\} = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ . Es decir las sucesiones de ceros y unos no es un conjunto numerable.

**Demostración.** Supongamos que si es numerable  $\Rightarrow$  podemos escribir

$A = \{(a_n^1)_{n \geq 1}, \dots, (a_n^j)_{n \geq 1}, \dots\}$ , todas las sucesiones de ceros y unos están contenidas en  $A$ . La sucesión donde  $a_i = 1 - a_n^i$  (en el  $i$ -ésimo lugar tiene lo contrario de lo que la  $n$ -ésima sucesión tiene en el lugar  $n$ ) debería ser una de ellas, pero eso es absurdo  $\therefore$  es no numerable.  $\square$

La idea del último ejemplo (argumento diagonal), se puede adaptar para probar que  $(0, 1]$  es no numerable.

#### 3.3.1. Principio de encaje de Intervalos



**Teorema 3.8.** Sea  $\mathbb{I}_1 \supset \mathbb{I}_2 \supset \mathbb{I}_3 \supset \cdots$  una sucesión de intervalos cerrados y acotados  $\mathbb{I}_n = [a_n, b_n] \Rightarrow$   
 La intersección de todos es no vacía.  
 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}_n = [a, b]$  con  $a = \sup(a_n)$ ,  $b = \inf(b_n)$ .

**Demostración.**  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists \mathbb{I}_{n+1} \subset \mathbb{I}_n \Rightarrow a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$

$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_1$ . El conjunto  $A$  de los  $a_i$  está acotado y  $B$  el conjunto de los  $b_i$  también.

Sea  $\alpha = \sup(A)$ ,  $\beta = \inf(B)$ . Como  $a_n \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \alpha \leq \beta \Rightarrow a_1 \leq \cdots \leq a_1 \leq \alpha \leq \beta \leq \cdots \leq b_1$ .

Luego  $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{I}_n \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{n \geq 1} \mathbb{I}_n$ .

Además ningún  $x \leq \alpha$  puede pertenecer a todos los  $\mathbb{I}_n$ . En efecto, si  $x < \alpha = \sup(A) \Rightarrow \exists a_1 \in A : x < a_1 \Rightarrow x \notin \mathbb{I}_n$ .

Análogamente con el ínfimo. □

**Teorema 3.9.**  $\mathbb{R}$  no es numerable.

**Demostración.** Supongamos que  $\exists f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : f(n) = x_n$ .

Definimos la sucesión de  $\mathbb{I}_n$  de la siguiente forma:

Tomamos  $[0, 1]$  y dividido en 3 cerrados iguales, luego, al menos uno no contiene a  $x_1$ , lo elijo como  $\mathbb{I}_1$  (si hay dos que no lo contienen elijo alguno). Inductivamente lo divido en 3 intervalos iguales y al menos 1 de ellos no contiene a  $x_{n+1}$  y lo elijo como  $\mathbb{I}_{n+1}$ . Por el principio anterior la  $\mathbb{I} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}_n \neq \emptyset$  (tiene un único elemento y la longitud de los intervalos tiende a cero).

Si  $x \in \mathbb{I}$  no puede ser igual o mayor que  $x_1$  (por construcción se los excluye en algún paso)  $\Rightarrow \mathbb{R}$  es no numerable, pues ese  $x$  queda afuera. □

## 3.4 Propiedades

**Teorema 3.10.** Sea  $X$  numerable,  $Y \subset X \Rightarrow Y$  es a lo sumo numerable.

**Demostración.** Supongamos que  $Y$  no es finito. Como  $X \sim \mathbb{N}$  puedo pensar  $X = (x_n)_{n \geq 1}$  y defino  $n_1 = \min\{n \in \mathbb{N} : x_n \in Y\}$  e inductivamente elegimos  $n_1, n_2, \dots, n_k, \dots$ . Definimos  $n_k = \min\{n \in \mathbb{N} : n > n_k, x_n \in Y\} \Rightarrow$  Tenemos la sucesión estrictamente creciente de naturales y podemos definir  $g : \mathbb{N} \rightarrow Y, g(k) = x_{n_k}$ .  $g$  es inyectiva si  $k \neq j, n_k \neq n_j$  por ser estrictamente creciente y es suryectiva, si  $y \in Y \Rightarrow y = x_j$ . Para ningún  $j \Rightarrow \exists k : n_k \leq j \leq n_{k+1}$ . Como  $j \leq n_{k+1} = \min\{n > n_k : x_n \in Y\}$  debe ser  $j = n_k$ . □

**Corolario 3.11.**  $f : X \rightarrow Y$  inyectiva e  $Y$  numerable  $\Rightarrow X$  es a lo sumo numerable.

**Demostración.**  $f$  es inyectiva  $\Rightarrow X \sim f(X)$  y como  $f(X) \subset Y \Rightarrow$  es a lo sumo numerable por el teorema anterior.  $\square$

**Teorema 3.12.**  $f : X \rightarrow Y$  suryectiva,  $X$  a lo sumo numerable  $\Rightarrow Y$  es a lo sumo numerable.

**Demostración.**  $f : X \rightarrow Y$  es suryectiva  $\exists g : Y \rightarrow X$  inversa a derecha tal que  $f \circ g = \text{id}_Y \Rightarrow f$  es inversa a izquierda de  $g \Rightarrow g$  es inyectiva  $\therefore$  por el corolario anterior  $Y$  es a lo sumo numerable.  $\square$

**Teorema 3.13.** Para cada  $m \in \mathbb{N}$ . Sea  $x_n$  un conjunto numerable  $\Rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} x_n = X$  es numerable.

**Demostración.**  $x_n$  es numerable  $\Rightarrow \exists f : \mathbb{N} \rightarrow x_n$  biyectiva. Sea  $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} x_n$  definida como  $f(n, m) = f_n(m)$ . Veamos que es suryectiva, dado  $x \in X$ ,  $\exists n \in \mathbb{N} : x \in x_n \Rightarrow \exists m : x = f_n(m)$  luego  $x = f_n(m) = f(n, m)$ . Como  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  es numerable y  $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{n \geq 1} x_n$  es suryectiva  $\Rightarrow \bigcup_{n \geq 1} x_n$  es a lo sumo numerable  $\therefore$  como es infinito, es numerable.  $\square$

**Ejemplo.**  $\mathbb{Q}(x) \sim \mathbb{N}$ .

**Demostración.**  $\mathbb{Q}_k[x] = \{p \in \mathbb{Q}(x) : \text{gr}(p) \leq k\}$  tenemos  $f_n : \mathbb{Q}^{n+1} \rightarrow \mathbb{Q}_n[x]$ ,  $f(a_0, \dots, a_{n+1}) = a_0 + \dots + a_n x^n$ , cada  $f_n$  es biyectiva  $\Rightarrow \mathbb{Q}^{n+1}$  es numerable y como la unión numerable de conjuntos numerables es numerable  $\therefore \mathbb{Q}(x)$  es numerable.  $\square$

**Definición 3.14.** Un número se dice algebraico si es raíz de algún polinomio con coeficientes enteros, por ejemplo  $\sqrt{2}$  es raíz de  $x^2 = 2$ .

**Definición 3.15.** Si un número real no es algebraico se lo llama trascendente.

Ejercicio: demostrar que el conjunto de números algebraicos es numerable.

*This page is intentionally left blank.*

# Clase IV - 03/09

## 4.1 Operaciones con cardinales

Dados dos cardinales  $n, m$  (no necesariamente finitos) y  $X, Y$  conjuntos disjuntos tales que  $\text{card}(X) = n$ ,  $\text{card}(Y) = m$ , podemos definir:

1. **Suma:**  $n + m = \text{card}(X \cup Y)$ .
2. **Producto:**  $n \cdot m = \text{card}(X \times Y)$ .
3. **Potencia:**  $n^m = \text{card}(\{f : Y \rightarrow X\}) = \text{card}(X^Y)$ .

**Nota.** Suponer que  $X \cap Y = \emptyset$  no es restrictivo porque  $X \sim (X \times \{1\})$  e  $Y \sim (Y \times \{2\})$ , y  $(X \times \{1\}) \sim (Y \times \{2\})$  y son disjuntos.

**Nota.** Hay que probar que la definición es independiente de los conjuntos  $X, Y$  que elegimos. Si  $n = \text{card}(\tilde{X})$  y  $m = \text{card}(\tilde{Y})$ ,  $\tilde{X} \cap \tilde{Y} = \emptyset \Rightarrow n + m = \text{card}(\tilde{X} \cup \tilde{Y})$ . Vale porque existen biyecciones entre  $\tilde{X}$  y  $X$  y entre  $\tilde{Y}$  y  $Y$ . Sea  $f : X \rightarrow \tilde{X}$ ,  $g : Y \rightarrow \tilde{Y}$  con lo cual  $h : X \cup Y \rightarrow \tilde{X} \cup \tilde{Y}$  dada por

$$h(z) = \begin{cases} f(z) & \text{si } z \in X, \\ g(z) & \text{si } z \in Y. \end{cases}$$

es biyectiva. Similar para el producto y la potencia.

Supongamos  $\text{card}(X) = n$ ,  $\text{card}(Y) = m$ ,  $\text{card}(Z) = p$ , no necesariamente finitos con  $X, Y, Z$  disjuntos dos a dos. La suma cumple las siguientes propiedades:

**Proposición 4.1.** 1. Conmutatividad:  $n + m = m + n$ , pues  $X \cup Y = Y \cup X$ .

2. Asociatividad:  $(n + m) + p = n + (m + p)$ .

3. Existencia del neutro:  $0 + n = n$ ,  $\emptyset \cup X = X$ .

El producto cumple las siguientes propiedades:

**Proposición 4.2.** 1. Conmutatividad:  $n \cdot m = m \cdot n$ , pues  $X \times Y \sim Y \times X$ .

2.  $0 \cdot n = 0$ , pues  $\emptyset \times X = \emptyset$ .

3.  $1 \cdot n = n$ , pues  $\{1\} \times X \sim X$ . Aquí,  $f : \{1\} \times X \rightarrow X$  saca el 1 y  $g : X \rightarrow \{1\} \times X$  agrega el 1. Ambas funciones son biyectivas.

**Proposición 4.3.** Distributiva del producto en la suma:  $n \cdot (m + p) = n \cdot m + n \cdot p$  porque  $X \times (Y \cup Z) \sim (X \times Y) \cup (X \times Z)$ .

**Nota.** No vale la ley de cancelación:  $n + m = n + p \not\Rightarrow m = p$ .  $n \cdot m = n \cdot p \not\Rightarrow m = p$ .

**Ejemplo.** Si  $n = \text{card}(\mathbb{N}) = \aleph_0$  y  $\text{card}(\mathbb{R}) = c$ , tenemos que:

1. a)  $n + n = \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ .

b)  $n \cdot n = \aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ .

2. a)  $c \cdot c = c$ .

b)  $c + c = c$ .

**Demostración.** 1. Vimos que

$$\text{card}(\{2n : n \in \mathbb{N}\}) = \aleph_0, \text{card}(\{2n + 1 : n \in \mathbb{N}\}) = \aleph_0 \quad (4.1)$$

La unión de ambos conjuntos es  $\mathbb{N}$ . Además  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \aleph_0$ , así  $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ .

2. Si pruebo que el cardinal de cualquier intervalo no degenerado (sin extremos iguales) de la recta es  $\mathfrak{c}$ , puedo probar que  $\mathfrak{c} + \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$  observando que  $(0, 1) = (0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1)$ .

En efecto,  $\arctan(x)$  es una biyección entre  $\mathbb{R}$  y el intervalo  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , y hay una biyección entre este intervalo y cualquier  $(a, b)$  dada por  $y = \frac{b-a}{\pi} \cdot (x + \frac{\pi}{2}) + a$ .

Además,  $(0, 1)$  y  $[0, 1]$  son coordinables. Si  $f : [0, 1] \rightarrow (0, 1)$  es inyectiva y por el Teorema de Cantor-Bernstein  $[0, 1] \sim (0, 1)$ .

Para probar  $\mathfrak{c} \cdot \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$ , uso que  $(0, 1] \times (0, 1] \sim (0, 1]$ .

Sea  $g : (0, 1] \rightarrow (0, 1] \times (0, 1]$ ,  $g(x) = (x, 1)$  es inyectiva.

$f : (0, 1] \times (0, 1] \rightarrow (0, 1]$ ,  $f(x, y) = 0.x_1y_1x_2y_2 \cdots$  (primeros decimales).

Si  $x, y \in (0, 1]$ , los pensamos con desarrollo decimal infinito. Como  $f$  es inyectiva, por el Teorema de Cantor-Bernstein, existe una biyección entre ellos, por lo que  $\mathfrak{c} \cdot \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$ .

□

Sean  $n = \text{card}(X)$ ,  $m = \text{card}(Y)$ ,  $p = \text{card}(Z)$ , no necesariamente finitos, con  $X, Y, Z$  disjuntos dos a dos.

**Proposición 4.4.**  $n^m \cdot n^p = n^{m+p}$

**Demostración.**  $X^Y \times X^Z \sim X^{Y \cup Z}$ .

$X^Y \times X^Z = \{(f, g) : f : Y \rightarrow X, g : Z \rightarrow X\}$ .

$f \in X^{Y \cup Z}, f : Y \cup Z \rightarrow X \Rightarrow (f|_Y, f|_Z) \in X^Y \times X^Z$  inyectiva.

Dadas  $f : Y \rightarrow X, g : Z \rightarrow X, h : Y \cup Z \rightarrow X$  tal que  $h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in Y, \\ g(x) & \text{si } x \in Z \end{cases}$

Como  $Y, Z$  son disjuntos por hipótesis  $h$  es inyectiva y vale por Teorema CSB.

□

**Proposición 4.5.**  $(n^m)^p = n^{mp}$

**Demostración.**  $f \in (X^Y)^Z, f : Z \rightarrow X^Y, Z \mapsto (f_Z : Y \rightarrow X)$ .

$(\forall z \in Z)(\exists f_Z : Y \rightarrow X)$ , si  $y \in Y$ ,  $f_Z(y)$  es  $g(z, y) = f_Z(y)$

□

**Teorema 4.6.** Sea  $n = \aleph_0$  o  $c$  y sea  $m$  otro cardinal tal que  $2 \leq m \leq 2^n \Rightarrow m^n = 2^n$ .  
 $(2^{\aleph_0}) = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0}$ .

**Demostración.** En general si  $m \leq p \Rightarrow m^m \leq p^n$  con  $\text{card}(X) = m$ ,  $\text{card}(Y) = m$ ,  
 $\text{card}(Z) = p$ ,  $X, Y, Z$  disjuntos dos a dos.

$f : Y \rightarrow Z$  es inyectiva  $\Rightarrow \forall g : X \rightarrow Y$  tenemos que  $f \circ g : X \rightarrow Z$  de manera inyectiva  
(si  $g_1 \neq g_2 \rightarrow f \circ g_1 \neq f \circ g_2$  porque  $f$  es inyectiva).  $\square$

**Nota.**  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \sim P(\mathbb{N})$  pues a cada  $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$  le asigno el subconjunto  $A \subset \mathbb{N}$  definido  
por  $n \in A \iff f(n) = 1$

**Teorema 4.7.**  $\mathbb{R} \sim \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  es decir  $2^{\aleph_0} = c$ .

**Demostración.**  $f : [0, 1] \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ ,  $f(x) = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . Siendo  $x_n$  las cifras del desarrollo  
en base dos de  $x$ .

Tenemos que  $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} \Rightarrow f$  es inyectiva xq el desarrollo es único.

Ahora si  $g : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, 1]$ ,  $g((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \geq 1} \frac{x_n}{3^n}$ ,  $x_n \in \{0, 1\}$ . No es inyectiva pues  
 $0, 11 = 0, 10\bar{1}$ . Una forma simple es pensar el desarrollo en base 3 de cada tira de 0 y  
1 que no tiene ningún dos. Es decir  $g((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \geq 1} \frac{x_n}{3^n}$  y  $(0, 11)_3 \neq (0, 10\bar{1})_3 \therefore$  es  
inyectiva y por Teorema CSB:  $\mathbb{R} \sim \{0, 1\}^{\aleph_0}$ .

Otra forma es la siguiente:  $S = \{0, 1\}^{\mathbb{N}} - \bigcup_{i=1}^{\infty} S_i$  con  $S_i = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}} : x_m =$   
 $0, \forall m > i\}$ . O sea  $0, 11000 \dots$  se saca y queda solo  $0, 10\bar{1}$ . Cada  $S_i$  es un conjunto finito  
(tiene  $2^i$  elementos) luego  $\bigcup_{i \geq 1} S_i$  es numerable  $\therefore S$  y  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  tienen el mismo cardinal.  
 $g((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \geq 1} \frac{x_n}{2^n}$  si es inyectiva y  $g : S \rightarrow [0, 1]$ .  $\square$

## 4.2 Hipótesis del continuo

$\nexists$  cardinal entre  $\aleph_0$  y  $c = 2^{\aleph_0}$ . No se puede demostrar ni refutar.

Es independiente de la teoría de conjuntos más el axioma de elección. Gödel 1940 probó que  
no se puede demostrar, Cohen en 1963 que no se puede refutar.

## 4.3 Construcción de los Reales

Sucesiones de números racionales  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ . Decimos que  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tiende a 0 si dado

$$\varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : |a_n| < \varepsilon, \forall n > n_0 \quad (4.2)$$

Notamos  $a_n \rightarrow 0$ .

**Definición 4.8.** Sea  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ . Decimos que la sucesión es de Cauchy  $\iff$  dado  $\varepsilon > 0, \exists n_0 : \forall n, m > n_0, |a_n - a_m| < \varepsilon$ .

**Teorema 4.9.**  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$  es convergente (es decir  $a_n - q \rightarrow 0, q \in \mathbb{Q}$ )  $\Rightarrow$  es de Cauchy.

**Demostración.** Dado  $\varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : |a_n - q| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n > n_0$ .

$$|a_n - a_m| = |(a_n - q) + (q - a_m)| \leq |a_n - q| + |q - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\forall n, m > n_0$ . □

**Teorema 4.10.** Toda sucesión de Cauchy es acotada.

**Demostración.** Como  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$  es de Cauchy, eligiendo  $\varepsilon = 1$

$\exists n_0 \in \mathbb{N} : |a_n - a_m| < 1, \forall n, m > n_0$ .

En particular  $|a_n - a_{n_0+1}| < 1$

$a_{n_0+1} - 1 < a_n < 1 + a_{n_0+1}, \forall n > n_0 \Rightarrow |a_n| < \max(|a_{n_0+1} + 1|, |a_{n_0+1} - 1|), \forall n > n_0$ .

Tomo  $M = \max(|a_0|, \dots, |a_{n_0}|, |a_{n_0+1} + 1|, |a_{n_0+1} - 1|)$  y vale  $\forall n \in \mathbb{N}$ . □

**Definición 4.11.** Sea  $\mathcal{C}_{\mathbb{Q}}$  el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy de números racionales. Dados  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}_{\mathbb{Q}}$ . Decimos que son equivalentes  $\iff a_n - b_n \rightarrow 0$ .

**Proposición 4.12.** La relación anterior es de equivalencia.

i) Reflexidad:  $a_n - a_n = 0 \rightarrow 0$ .

ii) Simetría:  $a_n - b_n \rightarrow 0 \Rightarrow b_n - a_n = -(a_n - b_n) \rightarrow 0$ .

iii) Transitividad:  $\varepsilon > 0, \exists n_0 : |a_n - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n > n_0$  y  $\exists n_1 : |b_n - c_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n > n_1$ .

Tomando  $n > \max(n_0, n_1), |a_n - c_n| \leq |a_n - b_n| + |b_n - c_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ .

**Definición 4.13.** Los números reales  $\mathbb{R}$  son las clases de equivalencia  $[(a_n)]$  de las sucesiones  $\mathcal{C}_{\mathbb{Q}}$  por la relación anterior.



*This page is intentionally left blank.*

# Clase V - 06/09

## 5.1 Construcción de los Reales

**Nota.** Dado  $q \in \mathbb{Q}$  definimos  $\tilde{q}$  como la clase de equivalencia de la sucesión constante como  $(q, q, q, \dots) \Rightarrow \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ .

**Definición 5.1.**  $\tilde{s}, \tilde{t} \in \mathbb{R}$ ,  $s = [(a_n)], t = [(b_n)]$  definimos  $s + t = [(a_n + b_n)]$  la clase de equivalencia de  $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

$s \cdot t = [(a_n b_n)]$  la clase de equivalencia de  $(a_n b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

Veamos que están bien definidas, si  $[(a_n)] = [(c_n)]$  y  $[(b_n)] = [(d_n)]$ .

$a_n - c_n \rightarrow 0$  y  $b_n - d_n \rightarrow 0$ .

$([a_n] + [b_n]) - ([c_n] + [d_n]) = ([a_n] - [c_n]) + ([b_n] - [d_n]) = 0 \Rightarrow$  la suma está bien definida.

$a_n b_n - c_n d_n = a_n b_n - c_n b_n + c_n b_n - c_n d_n = b_n(a_n - c_n) + c_n(b_n - d_n) \Rightarrow |a_n \cdot b_n - c_n \cdot b_n| \leq |b_n| |a_n - c_n| + |c_n| |b_n - d_n|$ .

Como  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$  están acotadas  $\exists M : |b_n| < M, |c_n| < M, \forall n \in \mathbb{N}$ .

$|a_n b_n - c_n b_n| \leq M(|a_n - c_n| + |b_n - d_n|) < \varepsilon, \forall n > n_0$ .

Porque  $a_n - c_n \rightarrow 0, b_n - d_n \rightarrow 0$ .

**Proposición 5.2.**  $\mathbb{R}$  es un cuerpo con esta definición.

**Demostración.** Ejercicio. □

**Teorema 5.3.** Dado  $s \in \mathbb{R} - \{0\}, \exists t \in \mathbb{R} : s \cdot t = 1$ .

**Demostración.**  $S = [(a_n)]$  sabemos que  $S \notin \tilde{0}$ , o sea  $a_n \not\rightarrow 0$ . Podría pasar que algunos de los terminos de  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  si sean 0, lo que pasa es que  $a_n \neq 0$ . para  $n$  lo suficiente grande.

Como  $a_n \not\rightarrow 0$ ,  $\exists \varepsilon_1 > 0$ ,  $\exists$  infinitos valores de  $M : |a_M - 0| > \varepsilon_1$ , si  $\varepsilon = \frac{\varepsilon_1}{2}$ , como  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de cauchy,  $\exists n : |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n, m > n_0$ .

Si  $M > n_0$  (puedo porque son infinitos) :  $|a_M| > \varepsilon_1 \Rightarrow |a_m - a_M| < \frac{\varepsilon_1}{2}, \forall m > n_0$ .

$-\varepsilon_1/2 < a_n - a_m < \varepsilon_1/2$  o  $-\varepsilon_1/2 < a_m - a_n < \varepsilon_1/2$ .

Si  $a_M > 0 \Rightarrow \frac{\varepsilon_1}{2} < a_M - \frac{\varepsilon_1}{2} < a_n < a_M + \frac{\varepsilon_1}{2}, \forall n > n_0$ .

Si  $a_M < 0$ ,  $\frac{\varepsilon_1}{2} < -a_M - \frac{\varepsilon_1}{2} < -a_n < -a_M + \frac{\varepsilon_1}{2} \Rightarrow a_n < -\frac{\varepsilon_1}{2}, \forall n > n_0$ .

O sea que  $\forall n > n_0$ ,  $a_n$  tiene el mismo signo que  $a_M$  en particular  $a_n \neq 0, \forall n > n_0$ .

Sabiendo esto veamos que  $\exists$  el inverso:

$S = [(a_n)] \neq 0$  por lo anterior  $\exists n_0 : a_n \neq 0, \forall n > n_0$ .

Sea  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$  como

$$b_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n < n_0, \\ \frac{1}{a_n} & \text{si } n > n_0. \end{cases} \Rightarrow$$

$$a_n b_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n < n_0, \\ 1 & \text{si } n > n_0, \end{cases} \Rightarrow$$

$(1, 1, \dots) - (a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0 \therefore [(a_n b_n)] = [(1, 1, \dots)]$ , es decir  $t = [(b_n)]$  cumple que  $t \cdot s = 1$ .  $\square$

## 5.2 Cuerpo ordenado

Para probar que  $\mathbb{R}$  es un cuerpo ordenado bajo esta definición hay que definir qué es ser positivo.

Sea  $s \in \mathbb{R}$  decimos que  $s$  es positivo si  $s \neq 0$  y  $s = [(a_n)]$  tal que  $a_n > 0 \forall n > n_0$ . O sea, todos los terminos son positivos a partir de un punto.

**Definición 5.4.** Decimos que  $s > t$  si  $s - t > 0$ . Ejercicio probar que está bien definido.

Veamos un ejemplo de como se prueban los axiomas de orden.

**Teorema 5.5.** Sean  $s, t \in \mathbb{R} : s > t, r \in \mathbb{R} \Rightarrow s + r > t + r$ .

**Demostración.**  $s = [(a_n)], t = [(b_n)], r = [(c_n)]$ .

Como  $s > t$ ,  $\exists n_0 : a_n - b_n > 0, \forall n > n_0, a_n - b_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow (a_n + c_n) - (b_n + c_n) = a_n - b_n > 0$  y  $(a_n + c_n) - (b_n + c_n) \not\rightarrow 0 \Rightarrow$

$s + r - (t + r) > 0 \Rightarrow s + r > t + r$ .  $\square$

**Teorema 5.6.**  $\mathbb{R}$  con esta construcción es Arquimediano.

**Demostración.** Sean  $s, t > 0, s, t \in \mathbb{R}$  quiero ver que  $\exists m \in \mathbb{N} : m \cdot s > t$ .

Es decir si  $s = [(a_n)], t = [(b_n)]$  quiero ver que  $[(m \cdot a_n)] > [(b_n)]$ . O sea que  $m \cdot a_n - b_n \not\rightarrow 0$  y que  $\exists n_0 : m \cdot a_n - b_n > 0, \forall n > n_0$ .

Supongamos que  $\forall m, n_0, \exists n > n_0 : m \cdot a_n \leq b_n$ . Como  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy  $\Rightarrow \exists M \in \mathbb{Q} : b_n < M, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$$a_n \leq \frac{b_n}{m} \leq \frac{M}{m}, \text{ para algún } n > n_0, \forall n_0.$$

Como  $\mathbb{Q}$  es arquimediano, dado  $\varepsilon > 0, \exists m : \frac{M}{m} < \frac{\varepsilon}{2}$ , elijo  $m$  así y tengo que

$$a_n \leq \frac{b_n}{m} < \frac{M}{m} < \frac{\varepsilon}{2}, n > n_0, \forall n_0.$$

Como  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy  $\exists n_0 : \forall n, k > n_0, |a_n - a_k| < \varepsilon/2$ . Para este  $n_0, \exists$  algún  $n > n_0$  tal que  $a_n < \varepsilon/2 \Rightarrow$

$\forall k > n_0, a_k - a_n < \varepsilon/2 \Rightarrow a_k < a_n + \varepsilon/2 < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 < \varepsilon \Rightarrow a_n \rightarrow 0$ . Absurdo!  
 $[(a_n)] = S > 0$ .

Luego  $\exists m \in \mathbb{N} : m \cdot a_n - b_n > 0, \forall n > n_0$ . Queda ver que  $m \cdot a_n - b_n \not\rightarrow 0$ , si  $m \cdot a_n - b_n \rightarrow 0$  nada que probar. Caso contrario tomamos  $m+1$  en vez de  $m$ .

$(m+1) \cdot a_n - b_n = m \cdot a_n + a_n - b_n > a_n > 0, \forall n > n_0 \Rightarrow m \cdot a_n - b_n \rightarrow 0$  y  $a_n \not\rightarrow 0 \therefore \mathbb{R}$  es arquimediano.  $\square$

**Teorema 5.7.**  $\mathbb{Q}$  es denso en  $\mathbb{R}$ . Es decir dado  $r \in \mathbb{R}$  y  $\varepsilon > 0, \exists q \in \mathbb{Q} : |r - q| < \varepsilon$ .  
 $r = [(a_n)],$  con  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$  es de Cauchy.

**Demostración.** Dado  $\varepsilon > 0, \exists n_0 : |a_n - a_m| < \varepsilon, \forall n, m > n_0$ .

Elijo algún  $l > n_0$  y defino  $q = [(a_l, a_l, \dots)] \Rightarrow r - q = [(a_n - a_l)]$  y  $q - r = [(a_l - a_n)]$ .

Como  $l > n_0 \Rightarrow (\forall n > n_0)(a_n - a_l < \varepsilon)(a_l - a_n < \varepsilon) \Rightarrow |r - q| < \varepsilon$ .  $\square$

### 5.3 $\mathbb{R}$ tiene la propiedad del supremo

Sea  $S \subset \mathbb{R}, S \neq \emptyset, M$  cota superior de  $S$ . Vamos a construir dos sucesiones  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (l_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . Como  $S \neq \emptyset, \exists s_0 \in S$ . Defino  $u_0 = M, l_0 = s_0$ .

Si ya están definidos  $u_m, l_m$ , llamo  $m_n = \frac{l_n + u_n}{2}$  al punto medio.

i) Si  $m_n$  es cota superior de  $S$  definimos  $u_{n+1} = m_n, l_{n+1} = l_n$ .

ii) Si  $m_n$  no es cota superior de  $S$  definimos  $u_{n+1} = u_n$  y  $l_{n+1} = m_n$ .

Como  $s_0 < M$  es fácil ver que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es decreciente y que  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es creciente. Queda como ejercicio demostrarlo.

**Lema 5.8.**  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  son sucesiones de Cauchy de números reales.

**Demostración.** Por construcción se tiene que  $l_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow (l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es creciente y acotada  $\Rightarrow$  Es de Cauchy.

Como  $u_n > s_0, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow -u_n \leq s_0, (-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es creciente  $\Rightarrow$  Es de Cauchy.

\*

**Demostración.** Supongamos que  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  no es de Cauchy. Entonces existe  $\varepsilon > 0$ :

$\forall n_0, \exists n, m \geq n_0 : l_n - l_m \geq \varepsilon$ .

Como  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es creciente,  $l_n - l_{n_0} \geq \varepsilon$ , inductivamente consigo:

$n_1 > n_0 : l_{n_1} - l_{n_0} \geq \varepsilon$

$n_2 > n_1 : l_{n_2} - l_{n_1} \geq \varepsilon$

$\vdots$

Por otro lado por la arquimedianidad  $\exists k \in \mathbb{N} : k \cdot \varepsilon > M - l_{n_0} \Rightarrow$

$l_{n_k} - l_{n_0} = (l_{n_k} - l_{n_{k-1}}) + (l_{n_{k-1}} - l_{n_{k-2}}) + \dots + (l_{n_1} - l_{n_0}) > k \cdot \varepsilon > M - l_{n_0} \Rightarrow l_{n_k} > M$ . Absurdo! □

□

**Lema 5.9.**  $\exists u \in \mathbb{R} : u_n \rightarrow u$ .

**Demostración.** Sea  $u_n$  un término de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \Rightarrow \exists q_n \in \mathbb{Q} : |u_n - q_n| < \frac{1}{n}$

Consideremos  $(q_1, q_2, \dots) \subset \mathbb{Q}$ .

Afirmo que  $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy. Dado  $\varepsilon > 0$ , como  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy  $\Rightarrow$

$\exists n_0 : \forall n, m > n_0, |u_n - u_m| < \frac{\varepsilon}{3}$ .

Por arquimedianidad  $\exists n_1 : \frac{1}{m}, \forall n > n_1 \Rightarrow$  si  $n > \max(n_0, n_1) \Rightarrow$

$|q_n - q_m| \leq |q_n - u_n| + |u_n - u_m| + |u_m - q_m| < \varepsilon \Rightarrow$

$u = [(q_n)] \in \mathbb{R}$ , falta ver que  $u_n \rightarrow u$ .

Si  $\tilde{q}_n = [(q_n, q_n, \dots)] \in \mathbb{R} \Rightarrow \tilde{q}_n - u \rightarrow 0$  pues  $q_n$  es de Cauchy y por construcción

$u_n - q_n < \frac{1}{n} \Rightarrow u_n - \tilde{q}_n \rightarrow 0$  y como  $\tilde{q}_n - u \rightarrow 0 \Rightarrow$

$u_n \rightarrow u$ . □

**Lema 5.10.**  $l_n \rightarrow u$

**Demostración.** Según las posibles definiciones de  $l_n$  tenemos que:

$$u_{n+1} - l_{n+1} = m_n - l_n = \frac{u_n + l_n}{2} - l_n = \frac{u_n - l_n}{2} \text{ o}$$

$$u_{n+1} - l_{n+1} = u_{n+1} - m_n = u_n - \frac{u_n - l_n}{2} = \frac{u_n - l_n}{2} \Rightarrow$$

$$u_1 - l_1 = \frac{1}{2}(M - s)$$

$$u_2 - l_2 = \frac{1}{2}(u_1 - l_1) = \left(\frac{1}{2}\right)^2(u - s)$$

$$\vdots$$

$$u_n - l_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n(M - s)$$

Por arquimedianidad de  $\mathbb{R}$ ,  $\forall \epsilon > 0$ ,  $\frac{1}{2^n}(M - s) < \epsilon$ ,  $\forall n > n_0 \Rightarrow$

$u_n - l_n \rightarrow 0 \therefore l_n \rightarrow u$ , pues  $u_n \rightarrow u$ . □

**Teorema 5.11.**  $\mathbb{R}$  tiene la propiedad del supremo.

**Demostración.** 1) Veamos que  $u$  es cota superior, si no  $u < s$ ,  $s \in S \Rightarrow \epsilon = s - u > 0$ , como  $u_n \rightarrow u$  y es decreciente  $\exists n : u_n - u < \epsilon \Rightarrow u_n < u + \epsilon = u + s - u = s$  Absurdo, por construcción  $u_n$  era cota superior de  $S$ ,  $\forall n$ .

2) Veamos que es la menor de las cotas superiores.

Sabemos que  $l_n$  no es cota superior de  $S$ , así que  $(\forall n \in \mathbb{N})(\exists s_n \in S) : l_n \leq s_n$ . Como  $l_n \rightarrow u$  y  $l_n$  es creciente  $\Rightarrow$

$\forall \epsilon > 0$ ,  $\exists n_0 : l_n > u - \epsilon$ ,  $\forall n > n_0 \Rightarrow s_n \geq l_n > u - \epsilon$ ,  $\forall n > n_0$ . Es decir que para todo  $\epsilon > 0$  tengo un  $s_n$  más grande en  $S$   $\therefore u$  es la menor de las cotas superiores. □

*This page is intentionally left blank.*

# Clase VI - 10/09

## 6.1 Sucesiones

Una sucesión de números reales es una función  $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ . Notamos  $x(n) = x_n$  y lo llamamos el  $n$ -ésimo término de la sucesión. Indicamos la sucesión como  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  o  $(x_1, x_2, \dots)$ .

Una subsucesión de  $x$  es la restricción de  $x$  a un subconjunto infinito  $A = \{n_1 < n_2 < \dots\} \subset \mathbb{N}$ . Escribimos  $(x_n)_{n \in A}$  para indicar la subsucesión.

**Nota.** Estrictamente la subsucesión no tiene dominio  $\mathbb{N}$ , pero es trivial considerarla como una función definida en  $\mathbb{N}$  componiendo con  $1 \mapsto x_1, 2 \mapsto x_2, \dots$ . Por esto se usa la notación  $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$ .

**Definición 6.1.** Decimos que  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N}) : |x_n - a| < \varepsilon, \forall n > n_0$ .

Equivalentemente, si  $\forall \varepsilon > 0$  el intervalo  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  contiene a todos los términos de la sucesión salvo quizás un número finitos.

**Teorema 6.2 (Unicidad del límite).** Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b \Rightarrow a = b$

**Demostración.** Supongamos que  $a \neq b$ . Tomemos  $\varepsilon = \frac{|b - a|}{2} > 0$ .

$(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (b - \varepsilon, b + \varepsilon) = \emptyset$ . En efecto si  $x$  pertenece a la intersección entonces  $|x - a| < \varepsilon$  y  $|x - b| < \varepsilon \Rightarrow$

$|b - a| \leq |a - x| + |x - b| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = |b - a|$  Absurdo! Como  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow \exists n_0 : x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon), \forall n > n_0 \Rightarrow$

$x_n \notin (b - \varepsilon, b + \varepsilon), \forall n > n_0 \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq b$  pues vimos que son disjuntos.  $\square$

**Teorema 6.3.** Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow$  toda subsucesión de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge a  $a$ .

**Demostración.** Dado  $(x_{n_1}, x_{n_2}, \dots)$  una subsucesión de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . Por hipótesis dado  $\varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : |x_n - a| < \varepsilon, \forall n > n_0$ . Como los índices de la subsucesión son infinitos,  $\exists n_{i_0} > n_0 \Rightarrow$  si  $n_i > n_{i_0} \Rightarrow |x_{n_i} - a| < \varepsilon, (n_i > n_{i_0} > n_0) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_i} = a. \square$



**Teorema 6.4.** Toda sucesión convergente es acotada.

**Demostración.** Sea  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ . Tomando  $\varepsilon = 1$ ,  $\exists n_\varepsilon : x_n \in (a-1, a+1), \forall n > n_\varepsilon$ .  
 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_{n_\varepsilon}, a-1, a+1\}$ ,  $c = \min(A)$ ,  $d = \max(A) \Rightarrow x_n \in [c, d], \forall n \in \mathbb{N} \therefore$   
 la sucesión es acotada.  $\square$

**Teorema 6.5.** Toda sucesión monótona y acotada es convergente.

**Demostración.** Supongamos que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es creciente y acotada y quiero ver que  
 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \sup\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ .  
 Dado  $\varepsilon > 0$ , como  $a - \varepsilon < a$ ,  $a - \varepsilon$  no puede ser cota superior de  $\{x_n\} \Rightarrow \exists n_0 : x_{n_0} > a - \varepsilon$ . Como  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es monótona, si  $n > n_0 \Rightarrow x_n > x_{n_0} > a - \varepsilon \Rightarrow$   
 $a - \varepsilon < x_n \leq a < a + \varepsilon, \forall n > n_0 \therefore x_n \rightarrow a$ .  
 Análogamente para  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es decreciente y acotada.  $\square$

**Corolario 6.6.** Si una sucesión monótona tiene una subsucesión convergente  $\Rightarrow$  es convergente.

**Demostración.**  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es acotada porque tiene una subsucesión acotada.  $\square$

**Ejemplo.**  $x_n = a^n, a \in \mathbb{R}$ . Si  $a = 0$  o  $a = 1$  la sucesión es constante.

Si  $a = -1$ , la sucesión diverge porque  $x_{2n} \rightarrow 1$  y  $x_{2n+1} \rightarrow -1$ .

Si  $a > 1$ , la sucesión es creciente y no acotada  $\Rightarrow$  diverge.

Si  $a < -1$ , la sucesión es decreciente y no acotada  $\Rightarrow$  diverge.

Si  $0 < a < 1$ , la sucesión es convergente por ser subsucesión de  $\frac{1}{n}$  y más aún  $a^n \rightarrow 0$ .

Si  $-1 < a < 0$ , la sucesión converge pues  $|a^n| = |a|^n = a^n \rightarrow 0$ .

## 6.2 Propiedades de límites

**Teorema 6.7.** Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  e  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión acotada  $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot y_n = 0$ .

**Demostración.**  $\exists c : |y_n| < c, \forall n \in \mathbb{N}$ , pues  $y_n$  es acotado.  
 Dado  $\varepsilon > 0$ , como  $x_n \rightarrow 0, \exists n_0 : |x_n| < \varepsilon/c, \forall n > n_0 \Rightarrow$   
 $|x_n y_n| < c(\varepsilon/c) = \varepsilon, \forall n > n_0 \therefore x_n \cdot y_n \rightarrow 0.$

□

Sea  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ .

**Proposición 6.8.**  $x_n + y_n \rightarrow a + b$ .

**Demostración.** Dado  $\varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n > n_0$  y  
 $\exists n_1 \in \mathbb{N} : |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n > n_1$ . Sea  $n_2 = \max(n_0, n_1)$   
 Si  $n > n_2, |(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$

□

**Proposición 6.9.**  $x_n - y_n \rightarrow a - b$ .

**Demostración.** Análogo.

□

**Proposición 6.10.**  $x_n \cdot y_n \rightarrow a \cdot b$ .

**Demostración.**  $x_n \cdot y_n - ab = x_n \cdot y_n - x_n \cdot b + x_n \cdot b - a \cdot b = x_n \cdot (y_n - b) + b \cdot (x_n - a).$   
 Como  $y_n - b \rightarrow 0$  y  $x_n$  es acotada, pues es convergente  $\Rightarrow x_n \cdot (y_n - b) \rightarrow 0$ . Además  
 $x_n - a \rightarrow 0 \Rightarrow b(x_n - a) \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \cdot y_n = a \cdot b.$

□

**Proposición 6.11.**  $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{a}{b}.$

**Demostración.** Si  $y_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow y_n \neq 0$  salvo quizá finitos términos.

En efecto, como  $b \neq 0$ , si  $\varepsilon = |b|$  resulta que  $0 \notin (b - \varepsilon, b + \varepsilon) \Rightarrow$

$\exists n_\varepsilon : y_n \in (b - \varepsilon, b + \varepsilon), \forall n > n_\varepsilon$ , luego  $y_n \neq 0, \forall n > n_\varepsilon$ .

Ahora escribo  $\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{x_n \cdot b - a \cdot y_n}{y_n \cdot b}$  quiero ver que  $\frac{1}{y_n \cdot b}$  es acotada.

Como  $y_n \cdot b \rightarrow b^2$  si  $\varepsilon = \frac{b^2}{2}$ ,  $\exists n_0 : y_n \cdot b > \frac{b^2}{2}, \forall n > n_0 \Rightarrow$

$0 < \frac{1}{y_n \cdot b} < \frac{2}{b^2}, \forall n > n_0 \Rightarrow (\frac{1}{y_n \cdot b})_{n \in \mathbb{N}}$  es acotada. □

### 6.3 Ejemplo subsucesiones

**Ejemplo.**  $x_n = \sqrt[n]{a}$ ,  $a > 0$ .

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es monótona (decreciente si  $a > 1$ , creciente si  $0 < a < 1$ ) y acotada  $0 < l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a}$ .

Para ver que  $l = 1$ , considero la subsucesión  $(a^{\frac{1}{n(n+1)}})_{n \in \mathbb{N}}$  convergente a  $l$ .

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}}}{\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n+1}}} = \frac{l}{l} = 1.$$

$\therefore l = 1$ .

**Ejemplo.**  $x_n = \sqrt[n]{n}$ .

Veamos si es monótona.  $\sqrt[n]{n} > \sqrt[n+1]{n+1} \iff n^{n+1} > (n+1)^{n+1} \iff n > (\frac{n+1}{n})^{n+1}$ .

Esto pasa para  $\forall n \geq 3$  porque  $(1 + \frac{1}{n})^n < 3, \forall n \in \mathbb{N}$ . Se puede demostrar por inducción. Luego, es decreciente a partir del tercer término.

Además está acotada inferiormente por 0, ( $\sqrt[n]{n} > 0$ )  $\therefore \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = l = \inf\{\sqrt[n]{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ .

Como  $\sqrt[n]{n} > 1 \Rightarrow l \geq 1$  y  $l \neq 0$ .

Considero la subsucesión  $(2n)^{\frac{1}{2n}} \Rightarrow l^2 = (\lim_{n \rightarrow \infty} (2n)^{\frac{1}{2n}})^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1 \cdot l$ .

Luego  $l^2 = l$  y  $l \neq 0 \therefore l = 1$ .

**Nota.** La definición de límite puede ser reformulada de la siguiente forma:

Dado  $a \in \mathbb{R}$  es el límite de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \iff \forall \varepsilon > 0$  el conjunto  $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)\}$  tiene complemento finito (o vacío) en  $\mathbb{N}$ .

Vamos a ver que  $a \in \mathbb{R}$  es el límite de alguna subsucesión de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \iff \forall \varepsilon > 0$  el conjunto  $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)\}$  es subconjunto infinito de  $\mathbb{N}$

**Teorema 6.12.**  $a \in \mathbb{R}$  es el límite de alguna subsucesión de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists$  infinitos índices  $n : x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ .

**Demostración.** Para la ida tenemos que  $a = \lim_{n \in A} x_n$ , con  $A = \{n_1 < n_2 < \dots\}$ .

$\forall \varepsilon > 0, \exists i_0 : x_{n_i} \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon), \forall i > i_0$ .

Como existen infinitos  $i > i_0 : n_i \in A \Rightarrow \exists$  infinitos  $n_i \in \mathbb{N}$  tales que  $x_{n_i} \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ .

Recíprocamente si tomamos sucesivamente  $\varepsilon = 1, 1/2, 1/3, \dots$ . Puedo obtener  $A = \{n_1, n_2, \dots\} : \lim_{n \in A} x_n = a$  pues:

Sea  $n_1 \in \mathbb{N} : x_{n_1} \in (a - 1, a + 1)$ . Supongamos por inducción que  $n_1 < n_2 < \dots < n_i$  fueron definidos tales que  $x_{n_2} \in (a - 1/2, a + 1/2), \dots, x_{n_i} \in (a - 1/i, a + 1/i)$ .

Como el conjunto  $\{n \in \mathbb{N} : x_n \in (a - \frac{1}{1+i}, a + \frac{1}{1+i})\}$  es infinito, contiene algún  $x_n$  con  $n > n_i$  y lo tomo como  $x_{n_{i+1}}$ .

Como  $|x_{n_i} - a| < \frac{1}{i}, \forall i \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} x_{n_i} = a$ . □

## 6.4 Punto de acumulación

**Definición 6.13.**  $a \in \mathbb{R}$  se llama punto de acumulación de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  si es límite de alguna subsucesión de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Definición 6.14.** Sea  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión acotada, digamos  $\alpha \leq x_n \leq \beta, \forall n \in \mathbb{N}$ . Si llamamos  $X_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$  tenemos que  $[\alpha, \beta] \supset X_1 \supset X_2 \supset \dots$ .

Así que llamando  $a_n = \inf(X_n)$ ,  $b_n = \sup(X_n)$  tenemos que

$\alpha \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq \dots \leq b_n \leq \dots \leq b_2 \leq b_1 \leq \beta \Rightarrow$

$\exists a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \sup(\inf(X_n)_{n \in \mathbb{N}})$ .

$b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf(b_n)_{n \in \mathbb{N}} = \inf(\sup(X_n)_{n \in \mathbb{N}})$ .

$a$  se llama el límite inferior de la sucesión  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

$a = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

$b$  se llama el límite superior de la sucesión  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

$b = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

**Ejemplo.**  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (-1, 2, -1/2, 3/2, -1/3, 4/3, \dots)$ .

$(x_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}} = -\frac{1}{n}$  y  $(x_{2n})_{n \in \mathbb{N}} = 1 + \frac{1}{n}$ .

Luego  $\inf(X_{2n-2}) = \inf(X_{2n-1}) = -\frac{1}{n}$

$\sup(X_{2n-2}) = \sup(X_{2n-1}) = 1 + \frac{1}{n} \Rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  y  $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ .

*This page is intentionally left blank.*

# Clase VII - 13/09

## 7.1 Límite superior e inferior

**Teorema 7.1.**  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  acotada  $\Rightarrow \liminf x_n$  es el menor punto de acumulación de la sucesión y  $\limsup x_n$  es el mayor.

**Demostración.** Veamos que  $a = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$  es punto de acumulación de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . Como  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  (los ínfimos de  $X_n$ ). Dados  $\varepsilon$  y  $n_0 \in \mathbb{N}$ ,  $\exists n_1 > n_0 : a - \varepsilon < a_{n_1} < a + \varepsilon$ ,  $a_{n_1} = \inf(X_{n_1}) \Rightarrow a + \varepsilon$  no puede ser cota inferior de  $X_{n_1}$ .  $\Rightarrow \exists n \geq n_1 : a_{n_1} \leq x_n \leq a + \varepsilon$ , ( $n \geq n_1 \geq n_0$  y  $(a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon)$ ), luego  $a$  es punto de acumulación de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

Falta ver que si  $c < a \Rightarrow c$  no es punto de acumulación.

Como  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  y  $c < a \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} : c < a_{n_0} \leq a$ . Como  $a_{n_0}$  es el ínfimo de  $X_{n_0}$  si  $n \geq n_0 \Rightarrow c < a_{n_0} \leq x_n$ . Tomando  $\varepsilon = a_{n_0} - c \Rightarrow c + \varepsilon = a_{n_0}$  y entonces  $\forall x_n : n \geq n_0, x_n \notin (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \therefore c$  no es punto de acumulación.  $\square$

**Teorema 7.2.** Toda sucesión acotada de  $\mathbb{R}$  tiene una subsucesión convergente.

**Demostración.**  $\limsup x_n$  es punto de acumulación de  $x_n$  así que alguna subsucesión converge a él.  $\square$

**Corolario 7.3.** Una sucesión acotada de  $\mathbb{R}$  es convergente  $\iff \limsup x_n = \liminf x_n$ , es decir, posee un único punto de acumulación.

**Demostración.** Para la ida tenemos que si  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge, toda subsucesión converge a lo mismo y en particular  $\limsup x_n = \liminf x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

Para la vuelta, si  $\limsup x_n = \liminf x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \Rightarrow$

Dado  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists n_0 \in \mathbb{N} : a - \varepsilon \leq a_{n_0} \leq a \leq b_{n_0} \leq a + \varepsilon$ .

Como  $n \geq n_0 \Rightarrow a_{n_0} \leq x_n \leq b_{n_0}$ .  $\square$

## 7.2 Sucesiones de Cauchy

Dada una sucesión  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ , decimos que es de Cauchy si dado  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists n_0 \in \mathbb{N} : |x_n - x_m| < \varepsilon, \forall n, m > n_0$ . Al igual que hicimos con las sucesiones de Cauchy en  $\mathbb{Q}$ .

1. Toda sucesión convergente es de Cauchy
2. Toda sucesión de Cauchy es acotada

**Lema 7.4.** Si una sucesión de Cauchy tiene una subsucesión que converge a  $a \in \mathbb{R} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ .

**Demostración.** Dado  $\varepsilon > 0 : \exists n_0 : |x_n - x_m| < \varepsilon/2, \forall n, m > n_0$ .

Como  $a$  es el límite de una subsucesión  $\exists n_1 > n_0 : |x_{n_1} - a| < \varepsilon/2$ .

$\Rightarrow$  si  $n > n_0, |x_n - a| \leq |x_n - x_{n_1}| + |x_{n_1} - a| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$ . □

**Teorema 7.5.** Toda sucesión de Cauchy en  $\mathbb{R}$  es convergente.

**Demostración.** Por ser de Cauchy es acotada, por ser acotada alguna subsucesión converge al  $\limsup$  o  $\liminf$  y por el lema anterior, toda la sucesión converge. □

## 7.3 Límites infinitos

**Definición 7.6.** Decimos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$  si dado  $a > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : x_n > a \forall n > n_0$ .

**Definición 7.7.** Decimos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$  si dado  $a > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : x_n < -a \forall n > n_0$ .

**Proposición 7.8.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$  e  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es acotada inferiormente  $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = +\infty$ .

**Demostración.** Sea  $A > 0, \exists c \in \mathbb{R} : c < y_n, \forall n \in \mathbb{N}$ . Como  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \exists n_0 \in \mathbb{N} : x_n > A - c, \forall n > n_0 \Rightarrow$  Si  $n > n_0, x_n + y_n > A - c + c = A \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = +\infty$ . □

**Proposición 7.9.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$  y  $\exists c > 0 : y_n > c, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = +\infty$ .

**Demostración.** Dado  $A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : x_n > A/c, \forall n > n_0 \Rightarrow$  si  $n > n_0, x_n \cdot y_n > (A/c) \cdot c = A \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot y_n = +\infty$ .  $\square$

**Proposición 7.10.**  $x_n > 0 \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = +\infty$ .

**Demostración.** Para la ida,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ . Dado  $A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : 0 < x_n < 1/A, \forall n > n_0 \Rightarrow \frac{1}{x_n} > A, \forall n > n_0 \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = +\infty$ .  
Para la vuelta  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = +\infty$ . Dado  $\varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : \frac{1}{x_n} > \frac{1}{\varepsilon}, \forall n > n_0 \Rightarrow 0 < x_n < \varepsilon, \forall n > n_0 \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .  $\square$

**Proposición 7.11.** Sean  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}$  e  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sucesiones de números positivos  $\Rightarrow$

a) Si  $\exists c > 0 : x_n > c, \forall n \in \mathbb{N}$  y si  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$ .

b)  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es acotada y  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$ .

**Demostración.** a) Dado  $A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : 0 < y_n < c/A, \forall n > n_0 \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} > (A/c) \cdot c = A, \forall n > n_0 \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$ .  
b) Dado  $\varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : y_n > k/\varepsilon, \forall n > n_0$ , donde  $k > 0$  es cota superior de  $x_n \Rightarrow \forall n > n_0, 0 < \frac{x_n}{y_n} < k \cdot (\varepsilon/k) = \varepsilon \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$ .  $\square$

## 7.4 Series numéricas

Dada una sucesión  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  formamos una nueva sucesión  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . Dada por  $S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2, \dots, S_n = a_1 + \dots + a_n$ ; que llamamos sumas parciales de la serie  $\sum_{n \geq 1} a_n$ .

**Teorema 7.12.**  $\sum_{n \geq 1} a_n$  converge  $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

**Demostración.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} \Rightarrow 0 = s - s = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - S_{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ .  $\square$

**Ejemplo.** El recíproco del teorema anterior es falsa pues  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  diverge.



**Demostración.**

$$S_{2^n} = 1 + 1/2 + (1/3 + 1/4) + (1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{n-1} + 1} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) \quad (7.1)$$

$$> 1 + 1/2 + 2/4 + 4/8 + \cdots + \frac{2^{n-1}}{2^n} = 1 + n/2 \quad (7.2)$$

Luego  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2^n} = +\infty$ .  $\square$

**Teorema 7.13.**  $a_n \geq 0, \forall n > 0 \Rightarrow$

$\sum_{n \geq 1} a_n$  converge  $\iff S_n$  forman una sucesión acotada.

**Demostración.** Por ser  $a_n \geq 0$ ,  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es monótona creciente, luego converge  $\iff$  es acotada.  $\square$

**Corolario 7.14 (Criterio de comparación).** Sean  $a_n, b_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ , dadas  $\sum_{n \geq 1} a_n, \sum_{n \geq 1} b_n \Rightarrow$  Si

$$\exists c > 0, n_0 \in \mathbb{N} : a_n \leq c \cdot b_n, \forall n > n_0 \Rightarrow \quad (7.3)$$

1. Si  $\sum b_n$  converge entonces  $\sum a_n$  converge.
2. Si  $\sum a_n$  diverge entonces  $\sum b_n$  diverge.

**Nota.**  $\sum a_n$  converge  $\iff$  Dado  $n_0 \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{n \geq n_0} a_n$  converge.

**Demostración.** Sea  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la primera serie,  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la segunda,  $t_n = s_{n+n_0} - s_{n_0}$ .  $\square$

**Teorema 7.15 (Criterio de Cauchy).**  $\sum a_n$  converge  $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : |a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon, \forall n > n_0, p \in \mathbb{N}$ .

**Demostración.**  $|s_{n+p} - s_n| = |a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon, \forall n > n_0 \in \mathbb{N} \Rightarrow (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy y por lo tanto convergente.  $\square$

**Definición 7.16.**  $\sum a_n$  es absolutamente convergente si  $\sum |a_n|$  converge.  
Si  $\sum a_n$  converge y  $\sum |a_n|$  diverge entonces decimos que es condicionalmente convergente.

**Teorema 7.17.** Toda serie absolutamente convergente es convergente.

**Demostración.** Como  $\sum |a_n|$  converge  $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : |a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| < \varepsilon, \forall n > n_0, p \in \mathbb{N} \Rightarrow$   
 $|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| < \varepsilon, \forall n > n_0, p \in \mathbb{N} \therefore \sum a_n$  converge.  $\square$

*This page is intentionally left blank.*

# Clase VIII - 24/09

## 8.1 Ejemplo de convergencia condicional

**Ejemplo.**  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  converge, pero no lo hace absolutamente.

**Demostración.** i) Las sumas parciales pares son:

- $S_2 = 1 - 1/2$
- $S_4 = (1 - 1/2) + (1/3 - 1/4)$
- $S_6 = (1 - 1/2) + (1/3 - 1/4) + (1/5 - 1/6)$

En general  $S_2 < S_4 < S_6 < \dots < S_{2n} < \dots < 1$ , es creciente y acotada, luego converge.

ii) Las sumas parciales impares son:

- $S_1 = 1$
- $S_3 = 1 - (1/2 - 1/3)$
- $S_5 = 1 - (1/2 - 1/3) - (1/4 - 1/5)$

En general  $S_1 > S_3 > \dots > S_{2n+1} > \dots > 0$ . Es decreciente y acotada, luego converge.

Por i) e ii)  $\exists \tilde{s} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$  y  $\exists s' = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1}$ , como  $S_{2n+1} - S_{2n} = \frac{1}{2n+1} \rightarrow 0 \Rightarrow \tilde{s} = s' \therefore$  la serie converge.  $\square$

## 8.2 Corolarios de series

**Corolario 8.1.** Sea  $\sum b_n$  una serie convergente de términos positivos si  $\exists k > 0$  y  $n_0 \in \mathbb{N}$  tales que  $|a_n| \leq k \cdot b_n, \forall n > n_0 \Rightarrow \sum a_n$  converge absolutamente.

**Demostración.** Sencilla aplicación del criterio de comparación.  $\square$

**Corolario 8.2.**  $\forall n > n_0, |a_n| \leq k \cdot c^n$  con  $0 < c < 1, k > 0 \Rightarrow \sum a_n$  es absolutamente convergente.

**Demostración.** Como  $c \in (0, 1)$ ,  $\sum c^n$  converge (serie geométrica).  $\square$

**Nota.** Tomando  $k = 1, |a_n| \leq c^n \iff \sqrt[n]{|a_n|} \leq c < 1, \forall n > n_0 \in \mathbb{N}$ . Que esto valga para algún  $n_0$  específico significa que  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ .

## 8.3 Criterios de convergencia

### 8.3.1. Criterio de la raíz

**Corolario 8.3.** Si  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow \sum a_n$  converge absolutamente.

**Nota.** Si existen infinitos índices tales que  $\sqrt[n]{|a_n|} > 1 \Rightarrow \sum a_n$  diverge pues  $a_n \not\rightarrow 0$ . Si  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$  el criterio no concluye ( $\sum \frac{1}{n}, \sum \frac{1}{n^2}$ ).

### 8.3.2. Criterio del cociente y D'Alembert

**Teorema 8.4 (Criterio del cociente).** Sean  $\sum_{n \geq 1} a_n$  una serie tal que  $a_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$  y  $\sum_{n \geq 1} b_n$  una serie de términos positivos y convergente  $\Rightarrow$

Si  $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq \frac{|b_{n+1}|}{|b_n|}, \forall n > n_0 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$  es absolutamente convergente.

**Demostración.**

$$\frac{|a_{n_0+2}|}{|a_{n_0+1}|} \leq \frac{|b_{n_0+2}|}{|b_{n_0+1}|}, \dots, \frac{|a_n|}{|a_{n-1}|} \leq \frac{|b_n|}{|b_{n-1}|}, \forall n > n_0 \quad (8.1)$$

Multiplicando todas las desigualdades obtenemos

$$\frac{|a_n|}{|a_{n_0+1}|} \leq \frac{|b_n|}{|b_{n_0+1}|} \iff |a_n| \leq \frac{|a_{n_0+1}| \cdot |b_n|}{|b_{n_0+1}|} \quad (8.2)$$

$\therefore$  por criterio de comparación  $\sum_{n \geq 1} a_n$  converge.  $\square$

**Corolario 8.5 (Criterio de D'Alembert).** Si  $\exists c \in (0, 1) : \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq c, \forall n > n_0 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$  converge absolutamente.

Equivalentemente si  $\limsup \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n$  converge absolutamente.

**Demostración.** Tomamos  $b_n = c^n$  en el teorema anterior pues  $\sum_{n \geq 1} c^n$  converge si  $c \in (0, 1)$ .  $\square$

**Nota.** Si el cociente es 1 el criterio no decide.  
Si el cociente es mayor que 1 la serie diverge.

**Teorema 8.6.**  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  acotada  $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (8.3)$$

En particular si  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$  y son iguales.

**Demostración.** Veamos que  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ .

Supongamos que no lo es  $\Rightarrow$

$$\exists c : \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < c < \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \quad (8.4)$$

Por la primer desigualdad  $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, \frac{a_{n+1}}{a_n} < c \Rightarrow$

$$\frac{a_{n_0+1}}{a_{n_0}} < c, \frac{a_{n_0+2}}{a_{n_0+1}} < c, \dots, \frac{a_n}{a_{n+1}} < c \Rightarrow \quad (8.5)$$

Multiplicando termino a termino

$$\frac{a_n}{a_{n_0}} < c^{n-n_0} \Rightarrow a_n < \frac{a_{n_0}}{c^{n_0}} \cdot c^n \quad (8.6)$$

Llamemos  $k = a_{n_0}/c^{n_0} \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k \cdot c^n} = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k} = c \quad (8.7)$$

Tendríamos que

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k \cdot c^n} = c \quad (8.8)$$

Absurdo! Luego debe ser  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ .

□

**Ejemplo.** Puede existir el límite de la raíz y no del cociente.

**Demostración.** Sean  $0 < a < b$  y la sucesión  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  que se obtiene alternando cada término por  $a$  ó  $b$

$$x_1 = a, x_2 = a \cdot b, x_3 = a^2 \cdot b, x_4 = a^2 \cdot b^2 \quad (8.9)$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \begin{cases} b & \text{si } n \text{ es par,} \\ a & \text{si no} \end{cases}$$

Luego  $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ , pero  $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = b$ ,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ .

Por otro lado  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt{a \cdot b}$ . Si  $x_{2k} = a^k \cdot b^k \Rightarrow \sqrt[2k]{a^k \cdot b^k} = \sqrt{a \cdot b}$ .

Si  $x_{2k-1} = a^k \cdot b^{k-1} \Rightarrow \sqrt[2k-1]{x_{2k-1}} = a^{\frac{k}{2k-1}} \cdot b^{\frac{k-1}{2k-1}} \rightarrow \sqrt{a \cdot b}$  si  $k \rightarrow \infty$ .

□

### 8.3.3. Criterio de Dirichlet - Abel

**Teorema 8.7.** Sea  $\sum_{n \geq 1} a_n$  no necesariamente convergente cuyas sumas parciales forman una sucesión acotada.

Sea  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión decreciente de números positivos con  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n \cdot b_n$  es convergente.

**Demostración.**

$$a_1 \cdot b_1 + \cdots + a_n \cdot b_n = \quad (8.10)$$

$$a_1 \cdot (b_1 - b_2) + (a_1 + a_2) \cdot (b_2 - b_3) + \cdots + (a_1 + \cdots + a_{n-1}) \cdot (b_{n-1} - b_n) + (a_1 + \cdots + a_n) \cdot b_n \quad (8.11)$$

$$= S_1 \cdot (b_1 - b_2) + S_2 \cdot (b_2 - b_3) + S_3 \cdot (b_3 - b_2) + \cdots + S_{n-1} \cdot (b_{n-1} - b_n) + S_n \cdot b_n \quad (8.12)$$

$$= \sum_{i=2}^n S_{i-1} \cdot (b_{i-1} - b_i) + S_n \cdot b_n \quad (8.13)$$

Por hipótesis  $\exists k > 0 : |S_n| \leq k, \forall n \in \mathbb{N}$  (son acotadas). Además  $\sum_{n \geq 2} b_{n-1} \cdot b_n$  es una telescópica de números positivos.

Luego  $\sum_{n \geq 2} S_{n-1} \cdot (b_{n-1} - b_n)$  es absolutamente converge y en particular convergente.

Como  $S_n \cdot b_n \rightarrow 0 \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \geq 2}^n S_{i-1} \cdot (b_{i-1} - b_i) + S_n \cdot b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \geq 1}^n a_n \cdot b_n \therefore$  converge.  $\square$

**Corolario 8.8 (Abel).** Si  $\sum a_n$  es convergente y  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es decreciente de términos positivos  $\Rightarrow \sum a_n \cdot b_n$  es convergente.

**Demostración.**  $b_n \rightarrow c$  pues es acotada inferiormente por 0 y decreciente.

Sea  $(b_n - c)_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión decreciente que tiende a cero, podemos aplicar el teorema anterior y, luego  $\sum_{n \geq 1} a_n \cdot (b_n - c) = S \Rightarrow \sum_{n \geq 1} a_n \cdot b_n = S - \sum a_n \cdot c$ .  $\square$

**Corolario 8.9 (Criterio de Leibniz).** Si  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es decreciente y  $b_n \rightarrow 0 \Rightarrow \sum (-1)^n b_n$  converge.

**Demostración.** Aplicamos el criterio de Dirichlet pues  $\sum (-1)^n$  no converge y  $S_n = 0, -1$  son acotadas.  $\square$

## 8.4 Parte positiva y negativa

**Definición 8.10.** Sea  $\sum_{n \geq 1} a_n$ , para cada  $n \in \mathbb{N}$  definimos  $p_n = \begin{cases} a_n & \text{si } a_n > 0, \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$



$$q_n = \begin{cases} 0 & \text{si } a_n \geq 0, \\ -a_n & \text{c.c} \end{cases} \Rightarrow p_n, q_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, a_n = p_n - q_n \text{ y } |a_n| = p_n + q_n = a_n + 2 \cdot q_n = 2 \cdot p_n - a_n.$$

**Nota.** Si  $\sum_{n \geq 1} a_n$  converge absolutamente  $\Rightarrow \forall k \in \mathbb{N}$  vale que

$$\sum_{n \geq 1} |a_n| \geq \sum_{n=1}^k |a_n| = \sum_{n=1}^k p_n + \sum_{n=1}^k q_n \Rightarrow \quad (8.14)$$

$$\sum_{n \geq 1} p_n, \sum_{n \geq 1} q_n \quad (8.15)$$

convergen, pues son crecientes y están acotadas por  $\sum_{n \geq 1} |a_n|$ . Además si  $\sum_{n \geq 1} p_n$  y  $\sum_{n \geq 1} q_n$  convergen  $\Rightarrow \sum a_n$  converge absolutamente.

**Teorema 8.11.** Si  $\sum a_n$  converge condicionalmente  $\Rightarrow \sum_{n \geq 1} p_n$  y  $\sum_{n \geq 1} q_n$  son divergentes.

**Demostración.** Supongamos que

$$\sum q_n = c \Rightarrow |a_n| = a_n + 2 \cdot q_n \quad (8.16)$$

$$\sum_{n=1}^k |a_n| = \sum_{n=1}^k a_n + 2 \cdot \sum_{n=1}^k q_n \quad (8.17)$$

Si  $k \rightarrow +\infty$  luego  $\sum_{n \geq 1} |a_n| = \sum_{n \geq 1} a_n + 2 \cdot c$  Absurdo! pues no converge absolutamente  $\therefore \sum_{n \geq 1} q_n$  diverge.  $\square$

## 8.5 Reordenamientos

**Definición 8.12.** Sea  $\sum a_n$ , cambiar el orden de la suma significa tomar una biyección  $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  y considerar la serie  $\sum b_n$  como  $b_n = a_{\phi(n)}$ .

**Teorema 8.13.** Todas las reordenaciones de una serie absolutamente convergente convergen al mismo valor de la serie original.

**Demostración.** Sea  $\sum a_n, a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ . Sea  $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  una biyección y  $b_n = a_{\phi(n)}$  quiero ver que  $\sum b_n = \sum a_n$ .

Sea  $S_n$  las sumas parciales de  $a_n$  y  $T_n$  las de  $b_n$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$  llamo  $m = \max(\phi(1), \dots, \phi(n))$ . Donde  $\{\phi(1), \dots, \phi(n)\} \subseteq [1, m]$ .

Luego  $T_n = \sum_{i \geq 1} a_{\phi(i)} \leq \sum_{j \geq 1} a_j = S_m$ . Luego  $T_n \leq S_m$ .

Análogamente con  $\phi^{-1} \Rightarrow S_m \leq T_n$  luego  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n \therefore \sum_{n \geq 1} a_n = \sum_{n \geq 1} b_n$ .  $\square$

El caso general,  $\sum_{n \geq 1} a_n = \sum_{n \geq 1} p_n - \sum_{n \geq 1} q_n \Rightarrow$  todo reordenamiento  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de los términos de  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  produce un reordenamiento de  $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$  que llamo  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . De modo que son la parte positiva y negativa de  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y usamos el caso anterior pues son términos de valores positivos.

*This page is intentionally left blank.*

# Clase IX - 27/09

## 9.1 (Continuación) Reordenamientos

**Teorema 9.1.** Si  $\sum_{n \geq 1} a_n$  converge condicionalmente. Dado  $c \in \mathbb{R}, \exists$  reordenamiento  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de los términos de  $\sum_{n \geq 1} a_n$  tal que  $\sum_{n \geq 1} b_n = c$ .

**Demostración.** Como  $a_n$  converge condicionalmente entonces  $a_n \rightarrow 0 \Rightarrow p_n, q_n \rightarrow 0$ , pero  $\sum_{n \geq 1} p_n = \sum_{n \geq 1} q_n = +\infty$ .

Reordenemos la serie tomando  $p_1, p_2, \dots, p_{n_1}$  donde  $n_1$  es el menor índice tal que  $p_1 + \dots + p_{n_1} > c, (T_1)$ .

Similarmente  $-q_1, -q_2, \dots, -q_{n_2}$  donde  $n_2$  es el menor índice tales que  $\sum_{i=1}^{n_1} p_i + \sum_{i=1}^{n_2} q_i < c, (T_2)$ .

Seguimos con el menor  $n_3$  tal que  $\sum_{i=1}^{n_1} p_i + \sum_{i=1}^{n_2} q_i + \sum_{i=1}^{n_3} p_i > c, (T_3)$ , etc.

Veamos que las sumas parciales  $T_n$  de este reordenamiento tienden a 0.

$\forall i$  impar tenemos que  $T_{n_{i+1}} < c < T_i \Rightarrow$

$0 < T_{n_i} - c \leq p_{n_i} \Rightarrow 0 < c - T_{n_i} < q_{n_i}$  y como  $\lim_{i \rightarrow \infty} p_{n_i} = 0 = \lim_{i \rightarrow \infty} q_{n_i} \Rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} T_{n_i} = c$ .

Además para  $i$  impar si  $n_i < n < n_{i+1} \Rightarrow T_{n_{i+1}} \leq T_n \leq T_{n_i}$  y para  $i$  par, si  $n_i < n < n_{i+1} \Rightarrow T_{n_{i+1}} \leq T_n \leq T_{n_i}$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = c$ . □

## 9.2 Topología Euclídea

**Definición 9.2.** La norma euclídea es la función  $\|\cdot\|$  que en cada punto  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  toma el valor  $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ .

Propiedades:

1.  $\forall x \in \mathbb{R}^n, \|x\| > 0$  y  $\|x\| = 0 \iff x = 0$ .
2.  $\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ .
3.  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

**Proposición 9.3 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz).** Si  $x = (x_1, \dots, x_n)$  e  $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n \Rightarrow \left| \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \right| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

**Demostración.** Ejercicio

□

**Definición 9.4.** La distancia euclídea es la función  $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : d(x, y) = \|x - y\|$ . Tenemos que  $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$ .

1.  $d(x, y) > 0$  y  $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2.  $d(x, y) = d(y, x)$
3.  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

**Demostración.** 1.  $d(x, y) = \|x - y\| > 0, d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0 \iff x = y$ .

2.  $d(x, y) = \|x - y\| = \|(-1)\| \cdot \|y - x\| = \|y - x\| = d(y, x)$ .

3.  $d(x, z) = \|x - z\| = \|x - z + y - y\| \leq \|x - y\| + \|z - y\| = d(x, y) + d(y, z)$ .

□

### 9.2.1. Conjuntos abiertos

**Definición 9.5.** Si  $x \in \mathbb{R}^n$  y  $r > 0$ , la bola abierta centrada en  $x$  de radio  $r$  es el conjunto  $B_r(x) = B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) < r\}$ .

**Definición 9.6.** Un subconjunto  $U \subset \mathbb{R}^n$  es abierto si  $\forall x \in U, \exists r > 0 : B_r(x) \subset U$ .

**Lema 9.7.** La bola abierta  $B_r(x)$  es un conjunto abierto.

**Demostración.** Sea  $s = r - d(x, y), y \in B_r(x)$ . Si  $z \in B_s(y) \Rightarrow d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + s = r$   
Luego  $z \in B_r(x) \Rightarrow B_s(y) \subset B_r(x) \therefore$  es abierto.

□

**Proposición 9.8.** Un subconjunto propio  $U \subset \mathbb{R}^n$  es abierto  $\iff \forall x \in U$  se tiene que  $\inf\{d(x, y) : y \in \mathbb{R}^n - U\} > 0$ .

El ínfimo existe pues el conjunto es no vacío y acotado superiormente.

**Demostración.** Para la ida tenemos que si  $U$  es abierto entonces  $\exists r > 0 : B_r(x) \subset U$ . Si  $y \in \mathbb{R}^n - U \Rightarrow y \notin B_r(x)$  por lo que  $d(x, y) > r > 0$  y  $r$  es una cota inferior mínima positiva del conjunto, pues si  $d(x, y) < r \Rightarrow y \in B_r(x)$  absurdo!

Para la vuelta tomemos  $s = \inf\{d(x, y) : y \in \mathbb{R}^n - U\} > 0$ . Consideremos  $B_{\frac{s}{2}}(x)$ . Si  $z$  pertenece a esa bola entonces  $d(x, z) < \frac{s}{2} < s \Rightarrow d(x, z) \notin \{d(x, y) : y \in \mathbb{R}^n - U\}$  pues si no sería el ínfimo, se sigue que  $z \in U$  y entonces  $B_{\frac{s}{2}}(x) \subset U \therefore U$  es abierto.  $\square$

**Proposición 9.9.** Propiedades de conjuntos abiertos:

1.  $\emptyset, \mathbb{R}^n$  son abiertos.
2. Intersección de una familia finita y no vacía de  $\mathbb{R}^n$  de subconjuntos abiertos es un conjunto abierto.
3. La unión de una familia cualquiera de subconjuntos abiertos de  $\mathbb{R}^n$  es abierto.

**Demostración.** 1. Por definición

2.  $U = \bigcap_{i=1}^k U_i, U_i \subset \mathbb{R}^n$ , abierto. Tomando  $B_r(x)$  con  $r = \min(r_1, \dots, r_k)$  y listo.
3. Si  $\mathcal{u}$  es una familia de abiertos de  $\mathbb{R}^n$  y  $U$  su unión, dado  $x \in U$  tiene que haber algún  $V \in \mathcal{u}$  tal que  $x \in V$ . Por ser  $V$  abierto  $\exists r > 0 : B_r(x) \subset V \subset U \therefore U$  es abierto.  $\square$

Notemos que la hipótesis de que la familia sea finita en la intersección es necesaria pues si definimos  $U_n = (1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{n \geq 1} U_n = \{1\}$  que no es abierto.

**Definición 9.10.** La topología Euclídea es el conjunto de todos los abiertos de  $\mathbb{R}^n$ .

**Corolario 9.11.** Un subconjunto de  $\mathbb{R}^n$  es abierto  $\iff$  es la unión de una familia de bolas abiertas.

**Demostración.** Para la ida: Sea  $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$  un conjunto abierto y sea  $\mathcal{u}$  la familia de bolas abiertas de  $\mathbb{R}^n$  contenidas en  $\mathcal{U}$ . Si llamamos  $\tilde{\mathcal{U}}$  a la unión de todas basta ver que  $\tilde{\mathcal{U}} = \mathcal{U}$ .

$\subset$ ) Inmediato.

$\supset$ ) Dado  $x \in \mathcal{U}$ ,  $\exists r > 0 : B_r(x) \subset \mathcal{U}$  por ser  $\mathcal{U}$  abierto y  $B_r(x) \in \mathcal{u} \Rightarrow B_r(x) \subset \tilde{\mathcal{U}} \Rightarrow \mathcal{U} \subset \tilde{\mathcal{U}}$  pues vale  $\forall x \in \mathcal{U}$ .

La vuelta es la proposición anterior.  $\square$

### 9.2.2. Interior de un conjunto

**Definición 9.12 (Interior).**  $X \subset \mathbb{R}^n$  decimos que  $x \in \mathbb{R}^n$  es interior a  $X$  si  $\exists r > 0 : B_r(x) \subset X$ . El interior del conjunto  $X$ , que notamos  $X^\circ$ , es el conjunto de puntos interiores de  $X$ .

**Nota.** Si  $X^\circ \subset X$ ,  $X$  es abierto  $\iff X^\circ = X$ .

**Proposición 9.13.** Sea  $X \subset \mathbb{R}^n$ .  $X^\circ$  es abierto y coincide con la unión de todos los subconjuntos abiertos de  $X$ . En particular  $X^\circ$  es el mayor abierto contenido en  $X$ .

**Demostración.** Sea  $\mathcal{U}$  la unión de todos los subconjuntos abiertos de  $X$ , veamos que  $\mathcal{U} = X^\circ$ .

i) Si  $x \in X^\circ$ ,  $\exists r > 0 : B_r(x) \subset \mathcal{U}$ , como  $B_r(x)$  es abierto  $B_r(x) \subset \mathcal{U}$  por lo que  $X^\circ \subset \mathcal{U}$ .

ii) Si  $x \in \mathcal{U} \Rightarrow \exists V \subset X$  abierto tal que  $x \in V$ , como  $V$  es abierto  $\exists r > 0 : B_r(x) \subset V \subset X \Rightarrow X^\circ$  por definición de punto interior, luego  $\mathcal{U} \subset X^\circ$ .

$\therefore X^\circ = \mathcal{U}$ .  $\square$

**Corolario 9.14.** Si  $X \subset Y \Rightarrow X^\circ \subset Y^\circ$ .

**Demostración.**  $X^\circ \subset X \subset Y$ . Como  $Y$  es el mayor abierto contenido en  $Y$  se sigue que  $X^\circ \subset Y^\circ \subset Y$ .  $\square$

Propiedades del interior

**Proposición 9.15.**  $(X \cap Y)^\circ = X^\circ \cap Y^\circ$ .

**Demostración.**  $(X \cap Y)^\circ \subset X \cap Y \Rightarrow X^\circ \cap Y^\circ$  es abierto  $\Rightarrow (X^\circ \cap Y^\circ) \subset (X \cap Y)^\circ$ .  
 $X \cap Y \subset X \Rightarrow (X \cap Y)^\circ \subset X^\circ$  y  $X \cap Y \subset Y \Rightarrow (X \cap Y)^\circ \subset Y^\circ \Rightarrow$   
 $(X \cap Y)^\circ \subset X^\circ \cap Y^\circ$ . □

**Proposición 9.16.**  $X^\circ \cup Y^\circ \subset (X \cup Y)^\circ$ .

**Demostración.**  $X^\circ \subset X \subset X \cup Y$  y  $Y^\circ \subset Y \subset X \cup Y \Rightarrow$   
 $X^\circ \cup Y^\circ \subset (X \cup Y)^\circ \Rightarrow X^\circ \cup Y^\circ \subset (X \cup Y)^\circ$ , pues  $X^\circ \cup Y^\circ$  es abierto. □

Notemos que la inclusión puede ser estricta pues sea  $X = (-1, 1)$ ,  $Y = [1, 2] \Rightarrow$   
 $1 \notin X^\circ \cup Y^\circ = (-1, 1) \cup (1, 2)$ , pero  $1 \in (X \cup Y)^\circ = (-1, 2)$ .

## 9.3 Entorno

**Definición 9.17 (Entorno).** Sea  $x \in \mathbb{R}^n$  un entorno de  $x$  es un subconjunto  $N \subset \mathbb{R}^n : x \in N^\circ$ .

**Proposición 9.18.** Un subconjunto de  $\mathbb{R}^n$  es abierto  $\iff$  es un entorno de cada uno de sus puntos.

**Demostración.** Si  $U$  es entorno de cada uno de sus puntos entonces  $U \subset U^\circ \Rightarrow U = U^\circ \therefore$  es abierto. □

**Proposición 9.19.** El interior de un subconjunto  $X \subset \mathbb{R}^n$  es el conjunto de puntos de los que  $X$  es entorno.

**Demostración.** Sea  $U$  el conjunto de puntos de  $X$  de los que  $X$  es un entorno. Si  $x \in U \Rightarrow X$  es el entorno de  $x$  y  $x \in X^\circ \Rightarrow U \subset X^\circ$ . Si  $x \in X^\circ \Rightarrow X$  es un entorno de  $x \Rightarrow x \in U \Rightarrow X^\circ \subset U$ . □

## 9.4 Conjunto Cerrado

**Definición 9.20 (Conjunto cerrado).** Un subconjunto  $F \subset \mathbb{R}^n$  se dice cerrado si su comple-



mento es abierto ( $\mathbb{R}^n - F$  es abierto).

**Proposición 9.21.** Propiedades de los conjuntos cerrados:

1.  $\emptyset, \mathbb{R}^n$  son cerrados.
2. La unión finita de conjuntos cerrados es cerrado.
3. La intersección de una familia arbitraria de cerrados es cerrada.

**Demostración.** 1.  $(\mathbb{R}^n)^c = \emptyset$  y  $\emptyset^c = \mathbb{R}^n$  abiertos.

2. Si  $F_1, \dots, F_k \subset \mathbb{R}^n$  son cerrados  $\Rightarrow (F_1 \cup \dots \cup F_k)^c = F_1^c \cap \dots \cap F_k^c$  y cada  $F_i$  es abierto.

3. Si  $F$  es una familia de cerrados  $(\bigcap_{f \in F} f)^c = (\bigcup_{f \in F} f^c)$  que es abierto.

□

**Definición 9.22.** Si  $x \in \mathbb{R}^n, r > 0$  llamamos bola cerrada centrada en  $x$  de radio  $r$  al conjunto  $\overline{B_r x} = \overline{B(r, x)} = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) \leq r\}$ .

**Proposición 9.23.** Veamos que la bola cerrada es, efectivamente, cerrada.

**Demostración.** Si  $y \in \mathbb{R}^n - \overline{B_r(x)}$  tenemos que  $d(x, y) > r$ . Llamamos  $0 < r_1 = d(x, y) - r$  y queremos que  $B_{r_1}(y) \subset \mathbb{R}^n - \overline{B_r(x)}$ .

Sea  $z \in B_{r_1}(y)$  por desigualdad triangular:

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

$$d(x, z) \geq d(x, y) - d(z, y) > d(x, y) - r_1 = r \Rightarrow z \notin \overline{B_r(x)} \therefore B_{r_1}(y) \subset \mathbb{R}^n - \overline{B_r(x)}. \quad \square$$

### 9.4.1. Clausura

**Definición 9.24 (Clausura).** La clausura de un subconjunto  $X \subset \mathbb{R}^n$  es la intersección  $\overline{X}$  de todos los subconjuntos cerrados de  $\mathbb{R}^n$  que contienen a  $X$ .

**Proposición 9.25.** Sea  $X \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow \overline{X}$  es el menor subconjunto cerrado de  $\mathbb{R}^n$  que contiene a  $X$  en el sentido de que es contenido en todo subconjunto cerrado de  $\mathbb{R}^n$  que contiene a

$X$ .

**Corolario 9.26.** Un subconjunto  $X \subset \mathbb{R}^n$  es cerrado  $\iff \bar{X} = X$ .

**Demostración.** Si  $X$  es cerrado, contiene a  $X$  y luego  $\bar{X} \subset X$ , como  $X \subset \bar{X} \Rightarrow X = \bar{X}$ .  
Si  $X = \bar{X} \Rightarrow X$  es cerrado, pues  $\bar{X}$  es cerrado.  $\square$

**Proposición 9.27.**  $X \subset Y \Rightarrow \bar{X} \subset \bar{Y}$ .

**Demostración.**  $X \subset Y \subset \bar{X}$ , pero como  $\bar{X}$  es el menor cerrado que contiene a  $X \Rightarrow \bar{X} \subset \bar{Y}$ .  $\square$

**Proposición 9.28.**  $\overline{X \cup Y} = \bar{X} \cup \bar{Y}$ .

**Demostración.**  $X \subset X \cup Y \Rightarrow \bar{X} \subset \overline{X \cup Y}$

$Y \subset X \cup Y \Rightarrow \bar{Y} \subset \overline{X \cup Y} \Rightarrow$

$\bar{X} \cup \bar{Y} \subset \overline{X \cup Y}$ .

Para la otra contención notemos que  $X \subset \bar{X}$  y  $Y \subset \bar{Y} \Rightarrow X \cup Y \subset \bar{X} \cup \bar{Y} \Rightarrow \overline{X \cup Y} \subset \overline{\bar{X} \cup \bar{Y}} \subset \bar{X} \cup \bar{Y}$ .  $\square$

**Proposición 9.29.**  $\overline{X \cap Y} \subset \bar{X} \cap \bar{Y}$ .

**Demostración.**  $X \cap Y \subset X \subset \bar{X}$  y  $X \cap Y \subset Y \subset \bar{Y} \Rightarrow X \cap Y \subset \bar{X} \cap \bar{Y} \Rightarrow \overline{X \cap Y} \subset \overline{\bar{X} \cap \bar{Y}} \subset \bar{X} \cap \bar{Y}$ .  
Pues es el menor de los cerrados.  $\square$

*This page is intentionally left blank.*

# Clase X - 01/10

## 10.1 (Continuación) Clausura

**Proposición 10.1.** Sean  $X \subset \mathbb{R}^n$  y  $x \in \mathbb{R}^n$ . Son equivalentes:

1.  $x \in \bar{X}$ .
2.  $\forall r > 0, B_r(x) \cap X \neq \emptyset$ .
3.  $\forall$  entorno abierto  $N$  de  $X$ ,  $N \cap X \neq \emptyset$ .
4.  $\forall$  entorno  $N$  de  $X$ ,  $N \cap X \neq \emptyset$ .

**Demostración.** 4)  $\Rightarrow$  3)  $\Rightarrow$  2) son inmediatos.

2)  $\Rightarrow$  1) Por contrarrecíproco, supongamos que  $x \notin \bar{X}$  de manera tal que  $\exists F$  cerrado tal que  $x \in F$  y  $X \subset F^c$  (si no estaría en la clausura)  $\Rightarrow x \in F^c$  que es abierto  $\Rightarrow \exists r > 0, B_r(x) \subset F^c, B_r(x) \cap X \subset B_r(x) \cap F = \emptyset$ .

1)  $\Rightarrow$  4) Supongamos que existe  $N$  entorno de  $X$  tal que  $N \cap X = \emptyset$ . El conjunto  $U = N^c$  es abierto y  $x \in U$ . Además  $U \subset N^c \subset X^c \Rightarrow X \subset U^c$  que es cerrado y  $x \in U^c \Rightarrow x \notin \bar{X}$ .  $\square$

**Ejemplo.** Si  $\mathbb{Q}^n$  es el conjunto de puntos de  $\mathbb{R}^n$  que tienen todas sus coordenadas racionales  $\overline{\mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$ . Decimos que  $\mathbb{Q}^n$  es denso en  $\mathbb{R}^n$ .

**Demostración.** 1)  $\overline{\mathbb{Q}^n} \subseteq \mathbb{R}^n : \mathbb{Q}^n \subset \mathbb{R}^n$ , que es cerrado  $\Rightarrow \overline{\mathbb{Q}^n} \subseteq \mathbb{R}^n$ .

2)  $\mathbb{R}^n \subseteq \overline{\mathbb{Q}^n} : \text{Si } x \in \mathbb{R}^n \text{ y } U \text{ es entorno abierto de } x, U \cap \mathbb{Q}^n \neq \emptyset \text{ (1) } \iff \text{2)). Como } U \text{ es abierto } \exists r > 0 : B_r(x) \subset U.$

Si  $x = (x_1, \dots, x_n)$  para cada  $i \in \{1, \dots, n\}$  elijo un racional  $q_i$  en el intervalo  $(x_i - \frac{r}{\sqrt{n}}, x_i + \frac{r}{\sqrt{n}}) : |x_i - q_i| < \frac{r}{\sqrt{n}} \Rightarrow d(x, q) < r$ . Sabemos que existe porque ya probamos que  $\mathbb{Q}$  es denso en  $\mathbb{R}$ .

$\Rightarrow q \in B_r(x) \subset U \Rightarrow U \cap \mathbb{Q}^n \neq \emptyset$  pues al menos  $q$  está allí  $\forall U$  entorno abierto de  $X$ .  
 $\therefore \mathbb{R}^n \subset \overline{\mathbb{Q}^n}$ .  $\square$

## 10.2 Punto de acumulación

**Definición 10.2 (Punto de acumulación).**  $X \subset \mathbb{R}^n$ . Un punto  $x \in X$  es de acumulación si pertenece a  $\overline{X - \{x\}}$ .

**Definición 10.3 (Conjunto derivado).** El conjunto derivado de  $X$  es el conjunto de todos los puntos de acumulación de  $X$ .

**Proposición 10.4.** Dados  $X \subset \mathbb{R}^n, x \in X$ , son equivalentes:

1.  $x$  es un punto de acumulación.
2.  $\forall r > 0, B_r(x)$  contiene un punto de  $X$  distinto de  $x$ .
3. Todo entorno abierto de  $x$  contiene un punto de  $X$  distinto de  $x$ .
4. Todo entorno de  $x$  contiene un punto de  $X$  distinto de  $x$ .

**Demostración.** 4)  $\Rightarrow$  3)  $\Rightarrow$  2) son inmediatos.

2)  $\Rightarrow$  1) Por contrarrecíproco:  $x \in X$  no es punto de acumulación de  $X$  luego  $x \in (X - \{x\})^c$ . Como ese conjunto es abierto  $\exists r > 0, B_r(x) \subset \overline{X - \{x\}} \Rightarrow B_r(x) \cap (X - \{x\}) \subset B_r(x) \cap \overline{X - \{x\}} = \emptyset$ .

1)  $\Rightarrow$  4) Sea  $x \in X'$  y  $N$  un entorno de  $x$ . Como  $x \in \overline{X - \{x\}} \Rightarrow N \cap (X - \{x\}) \neq \emptyset$ .  $\square$

**Proposición 10.5.** Si  $X \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow \overline{X} = X \cup X'$ .

**Demostración.** Sea  $X \subset \mathbb{R}^n$  sabemos que  $X \subset \overline{X}$ . Por otro lado si  $x \in X' \Rightarrow$  Para cualquier entorno  $N$  de  $X$ ,  $N \cap X \subset N \cap \overline{X - \{x\}} \neq \emptyset \Rightarrow x \in \overline{X} \Rightarrow X' \subset \overline{X} \Rightarrow X \cup X' \subset \overline{X}$ .

Sea  $x \in \overline{X}$  y supongamos que  $x \notin X$ . Para cada entorno  $N$  de  $X$  tenemos que  $N \cap (X - \{x\}) = N \cap X \neq \emptyset \Rightarrow x \in X'$ , luego  $\overline{X} \subset X \cup X'$ .  
 $\therefore \overline{X} = X \cup X'$ .  $\square$

**Proposición 10.6.** Sea  $X \subset \mathbb{R}^n$ . Un punto  $x$  es punto de acumulación de  $X \iff \forall$  entorno abierto de  $X$  contiene infinitos elementos de  $x$ .

**Demostración.**  $\Leftarrow$ ) Si todo entorno abierto de  $x$  contiene infinitos elementos de  $X$  entonces hay alguno distinto de  $x$  y  $x \in X'$ .

$\Rightarrow$ ) Sea  $x \in X'$  y  $N$  un entorno abierto de  $x \Rightarrow \exists r > 0 : B_r(x) \subset N$ .

Construyamos una sucesión de puntos  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  pertenecientes a  $N \cap X$  y tales que  $d(x_n, x) > d(x_{n+1}, x) > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ .

$x_1 \neq x$ , si  $n > 0$  y ya elegimos  $x_1, \dots, x_n : d(x_1, x) > \dots > 0, \forall i \in \{1, \dots, n-1\}$ . Como  $B_{d(x_n, x)}(x)$  es un entorno abierto de  $x$  y  $x \in X'$  contiene algún punto distinto de  $x$ , lo llamo  $x_{n+1}$ .

Tenemos entonces que  $d(x_n, x) > d(x_{n+1}, x) > 0 \Rightarrow$  los términos de la sucesión  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  son todos diferentes de  $x$ , distintos dos a dos y pertenecen a  $B_r(x)$ .

$\therefore (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset N \cap X$  es infinito.  $\square$

**Proposición 10.7.**  $X \subset \mathbb{R}^n, (X')' \subset X'$ .

**Demostración.**  $x \in (X')'$  y  $N$  un entorno abierto de  $x$ . Sabemos que  $N$  contiene un punto  $y \in X'$  distinto de  $x$ . Luego contiene infinitos puntos de  $X \therefore x \in X'$ .  $\square$

**Corolario 10.8.** El conjunto derivado de todo subconjunto de  $\mathbb{R}^n$  es cerrado.

**Demostración.**  $\overline{X'} = X' \cup (X')' = X' \therefore$  es cerrado.  $\square$

**Definición 10.9 (Conjunto perfecto).**  $X \subset \mathbb{R}^n$  es un conjunto perfecto  $\iff X = X'$ .

**Definición 10.10 (Punto aislado).**  $X \subset \mathbb{R}^n, x \in X$  es aislado en  $X$  si  $\exists N$  un entorno de  $x : N \cap X = \{x\}$ .

**Definición 10.11 (Conjunto discreto).** Un conjunto es discreto  $\iff$  todos sus puntos son aislados.

**Ejemplo.**  $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$  es discreto.

## 10.3 Sucesiones en varias dimensiones

Decimos que una sucesión  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$  converge a un punto  $L \in \mathbb{R}^n$  si  $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N}) : \forall n > n_0, d(x_n, L) < \varepsilon$ .

**Lema 10.12.** Si una sucesión tiene límite en  $\mathbb{R}^n$  es único.

**Demostración.** Supongamos que converge a  $L$  y a  $L'$  con  $L \neq L' \Rightarrow$   
 $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N}) : (\forall n > n_0), d(x_n, L) < \varepsilon$   
 $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_1 \in \mathbb{N}) : (\forall n > n_1), d(x_n, L') < \varepsilon$   
 $d(L, L') \leq d(L, x_n) + d(x_n, L') \leq 2 \cdot \varepsilon, \forall n > \max(n_0, n_1).$   
 Sea  $\varepsilon = d(L, L')/2 \Rightarrow d(L, L') < d(L, L')$  Absurdo! □

**Proposición 10.13.** Sea  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$  y  $L \in \mathbb{R}^n$  son equivalentes:

1.  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$
2.  $\forall r > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, x_n \in B_r(L)$
3.  $\forall$  entorno abierto  $N$  de  $L, \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, x_n \in N$
4.  $\forall$  entorno  $N$  de  $L, \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, x_n \in N$

**Demostración.** 4)  $\Rightarrow$  3)  $\Rightarrow$  2)  $\Rightarrow$  1) son inmediatas de la definición de límite.  
 1)  $\Rightarrow$  4) Sea  $N$  un entorno de  $L$ . Como  $L \in N^\circ, \exists r > 0 : B_r(L) \subset N^\circ$  y como  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, d(L, x_n) < r \Rightarrow x_n \in B_r(L) \subset N, \forall n > n_0$ . □

**Proposición 10.14.** Ejercicio: Demostrar las siguientes propiedades en  $\mathbb{R}^n$ .

1. Toda sucesión convergente es acotada.
2. Suma de sucesiones convergentes es convergente y el límite de la suma es la suma de los límites.
3. Si  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$  y  $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  convergen  $\Rightarrow (x_n \cdot \lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n$ .

**Proposición 10.15.** Sea  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n, x_i = (x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n}) \in \mathbb{R}^n$ . Son equivalentes:

1. La sucesión converge en  $\mathbb{R}^n$ .

2.  $\forall i \in \{1, \dots, n\}, (x_{n_i})_{n \in \mathbb{N}}$  converge a  $\mathbb{R}$ .

Si se cumplen y además  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_i} = L_i, \forall i \in \{1, \dots, n\} \Rightarrow L = (L_1, \dots, L_n)$ .

**Demostración.** 1)  $\Rightarrow$  2) Sea  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  y  $L = (L_1, \dots, L_n)$ , si  $i \in \{1, \dots, n\}$  y  $\varepsilon > 0, \exists n_0 : \forall n > n_0, d(x_n, L) < \varepsilon \Rightarrow$

$\forall n > n_0, d(x_{n_i}, L_i) < \varepsilon \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_i} = L_i$ .

2)  $\Rightarrow$  1) Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_i} = L_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}$ . Llamo  $L = (L_1, \dots, L_m)$ .

Dado  $\varepsilon > 0, \exists n_i \in \mathbb{N} : \forall n > n_i, d(x_{n_i}, L_i) < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \Rightarrow n_0 = \max(n_1, \dots, n_m)$  y  $n > n_0$ ,

$d(x_n, L) = (d(x_{n_1}, L_1)^2 + \dots + d(x_{n_m}, L_m)^2) < (\frac{\varepsilon^2}{n} + \dots + \frac{\varepsilon^2}{n})^{\frac{1}{2}} = \varepsilon$ .

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ . □

## 10.4 Conjuntos compactos

**Teorema 10.16.** Un subconjunto  $F \subset \mathbb{R}^n$  es cerrado  $\iff$  si  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset F$  y  $x_n \rightarrow x, x \in F$ .

**Demostración.**  $\Rightarrow$ ) Sea  $F \subset \mathbb{R}^n$  cerrado y supongamos que  $\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset F, x_n \rightarrow L \in F^c$ .

Como  $F^c$  es abierto, entonces  $\exists r > 0 : B_r(X) \subset F^c \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} : x_n \subset F^c, \forall n > n_0$ .

Absurdo pues  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset F$ .

$\Leftarrow$ ) Si  $F \subset \mathbb{R}^n$  no es cerrado  $\exists x \in F'$  y  $x \notin F$ . Como  $x$  es punto de acumulación  $\forall n > n_0 \in \mathbb{N}, B_{\frac{1}{n}}(x) \cap X \neq \emptyset$  y elijamos un punto  $x_n$  allí.  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset F$  y  $d(x_n, x) < \frac{1}{n}, \forall n > n_0 \therefore x_n \rightarrow x \notin F$ . □

**Ejemplo.**  $(0, 1]$  no es cerrado pues  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  y  $\frac{1}{n} \in (0, 1], \forall n \in \mathbb{N}$ .

**Definición 10.17 (Relativamente compacto).** Un subconjunto  $F \subset \mathbb{R}^n$  se dice relativamente compacto si toda sucesión en  $F$  posee una subsucesión convergente.

**Definición 10.18 (Compacto).** Un conjunto se dice compacto si además de ser relativamente compacto cumple que está acotado.



**Proposición 10.19.** Un subconjunto de  $\mathbb{R}^n$  es relativamente compacto  $\iff$  es acotado.

**Demostración.** Sea  $F \subset \mathbb{R}^n$  no acotado  $\Rightarrow$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\exists y_n \in F : \|y_n\| > n$ .

Si  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  es una función estrictamente creciente cualquiera entonces la sucesión  $(y_{f(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  de  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  no es acotada, pues  $\|y_{f(n)}\| > f(n) \geq n$  y  $\therefore$  no converge. Luego  $F$  no es relativamente compacto.

Supongamos ahora que  $F$  es acotado, digamos que  $\exists k > 0 : F \subset B_k(0)$  y sea  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión en  $F$ .

Para cada  $m \in \mathbb{N}$ ,  $x_m = (x_{m_1}, x_{m_2}, \dots, x_{m_n})$ . Si  $L = \{1, \dots, n\} \Rightarrow \forall m \in \mathbb{N}, \|x_{m_i}\| \leq \|x_m\| < k$ , es decir que las sucesiones  $(x_{m_1})_{m \in \mathbb{N}}, \dots, (x_{m_n})_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  son acotadas.

En particular  $\exists f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  estrictamente creciente tal que la subsucesión  $(x_{f(m)_1})_{m \in \mathbb{N}}$  converge. Es decir que  $1$  es un elemento del conjunto  $D$  de todos los  $f \in \{1, \dots, n\}$  con la propiedad: "Hay una función estrictamente creciente  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} : \forall i \in \{1, \dots, f\}$  la sucesión  $(x_{f(m)_i})_{m \in \mathbb{N}}$  converge".

Sea  $k = \max D$  y  $k < n$ . Como  $k \in D$ ,  $\exists f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  estrictamente creciente tal que  $\forall i \in \{1, \dots, k\}$  la sucesión  $(x_{f(m)_i})_{m \in \mathbb{N}}$  converge.

Por otro lado  $(x_{f(m)_{k+1}})_{m \in \mathbb{N}}$  es acotada  $\Rightarrow$  Hay una función  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  estrictamente creciente tal que  $(x_{g(f(m))_{k+1}})_{m \in \mathbb{N}}$  converge.

Entonces las  $k+1$  sucesiones convergen y  $g(f(m))$  generan subsucesiones que convergen a lo mismo.

Sea  $h = g \circ f$  estrictamente creciente, entonces  $k+1 \in D$  absurdo pues  $k = \max D$ .

Luego  $k = n \Rightarrow \exists f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  estrictamente creciente tal que

$(x_{f(m)_1})_{m \in \mathbb{N}}, \dots, (x_{f(m)_n})_{m \in \mathbb{N}}$  convergen  $\therefore F$  es relativamente compacto.  $\square$

*This page is intentionally left blank.*

# Clase XI - 04/10

## 11.1 (Continuación) Conjuntos Compactos

**Corolario 11.1.**  $F \subset \mathbb{R}^n$  es compacto  $\iff$  es cerrado y acotado.

**Definición 11.2 (Cubrimiento).** Sea  $X \subset \mathbb{R}^n$ . Una familia  $\mathcal{U}$  de subconjuntos de  $\mathbb{R}^n$  es un cubrimiento de  $X$  si  $X \subset \bigcup_{u \in \mathcal{U}} u$  y es un cubrimiento abierto si todo subconjunto de  $\mathcal{U}$  es abierto.

**Definición 11.3 (Subcubrimiento).** Un subcubrimiento de  $\mathcal{U}$  es un cubrimiento  $\mathcal{V}$  de  $X$  tal que  $\mathcal{V} \subset \mathcal{U}$ .

**Teorema 11.4 (Lindelöf).** Todo cubrimiento abierto de algún subconjunto de  $\mathbb{R}^n$  admite a lo sumo un subcubrimiento a lo sumo numerable.

**Demostración.** Sea  $X \subset \mathbb{R}^n$  y  $\mathcal{U}$  un cubrimiento abierto de  $X$ .

- Si  $X = \emptyset \Rightarrow \emptyset$  es un subcubrimiento de  $\mathcal{U}$  a lo sumo numerable.
- Si  $X \neq \emptyset \Rightarrow \mathcal{U} \neq \emptyset \Rightarrow$  Podemos fijar  $U_0 \in \mathcal{U}$ .

Para cada  $q \in \mathbb{Q}^n$  y sea  $s \in \mathbb{Q} > 0$ . Elegimos un elemento  $U(q, s)$  de  $\mathcal{U}$  de la siguiente forma:

1. Si hay elementos de  $\mathcal{U}$  que contienen a  $B_s(q)$  elegimos cualquiera de ellos y lo llamamos  $u(q, s)$ .
2. Si no hay ninguno ponemos  $U(q, s) = U_0$ .

Sea  $x \in X$  como  $\mathcal{U}$  es un cubrimiento abierto de  $X$ ,  $\exists u \in \mathcal{U}$  abierto tal que  $x \in u \Rightarrow \exists r > 0 : B_r(x) \subset u$ .

Si tomamos  $q \in \mathbb{Q}^n : q \in B_{\frac{r}{2}}(x)$  y  $s \in \mathbb{Q} : d(x, q) < s < \frac{r}{2} \Rightarrow x \in B_s(q)$  y  $B_s(q) \subset B_r(x) \subset u$ .

Así que hay elementos de  $\mathcal{U}$  que contienen a  $B_s(q)$  y por lo tanto  $x \in B_s(q) \subset U(q, s)$ . Esto prueba que  $V = \{U(q, s) : q \in \mathbb{Q}^n, s \in \mathbb{Q} > 0\}$  es un subcubrimiento de  $\mathcal{U}$  y es numerable pues  $\mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}^n$  es numerable y la función  $\mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q} > 0 \rightarrow V, (q, s) \mapsto U(q, s)$ , es suryectiva  $\therefore V$  es a lo sumo numerable.  $\square$

**Corolario 11.5.** Un subconjunto  $F \subset \mathbb{R}^n$  es compacto  $\iff \forall$  cubrimiento abierto de  $F$  admite un subcubrimiento finito.

**Demostración.** Para la ida sea  $F \subset \mathbb{R}^n$  compacto,  $\mathcal{U}$  un cubrimiento abierto de  $F$ . Por Lindelöf hay un subcubrimiento a lo sumo numerable  $\mathcal{V}$  de  $\mathcal{U}$  y  $\exists f: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{V}$  suryectiva. Por el absurdo supongamos que  $\mathcal{U}$  no contiene subcubrimiento finito de  $F$ . En particular si  $m \in \mathbb{N}$ ,  $V_m = \{f(1), \dots, f(m)\} \in \mathcal{V}$  no es subcubrimiento de  $F$ , por ser finito

$$\Rightarrow \exists x_m \in F - \bigcup_{i=1}^m f(i) \quad (11.1)$$

De esta forma tenemos una sucesión de elementos de  $F$ ,  $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ .

Como  $F$  es compacto  $\exists h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  estrictamente creciente tal que  $(x_{h(m)})_{m \in \mathbb{N}} \rightarrow L \in F$ .

Como  $\mathcal{V}$  es un cubrimiento de  $F$  y  $f$  es sobreyectiva  $\Rightarrow \exists s \in \mathbb{N} : L \in f(s)$ . Por otro lado como  $\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = L$  y  $f(s)$  es un entorno de  $L$ ,  $\exists m_0 \in \mathbb{N} : x_{h(m)} \in f(s), \forall m > m_0$ .

Como  $m < h(s + m_0) \Rightarrow x_{h(s+m_0)} \in f(s)$  Absurdo!

$x_{h(m_0+s)} \in F - \bigcup_{i=1}^{h(s+m_0)} f(i)$  que es disjunto con  $f(s)$  pues  $s < h(s + m_0)$ .

$\therefore \mathcal{V}$  y, por lo tanto,  $\mathcal{U}$  contienen un subcubrimiento finito.

Para la vuelta supongamos que todo cubrimiento abierto de  $F$  admite un subcubrimiento finito, pero que  $F$  no es compacto.

Hay una sucesión  $(x_m)_{m \in \mathbb{N}} \subset F$  que no tiene ninguna subsucesión convergente. Si  $x \in F$ , no hay ninguna subsucesión de  $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$  que converge a  $x$  y, por lo tanto,  $\exists r_x > 0 : S_x = \{m \in \mathbb{N} : x_m \in B_{r_x}(x)\}$  es finito.

El conjunto  $\mathcal{U} = \{B_{r_x}(x) : x \in F\}$  es un cubrimiento abierto de  $F$ .

Por hipótesis hay un subconjunto finito  $\{y_1, \dots, y_k\}$  tal que  $\{B_{r_{y_1}}(y_1), \dots, B_{r_{y_k}}(y_k)\}$  es subcubrimiento de  $F$ .

En particular  $\forall m \in \mathbb{N}, \exists i \in \{1, \dots, k\} : x_m \in B_{r_{y_i}}(y_i) \Rightarrow$

$m \in S_{y_i} \therefore \mathbb{N} \subset S_{y_1} \cup \dots \cup S_{y_k}$  Absurdo! pues los  $S_{y_i}$  son finitos. □

**Proposición 11.6.** Sea  $K \subset \mathbb{R}^n$  compacto. Si  $\mathcal{U}$  es un cubrimiento abierto de  $K$  entonces  $\exists \delta > 0 : \text{si } x, y \in K, d(x, y) < \delta \Rightarrow \exists u \in \mathcal{U} \text{ abierto tal que } x, y \in u$ .  
 $\delta$  se llama número de Lebesgue del cubrimiento  $\mathcal{U}$ .

**Demostración.** Sea  $\mathcal{U}$  un cubrimiento abierto de  $K$ . Para cada  $x \in K, \exists U_x \in \mathcal{U} : x \in U_x$ . Como  $U_x$  es abierto  $\exists r_x > 0 : B_{r_x}(x) \subset U_x$ .

El conjunto  $\mathcal{U}' = \{B_{\frac{r_x}{2}} : x \in K\}$  es un cubrimiento abierto de  $K$ .  $\mathcal{U}'$  posee un subcubrimiento finito.

$\exists x_1, \dots, x_k : K \subset \bigcup_{i=1}^k B_{\frac{r_{x_i}}{2}}(x_i)$ .

Veamos que  $\delta = \frac{1}{2} \cdot \min(r_{x_1}, \dots, r_{x_k})$  es un número de Lebesgue:

Sean  $x, y \in K : d(x, y) < \delta \Rightarrow$

$\exists i \in \{1, \dots, k\} : x \in B_{\frac{r_{x_i}}{2}}(x_i) \Rightarrow \|x_i - y\| \leq \|x_i - x\| + \|x - y\| \leq \frac{r_{x_i}}{2} + \delta < \frac{r_{x_i}}{2} + \frac{r_{x_i}}{2} = r_{x_i} \Rightarrow$

$x, y \in B_{r_{x_i}}(x_i) \subset U_{x_i}$  que es abierto de  $\mathcal{U}$ . □

## 11.2 Propiedades de límites

**Definición 11.7 (Límite).**  $A \subset \mathbb{R}^n, x_0$  un punto de acumulación de  $A$  y  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$  una función, decimos que  $y \in \mathbb{R}^n$  es límite de  $f$  en  $x_0$  si:  
 $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) : (\forall x \in A)$  si  $0 < \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - y\| < \varepsilon$ .

**Lema 11.8.** Si  $A \subset \mathbb{R}^n$  y  $x_0 \in A'$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^k$  tiene como mucho un único límite en  $x_0$ .

**Demostración.** Sea  $y, y' \in \mathbb{R}^k$  : son límite de  $f$  en  $x_0 \in A'$ . Tomemos  $\varepsilon = \frac{1}{2} \cdot \|y - y'\| > 0$ .

$$\Rightarrow \exists \delta_1, \delta_2 : 0 < \|x - x_0\| < \delta_1 \Rightarrow \|f(x) - y\| < \varepsilon$$

$$0 < \|x - x_0\| < \delta_2 \Rightarrow \|f(x) - y'\| < \varepsilon.$$

$$\text{Si } \delta = \min(\delta_1, \delta_2) \Rightarrow \text{Si } 0 < \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow$$

$$\|f(x) - y\| + \|f(x) - y'\| < 2 \cdot \varepsilon$$

$$\|y - y'\| < 2 \cdot \varepsilon = \|y - y'\| \text{ Absurdo!}$$

$\therefore$  el límite es único. □

**Proposición 11.9.** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n, x_0 \in A', f : A \rightarrow \mathbb{R}^k, y \in \mathbb{R}^k$  son equivalentes:

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y$
2.  $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) : f(B_\delta(x_0)) \cap (A - \{x_0\}) \subset B_\varepsilon(y)$
3.  $\forall$  entorno  $V$  de  $y$ ,  $\exists$  un entorno  $U$  de  $x_0$  tal que  $f(U \cap (A - \{x_0\})) \subset V$ .

**Demostración.** 1)  $\Rightarrow$  2) Dado

$$\varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - y\| < \varepsilon \quad (11.2)$$

Si

$$x \in B_\delta(x_0) \cap (A - \{x_0\}) \Rightarrow x \in A, \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \quad (11.3)$$

$$\|f(x) - y\| < \varepsilon \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(y) \therefore f(B_\delta(x_0) \cap (A - \{x_0\})) \subset B_\varepsilon(y) \quad (11.4)$$

2)  $\Rightarrow$  3) Si  $V$  es un entorno de  $y \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(y) \subset V$ . Por hipótesis

$$\exists \delta > 0 : f(B_\delta(x_0) \cap (A - \{x_0\})) \subset B_\varepsilon(y) \quad (11.5)$$

Tomo  $U = B_\delta(x_0)$  que es un entorno de  $x_0$ .

3)  $\Rightarrow$  1) Sea  $\varepsilon > 0$ . Como  $B_\varepsilon(y)$  es un entorno de  $y$ . Por hipótesis  $\exists$  un entorno  $U$  de  $x_0 : f(U \cap (A - \{x_0\})) \subset B_\varepsilon(y)$ . Como  $U$  es entorno de  $x_0, \exists \delta > 0 : B_\delta(x_0) \subset U$ .

Si  $x \in A$  es tal que  $0 < \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow x \in B_\delta(x_0) \cap (A - \{x_0\}) \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(y) \Rightarrow \|f(x) - y\| < \varepsilon$

$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y$ . □

**Proposición 11.10.**  $A \subset \mathbb{R}^n, x_0 \in A', f : A \rightarrow \mathbb{R}^k, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y \iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A - \{x_0\}, x_n \rightarrow x_0, (f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  converge a  $y$ .

**Demostración.**  $\Rightarrow$ ) Supongamos que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y$ . Sea  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A - \{x_0\}, x_n \rightarrow x_0$ . Dado

$$\varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : d(x, x_0) < \delta \Rightarrow d(f(x), y) < \varepsilon \quad (11.6)$$

Además

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : d(x_n, x_0) < \delta, \forall n > n_0 \quad (11.7)$$

$$\Rightarrow d(f(x_n), y) < \varepsilon, \forall n > n_0 \therefore (f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow y \quad (11.8)$$

$\Leftarrow$ )  $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A - \{x_0\}, x_n \rightarrow x_0, (f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow y$ .

Supongamos que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq y$ . Luego  $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0, d(x, x_0) < \delta$ , pero  $d(f(x), y) \geq \varepsilon$ .

En particular consideremos  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A - \{x_0\}$  y podemos encontrar  $d(x_n, x_0) < \delta, \forall n > n_0 \in \mathbb{N}$  pues  $x_n \rightarrow x_0$ .

Luego  $d(f(x_n), y) \geq \varepsilon, \forall n > n_0 \therefore (f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \not\rightarrow y$ . □

**Proposición 11.11.** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n, x_0 \in A', f, g : A \rightarrow \mathbb{R}^k, h : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = z \Rightarrow$   
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y + z$ .

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = r \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) \cdot f(x) = r \cdot y$$

$$3. \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = r \neq 0, h(x) \neq 0 (\forall x \in A) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{h(x)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)} = \frac{1}{r}.$$

**Proposición 11.12.** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n, x_0 \in A', f : A \rightarrow \mathbb{R}^k, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y$ .

1. Si  $z \neq y, \exists r > 0 : z \in f(B_r(x_0) - (A - \{x_0\}))$ .
2. Si  $y > 0 \Rightarrow \exists r > 0 : f(x) > 0, \forall x \in (B_r(x_0) - (A - \{x_0\}))$ .
3.  $\exists r > 0 : f$  es acotada sobre  $B_r(x_0) \cap A$ , o sea,  $\{f(x) : x \in B_r(x_0) \cap A\}$  está acotado superiormente.

**Demostración.** 1.  $y \neq z \Rightarrow d(y, z) > 0 \Rightarrow \exists r > 0 : 0 < d(x, x_0) < r \Rightarrow d(f(x), y) < d(y, z)$ .

2.  $x \in B_r(x_0) \cap (A - \{x_0\}) \Rightarrow 0 < d(x, x_0) < r \Rightarrow d(f(x), y) < d(z, y) \therefore f(x) \neq z$ , o sea,  $z \in f(B_r(x_0) \cap (A - \{x_0\}))$ .

3. Sea  $\varepsilon = 1 \Rightarrow \exists r > 0 : \forall x \in A$  vale que  $0 < d(x, x_0) < r \Rightarrow d(f(x), y) < 1 \Rightarrow$   
 Si  $x \in B_r(x_0) \cap (A - \{x_0\}), \|f(x)\| = \|f(x) + y - y\| \leq \|f(x) - y\| + \|y\| < 1 + \|y\|$ .  
 $\therefore$  si  $x_0 \notin A, 1 + \|y\|$  es cota superior para  $\{f(x) : x \in B_r(x) \cap A\}$ .  
 Si  $x_0 \in A \Rightarrow 1 + \|y\| + \|f(x_0)\|$  es cota superior. La definición del límite no sirve para  $x_0$ , por eso se separa en casos.

□

**Teorema 11.13 (Teorema del Sandwich).** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n, x_0 \in A'$  y  $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}, \forall x \in A, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ , si:  
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = y \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y$ .

**Demostración.** Dado  $\varepsilon > 0, \exists \delta_1, \delta_2 > 0 :$

$$0 < d(x, x_0) < \delta_1 \Rightarrow d(f(x), y) < \varepsilon \quad (11.9)$$

$$0 < d(x, x_0) < \delta_2 \Rightarrow d(h(x), y) < \varepsilon \quad (11.10)$$

Sea  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2) \Rightarrow \exists x \in A : 0 < d(x, x_0) < \delta \Rightarrow$

$$y - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < y + \varepsilon \Rightarrow d(g(x), y) < \varepsilon \quad (11.11)$$

□

$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y$ .



*This page is intentionally left blank.*

# Clase XII - 08/10

12.1 Límites en varias dimensiones

12.2 Continuidad en un punto

12.3 Composición de funciones

12.4 Continuidad global

*This page is intentionally left blank.*

# Clase XIII - 15/10

13.1 Gráficas continuas

13.2 Teorema de Weierstrass

13.3 Teorema del valor intermedio

13.4 Convexidad

*This page is intentionally left blank.*

# Clase XIV - 18/10

14.1 Continuidad uniforme

14.2 Conjuntos Conexos y Arco-conexos

*This page is intentionally left blank.*

# Parciales

## 15.1 Primer parcial - Primera fecha - 14/10

1. Dada  $f : X \rightarrow Y$ . Mostrar que  $f$  es inyectiva  $\iff f(A - B) = f(A) - f(B)$  para todo par de conjuntos  $A, B \subseteq X$ .
2. Considerar  $K$  un cuerpo ordenado y  $f : K \rightarrow K$  definida por  $f(x) = (1 + x^2)^{-1}$ . Calcular, en el caso que existan:  $\inf(f(\mathbb{Z}))$  y  $\sup(f(\mathbb{Z}))$ .
3. Considerar  $B \subseteq A$  conjuntos no vacíos de números reales. Se sabe que  $A$  está acotado superior y que  $\forall x \in A, \exists y \in B : x \leq y$ . Demostrar que  $\sup A = \sup B$ .
4. Demostrar, usando la definición que  $\frac{4^n - 6}{4^{n+1} + 10} \rightarrow \frac{1}{4}$ .
5. Decidir si las siguientes sucesiones son convergentes. En caso afirmativo, determinar su límite.

a)  $a_1 = -\frac{3}{2}, 3 \cdot a_{n+1} = 2 + a_n^3$ . Dar un valor de  $a_1$  para que la sucesión converja a  $-2$ .

b)  $b_1 = 1, b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n}$ .

6. Considerar una sucesión  $(a_n)$  de términos positivos tal que  $a_n \rightarrow L$ . Demostrar que

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \rightarrow L \quad (15.1)$$

7. Considerar  $(a_n)$  y  $(b_n)$  sucesiones acotadas superiormente mostrar que

$$\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n \quad (15.2)$$

Dar un ejemplo donde la desigualdad sea estricta.

8. Considerar  $(a_n)$  sucesión de términos positivos tal que  $\sum a_n$  es convergente. Decidir si la siguiente serie es convergente o divergente:  $\sum \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ .

## 15.2 Primer parcial - Segunda fecha - 28/10

1. Considerar  $(a_n)$  y  $(b_n)$  tales que  $a_n \rightarrow M$  y  $b_n \rightarrow L \neq 0$ . Demostrar usando la definición que  $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{M}{L}$ .



2. Considerar  $f : X \rightarrow Y$  y  $B \subset Y$ . Demostrar que  $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ . Dar un ejemplo donde la desigualdad sea estricta.
3. Decidir si la sucesión  $b_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{b_n}}$  con  $b_1 = 1$  es convergente. En caso afirmativo, determinar su límite.
4. Considerar  $(x_n)$  la sucesión acotada tal que  $\liminf x_n = \limsup x_n = L$ . Demostrar que  $x_n \rightarrow L$ .
5. Decidir si  $\sum \frac{n! \cdot e^n}{n^{n+1}}$  es convergente o divergente.
6. Considerar  $(a_n)$  una sucesión decreciente tal que  $\sum a_n$  es convergente. Demostrar que  $na_n \rightarrow 0$ .
7. Considerar  $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq 0$ . Demostrar que  $\sum a_n$  converge  $\iff \sum 2^n \cdot a_{2^n}$  converge.

### 15.3 Segundo parcial - Primera fecha - 20/12

1. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  y  $f_n(x) = f(nx)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N} : (f_n)$  es equicontinua en 0. Demostrar que  $f$  es constante.
2. Considerar  $F$  cerrado y  $K$  compacto en  $\mathbb{R}^n$  tales que  $F \cap K = \emptyset$ . Demostrar que  $d(F, K) > 0$ . Se define  $d(F, K) = \inf\{d(f, k) : f \in F, k \in K\}$ .  
Dar un ejemplo donde  $F$  y  $G$  sean cerrados disjuntos tales que  $d(F, G) = 0$ .
3. Considerar  $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  una función tal que  $\forall \varepsilon > 0, \exists g_\varepsilon : X \rightarrow \mathbb{R}$  continua tal que  $\forall x \in X$  se cumple que  $|f(x) - g_\varepsilon(x)| < \varepsilon$ . Mostrar que  $f$  es continua.
4. a) Considerar  $f_n : X \rightarrow Y$  tales que  $f_n \rightrightarrows f$  y  $g : Y \rightarrow Z$  uniformemente continua. Demostrar que  $g \circ f_n \rightrightarrows g \circ f$ .  
b) Considerar  $g_n : Y \rightarrow Z$  tales que  $g_n \rightrightarrows g$  y  $f : X \rightarrow Y$ . Es cierto que  $g_n \circ f \rightrightarrows g \circ f$ ?
5. a) Demostrar que  $x^n(1-x)$  converge uniformemente a 0 en  $[0, 1]$ .  
b) Estudiar la convergencia puntual y uniforme de las siguientes series en el intervalo  $[0, 1]$ .
  - 1)  $\sum_{n \geq 1} x^n(1-x)$
  - 2)  $\sum_{n \geq 1} (-1)^n x^n(1-x)$

*This page is intentionally left blank.*