

Análisis Funcional: Práctica I

Bustos Jordi
Espacios normados

2 de septiembre de 2026

Ejercicio 1. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado.

a) Demostrar que la función $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$d(x, y) := \|x - y\| \quad \text{para todo } x, y \in E,$$

es una métrica.

b) Probar que las siguientes funciones son continuas con la topología asociada a d , la cual hace de E un Espacio Vectorial Topológico.

i. Las traslaciones $T_x : E \rightarrow E$ dadas por $T_x(y) = x + y$ para $x, y \in E$ (x fijo).

ii. La multiplicación por un escalar $M_x : \mathbb{K} \rightarrow E$ dada por $M_x(\alpha) = \alpha x$ para $x \in E$ y $\alpha \in \mathbb{K}$ (x fijo).

iii. La norma, $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ dada por $x \mapsto \|x\|$. Mostrar que además vale la siguiente desigualdad:

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| = d(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in E.$$

Demostración. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado.

a) Es claro que $d(x, x) = \|x - x\| = \|0\| = 0$ para todo $x \in E$. Además

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|y - x\| = d(y, x) \quad \text{para todo } x, y \in E.$$

La desigualdad triangular se cumple porque vale para la norma y, por lo tanto, d es una métrica.

b) Para demostrar la continuidad de las traslaciones, sea $x \in E$ y consideremos $T_x(y) = x + y$. Dado $\epsilon > 0$, si $d(y_1, y_2) < \epsilon$, entonces

$$d(T_x(y_1), T_x(y_2)) = d(x + y_1, x + y_2) = \|(x + y_1) - (x + y_2)\| = \|y_1 - y_2\| = d(y_1, y_2) < \epsilon,$$

lo que prueba la continuidad de T_x .

Para la multiplicación por un escalar, sea $x \in E$ y consideremos $M_x(\alpha) = \alpha x$. Dado $\epsilon > 0$, si $|\alpha_1 - \alpha_2| < \frac{\epsilon}{\|x\|}$, entonces

$$d(M_x(\alpha_1), M_x(\alpha_2)) = d(\alpha_1 x, \alpha_2 x) = \|\alpha_1 x - \alpha_2 x\| = |\alpha_1 - \alpha_2| \|x\| < \epsilon,$$

lo que prueba la continuidad de M_x .

La continuidad de la norma se sigue de la desigualdad

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| = d(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in E.$$

□

Ejercicio 2. Sean E un espacio vectorial y $\tilde{d}$ una métrica que verifica

- $\tilde{d}(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| \tilde{d}(x, y)$ para todo $x, y \in E$ (homogeneidad).
- $\tilde{d}(x + v, y + v) = \tilde{d}(x, y)$ para todo $x, y, v \in E$ (invarianza por traslaciones).

Demostrar que $\tilde{d}$ proviene de una norma.

Demostración. Definamos la siguiente norma

$$\|x\| := \tilde{d}(x, 0)$$

Es fácil verificar que esta definición cumple con las propiedades de una norma:

- $\|x\| = 0 \iff \tilde{d}(x, 0) = 0 \iff x = 0.$
- $\|\lambda x\| = \tilde{d}(\lambda x, 0) = |\lambda| \tilde{d}(x, 0) = |\lambda| \|x\|.$
- $\|x + y\| = \tilde{d}(x + y, 0) = \tilde{d}(x, -y) = \tilde{d}(x, 0 + (-y)) \leq \tilde{d}(x, 0) + \tilde{d}(-y, 0) = \|x\| + \|y\|.$

Por lo tanto, $\|\cdot\|$ es una norma y $\tilde{d}(x, y) = \|x - y\|$ para todo $x, y \in E$. □

Ejercicio 3. Dar un ejemplo de una distancia que no proviene de una norma.

Demostración. Un ejemplo clásico de una distancia que no proviene de una norma es la distancia discreta en un conjunto X con al menos dos elementos:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ 1 & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

Esta distancia no puede provenir de una norma, ya que si existiera una norma $\|\cdot\|$ tal que $d(x, y) = \|x - y\|$, entonces para cualquier $x \neq y$ tendríamos $\|x - y\| = 1$. Sin embargo, para cualquier $x \neq y$, $\|2(x - y)\| = 2\|x - y\| = 2$, lo cual contradice la definición de la distancia discreta. □

Ejercicio 4. Sea E un espacio normado. Probar que si $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy de elementos no nulos de E que no converge a cero, entonces $\left\{ \frac{x_n}{\|x_n\|} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es también una sucesión de Cauchy.

Demostración. Sea $\epsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\|x_n - x_m\| < \epsilon \quad \forall n, m \geq n_0$$

Luego,

$$\begin{aligned}
\left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} \right\| &= \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} + \frac{x_n}{\|x_m\|} - \frac{x_n}{\|x_m\|} \right\| \\
&\leq \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_n}{\|x_m\|} \right\| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \left\| \frac{x_n \cdot \|x_m\| - x_n \cdot \|x_n\|}{\|x_n\| \cdot \|x_m\|} \right\| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \frac{1}{\|x_n\| \|x_m\|} \cdot \|x_n \cdot (\|x_n\| - \|x_m\|)\| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \frac{1}{\|x_n\| \|x_m\|} \cdot \|x_n\| \cdot |\|x_n\| - \|x_m\|| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \frac{|\|x_n\| - \|x_m\||}{\|x_m\|} + \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} \\
&\leq \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} + \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} \\
&= 2 \cdot \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} \\
&\leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{\|x_m\|}.
\end{aligned}$$

Además, como $\|x_n\| \not\rightarrow 0$, existe $c > 0$ tal que $\|x_n\| \geq c$ para todo n suficientemente grande. Por lo tanto, para n, m suficientemente grandes,

$$\left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} \right\| \leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{\|x_m\|} \leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{c}.$$

Como $\epsilon > 0$ era arbitrario, se concluye que $\left\{ \frac{x_n}{\|x_n\|} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy. $\square$

Ejercicio 5. Probar que cada uno de los siguientes espacios es normado sobre $\mathbb{R}$ y decidir si es un espacio de Banach.

- a) $\ell^1 := \{x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ tales que } \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ con $\|x\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$.
- b) $\ell^\infty := \{x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ tales que } \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ con $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$.
- c) $c_0 := \{x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ que convergen a } 0\}$ con $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$.
- d) $B[a, b] = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ acotadas}\}$ con $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.
- e) $C[a, b]$ con $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.
- f) $C^1[a, b] := \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ tales que } f \text{ es de clase } C^1\}$ con

$$\|f\| = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| + \sup_{x \in [a, b]} |f'(x)|.$$

Demostración. a) **Espacio ℓ^1 :**

Es espacio normado: Para $x, y \in \ell^1$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

- Positividad: $\|x\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n| \geq 0$. Si $\|x\|_1 = 0$, entonces cada término $|x_n| = 0$, lo que implica $x_n = 0$ para todo n , luego $x = 0$.
- Homogeneidad: $\|\alpha x\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |\alpha x_n| = |\alpha| \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n| = |\alpha| \|x\|_1$.

- Desigualdad triangular: $\|x + y\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n + y_n| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} (|x_n| + |y_n|) = \|x\|_1 + \|y\|_1$.

Es de Banach: Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en ℓ^1 , donde $x_n = (x_n^{(1)}, x_n^{(2)}, \dots)$. Para todo $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m, n \geq N$,

$$\|x_n - x_m\|_1 = \sum_{k \in \mathbb{N}} |x_n^{(k)} - x_m^{(k)}| < \epsilon.$$

En particular, para cada $k \in \mathbb{N}$ fijo, $|x_n^{(k)} - x_m^{(k)}| < \epsilon$, por lo que $\{x_n^{(k)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ y converge a un límite $x^{(k)} \in \mathbb{R}$. Sea $x := (x^{(1)}, x^{(2)}, \dots)$.

Dado $\epsilon > 0$, tomamos N de la condición de Cauchy. Para cualquier entero $M \geq 1$ y $m, n \geq N$:

$$\sum_{k=1}^M |x_n^{(k)} - x_m^{(k)}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |x_n^{(k)} - x_m^{(k)}| < \epsilon.$$

Tomando el límite cuando $m \rightarrow \infty$, obtenemos:

$$\sum_{k=1}^M |x_n^{(k)} - x^{(k)}| \leq \epsilon.$$

Como esto vale para cualquier M , tomamos el supremo (o límite cuando $M \rightarrow \infty$) para obtener $\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^{(k)} - x^{(k)}| \leq \epsilon$. Esto prueba que $x_n - x \in \ell^1$ (y por ende $x \in \ell^1$) y que $x_n \rightarrow x$ en la norma $\|\cdot\|_1$. Luego, ℓ^1 es de Banach.

b) **Espacio ℓ^∞ :**

Es espacio normado: Para $x, y \in \ell^\infty$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

- Positividad: $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| \geq 0$. Si $\|x\|_\infty = 0$, entonces $\sup |x_n| = 0 \implies x_n = 0$ para todo $n \implies x = 0$.
- Homogeneidad: $\|\alpha x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |\alpha x_n| = |\alpha| \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| = |\alpha| \|x\|_\infty$.
- Desigualdad triangular: $\|x + y\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n + y_n| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} (|x_n| + |y_n|) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| + \sup_{n \in \mathbb{N}} |y_n| = \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$.

Es de Banach: Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sucesión de Cauchy en ℓ^∞ . Para cada coordenada k , $\{x_n^{(k)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ y converge a $x^{(k)}$. Dado $\epsilon > 0$, existe N tal que para $n, m \geq N$, $|x_n^{(k)} - x_m^{(k)}| < \epsilon$ para todo k . Tomando límite con $m \rightarrow \infty$ se obtiene $|x_n^{(k)} - x^{(k)}| \leq \epsilon$ para todo k , lo que implica $\sup_k |x_n^{(k)} - x^{(k)}| \leq \epsilon$. Esto prueba que $x \in \ell^\infty$ y que hay convergencia en norma.

c) **Espacio c_0 :**

Es espacio normado: Las propiedades de norma se heredan directamente de ℓ^∞ , al ser $c_0 \subset \ell^\infty$.

Es de Banach: Basta notar que c_0 es un subespacio cerrado de ℓ^∞ . Si $x_n \rightarrow x$ en ℓ^∞ y cada $x_n \in c_0$, para cada $\epsilon > 0$ existe N tal que $\|x_N - x\|_\infty < \epsilon/2$. Como $x_N \in c_0$, existe M tal que para $k \geq M$, $|x_N^{(k)}| < \epsilon/2$. Luego $|x^{(k)}| \leq |x^{(k)} - x_N^{(k)}| + |x_N^{(k)}| < \epsilon$, mostrando que $x \in c_0$. Todo subespacio cerrado de un Banach es Banach.

d) **Espacio $B[a, b]$:**

Es espacio normado:

- Positividad: $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \geq 0$. Si es 0, $f(x) = 0$ para todo $x \implies f = 0$.
- Homogeneidad: $\|\alpha f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |\alpha f(x)| = |\alpha| \|f\|_\infty$.
- Desigualdad triangular: Idéntica a ℓ^∞ , usando el supremo sobre $[a, b]$.

Es de Banach: Si $\{f_n\}$ es de Cauchy en $B[a, b]$, converge puntualmente a una función $f(x)$. Por el mismo argumento que en ℓ^∞ , la convergencia es uniforme ($\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$). Al ser cada f_n acotada y converger uniformemente, f resulta acotada, por lo que $B[a, b]$ es completo.

e) **Espacio $C[a, b]$:**

Es espacio normado: Se hereda al ser un subespacio de $B[a, b]$ (toda función continua en un compacto es acotada).

Es de Banach: $C[a, b]$ es cerrado en $B[a, b]$. El límite uniforme de una sucesión de funciones continuas es continuo, por lo que si $f_n \rightarrow f$ en norma infinito con $f_n \in C[a, b]$, entonces $f \in C[a, b]$. Por lo tanto, es completo.

f) **Espacio $C^1[a, b]$:**

Es espacio normado:

- Positividad: $\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \geq 0$. Si $\|f\| = 0$, entonces en particular $\|f\|_\infty = 0 \implies f = 0$.
- Homogeneidad: $\|\alpha f\| = \|\alpha f\|_\infty + \|\alpha f'\|_\infty = |\alpha| \|f\|_\infty + |\alpha| \|f'\|_\infty = |\alpha| \|f\|$.
- Desigualdad triangular: $\|f + g\| = \|f + g\|_\infty + \|f' + g'\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty + \|f'\|_\infty + \|g'\|_\infty = \|f\| + \|g\|$.

Es de Banach: Sea $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $C^1[a, b]$. Dado $\epsilon > 0$, existe N tal que para $m, n \geq N$:

$$\|f_n - f_m\|_{C^1} = \|f_n - f_m\|_\infty + \|f'_n - f'_m\|_\infty < \epsilon$$

Esto implica que $\|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon$ y $\|f'_n - f'_m\|_\infty < \epsilon$.

Por lo tanto, $\{f_n\}$ y $\{f'_n\}$ son sucesiones de Cauchy en el espacio de Banach $C[a, b]$ (con la norma infinito). Existen entonces funciones $f, g \in C[a, b]$ tales que $f_n \rightarrow f$ y $f'_n \rightarrow g$ uniformemente.

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, para cada $x \in [a, b]$:

$$f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt$$

Como la convergencia $f'_n \rightarrow g$ es uniforme en $[a, b]$, podemos intercambiar límite e integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f'_n(t) dt \implies f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt$$

Al ser g continua, f es derivable con derivada $f' = g$. Como $g \in C[a, b]$, concluimos que $f \in C^1[a, b]$. Finalmente, $\|f_n - f\|_{C^1} = \|f_n - f\|_\infty + \|f'_n - g\|_\infty \rightarrow 0 \therefore$ el espacio es completo. □

Ejercicio 6. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio vectorial normado. Demostrar que son equivalentes:

- (a) E es un espacio de Banach.
- (b) La bola cerrada $B_E = \{x \in E : \|x\| \leq 1\}$ es completa.
- (c) La cáscara $S_E = \{x \in E : \|x\| = 1\}$ es completa.
- (d) Para toda sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ tal que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\| < \infty$, se tiene que $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n$ converge en E .

Demostración. $a \iff d$ está demostrado en la **Proposición 1.1.13** del apunte de Demetrio. Haremos el siguiente camino para demostrar las equivalencias: $a \iff b$ y $b \implies c$.

Veamos que $a \implies b$, sea E un espacio de Banach i.e completo y normado es claro que B_E es normado. Veamos que es completo, para ello, dada una sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset B_E$ de Cauchy, veamos que tiene límite en

B_E . Como $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset B_E \subseteq E$ y E es completo sabemos que $x_n \rightarrow x \in E$, queremos ver que efectivamente $x \in B_E$, es decir, que $\|x\| \leq 1$. Como $\|x_n\| \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y la norma es una función continua, vale que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\|.$$

Por lo tanto, $\|x\| \leq 1$ y $x \in B_E$, lo que demuestra que B_E es completo.

Para la recíproca, supongamos que B_E es completo. Sea $\{x_n\}_{n \geq 1}$ de Cauchy en E , supongamos sin pérdida de generalidad que no tiene términos nulos y $x_n \not\rightarrow 0$. Por el **Ejercicio 4** la sucesión $\left\{\frac{x_n}{\|x_n\|}\right\}_{n \geq 1}$ es de Cauchy en B_E y, por lo tanto, $\frac{x_n}{\|x_n\|} \rightarrow L \in B_E$. Como x_n es de Cauchy, $\|x_n\|$ también lo es pues es una sucesión de números reales, por lo tanto $\|x_n\| \rightarrow \ell$ para algún $\ell \geq 0$. Así, $x_n = \|x_n\| \frac{x_n}{\|x_n\|} \rightarrow \ell L \in E$, lo que demuestra que E es completo.

Que $b \implies c$ sale de que S_E es un subespacio cerrado de B_E y, por lo tanto, completo. $\square$

Ejercicio 7. Probar que si $(E, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado y F es un subespacio de E , entonces $\overline{F}$ también lo es.

Demostración. Para demostrar que $\overline{F}$ es subespacio debemos ver que:

- a) $0 \in \overline{F}$.
- b) Si $x, y \in \overline{F}$, entonces $x + y \in \overline{F}$.
- c) Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $x \in \overline{F}$, entonces $\alpha x \in \overline{F}$.

La primera propiedad sale trivialmente pues $0 \in F \subseteq \overline{F}$.

Para ver que la suma es cerrada separemos en casos, recordemos que la clausura de un conjunto es el conjunto unión sus puntos de acumulación, por lo tanto puede ocurrir que $x, y \in F$, $x \in F$ e $y \in \overline{F} \setminus F$ o $x, y \in \overline{F} \setminus F$. Si $x, y \in F$ es claro que $x + y \in F \subseteq \overline{F}$, si $x \in F$ e $y \in \overline{F} \setminus F$, entonces y es un punto de acumulación de F y por lo tanto $x + y$ también lo es, así que $x + y \in \overline{F}$. Finalmente, si $x, y \in \overline{F} \setminus F$, ambos son puntos de acumulación de F y por lo tanto $x + y$ también lo es, así que $x + y \in \overline{F}$. La propiedad de la multiplicación por escalares se demuestra de manera análoga considerando los casos $x \in F$ y $x \in \overline{F} \setminus F$.

Por lo tanto, $\overline{F}$ es un subespacio de E . $\square$

Ejercicio 8. Sean $N_1(\cdot)$ y $N_2(\cdot)$ dos normas sobre un espacio vectorial E . Probar que las siguientes expresiones definen una norma sobre E .

- a) $\alpha N_1(\cdot) + \beta N_2(\cdot)$ para $\alpha, \beta > 0$.
- b) $\max\{N_1(\cdot), N_2(\cdot)\}$.

Calcular la bola unidad cerrada en $\mathbb{R}^2$ de la norma $\|\cdot\| := \frac{1}{2} \|\cdot\|_1 + \frac{1}{2} \|\cdot\|_\infty$. Graficar.

Demostración. Veamos que $\alpha N_1(\cdot) + \beta N_2(\cdot)$ define una norma. Sean $x, y \in E$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces:

- a) $(\alpha N_1 + \beta N_2)(x) = \alpha N_1(x) + \beta N_2(x) \geq 0$, y es cero si y sólo si $x = 0$.
- b) $(\alpha N_1 + \beta N_2)(x + y) = \alpha N_1(x + y) + \beta N_2(x + y) \leq \alpha(N_1(x) + N_1(y)) + \beta(N_2(x) + N_2(y)) = (\alpha N_1 + \beta N_2)(x) + (\alpha N_1 + \beta N_2)(y)$.
- c) $(\alpha N_1 + \beta N_2)(\lambda x) = \alpha N_1(\lambda x) + \beta N_2(\lambda x) = |\lambda|(\alpha N_1(x) + \beta N_2(x)) = |\lambda|(\alpha N_1 + \beta N_2)(x)$.

Luego, $\alpha N_1 + \beta N_2$ cumple con las tres propiedades de una norma, y por lo tanto es una norma sobre E .

Veamos ahora que $\max\{N_1(\cdot), N_2(\cdot)\}$ define una norma. Sean $x, y \in E$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces:

- a) $\max\{N_1(x), N_2(x)\} \geq 0$, y es cero si y sólo si $x = 0$.

b)

$$\begin{aligned}\max\{N_1(x+y), N_2(x+y)\} &\leq \max\{N_1(x) + N_1(y), N_2(x) + N_2(y)\} \\ &\leq \max\{N_1(x), N_2(x)\} + \max\{N_1(y), N_2(y)\}\end{aligned}$$

$$c) \max\{N_1(\lambda x), N_2(\lambda x)\} = \max\{|\lambda|N_1(x), |\lambda|N_2(x)\} = |\lambda| \max\{N_1(x), N_2(x)\}.$$

Luego, $\max\{N_1(\cdot), N_2(\cdot)\}$ cumple con las tres propiedades de una norma, y por lo tanto es una norma sobre E .

Finalmente, para la norma $\|\cdot\| := \frac{1}{2} \|\cdot\|_1 + \frac{1}{2} \|\cdot\|_\infty$, basta notar que es de la forma $\alpha N_1 + \beta N_2$ con $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$, que ya vimos que define una norma. La bola unidad cerrada en $\mathbb{R}^2$ de esta norma se puede calcular considerando los puntos (x, y) tales que $\frac{1}{2}(|x| + |y|) + \frac{1}{2} \max\{|x|, |y|\} \leq 1$. Esto se puede simplificar a $|x| + |y| \leq 2$ y $\max\{|x|, |y|\} \leq 2$, y graficando se obtiene un octógono centrado en el origen con vértices en $(\pm 2, 0)$, $(0, \pm 2)$ y $(\pm 1, \pm 1)$. $\square$

Ejercicio 9. Sea E un espacio normado no trivial. Probar:

- a) La clausura de cualquier bola abierta es la correspondiente bola cerrada.
- b) El diámetro de $B(a; r)$ es $2r$.
- c) Si $B(a; r) \subset B(b; s)$, entonces $r \leq s$ y $\|a - b\| \leq s - r$.

Demostración. Sea E un EN no trivial.

- a) Veamos que $\overline{B(a; r)} = \{x \in E : \|x - a\| \leq r\}$. Primero probaremos la inclusión $\subseteq$. Sea $x \in \overline{B(a; r)}$. Entonces existe una sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset B(a; r)$ tal que $x_n \rightarrow x$ (es decir, $\|x_n - x\| \rightarrow 0$). Por la desigualdad triangular:

$$\|x - a\| \leq \|x - x_n\| + \|x_n - a\| < \|x - x_n\| + r$$

Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, se obtiene $\|x - a\| \leq r$. Por lo tanto, $\overline{B(a; r)} \subseteq \{x \in E : \|x - a\| \leq r\}$.

Para la inclusión $\supseteq$, sea $x \in E$ tal que $\|x - a\| \leq r$. Si $\|x - a\| < r$, entonces trivialmente $x \in B(a; r) \subseteq \overline{B(a; r)}$. Si $\|x - a\| = r$, definimos la sucesión $x_n = a + \left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - a)$ para $n \geq 1$. Notemos que:

$$\|x_n - a\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \|x - a\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right) r < r$$

Luego, $x_n \in B(a; r)$ para todo n . Además, $\|x_n - x\| = \frac{1}{n} \|x - a\| \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Como construimos una sucesión en la bola abierta que converge a x , concluimos que $x \in \overline{B(a; r)}$.

- b) Dados $x, y \in B(a; r)$, por desigualdad triangular tenemos:

$$\|x - y\| \leq \|x - a\| + \|a - y\| < r + r = 2r$$

Esto implica que $\text{diam}(B(a; r)) = \sup_{x, y \in B(a; r)} \|x - y\| \leq 2r$.

Para ver la otra desigualdad, como el espacio E es no trivial, existe un vector $v \in E$ con $v \neq 0$. Sea $u = \frac{v}{\|v\|}$. Para cualquier $0 < t < r$, consideramos los puntos:

$$x_t = a + tu \quad \text{y} \quad y_t = a - tu$$

Como $\|x_t - a\| = t < r$ y $\|y_t - a\| = t < r$, ambos puntos pertenecen a $B(a; r)$. La distancia entre ellos es $\|x_t - y_t\| = \|2tu\| = 2t$. Como el diámetro es el supremo de las distancias, $\text{diam}(B(a; r)) \geq 2t$ para todo $t \in (0, r)$. Haciendo $t \rightarrow r^-$, obtenemos $\text{diam}(B(a; r)) \geq 2r$, de donde se concluye la igualdad.

- c) Si $a = b$, la hipótesis es $B(a; r) \subset B(a; s)$, lo cual implica directamente (tomando puntos a distancia $t < r$) que $r \leq s$. Además, $\|a - b\| = 0 \leq s - r$.

Si $a \neq b$, consideramos el vector unitario $u = \frac{a-b}{\|a-b\|}$ que apunta desde b hacia a . Para cualquier $t \in (0, r)$, definimos el punto:

$$x_t = a + tu$$

Es claro que $\|x_t - a\| = t < r$, luego $x_t \in B(a; r)$. Por hipótesis, $x_t \in B(b; s)$, por lo que $\|x_t - b\| < s$. Calculamos esta distancia:

$$\begin{aligned} x_t - b &= (a - b) + t \frac{a - b}{\|a - b\|} \\ &= (a - b) \left(1 + \frac{t}{\|a - b\|} \right) \end{aligned}$$

Tomando norma a ambos lados, como el escalar en el paréntesis es positivo:

$$\|x_t - b\| = \|a - b\| \left(1 + \frac{t}{\|a - b\|} \right) = \|a - b\| + t$$

Sustituyendo esto en la condición $\|x_t - b\| < s$, obtenemos:

$$\|a - b\| + t < s$$

Como esta desigualdad vale para todo $0 < t < r$, podemos tomar el límite cuando $t \rightarrow r^-$, lo que resulta en:

$$\|a - b\| + r \leq s$$

Reordenando los términos se obtiene la desigualdad buscada $0 \leq \|a - b\| \leq s - r$.

□

Ejercicio 10. Demostrar que en un espacio de Banach, toda sucesión encajada de bolas cerradas $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ no vacías con radios $r_n \rightarrow 0$, tiene un punto en común.

Demostración. Sea $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión encajada de bolas cerradas no vacías con radios $r_n \rightarrow 0$. Es decir,

$$B_1 \supset B_2 \supset \cdots \supset B_n \supset \cdots, \quad B_n = \overline{B(a_n; r_n)} \neq \emptyset, \quad r_n \rightarrow 0.$$

Como cada B_n es no vacía, podemos elegir un punto $x_n \in B_n$. La sucesión x_n es de Cauchy, ya que para $m > n$,

$$\|x_m - x_n\| \leq \|x_m - a_m\| + \|a_m - a_n\| + \|a_n - x_n\| \leq r_m + \|a_m - a_n\| + r_n.$$

Como $r_n \rightarrow 0$, basta mostrar que $\|a_m - a_n\| \rightarrow 0$. Pero $a_n \in B_n \subset B_m$ para $m \leq n$, luego $\|a_n - a_m\| \leq r_m \rightarrow 0$. Por lo tanto, x_n es de Cauchy y converge a algún punto $x \in E$. Finalmente, como B_n son cerradas y $x_n \in B_n$, se tiene $x \in B_n$ para todo n , es decir, x es un punto en común. □

Ejercicio 11. En el espacio ℓ^∞ definimos

$$\|x\|_Q = \limsup_{n \rightarrow \infty} |x_n|, \quad x = (x_n) \in \ell^\infty.$$

- Probar que $\|\cdot\|_Q$ es una seminorma en ℓ^∞ y $\|x\|_Q = 0$ si y sólo si $x \in c_0$.
- Probar que $\|x\|_Q = \|Qx\|$ para todo $x \in \ell^\infty$, donde $Q : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty/c_0$ denota la proyección al cociente, y probar que este espacio está equipado con la norma cociente.

Demostración.

□

Ejercicio 12. Sean E un espacio normado y F un subespacio de E . Probar que si F y E/F son completos, entonces E también lo es.

Demostración.

□

Ejercicio 13. Sean E un espacio normado y F un subespacio cerrado de E . Probar:

- a) Si E es separable entonces también lo es E/F .
- b) Si F y E/F son separables entonces también lo es E .
- c) Dar un ejemplo en el cual E/F sea separable pero E no.

Demostración.

□

Ejercicio 14. Sean E un espacio vectorial normado y $F \subset E$ un subespacio de dimensión finita. Probar que para todo $x \notin F$ existe $y_0 \in F$ que realiza la distancia, es decir,

$$\|x - y_0\| = \inf_{y \in F} \|x - y\|.$$

Demostración.

□

Ejercicio 15. Dar un ejemplo de dos subespacios cerrados de un espacio de Banach tal que su suma no sea cerrada.

Demostración.

□