

Pacient: [REDACTED]
 Sexe: M
 Sollicitant: [REDACTED]
 Servei: ME
 N° prestació /n° Lab Extern:
 Centre d'extracció autoritzat: 8227 CERBA PARIS Barcelona

N° Laboratori: 700044998
 Historia clínica:
 Procedència: Centre d'extracció extern
 Data finalització:
 Data sol·licitud: 7/8/25

Hematologia

Hematimetria i citologia sang perifèrica

Hemograma

	Resultat	Unitats	Intervals de referència
San—Eritròcits; c.nom.	5.00	x10E12/L	4.30 - 5.60
San—Hemoglobina; c.massa	15.6	g/dL	13 - 16.5
San—Hematocrit	47.5	%	40.0 - 50.0
San—Eritròcits; vol.entític (VCM)	96	fL	84 - 97
Eritrocits (Sang)—Hemoglobina; massa entítica (HCM)	31.5	pg	27 - 32
San—Hemoglobina (CHCM)	33	g/dL	31 - 35
San—Volum eritrocític; ample rel.	* 14.2	%	12.0 - 14.0
San—Leucòcits; c.nom.	5.7	x10E9/L	3.9 - 9.5
San—Neutròfils(segmentats); c.nom.	3.50	x10E9/L	1.50 - 5.70
San—Neutròfils(segmentats); fr.nom. (%)	60.7	%	37.1 - 68.4
San—Limfòcits; c.nom.	1.40	x10E9/L	1.30 - 3.40
San—Limfòcits; fr.nom. (%)	25.2	%	21.0 - 50.0
San—Monòcits; c.nom.	0.50	x10E9/L	0.31 - 0.92
San—Monòcits; fr.nom. (%)	9.2	%	5.1 - 11.2

Pacient: [REDACTED]
Historia cl

Nº Laboratori: 700044998
Data finalització:

	Resultat	Unitats	Intervals de referència	
San—Eosinòfils; c.nom.	0.20	x10E9/L	0.00	- 0.39
San—Eosinòfils; fr.nom. (%)	3.6	%	0.0	- 6.6
San—Basòfils; c.nom.	0.10	x10E9/L	0.00	- 0.50
San—Basòfils; fr.nom. (%)	1.3	%	0.0	- 1.3
San—Plaquetes; c.nom.	294	x10E9/L	149	- 303
San—Plaquetes; vol.entític (VPM)	8.8	fL	7.0	- 15.0

Pacient: [REDACTED]
Historia cl

Nº Laboratori: 700044998
Data finalització:

	Resultat	Unitats	Intervals de referència
Hemostàsia			
Hemostàsia general			
Pla—Dímer D de la fibrina; c.massa (Immunoquímica)	<500	ng/mL	<= 500

	Resultat	Unitats	Intervals de referència
Bioquímica			
Bioquímica general			
Perfil ions			
Sèrum—Sodi; c.subst.	141	mmol/L	136 - 146
Sèrum—Potassi; c.subst.	4.80	mmol/L	3.50 - 5.10
Sèrum—Clorur; c.subst.	102	mmol/L	101 - 109
Sèrum—Glucosa; c.subst.	5.4 97.3	mmol/L mg/dL	4.1 - 6.1 73.9 - 109.9
	(4,1 - 6,1) mmol/L (74 - 110) mg/dL Valor discriminante de diabetes mellitus: 7,0 mmol/L (126 mg/dL)		
Sèrum—Creatinina; c.subst.	100 1.1	µmol/L mg/dL	64 - 104 0.7 - 1.1
Sèrum—Urea; c.subst.	* 8.8 52.9	mmol/L mg/dL	2.8 - 7.2 16.8 - 43.2
Sèrum—filtrat glomerular; vol.(equació CKD-EPI)	76	mL/min/1,73 m2	60 - 999
	Según ecuación CKD-EPI creatinina (2009). Valor discriminante >60 mL/min/1.73m2. (Multiplicar por 1.159 si es de raza negra)		
	> 90 Lesión renal con filtrado glomerular normal o aumentado 60 - 89 Lesión renal con disminución leve del filtrado glomerular 30 - 59 Disminución moderada del filtrado glomerular 15 - 29 Disminución severa del filtrado glomerular < 15 Fallo renal o diálisis		
Sèrum—Alanina-aminotransferasa (ALT / GPT); c.cat.	15	U/L	<= 50
Sèrum—Aspartat-aminotransferasa (AST / GOT); c.cat.	27	U/L	<= 50
Sèrum—gamma-Glutamiltransferasa (GGT); c.cat.	27	U/L	<= 55
Sèrum—Fosfatasa alcalina; c.cat.	75	U/L	43 - 115
Sèrum—Proteïna; c.massa	65.1	g/L	57.0 - 83.0
Sèrum—Ferro (II+III); c.subst.	27 151	µmol/L µg/dL	12 - 31 65 - 175
Sèrum—Ferritina; c.massa	82	ng/mL	20 - 250

	Resultat	Unitats	Intervals de referència
Sèrum—Transferrina; c.subst.(CRM 470)	241	mg/dL	200 - 360
Sèrum—Proteïna C reactiva; c.massa	1.0	mg/L	<= 5.0
Sèrum—Urat; c.subst.	425.0 7.2	µmol/L mg/dL	208.3 - 428.4 3.5 - 7.3

Lípids i risc cardiovascular

Sèrum—Colesterol; c.subst.	4.88 188	mmol/L mg/dL	<= 5.17 <= 200
Valor deseable en adultos: < 5.17 mmol/L (200 mg/dL)			
Sèrum—Colesterol LDL; c.subst. (segons Friedewald)	* 3.09 119	mmol/L mg/dL	<= 3.00 <= 116
Valores recomendados según riesgo cardiovascular:			
- Prevención secundaria y riesgo cardiovascular muy alto: < 1.4 mmol/L (55 mg/dL) - Riesgo cardiovascular alto: < 1.8 mmol/L (70 mg/dL) - Riesgo cardiovascular moderado: < 2.6 mmol/L (100 mg/dL) - Riesgo cardiovascular bajo: < 3 mmol/L (116 mg/dL)			
Sèrum—Colesterol HDL; c.subst.	1.46 56	mmol/L mg/dL	>= 1.03 >= 40
Valores deseables en adultos:			
- Mujeres: > 1.29 mmol/L (> 50 mg/dL) - Hombres: > 1.03 mmol/L (> 40 mg/dL)			
Sèrum—Triglicèrids; c.subst.	0.77 68	mmol/L mg/dL	<= 1.69 <= 150
Valor deseable en adultos:			
- Ayunas: < 1.69 mmol/L (150 mg/dL) - No ayuno: < 1.97 mmol/L (175 mg/dL)			

Estudi funció tiroïdal

Sèrum—Tirotropina (TSH); c.sust.arb.	1.25	µUI/mL	0.38 - 5.33
Mujeres gestantes 1er trimestre: 0.05 - 3.7 µUI/mL gestantes 2do trimestre: 0.31 - 4.35 µUI/mL gestantes 3er trimestre: 0.41 - 5.18 µUI/mL			

Vitamines

Sèrum—Cobalamines (Vit B12); c.subst.	448	pg/mL	180 - 914
Sèrum—Folats; c.subst.	12.6	ng/mL	4.0 - 19.9

	Resultat	Unitats	Intervals de referència
Marcadors tumorals			
Sèrum—Antigen específic de la pròstata; c.massa	0.12	ng/mL	<= 3.10
	No procede la determinacion de PSA libre debido a la concentracion de PSA total.		

La eficiencia diagnóstica de los Marcadores Tumorales viene limitada por la sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos. Actualmente, su máxima utilidad reside en la monitorización de la efectividad del tratamiento.

Estudi bioquímic i microscòpic de l'orina

Ori—Sediment urinari; microscopia

Ori—Eritrocits; c.nom.	0	Cél/campo	<= 5
Ori—Leucòcits; c.nom.	0	Cél/campo	<= 9
Ori—Bacteris; c.nom.	Ausencia		
Ori—Fongs; c.arb.	Ausencia		
Ori—Comentari urocultiu	No procede cultivo por sedimento no patológico. El diagnóstico de infección urinaria se considera poco probable. Si persiste la sintomatología, se recomienda remitir nueva muestra para su valoración.		


	Resultat	Unitats	Intervals de referència
--	----------	---------	-------------------------

Immunologia

Estudi del proteinograma en sèrum

Proteinograma

Sèrum—Albúmina; fr.massa (%)	67.1	%	55.8 - 66.1
Sèrum—Albúmina; c.massa	43.7	g/L	40.2 - 47.6
Sèrum—alfa1-Globulines; fr.massa (%)	2.6	%	2.9 - 4.9
Sèrum—alfa1-Globulines; c.massa	1.7	g/L	2.1 - 3.5
Sèrum—alfa2-Globulines; fr.massa (%)	10.4	%	7.1 - 11.8
Sèrum—alfa2-Globulines; c.massa	6.8	g/L	5.1 - 8.5
Sèrum—beta1-Globulines; fr.massa (%)	5.8	%	4.7 - 7.2
Sèrum—beta1-Globulines; c.massa	3.8	g/L	3.4 - 5.2
Sèrum—beta2-Globulines; fr.massa (%)	4.9	%	3.2 - 6.5
Sèrum—beta2-Globulines; c.massa	3.2	g/L	2.3 - 4.7
Sèrum—gamma-Globulines; fr.massa (%)	9.2	%	11.1 - 18.8
Sèrum—gamma-Globulines; c.massa	6.0	g/L	8.0 - 13.5
Sèrum—Quient A/G	2.04		0.99 - 1.81
Sèrum—Comentari Interpretatiu	No se observa componente monoclonal.		



	Resultat	Unitats	Intervals de referència
Serologia			
Sèrum—Hepatitis B: antigen superfície (HbsAg) (CLIA)	Negativo		
Sèrum—Hepatitis C, anticossos IgG (CLIA)	Negativo		
Sèrum—Treponema pallidum, anticossos específics totals (CLIA)	<0.1		
	Negativo		
Sèrum—VIH 1 i 2, anticossos i antigen p24 (CLIA)	0.54 Negativo	S/CO	<= 0.99

Pacient: [REDACTED]
Historia cl

Nº Laboratori: 700044998
Data finalització:

Resultat	Unitats	Intervals de referència
----------	---------	-------------------------

Microbiologia

Microbiologia orina

Urocultiu - Micció espontània

Urocultiu convencional

No procede cultivo por sedimento no patológico. El diagnóstico de infección urinaria se considera poco probable.

Facultatiu Responsables: Dra. Beatriz Candás, Dra. Agustina Cía, Dr. Jaume Llaberia, Dr. Mario Ros, Dr. Javier Sánchez i Dra. Indira Bhambi

Poden contactar amb el Laboratori Clínic per a qualsevol dubte o aclariment, indicant l'especialitat del professional que voleu consultar.