

GRUPOS SU(2) - ISOSPIN

Definición: H es invariante bajo transformación S si $[S, H] = 0 \iff SHS^\dagger = H$. Implica conservación de números cuánticos (Teorema de Noether para continuas).

PARIDAD (P) (REFLEXIÓN ESPACIAL) - J^P ($J \neq \text{spin}$, $P \equiv \text{paridad}$)

Operador Unitario y Hermítico ($P^\dagger = P^{-1} = P \rightarrow P^2 = \mathbb{I}$). Inversión de coords espaciales. $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}, \quad t \rightarrow t \quad \vec{S} \rightarrow \vec{S}, \quad \lambda \rightarrow -\lambda \quad \vec{p} \rightarrow -\vec{p}$ (Vector) $\vec{L} \rightarrow \vec{L}$ (Pseudovector)

- **Operador:** $P|a\rangle = \eta_P|a\rangle$ con $\eta_P = \pm 1$ $P = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$.
- **Bosones:** Partícula y antipartícula tienen misma paridad. $\eta_a \eta_{\bar{a}} = +1$.
- **Fermiones:** Partícula y antipartícula tienen paridad opuesta. $\eta_a \eta_{\bar{a}} = -1$.
- **Conservación:** Multiplicativa. $\eta_{\text{tot}} = \prod \eta_i$. Sistemas compuestos: $\eta_{\text{tot}} = (\prod \eta_i)(-1)^L$.

En **Espinores de Dirac:** Transformación del campo: $\Psi'(t, -\vec{x}) = \gamma^0 \Psi(t, \vec{x})$.

CONJUGACIÓN DE CARGA (C)

Operador Unitario y Hermítico ($C^\dagger = C^{-1} = C \rightarrow C^2 = \mathbb{I}$). Partícula $\leftrightarrow$ antipartícula. No afecta espín ($\vec{S}$) ni momento ($\vec{p}$), pero invierte cargas ($Q, B, L, \dots$).

- **Operador:** $C|p, \lambda, Q\rangle = \eta_C|p, \lambda, -Q\rangle$.
- **Autovalores:** Solo definidos para sistemas totalmente neutros. En ese caso, $\eta_C = \pm 1$.
- **Sistemas $f\bar{f}$:** La paridad C del par es $\eta_C = (-1)^L (-1)^S$.
- **Conservación:** Multiplicativa solo para sistemas de bosones neutros ($\eta_{\text{tot}} = \prod \eta_i$).

En **Espinores:** Cambia helicidad y quiralidad. $\Psi^C = i\gamma^2 \gamma^0 \bar{\Psi}^T$.

OPERADOR G-paridad

Operador Unitario ($G^\dagger = G^{-1}$) y multiplicativo.

- **Operador:** $G = CR \quad R = \exp(i\pi I_2)$ = antiadiag(1, -1, 1). Conservado en strong.

Para mesones neutros: $G = C(-1)^I$.

INVERSIÓN TEMPORAL (T)

Operador Anti-unitario ($T^\dagger = T^{-1}$ y $\langle T\psi|T\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$). TMA de Kramers: $T^2 = (-1)^{2J}$. $t \rightarrow -t, \quad \vec{x} \rightarrow \vec{x} \quad \vec{p} \rightarrow -\vec{p}, \quad \vec{S} \rightarrow -\vec{S} \quad \lambda \rightarrow \lambda$.

Invariancia T implica reversibilidad de las amplitudes de scattering ($\mathcal{M}_{fi} = \mathcal{M}_{i'f'}$).

- **Operador:** $T|p, \lambda, in\rangle = \eta_C| -p, \lambda, out\rangle$ con $|\eta_T| = 1$. $T = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$.
- **Operador:** $T = UK$ (Anti-unitario: $\langle T\psi|T\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$)
- **Transformación:** $T|\vec{p}, s_z\rangle = \eta_T| -\vec{p}, -s_z\rangle$
- **Invariancia:** No genera carga multiplicativa.

AUTOVALORES DE SIMETRÍA (P y C)

Símbolo	P	C	G	Notas
BOSONES				
π^0	-1	+1	-1	Pseudoscalar; $G = C(-1)^I$.
$\pi^\pm$	-1	-	-1	$C \pi^\pm\rangle \propto \pi^\mp\rangle$; G es igual para el multiplete.
γ	-1	-1	-	Vectorial; la interacción EM rompe el isospín.
$n\gamma$	-	$(-1)^n$	-	Teorema de Furry.
FERMIONES				
p	+1	-	-	Convención usual; $B = 1 \implies$ no es autoestado.
$\bar{p}$	-1	-	-	Opuesta al protón; $B = -1$.
n	+1	-	-	$C n\rangle \propto \bar{n}\rangle$; $B = 1$.
$\bar{n}$	-1	-	-	Opuesta al neutrón; $B = -1$.
$u, d, \dots$	+1	-	-	Quarks; $B = 1/3$.
$\bar{u}, d, \dots$	-1	-	-	Antiquarks; $B = -1/3$.

TEOREMA CPT

Any local, Lorentz-invariant, Hermitian QFT is invariant under the CPT transformation.

Consecuencias partícula/antipartícula: $m = \bar{m} \quad \tau = \bar{\tau} \quad \mu = -\bar{\mu}$.

$\vec{x} \rightarrow -\vec{x}, \quad t \rightarrow -t \quad \vec{S} \rightarrow -\vec{S}, \quad \lambda \rightarrow -\lambda \quad \vec{p} \rightarrow \vec{p} \quad L \rightarrow R \quad \eta_{CPT} = \eta_C \eta_P \eta_T$

VIOLACIÓN DE SIMETRÍAS DISCRETAS

Interacción	P (Paridad)	C (Carga)	T (Tiempo)	CP	CPT
Strong	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva
EM	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva
Weak	Viola (Máx)	Viola (Máx)	Viola	Viola	Conserva

$V - A \equiv \gamma^\mu (1 - \gamma^5)$ fundamental en interacciones weak (violación máxima de paridad)

SIMETRÍAS CONTINUAS Y GRUPOS DE LIE

- **Transformaciones:** Descritas por parámetros continuos (ej. ángulos).

Invariancia de H bajo transf. $\Leftrightarrow U(\theta)HU(\theta)^{-1} = H \implies$ leyes de conservación.

- **Generadores (J):** Operadores hermiticos que construyen la transformación finita.

$U(\theta) = e^{i\sum_a \theta_a J_a}$

- **Parámetros (θ):** Parámetros de la transformación, $\theta \in \mathbb{R}$, continuos.
- **Conmutación:** $[H, J_a] = 0 \implies$ Generadores son constantes de movimiento.
- **Invariancia del subespacio:** Dado $\{|n\rangle\}$ tal que $H|n\rangle = E_n|n\rangle$ y $[H, J_a] = 0$: $H(J_a|n\rangle) = J_a H|n\rangle = E_n(J_a|n\rangle) \implies J_a|n\rangle$ autoestado de H con mismo autovalor E_n .
- **Degeneración:** Si $[H, J_a] = 0$ y $[J_a, J_b] \neq 0$, los autoestados de H forman multipletes degenerados (misma energía E_n).

GRUPO DE ROTACIONES SO(3)

- **Definición:** Matrices 3×3 ortogonales ($O^T O = I$) con $\det O = +1$.
- **Generadores:** 3 operadores de momento angular J_1, J_2, J_3 .
- **Álgebra de Lie SO(3):** $[J_a, J_b] = i\epsilon_{abc} J_c$
- **Operadores Escalera:**

$$J_\pm = J_1 \pm iJ_2 \qquad J_\pm |j, m\rangle = \sqrt{j(j\mp m)(j\pm m+1)} |j, m\pm 1\rangle$$

- **Producto Tensorial (Adición de Momento Angular):**

Composición de dos partículas de espín/isospín j_1 y j_2 .

$|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle = |J, M\rangle \quad J = j_1 + j_2 : |j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2 \quad M = m_1 + m_2 \quad |M| \leq J$

Clebsch-Gordan Coefficients: $|J, M\rangle = \sum_{m_1, m_2} \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | J M \rangle |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$.

- **Representaciones Irreducibles (Irreps):**
- Caracterizadas por momento angular j (entero o semientero).
- Dimensión: $d = 2j + 1$.
- Base: $\{|j, m\rangle\}$ con $m \in \{-j, -j+1, \dots, j-1, j\}$.
- **Casimír:** $J^2 = \sum J_a^2$ conmuta con todos los J_a .

GRUPOS SU(3) - SIMETRÍAS INTERNAS


- **Definición:** Matrices $n \times n$ unitarias ($U^\dagger U = I$) con $\det U = 1$. “Special Unitary”.
- **Generadores:** Hermíticos ($T_a^\dagger = T_a$) y Traza nula ($\text{Tr}(T_a) = 0$).
- Número de generadores independientes: $N = n^2 - 1$.
- **Rango:** Número de generadores diagonales simultáneamente diagonalizables $= n - 1$.

GRUPO SU(2) - ISOSPIN

- **Generadores:** $N = 2^2 - 1 = 3$. Relación con matrices de Pauli σ_a : $T_a = \frac{\sigma_a}{2}$
- **Álgebra SU(2):** $[T_a, T_b] = i\epsilon_{abc} T_c$ (Isomorfa a SO(3)).
- **Irreps Fundamentales:** Autoestados comunes a T^2, T_3 . T_3 único generador diagonal.

1. **Doblete (2):** $j = 1/2$. Dim=2. Rep. fundamental. Base: $|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
2. **Triplete (3):** $j = 1$. Dim=3. Rep. adjunta. Base: $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$.
3. **Singlete (1):** $j = 0$. Dim=1. Invariante escalar. Base: $|0, 0\rangle$
4. **Cuadruplete (4):** $j = 3/2$ Dim=4. .

- Cada estado $|j, m\rangle$ se transforma en los otros bajo la acción de $T_\pm$:



- Los representantes de los generadores de SU(2) son matrices $(2j+1) \times (2j+1)$.

- A partir de dos multipletes A, B con j_A, j_B tal que $A = 2j_A + 1, B = 2j_B + 1$, se pueden descomponer, empleando coeficientes de C.G., en otros multipletes tal que:

$$A \otimes B = \bigoplus_{J=|j_A-j_B|}^{j_A+j_B} (2J+1) \rightarrow \prod \dim_{\otimes} = \sum \dim_{\oplus} \quad \text{e.g.} \quad \mathbf{2} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{1} \quad \mathbf{2} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{4} \oplus \mathbf{2}$$

GRUPO SU(3) - MODELO DE QUARKS

- **Generadores:** $N = 3^2 - 1 = 8$. Relación con matrices de Gell-Mann λ_a : $F_a = \frac{\lambda_a}{2}$.

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- **Álgebra SU(3):** $[F_a, F_b] = if_{abc} F_c \quad f_{abc}$: Ctes de estructura totalmente antisim.

$f_{123} = 1, f_{147} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = \frac{2}{3}, f_{156} = f_{367} = -\frac{2}{3}, f_{458} = f_{678} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- Asimetría: $f_{abc} = -f_{bac} = -f_{cba} = -f_{acb} \quad f_{abc} = f_{bca} = f_{cab}$ resto: nulos.

- **Subálgebra de Cartan (Rango 2):** Los generadores diagonales conmutan $[F_3, F_8] = 0$.

1. Isospín (T_3): $T_3 = F_3 = \frac{1}{2} \text{diag}(1, -1, 0)$.
2. Hiper carga (Y): $Y = \frac{2}{\sqrt{3}} F_8 = \text{diag}(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$.

Los autoestados se etiquetan por (t_3, y) en un plano 2D.


- **Relación de Gell-Mann-Nishijima:** $Q = T_3 + \frac{Y}{2}$ con $T_3 = I_3, \quad Y = B + S$.

$Q \equiv$ carga eléctrica (generador de SU(1)_{EM}), $B \equiv$ número bariónico, $S \equiv$ extrañeza

q	Q	T3	Y	S	B	spín
u	+2/3	+1/2	+1/3	0	1/3	1/2
d	-1/3	-1/2	+1/3	0	1/3	1/2
s	-1/3	0	-2/3	-1	1/3	1/2

Antiquarks: todos los números Q, T_3, Y, S, B opuestos.

- **Operadores Escalera (Raíces):** Se definen 3 tipos de espín en el plano (T_3, Y):



1. **I-spin ($T_\pm$):** $F_1 \pm iF_2$. $\Delta T_3 = \pm 1, \Delta Y = 0$.
2. **V-spin ($V_\pm$):** $F_4 \pm iF_5$. $\Delta T_3 = \mp 1/2, \Delta Y = \pm 1$.
3. **U-spin ($U_\pm$):** $F_6 \pm iF_7$. $\Delta T_3 = \pm 1/2, \Delta Y = \pm 1$.

REPRESENTACIONES IRREDUCIBLES SU(3)

- **Diagramas de Peso:** Los estados forman hexágonos o triángulos en el plano (T_3, Y).
- **Etiquetado (p, q):** p, q enteros ≥ 0 . Relacionados con longitud lados polígono en frontera.
- **Dimensión:** $d(p, q) = \frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2)$
- **Irreps Importantes:**

1. **Fundamental 3:** $(p, q) = (1, 0)$. Quarks (u, d, s) : $u(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}), d(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}), s(0, -\frac{2}{3}) \quad (\Delta)$
2. **Antifundamental $\bar{3}$:** $(p, q) = (0, 1)$. Antiquarks $(\bar{u}, \bar{d}, \bar{s})$. (∇)
3. **Singlete 1:** $(p, q) = (0, 0)$. (●)
4. **Octete 8:** $(p, q) = (1, 1)$. Mesones espín 0, Bariones espín 1/2. Gluones. Rep. Adjunta.
5. **Decuplete 10:** $(p, q) = (3, 0)$. Bariones espín 3/2 (Resonancias Δ, Ω^-).
6. **Sextete 6:** $(2, 0)$ y $\bar{6}(0, 2)$.

- **Conjugada:** $X \neq \bar{X}$ equivalentemente $(p, q) \neq (q, p)$ (es representación c.c.). Solo: **8 = 8**.
- **Productos Tensoriales de Irreps** (ejemplos): $\mathbf{8} \otimes \mathbf{8} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10} \oplus \mathbf{27}$
 $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1} \quad \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{6} \oplus \mathbf{3} \quad \mathbf{3} \otimes \mathbf{6} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{10} \quad \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10}$

PROPIEDADES ALGEBRAICAS

- Los productos directos cumplen propiedades distributivas, asociativas y conmutativas respecto a la suma directa.
- **Isospin Agrandado:** $SU(2) \subset SU(3)$. Las interacciones fuertes conservan $SU(3)$ (aproximadamente) y $SU(2)$ (con mayor precisión).

CLASIFICACIÓN DE HADRONES - SU(3)_F (F ≡ flavour)

- Solo podemos observar partículas libres (estados ligados) neutras de color (singletes) - Mesones (qq): Descomposición en $SU(3)_F$: $\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}$

Bariones (qqq): Descomposición en $SU(3)_F$: $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10}$

- $SU(2)_I$ (Isospín): Muy buena simetría ($m_u \approx m_d$).
- $SU(3)_F$ (Sabor): Simetría rota ($m_s > m_{u,d}$) Δm dentro de los multipletes.
- $\#$ SU(4) o superiores como simetrías aproximadas debido a la gran masa de c, b, t.

GRUPOS DE ONDA (MODELO SU(3)_C)

Función de onda total de un hadrón: $\Psi_{\text{tot}} = \Psi_{\text{espacio}} \times \Psi_{\text{sabor}} \times \Psi_{\text{spin}} \times \Psi_{\text{color}}$

Ψ_{tot} **totalmente antisimétrica** (fermiones), **totalmente simétrica** (bosones).

Construcción del Protón ($p^\uparrow$):

- Paridad $\Psi_{\text{espacio}}: (-1)^L$. Estado fundamental ($L = 0$) $\implies$ simétrica.

Combinación Flavor-Spin debe ser simétrica (para compensar antisimetría de color).

Base de Flavour (uud):

- Simétrica ($1 \leftrightarrow 2$): $\phi_S = \frac{1}{\sqrt{6}}[(ud + du)u - 2uud]$.
- Antisimétrica ($1 \leftrightarrow 2$): $\phi_A = \frac{1}{\sqrt{2}}(ud - du)u$.

Base de Spin ($\uparrow\uparrow\downarrow$):

- Simétrica ($1 \leftrightarrow 2$): $\chi_S = \frac{1}{\sqrt{6}}[\uparrow\uparrow\downarrow + \uparrow\downarrow\uparrow - 2\downarrow\uparrow\uparrow]$ (Espín 1).
- Antisimét ($1 \leftrightarrow 2$): $\chi_A = \frac{1}{\sqrt{2}}[\uparrow\downarrow\uparrow - \downarrow\uparrow\uparrow]$ (Espín 0).

- Función Flavour-Spin: $\Psi_{F-S}(p^\uparrow) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_S \chi_S + \phi_A \chi_A) =$

$$= |p \uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{18}}[2|u \uparrow u \uparrow d \downarrow\rangle - |u \uparrow u \downarrow d \uparrow\rangle - |u \downarrow u \uparrow d \uparrow\rangle + \text{perms}]$$

perms: permutaciones *cíclicas* de los pares (quarks-espín)

MOMENTOS MAGNÉTICOS

Operador: $\vec{\mu} = \sum_i \mu_i \vec{\sigma}_i$. Donde $\mu_q = Qq(\frac{e}{2m_q})$. Valor esperado $\langle p \uparrow | \mu_z | p \uparrow \rangle$:

$$\mu_p = \frac{1}{3}(4\mu_u - \mu_d) \qquad \mu_n = \frac{1}{3}(4\mu_d - \mu_u)$$

COLOR SU(3)_c

Carga de Color: $R = \mathbf{q}_1, G = \mathbf{q}_2, B = \mathbf{q}_3$ (Fundamental **3** de $SU(3)_c$).

Confinamiento: Los hadrones observados son **Singletes de Color** (1).

Ψ_{color} debe ser totalmente antisimétrica e invariante bajo rotaciones en el espacio de color.

Singlete Bariónico (qqq): $\mathbf{1} \in \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3}$

$\Psi_{\text{color}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\epsilon_{ijk}|q_i q_j q_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(RGB - RBG + BRG - BGR + GBR - GRB)$

Singlete Mesónico (q $\bar{q}$): $\mathbf{1} \in \mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}}$

$\Psi_{\text{color}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(R\bar{R} + G\bar{G} + B\bar{B}) \quad \bar{R} = \frac{1}{\sqrt{2}}(GB - BG) \quad \bar{G} = \frac{1}{\sqrt{2}}(BR - RB) \quad \bar{B} = \frac{1}{\sqrt{2}}(RG - GR)$

MODELO DE PARTONES (FEYNMAN 1969)

Composición Hadrones:

- **Quarks de valencia** (q_v): Definen n^{os} cuánticos. e.g.: $p(u_v u_v d_v)$, $n(d_v d_v u_v)$.
- **Partones del mar (Sea Partons):** Pares $q\bar{q}$ (prob< no nula de excitación) y gluones (g). Participan en reparto energético, no en números cuánticos globales.

Cinemática (Infinito Momentum Frame):

- Protón con momento P y energía E . Partón i lleva fracción x del momento.
- **Variable de Bjorken:** $x = p_{\text{parton}}/P_{\text{proton}}$, con $0 \leq x \leq 1$.
- Momentos: $p_i^\mu \approx x P^\mu$. Transverso ($\perp$) $P_T \approx 0$, Longitudinal ($\parallel$) $P_L \neq 0$ (respecto haz).
- Masa hadrón y partones se desprecian a altas energías ($s \gg M^2$).

FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE PARTONES (PDFs)

PDF ($f_i(x)$): Probabilidad de hallar partón tipo i con fracción de momento x en el hadrón.

- **Regla de suma (Momentum Sum Rule):** Conservación del momento total del protón.

$$\sum_i \int_0^1 x f_i(x) dx = 1$$

La suma i incluye valencia, sea y gluones. Experimentos: gluones $\sim 50\%$ del momento.

Tipos y Nomenclatura:

- Valencia: u_v, d_v . Sea: $u_s, d_s, s_s, \dots$ y antiquarks $\bar{u}, \bar{d}, \bar{s}$.
- Simetría del mar: $q_s(x) = \bar{q}_s(x)$.
- PDFs totales: $u(x) = u_v(x) + u_s(x)$, $\bar{u}(x) = \bar{u}_s(x)$.
- Protón tiene $2u$ y $1d$: $\int_0^1 (u(x) - \bar{u}(x))dx = 2, \int_0^1 (d(x) - \bar{d}(x))dx = 1$.

Comportamiento “Naive”:

- Valencia: Domina en $x \sim 1/3$.
- Sea/Gluones: Dominan a baja x ($x \rightarrow 0$). Divergencia infrarroja regularizada.

TEOREMA DE FACTORIZACIÓN

Separación del proceso hadrónico en:

1. **Soft Physics:** PDFs (No perturbativo, universal).
2. **Hard Physics:** Sección eficaz partónica $\hat{\sigma}$ (Perturbativo, calculable).

Fórmula General (Colisión $P_1 + P_2$):

$$\sigma_{\text{tot}}(s) = \sum_{i,j} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 f_i(x_1) f_j(x_2) \hat{\sigma}_{ij}(\hat{s})$$

- $x_{1,2}$: Fracción momento partones 1 y 2.
- $s = (P_1 + P_2)^2 \approx 2P_1 P_2$.
- $\hat{s} = (x_1 P_1 + x_2 P_2)^2 \approx x_1 x_2 s$.
- $\hat{\sigma}_{ij}$: Sección eficaz subprocesso elemental $i + j \rightarrow$ final.

PROCESOS DE COLISIÓN ESPECÍFICOS

1. **Electrón-Protón ($ep \rightarrow e^- X$, DIS):** Sonda: Fotón virtual γ^* (o Z) con $Q^2 = -q^2$.

$$\sigma(ep \rightarrow eX) = \sum_i \int_0^1 dx f_i(x) \hat{\sigma}(eq_i \rightarrow eq_i)$$

- Diagrama: Scattering e^- sobre quark libre q_i .
- Estado final: e^- saliente + Jet hadrónico (quark) + Remanente protón (dirección haz).

2. **Protón-Antiprotón ($p\bar{p} \rightarrow \ell^+ \ell^- X$, Drell-Yan):** Aniquilación $q_i \bar{q}_i \rightarrow \gamma^*/Z \rightarrow \ell^+ \ell^-$.

$$\sigma = \sum_i \int dx_1 dx_2 [f_i(x_1) f_{\bar{i}}(x_2) + f_{\bar{i}}(x_1) f_i(x_2)] \hat{\sigma}(q\bar{q} \rightarrow \ell\ell)$$

- Requiere un quark de valencia y un antiquark (valencia en $\bar{p}$ o sea en p).

3. **Protón-Protón ($pp \rightarrow W^\pm X$):** Producción bosón W vía interacción débil.

$$\sigma = \sum_{i,j} \int dx_1 dx_2 f_i(x_1) f_j(x_2) V_{CKM}^2 \hat{\sigma}(q_i \bar{q}_j \rightarrow W)$$

- Ejemplo $u\bar{d} \rightarrow W^+$. Antiquark debe provenir del mar (sea) en colisiones pp .

FUNCIÓN DE SECCIÓN EFICAZ (σ)

Función $F_2(x, Q^2)$: Relaciona sección eficaz medida con contenido partónico.

$$F_2(x, Q^2) = \sum_i e_i^2 x f_i(x, Q^2)$$

- e_i : Carga eléctrica quark ($u = 2/3, d = -1/3$).
- Glúones no contribuyen directamente a F_2 en orden más bajo (LO), solo q/q̄ cargados.
- Scaling de Bjorken:**
- Predicción Partones (Naive): $F_2(x, Q^2) \rightarrow F_2(x)$. Indep de Q^2 si partones puntuales.
- Violación del Scaling:** Experimentalmente F_2 depende de Q^2 .
- x bajos: F_2 crece con Q^2 (aumenta densidad partones sea/glúones al aumentar resolución).
- x altos: F_2 decrece con Q^2 (quarks valencia radian glúones y pierden momento).

EVOLUCIÓN QCD (DGLAP)

El modelo de partones estático no predice dependencia en Q^2 . QCD introduce evolución vía emisión de glúones (splitting).

- Escala Q^2 : Resolución espacial probe $\sim 1/\sqrt{Q^2}$.
- Ecuaciones DGLAP:** Describen variación de PDFs con $\ln Q^2$.
- Ejemplo (Evolución del Gluón):**

$$\frac{dg(x, Q^2)}{d \ln Q^2} = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} \int_x \frac{dy}{y} \left[\sum_q P_{gq} \left(\frac{x}{y} \right) q(y, Q^2) + P_{gg} \left(\frac{x}{y} \right) g(y, Q^2) \right]$$

- α_s : Constante acoplamiento fuerte.
- $P_{ba}(z)$: Funciones de splitting. Probabilidad proceso $a \rightarrow b$ con fracción z .
- $P_{q\bar{q}}$: Quark radia gluón (queda quark).
- P_{gq} : Quark radia gluón (queda gluón).
- P_{gg} : Gluón se divide en glúones ($g \rightarrow gg$).
- $P_{q\bar{q}}$: Gluón crea par $q\bar{q}$.

DIAGRAMAS DE FEYNMAN (FD): GENERALIDADES

Representación gráfica en el espacio de momentos.

- Ejes: Eje temporal de izquierda (IN) a derecha (OUT).
- Conservación P^μ en cada vértice y globalmente.
- Líneas Internas: Virtuales (off-shell: $p^2 \neq m^2$).
- Líneas externas (patas): Reales (on-shell: $p_i^2 = m_i^2$).
- Amplitud Invariante (F o $\mathcal{M}$):

$$T_{fi} = -i(2\pi)^4 \delta^4(P_{\text{tot}}) F \quad P_{\text{tot}} = P_{\text{in}} - P_{\text{out}}$$

 $-iF = (\text{Vértices}) \times (\text{Propagadores}) \times (\text{Patatas Ext.})$

GUÍA DE TRAZADO LÍNEAS

Trazo	Estilo Visual	Partícula
	Línea cont. + Flecha	Fermión ($e^\pm, \mu, q$)
	Flecha opuesta	Antifermión ($e^\pm, \bar{q}$)
	Ondulada (Snake)	Fotón (γ, W, Z)
	Discontinua (Dashed)	Escalar (π, K, H)
	Bucle (Coil)	Glúon (g)

- Flechas:** Indican flujo de carga fermiónica (NO siempre coinciden con el momento).

CANALES DE MANDELSTAM (1 + 2 → 3 + 4)

Amplitud total $F = F_s + F_t + F_u$. $s + t + u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2$

Canal s: Aniquilación

$s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2$

Canal t: Dispersión

$t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2$

Canal u: Intercambio

$u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2$

CM, $m \rightarrow 0$: $s = 4E^2$ $t = -\frac{s}{2}(1 - \cos \theta)$ $u = -\frac{s}{2}(1 + \cos \theta)$

REGLAS: PROPAGADORES (Internos)

Inverso de la función de Green de 2 puntos en el espacio de momentos.


$\mathcal{FT}$ al espacio de momentos: $i\partial^\mu \rightarrow \frac{p^\mu}{i}$ $\square^2 = \partial_\mu \partial^\mu \rightarrow -p^2$ $\frac{1}{\square^2 + m^2} \rightarrow \frac{1}{-p^2 + m^2}$

- Escalar** (spin 0, m): $\Delta(p) = \frac{1}{p^2 - m^2}$
- Fermión** (spin 1/2, m): $S_F(p) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2}$
- Fotón** (spin 1, $m = 0$, Feynman): $D_{\mu\nu}(p) = \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2} = \frac{-ig_{\nu\mu}}{k^2}$

REGLAS: VÉRTICES DE INTERACCIÓN - $V^\mu = FR \equiv$ Feymann Rule

Multiplica i por $\mathcal{L}_{\text{int}}$ (solamente la parte relevante de $\mathcal{L}_{\text{int}}$ en el espacio de momentos: no normalización y no campos externos: e.g. $A_\mu, e^{i(p_f - p_i)x}, \dots$).

- Escalar:** Bosón cargado ϕ - Fotón A_μ
- Fermiónica:** Fermión ψ - Fotón A_μ



TEOREMAS DE TRAZAS (TRUCO DE CASIMIR)

Γ cualquier producto de matrices de Dirac. $\bar{\Gamma} = \gamma^0 \Gamma^\dagger \gamma^0$

- Relación:** $[\bar{u}(p', s') \Gamma u(p, s)]^\dagger = \bar{u}(p, s) \bar{\Gamma} u(p', s')$.
- If $\Gamma = \gamma^\mu$: $[\bar{u}(p', s') \gamma^\mu u(p, s)]^\dagger = \bar{u}(p, s) \gamma^\mu u(p', s')$.
- Tip:** $\sum_{s_1, s_3} |\bar{u}_3 \gamma^\mu u_1|^2 = \sum_{s_1, s_3} (\bar{u}_3 \gamma^\mu u_1)(\bar{u}_1 \gamma^\nu u_3) = \text{Tr}[(\not{p}_3 + m_3) \gamma^\mu (\not{p}_1 + m_1) \gamma^\nu]$.

CÁLCULO DE SECCIÓN EFICAZ (σ)

Relación entre Amplitud Invariante F (o $\mathcal{M}$) y observables.

- Sección Eficaz Diferencial** ($A + B \rightarrow C + D$ en CM):

$$d\sigma = \frac{1}{2E_{CM} |\vec{v}_A - \vec{v}_B|} |\vec{F}|^2 d\Phi_2 = \frac{1}{2\lambda^{1/2}(s, m_A^2, m_B^2)} |\vec{F}|^2 dLips(s, p_C, p_D)$$

$$\lambda^{1/2}(s, m_A^2, m_B^2) = 2\sqrt{(p_A \cdot p_B)^2 - m_A^2 m_B^2}$$

$$dLips(s, p_C, p_D) = (2\pi)^4 \delta^4(p_A + p_B - p_C - p_D) \frac{d^3 \vec{p}_C}{(2\pi)^3 2E_C} \frac{d^3 \vec{p}_D}{(2\pi)^3 2E_D}$$

$$\delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) = \delta(E_1 + E_2 - E_3 - E_4) \delta^3(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 - \vec{p}_3 - \vec{p}_3)$$


Promedio de spin (si no son escalares): $|\vec{F}|^2 = \frac{1}{(2S_A + 1)(2S_B + 1) \text{ spins}} \sum |F|^2$

Si la partícula i es un **fotón**, no se emplea $(2S_i + 1)$, sino que se divide entre 2


$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{CM}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\vec{p}_f|}{|\vec{p}_i|} |\vec{F}|^2 \quad \frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{16\pi} \frac{1}{\lambda(s, m_1^2, m_2^2)} |\vec{F}|^2$$

PROCESOS QED (DIAGRAMAS)

- Aniquilación** $e^- e^+ \rightarrow \mu^- \mu^+$: Solo canal s (carga total 0, muones distinguibles).




- Dispersión Møller** $e^- e^- \rightarrow e^- e^-$: Partículas iguales. Interferencia Canal t + Canal u.



$F = F_t - F_u$ (Signo relativo - por Fermi)

- Dispersión Bhabha** $e^- e^+ \rightarrow e^- e^+$: Canal s (aniquilación) + Canal t (scattering).



- Compton** $e^- \gamma \rightarrow e^- \gamma$: Canal s + Canal u (Diagramas con propagador fermiónico).

LAGRANGIANO DE QED

Construcción mínima invariante $U(1)_{EM}$ y Lorentz:

$\mathcal{L}_{QED} = \mathcal{L}_{\text{Dirac}} + \mathcal{L}_{\text{Maxwell}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$

$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi$ $\mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ $\mathcal{L}_{\text{int}} = -J^\mu_\psi A_\mu$ $J^\mu_\psi = eQ\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$

$\mathcal{L}_{QED} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$

- Ecuaciones de Movimiento:** Dirac: $(i\not{\partial} - m)\psi = 0$. Maxwell: $\partial_\nu F^{\nu\mu} = J^\mu$.

INVARIANCIA GAUGE U(1)

Global: $\psi \rightarrow e^{-iQ\theta} \psi$ $\bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi} e^{+iQ\theta}$ $\partial_\mu \psi \rightarrow e^{-iQ\theta} \partial_\mu \psi$ ($\theta = \text{cte}$). $\mathcal{L}_{\text{Dirac}}$ es invariante.

Local: $\psi \rightarrow e^{-iQ\theta(x)} \psi$. Requiere introducir campo gauge A_μ .

- Derivada Covariante:** $D_\mu = \partial_\mu + ieQA_\mu$

Transformación del campo gauge para mantener invarianza: $A_\mu \rightarrow A_\mu + \frac{1}{e} \partial_\mu \theta(x)$

- Tensor de Campo:** $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. Es invariante gauge ($F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}$).

VECTORES DE POLARIZACIÓN $\epsilon^\mu(q)$ $k = q \equiv$ momento del fotón

Condición Lorentz: $\partial_\mu A^\mu = 0 \Rightarrow A^\mu = \epsilon^\mu(q) e^{-iq \cdot x}$ $q_\mu \epsilon^\mu(q) = 0$ $k^2 = 0 \Leftrightarrow$ fotón real

- Suma de Polarizaciones** (Complejitud): $\sum_{\lambda=1,2} \epsilon^{(\lambda)}_i(q) \epsilon^{(\lambda)*}_j(q) = -g_{ij}$
- dof = 2. Dado $q^\mu = (E, 0, 0, |q|) \Rightarrow E = |q|$ y las polarizaciones son:

$\epsilon^{(\lambda=+1)}_i(q) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, +i, 0)$ $\epsilon^{(\lambda=-1)}_i(q) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0)$

Vector de polarización ϵ^μ : Codifica la orientación espacial del espín de la partícula, describiendo físicamente cómo se proyecta su momento angular intrínseco (helicidad) a lo largo de su trayectoria.

FIJACIÓN DE GAUGE (R_ξ)

Se debe introducir $\mathcal{L}_{GF} = -\frac{1}{2\xi} (\partial_\mu A^\mu)^2$, $\xi \in \mathbb{R}$ en $\mathcal{L}_{QED}$ para fijar el Gauge.

- Modifica las ecuaciones de movimiento pero hace el propagador invertible.
- Observables:** Independientes del parámetro ξ .
- Propagador del Fotón:** Obtenido invirtiendo el operador cinético cuadrático.

$$i\Delta_{\mu\nu}(k) = \frac{-i}{k^2 + i\epsilon} \left[g_{\mu\nu} + (\xi - 1) \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right]$$

$\cdot$ **Feynman-'t Hooft** ($\xi = 1$): $\Delta_{\mu\nu} \propto \frac{g_{\mu\nu}}{k^2}$ $\cdot$ **Landau** ($\xi = 0$): $\Delta_{\mu\nu} \propto \frac{g_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu / k^2}{k^2}$

ANÁLISIS DE DIAGRAMAS DE FEYNMAN

- Asignar momentos:** A cada partícula se le asigna un momento p_i .
- Dibujar diagramas:** Se dibujan todos los posibles diagramas ($\text{cañal}, s, t$ y u). Descarta aquellos diagramas que no conserven las cantidades de la tabla:

Cantidad	Fuerte	Electromagnética	Débil
Energía/Momento (p^μ)	Sí	Sí	Sí
Momento angular total	Sí	Sí	Sí
Carga Eléctrica (Q)	Sí	Sí	Sí
Carga de Color	Sí	—	—
Sabor (Quarks)	Sí	Sí	No (vía $W^\pm$)
Paridad (P)	Sí	Sí	No
Conjugación de Carga (C)	Sí	Sí	No
G-Paridad (G)	Sí	No	No
Simetría CP	Sí	Sí	No (violación)
Isospin (I)	Sí	No	No
3ª Componente Isospin (I_3)	Sí	Sí	No

- Aplicar Feynman Rules:** Se leen los diagramas de Feynmann aplicando FR. Tips:
 - Vértices distintos tienen índices distintos.
 - Partícula *ingoing* con momento $p \equiv$ Antipartícula *outgoing* con momento $-p$.
 - Si dos diagramas son idénticos salvo por el intercambio de dos fermiones externos, se multiplica por (-1) una de las dos amplitudes invariantes.
 - Las líneas fermiónicas se leen al revés.
- Cálculo $|F|^2$ y $|\vec{F}|^2$:** Se calcula $|F|^2 = F \cdot F^*$. Nota: F y F^* con distintos índices.
- Producto espacio espinorial,** relaciones de completitud y expresarlo en términos de trazas.
- Cálculo de trazas:** Se calculan trazas, y se contraen con $\eta_{\mu\mu} \eta^{\rho\rho}$.
- Crossing:** $s \leftrightarrow t \Leftrightarrow p_3 \leftrightarrow -p_2$ & $m_3 \leftrightarrow m_2$ (evitas recalcular $|\vec{F}|^2$ si consigues *isomorfear* a un diagrama equivalente). Idem para $s \leftrightarrow u$ y $t \leftrightarrow u$.
- PROCESO DE ANIQUILACIÓN ($e^- e^+ \rightarrow \mu^- \mu^+$)**

Amplitud (F_s): Lectura del diagrama (recordar sentido opuesto a flechas fermiónicas):

$$-iF = [\bar{u}(p_3)(ie\gamma^\mu)v(p_4)] \frac{-ig_{\mu\nu}}{s} [\bar{v}(p_2)(ie\gamma^\nu)u(p_1)]$$

Simplificación ($m_e \approx 0$ frente a m_μ o energías altas):

$$F = \frac{e^2}{s} [\bar{u}_3 \gamma^\mu v_4] [\bar{v}_2 \gamma_\mu u_1]$$

Cuadrado de Amplitud Promediada

$$|\vec{F}|^2 = \frac{e^4}{4s^2} \text{Tr}[(\not{p}_3 + m_\mu)\gamma^\mu(\not{p}_4 - m_\mu)\gamma^\nu] \text{Tr}[(\not{p}_2 - m_e)\gamma_\mu(\not{p}_1 + m_e)\gamma_\nu]$$

Resultado exacto (con masas):

$$|\vec{F}|^2 = \frac{2e^4}{s^2} \{ (p_1 \cdot p_3)(p_2 \cdot p_4) + (p_1 \cdot p_4)(p_2 \cdot p_3) + m_\mu^2 (p_1 \cdot p_2) \}$$

Límite Ultra-Relativista (UR, $m \rightarrow 0$):

$$|\vec{F}|^2_{UR} = \frac{2e^4}{s^2} [t^2 + u^2] = 2e^4 \left(\frac{t^2 + u^2}{s^2} \right)$$

Sección Eficaz (CM):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{CM}} = \frac{\alpha^2}{4s} (1 + \cos^2 \theta) \quad \sigma_{tot} = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$$

Crossing Symmetry: Este proceso está relacionado con $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$ (scattering) mediante:

- $p_3 \leftrightarrow -p_2$ (intercambio momento saliente μ con entrante e^+).
- Implica $s \leftrightarrow t$.

MÖLLER SCATTERING ($e^- e^- \rightarrow e^- e^-$)

Amplitud Total:

$$F = F_t - F_u$$

Signo relativo (-) por estadística Fermi (intercambio fermiones idénticos finales $p_3 \leftrightarrow p_4$).

$$-iF_t = [\bar{u}_3(ie\gamma^\mu)u_1] \frac{-ig_{\mu\nu}}{t} [\bar{u}_4(ie\gamma^\nu)u_2] \quad -iF_u = [\bar{u}_4(ie\gamma^\mu)u_1] \frac{-ig_{\mu\nu}}{u} [\bar{u}_3(ie\gamma^\nu)u_2]$$

Cuadrado de Amplitud Promediada (con Interferencia):

$$|\vec{F}|^2 = \frac{1}{4} \sum |F|^2 = \frac{1}{4} \sum (|F_t|^2 + |F_u|^2 + 2\text{Re}(F_t F_u^*))$$

Estructura del resultado (A, B, C son funciones de trazas):

$$|\vec{F}|^2 = \frac{e^4}{4} \left\{ \frac{A}{t^2} + \frac{B}{u^2} + \frac{C}{ut} \right\}$$

Donde los términos cinemáticos (variables de Mandelstam) son:

- Término directo t (A): $\propto s^2 + u^2 + \dots$
- Término cruzado u (B): $\propto s^2 + t^2 + \dots$ (obtenido por crossing $t \leftrightarrow u$).
- Interferencia (C): Término mixto negativo y complejo.

Límite No-Relativista (NR): Condición: $|\vec{p}| \ll m_e \Rightarrow E \approx m_e, s \approx 4m_e^2$.

$$\text{Fórmula de Mott: } \frac{d\sigma}{d\Omega_{NR}} = \frac{m_e^2 \alpha^2}{16|\vec{p}|^4} \left\{ \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} + \frac{1}{\cos^4(\theta/2)} - \frac{1}{\sin^2(\theta/2) \cos^2(\theta/2)} \right\}$$

- El primer término recupera Rutherford. El tercer término es cuántico (interferencia).

Límite Ultra-Relativista (UR): Condición: $|\vec{p}| \gg m_e \Rightarrow m_e \rightarrow 0$.

$$\{A\} \approx 8[s^2 + u^2], \quad \{B\} \approx 8[s^2 + t^2], \quad \{C\} \approx 16s^2$$

$$|\vec{F}|^2_{UR} = 2e^4 \left\{ \frac{s^2 + u^2}{t^2} + \frac{s^2 + t^2}{u^2} + \frac{2s^2}{ut} \right\}$$

Sección eficaz diferencial (Møller, 1932):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{UR}} = \frac{\alpha^2}{4s} \left\{ \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} + \frac{1}{\cos^4(\theta/2)} + 1 \right\}$$

- Nota: El término +1 proviene de la interferencia y simetría en el límite UR.
- Interferencia Cuántica:**
- Esencial en Møller (partículas idénticas).
- $F_t F_u^* \neq 0$.
- Contribuye significativamente a la sección eficaz, diferenciando QED clásica de cuántica.

BHABHA SCATTERING ($e^-e^+ \rightarrow e^-e^+$)
Cuadrado del Promedio de Amplitud (Límite UR): Despreciando masas ($m_e \rightarrow 0$):

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4 \left\{ \frac{s^2 + u^2}{t^2} + \frac{u^2 + t^2}{s^2} + \frac{2u^2}{st} \right\}$$

Sección Eficaz Diferencial (CM):

En el centro de masas, usando $\alpha = e^2/4\pi$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{CM}} = \frac{\alpha^2}{8s} \left\{ \frac{1 + \cos^4(\theta/2)}{\sin^4(\theta/2)} + \frac{1 + \cos^2\theta}{2} - \frac{2\cos^4(\theta/2)}{\sin^2(\theta/2)} \right\}$$

COMPTON SCATTERING ($\gamma e^- \rightarrow \gamma e^-$)

Amplitudes:

$$-i\mathcal{M}_S = \bar{u}(p') (ie\gamma^\nu) \epsilon_\nu^*(k') \frac{i(\not{p} + \not{k} + m)}{s - m^2} (ie\gamma^\mu) \epsilon_\mu(k) u(p)$$

$$-i\mathcal{M}_u = \bar{u}(p') (ie\gamma^\mu) \epsilon_\mu(k) \frac{i(\not{p} - \not{k}' + m)}{u - m^2} (ie\gamma^\nu) \epsilon_\nu^*(k') u(p)$$

Simplificación de Propagadores (UR): En el límite ultrarelativista ($m \rightarrow 0$):

$$\frac{i(\not{p} + \not{k})}{s}, \quad \frac{i(\not{p} - \not{k}')}{u}$$

Cálculo de la Traza (Canal s):

• Promedio sobre polarizaciones iniciales (fotón $\times 2$, electrón $\times 2$) $\rightarrow$ factor 1/4.

$$|\overline{\mathcal{M}}_S|^2 = \frac{e^4}{4s^2} \text{Tr}[\not{p}' \gamma^\alpha (\not{p} + \not{k}) \gamma^\mu \not{p} \gamma_\mu (\not{p} + \not{k}) \gamma_\alpha]$$

• Usando identidades de trazas y $p^2 = k^2 = 0$:

$$|\overline{\mathcal{M}}_S|^2 = \frac{e^4}{4s^2} 32[(p' \cdot k)(p \cdot k)]$$

• En variables de Mandelstam UR ($s \approx 2p \cdot k$, $u \approx -2p' \cdot k$):

$$|\overline{\mathcal{M}}_S|^2 = 2e^4 \left(-\frac{u}{s} \right)$$

Resultado Final (Suma de canales):

• Considerando $\mathcal{M}_u$ y términos de interferencia:

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4 \left(-\frac{u}{s} - \frac{s}{u} \right)$$

• Notar: $-u/s$ y $-s/u$ son positivos en región física ($s > 0, u < 0$).

Sección Eficaz (CM):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{CM}} = \frac{1}{64\pi^2 s} |\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{e^4}{32\pi^2 s} \left(-\frac{u}{s} - \frac{s}{u} \right)$$

QUARKS EN QED

Proceso $e^-q \rightarrow e^-q$:

- Análogo a $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$ (t-channel dominante).
- Vértice Quark:** Se sustituye $ie\gamma^\mu$ por $-ieQ_q\gamma^\mu$ (donde Q_q es la carga fraccionaria).
- Factor de Color (F_C):**

• Se debe promediar sobre colores iniciales y sumar sobre finales.

$$F_C = \frac{1}{3} \sum_{i,j} \delta_{ij} \delta_{ij}^* = \frac{1}{3} \sum_i \delta_{ii} = \frac{3}{3} = 1$$

• Resultado amplitud e^-q :

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4 Q_q^2 F_C \frac{s^2 + u^2}{t^2}$$

CROSSING SYMMETRY & OTROS PROCESOS

Aplicación de simetría de cruce para obtener $|\overline{\mathcal{M}}|^2$ de nuevos procesos a partir de previos.

1. $e^-e^+ \rightarrow q\bar{q}$ (**Creación de pares hadrónicos**):

- Crossing desde $e^-q \rightarrow e^-q$.
- Vértice Quark:** Se sustituye $ie\gamma^\mu$ por $-ieQ_q\gamma^\mu$ (donde Q_q es la carga fraccionaria).
- Factor de color:** No se promedia color inicial (leptones), se suma final.
- $F_C = \sum \delta_{ij} \delta_{ij} = 3$.

• Resultado: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{e^4}{s^2} Q_q^2 (3)[t^2 + u^2]$.

2. $q\bar{q} \rightarrow \gamma\gamma$ (**Aniquilación**):

- Crossing desde Compton ($e^-\gamma \rightarrow e^-\gamma$).
- Requiere reevaluar factor de color (promedio inicial de quarks).
- Resultado: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 \propto Q_q^4 F_C (-u/s - s/u)$.

3. $q\bar{q} \rightarrow g g$ (**QCD**):

• Análogo a aniquilación en dos fotones pero con vértices de color y gluones.

CROMODINÁMICA CUÁNTICA (QCD)


$$\mathcal{L}_{QCD} = \sum_q \bar{q}(i\not{D} - m_q)q - \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{\mu\nu}_a$$

• **Derivada Covariante:** $D_\mu = \partial_\mu - ig_s \left(\frac{\lambda^a}{2} \right) A_\mu^a$ g_s cte acoplamiento strong, $a : 1 - 8$

• **Tensor de Campo:** $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g_s f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$.

• **Álgebra SU(3):** $\boxed{T^a = t^a = \frac{\lambda^a}{2}}$ $[t^a, t^b] = if^{abc} t^c$ $f^{abc} = f_{abc}$ $t^{a*} = t^a$.

• **Invarianza gauge local:** $q(x) \rightarrow \exp \left\{ i \sum_a \left(\frac{\lambda^a}{2} \right) \theta_a(x) \right\} q(x)$, ídem $D_\mu q(x)$.



REGLAS DE FEYNMAN

• **Propagadores:** Quark: $i \frac{(\not{p} + m)}{(p^2 - m^2 + i\epsilon)} \cdot \delta_{ij}$ Gluón (Feynman): $-i\eta_{\mu\nu} \frac{\delta^{ab}}{k^2}$.

• **Vértice Quark-Gluón:** $ig_s \left(\frac{\lambda^a}{2} \right)_{ij} \gamma^\mu$.

• **Vértice 3-Gluones:** $-g_s f^{abc} [\eta_{\mu\nu} (k_1 - k_2)_\rho + \eta_{\nu\rho} (k_2 - k_3)_\mu + \eta_{\rho\mu} (k_3 - k_1)_\nu]$.

• **Vértice 4-Gluones:** $-ig_s^2 [f^{abc} f^{cde} (\eta_{\mu\rho} \eta_{\nu\sigma} - \eta_{\mu\sigma} \eta_{\nu\rho}) + f^{ace} f^{bde} (\eta_{\mu\nu} \eta_{\rho\sigma} - \eta_{\mu\sigma} \eta_{\nu\rho}) + f^{ade} f^{bce} (\eta_{\mu\nu} \eta_{\rho\sigma} - \eta_{\mu\rho} \eta_{\nu\sigma})]$.

CONSTANTES Y SUMAS DE COLOR (SU(3))

$$C_F = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c} = \frac{4}{3} \quad C_A = N_c = 3 \quad T_F = \frac{1}{2}$$

$$\delta_{ab} C_A = \sum_{c, c'} f^{acc'} f^{bcc'} \quad \delta_{ij} C_F = \sum_{a, k} \frac{\lambda_{ik}^a}{2} \frac{\lambda_{kj}^a}{2} \quad \delta_{ab} T_F = \sum_{ij} \frac{\lambda_{ji}^a}{2} \frac{\lambda_{ij}^b}{2}$$

HARD SCATTERING (LÍMITE ULTRARELATIVISTA $m \rightarrow 0$)

Secciones eficaces promediadas ($\sum |\mathcal{M}|^2$) en QCD mediante comparación con QED:

• $qq' \rightarrow qq'$ ($q \neq q'$): Canal t. $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{2}{9} [2g_s^4 \frac{s^2 + u^2}{t^2}]$.

• $q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}'$ ($q \neq q'$): Canal s. $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{2}{9} [2g_s^4 \frac{t^2 + u^2}{s^2}]$.

• **Bhabha ($q\bar{q} \rightarrow q\bar{q}$):** Canales s y t. $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2g_s^4 [\frac{2}{9} \frac{u^2 + t^2}{s^2} + \frac{2}{9} \frac{s^2 + u^2}{t^2} - \frac{4}{27} \frac{u^2}{st}]$.

• **Compton QCD ($gq \rightarrow gq$):** Canales s, u, t $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = g_s^4 [\frac{s^2 + u^2}{t^2} - \frac{4}{9} \frac{s^2 + u^2}{su}]$.

• $gg \rightarrow gg$: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{9}{2} g_s^4 [3 - \frac{u}{s^2} - \frac{s}{u^2} - \frac{s}{t^2}]$.

CÁLCULO DE FACTORES DE COLOR (F_C)

Procedimiento: extraer tensores de color de $\mathcal{M}$ y $\mathcal{M}^*$, promediar iniciales y sumar finales.

• **Promedio inicial:** $\frac{1}{N_{c1} N_{c2}}$ (Quarks: 3, Gluones: 8).

• **Ejemplo $qq' \rightarrow qq'$:** $F_C = \frac{1}{3 \cdot 3} \sum_{i,j,k,m} (t_{ij}^a t_{ab}^b t_{km}^b) (t_{ij}^{a'} t_{a'b'}^b t_{km}^{b'}) = \text{Hermiticidad} + \text{props. } \delta_{ab} =$

$= \frac{1}{9} \sum_{i,j,k,m} ab (t_{ij}^a t_{km}^a) (t_{ji}^b t_{mk}^b) = \frac{1}{9} \sum_{aa'} t_{aa'}^a \sum_{ij} (t_{ij}^a t_{ji}^{a'}) \sum_{km} (t_{km}^a t_{mk}^a) = \text{suma de color} =$

$= \frac{1}{9} \sum_{aa'} (T_F \delta_{aa'}) (T_F \delta_{aa'}) = \frac{1}{9} T_F^2 \sum_a \delta_{aa}^2 = \frac{1}{9} \cdot 8 \cdot T_F^2 = \frac{8}{9}$

• **Patas con Quark y/o Fotones:** Incluir delta de color aunque el vértice no sea de QCD.

• **Procesos Mixtos:** $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$: $F_C = 3$ $\gamma q \rightarrow \gamma q$: $F_C = 1$ $gq \rightarrow \gamma q$: $F_C = \frac{1}{6}$.

QCD EN COLISIONADORES e^+e^- Y COLISIONADORES HADRÓNICOS

Los partones producidos en el estado final se confinan formando **jets**. La configuración cinemática típica en colisión frontal cumple $p_{j1} + p_{j2} + \dots = 0$.

Producción de 2 jets: $\sigma(e^-e^+ \rightarrow 2 \text{ jets}) \approx \sum_q \sigma(e^+e^- \rightarrow q\bar{q})$. Mediante comparación

con $e^+e^- \rightarrow \mu^-\mu^+$, se obtiene para $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$:

$$|\overline{F}|^2 = e^4 Q_q^2 N_c \frac{t^2 + u^2}{s^2}$$

$$\sigma(e^-e^+ \rightarrow q\bar{q}) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s} (Q_q^2 N_c) = \sigma(e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+) (Q_q^2 N_c) \quad \frac{\sigma(e^-e^+ \rightarrow 2 \text{ jets})}{\sigma(e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+)} = N_c \sum_q Q_q^2$$

• $\sum_q$ depende de $\sqrt{s} = 2E$: $\sqrt{s} = [5, 20, 10^3] \text{ GeV} \rightarrow q : [u, d, s, c, u, d, s, c, b, t]$

Producción de 3 jets: ($e^-e^+ \rightarrow 3 \text{ jets}$) $\approx \sum_q \sigma(e^-e^+ \rightarrow q\bar{q}g)$. El factor de color es constante para las contribuciones. $F_C = \sum_{\alpha, i, j} t_{ij}^\alpha t_{ji}^\alpha = C_F \cdot N_c = \frac{4}{3} \cdot 3 = 4$

Definiendo las fracciones de energía del centro de masas para los partones finales $x_i = \frac{2E_i}{\sqrt{s}}$ sujeto a la restricción cinemática $x_1 + x_2 + x_3 = 2$, la ratio diferencial es:

$$\frac{\sigma(e^-e^+ \rightarrow 3 \text{ jets})}{\sigma(e^-e^+ \rightarrow 2 \text{ jets})} = \frac{2\alpha_s}{3\pi} \iint \frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)} dx_1 dx_2 \quad \alpha_s = \frac{g_s^2}{4\pi}$$

Colisión de hadrones (pp o $p\bar{p}$): los partones no son elementales. Intervienen **PDFs** en el estado inicial y **funciones de hadronización** en el final.

• Teorema de Factorización: La sección eficaz hadrónica total es la convolución de las PDFs con la sección eficaz partónica (*hard scattering process*):

$$\sigma(pp \rightarrow X) = \sum_{i,j} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 f_i(x_1, Q^2) f_j(x_2, Q^2) \hat{\sigma}_{ij}(s) + (x_1 \leftrightarrow x_2)$$

• $f_{i/j}(x, Q^2)$: prob hallar partón i/j con fracción de momento x evaluado a energía Q^2 .

• $\hat{\sigma}_{ij}$: Sección eficaz a nivel de partones (ej. $q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}'$). Dominado por QCD: $\hat{\sigma} \sim \mathcal{O}(\alpha_s^2)$.

• $\hat{s} = x_1 x_2 s$: Invariante de Mandelstam partónico. Se asume típicamente $Q^2 = \hat{s}$.

• **Suma contribuciones** a nivel de sección eficaz (no de amplitud, $\nexists$ interferencia macro).

• **Aproximación Valencia:** Hadrón H compuesto por n_v quarks de valencia, PDF para quark i : $q_{v,i}(x, Q^2) = n_i \delta \left(x - \frac{1}{n_v} \right)$, con n_i quarks de valencia de sabor i en H .

FAMILIAS DE FERMIONES

	1ª familia	2ª familia	3ª familia
	$\begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \end{pmatrix}, e_R^-$	$\begin{pmatrix} \nu_{\mu L} \\ \mu_L \end{pmatrix}, \mu_R^-$	$\begin{pmatrix} \nu_{\tau L} \\ \tau_L \end{pmatrix}, \tau_R^-$
	$\begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}, u_R, d_R$	$\begin{pmatrix} c_L \\ s_L \end{pmatrix}, c_R, s_R$	$\begin{pmatrix} t_L \\ b_L \end{pmatrix}, t_R, b_R$

	u_R	u_L	d_R	d_L	ν_{eL}	e_R	e_L
Y	4/3	1/3	-2/3	1/3	-1	-2	-1
T_3	0	1/2	0	-1/2	1/2	0	-1/2
Q	2/3	2/3	-1/3	-1/3	0	-1	-1

Para la 2ª y 3ª familia es idéntico, con: $[u, d, e, \nu_e] \rightarrow [c, s, \mu, \nu_\mu] \rightarrow [t, b, \tau, \nu_\tau]$

SIMETRÍA ELECTRODÉBIL (SM-EW): $SU(2)_L \times U(1)_Y$

• **Quiralidad:** $\Psi_{L,R} = P_{L,R} \Psi$, con proyectores $P_{L,R} = \frac{1 \mp \gamma_5}{2}$.

• **Generadores:** Para $SU(2)_L$, $T_i = \frac{\tau_i}{2}$ (Isospín débil). Para $U(1)_Y$, hipercarga débil Y .

• **Fermiones:** Agrupados en dobletes levógiros L y singletes dextrógiros R .

• **Carga eléctrica:** Relaciones: $Q = T_3 + \frac{Y}{2}$ $J_{EM}^\mu = J_3^\mu + \frac{1}{2} J_Y^\mu$.

• **Derivada covariante:** $D_\mu = \partial_\mu - ig_t A_\mu^a - ig' \frac{Y}{2} B_\mu$

• B_μ ($a = 1, 2, 3$) bosones de gauge de $SU(2)_L$ con acoplo g .

• B_μ bosón de gauge de $U(1)_Y$ con acoplo g' .

• **Bosones físicos:** Mezcla de W_μ^3 y B_μ parametrizada por el ángulo débil θ_w .

$$W_\mu^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}} (W_\mu^1 \mp iW_\mu^2) \quad Z_\mu = W_\mu^3 \cos \theta_w - B_\mu \sin \theta_w \quad A_\mu = W_\mu^3 \sin \theta_w + B_\mu \cos \theta_w$$

• **Unificación:** $e = g \sin \theta_w = g' \cos \theta_w$. Para $Q^2 = M_Z^2$: $e = 0.31$, $g = 0.65$, $g' = 0.35$

• **Masas:** Mecanismo de Higgs $M_Z = \frac{M_W}{\cos \theta_w}$; Constante de Fermi $\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2}$.

LAGRANGIANO ELECTRODÉBIL

$$\mathcal{L}_{EW} = \sum_f \bar{\Psi} i \not{D} \Psi - \frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W_a^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} \quad f \equiv \text{fermiones}$$

$$W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a + g\epsilon^{abc} W_\mu^b W_\nu^c \quad B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$$

REGLAS DE FEYNMAN (VÉRTICES)

• **Corriente cargada ($W^\pm$):** Interacciona solo con fermiones L . $W^\pm \rightarrow f\bar{f}'$: $\frac{ig}{\sqrt{2}} \gamma^\mu P_L$

• Vértices con quarks: multiplica por elemento matriz CKM (U_{ij}) y tensor de color.

$$U_{CKM} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.974 & 0.224 & 0.00365 \\ 0.224 & 0.973 & 0.0421 \\ 0.00896 & 0.0413 & 0.999 \end{pmatrix} \approx \mathbb{I} + \text{correcciones pequeñas}$$

• **Corriente neutra (Z^0):** Interacciona con L y R . $Z^0 \rightarrow f\bar{f}$: $\frac{ig}{\cos \theta_w} \gamma^\mu (g_L P_L + g_R P_R)$

• Vértices con neutrinos: multiplica por $\frac{1}{2}$ y elimina la parte entre paréntesis.

• Vértices con quarks: multiplica por el tensor de color.

• **Acoplos quirales del Z:** $g_L = T_3 - Q \sin^2 \theta_w$, $g_R = -Q \sin^2 \theta_w$.

PROPAGADORES Y ESTADOS EXTERNOS

• **Propagador fermión:** $\frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2}$ (multiplicado por el tensor de color para quarks).

• **Propagador bosón V** (W, Z): $\frac{-i(g_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu / M_V^2)}{k^2 - M_V^2}$.

• **Compleitud:** Bosones masivos ($k^2 = M_V^2$) con 3 estados de polarización ($\lambda = \pm 1, 0$):

$$\sum_\lambda \epsilon_\mu^{(\lambda)}(k) \epsilon_\nu^{(\lambda)*}(k) = -g_{\mu\nu} + \frac{k_\mu k_\nu}{M_V^2} \epsilon_\mu(k) k^\mu = 0$$

CÁLCULO DE AMPLITUDES (TRAZAS)

• Amplitud cuadrada promediada: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{1}{\prod s_{in}} \sum |\mathcal{M}|^2$.

• **Propiedades trazas:** $P_L P_R = 0$, $P_L^2 = P_L$, $\gamma^\mu P_L = P_R \gamma^\mu$.

$\text{Tr}\{\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma\} = 4(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho})$ $\text{Tr}\{\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma_5\} = -4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$

• Contracción de tensores de Levi-Civita: $\epsilon_{\alpha\beta\mu\nu} \epsilon^{\rho\sigma\mu\nu} = -2(\delta_\alpha^\rho \delta_\beta^\sigma - \delta_\alpha^\sigma \delta_\beta^\rho)$

CINEMÁTICA Y TASAS DE DESINTEGRACIÓN

• Anchura parcial para desintegración $1 \rightarrow 2$: $\Gamma = \int \frac{1}{2M_W} |\overline{\mathcal{M}}|^2 d\text{Lips}(M_W; p_1, p_2)$

$$\int d\text{Lips} = \frac{\sqrt{(M^2 - (m_1 + m_2)^2)(M^2 - (m_1 - m_2)^2)}}{8\pi M^2} \quad \text{si } m_1, m_2 \rightarrow 0 \Rightarrow \int d\text{Lips} = \frac{1}{8\pi}.$$

• **Sección eficaz:** $\frac{d\sigma}{d^3l_{cm}} = \frac{1}{64\pi^2 s} |\overline{\mathcal{M}}|^2 \frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|}$.

ANCHURAS DE DESINTEGRACIÓN (W y Z)

Decaimiento del Bosón W:

• $\Gamma(W^- \rightarrow d\bar{u}) = 3|V_{ud}|^2 \Gamma(W^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e) = 3|V_{ud}|^2 (g^2 M_W / 48\pi)$ $V_{ud}^{UCKM} \approx 1$

• Factor de color: $F_C = \sum \delta_{ij} \delta_{ij}^* = 3$

Decaimiento del Bosón Z:

• Anchura a neutrinos: $\Gamma(Z \rightarrow \nu_e \bar{\nu}_e) = g^2 M_Z / 96\pi \cos^2 \theta_w$

• **Branching Ratios (BR)** aproximados:

Invisible ($Z \rightarrow \nu\bar{\nu}$): $\sim 20\%$ Hadrónico ($Z \rightarrow q\bar{q}$): $\sim 70\%$ Leptónico ($Z \rightarrow l^+ l^-$): $\sim 10\%$

Integrals ($n \in \mathbb{N}_0$, $m \in \mathbb{Z}$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \mu, \nu, \sigma, r \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ Dom f , $a, b, z \in \mathbb{C}$)

Basic

$$f(x+\alpha)^r dx = \frac{(x+\alpha)^{r+1}}{r+1} \quad f x(x+\alpha)^r dx = \frac{(x+\alpha)^{r+1}(rx+x-\alpha)}{(r+1)(r+2)} \quad f a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \quad f u dv = uv - \int v du$$

Rational

$$f \frac{dx}{\alpha x + \beta} = \frac{1}{\alpha} \ln |\alpha x + \beta| \quad f \frac{dx}{x^2 + \alpha^2} = \frac{1}{\alpha} \arctan \frac{x}{\alpha} \quad f \frac{dx}{x^2 - \alpha^2} = \frac{1}{2\alpha} \ln \left| \frac{x-\alpha}{x+\alpha} \right| \quad f \frac{dx}{\alpha^2 - x^2} = \frac{1}{2\alpha} \ln \left| \frac{\alpha+x}{\alpha-x} \right|$$
$$f \frac{dx}{\alpha x^2 + \beta x + \gamma} = \frac{2}{\sqrt{4\alpha\gamma - \beta^2}} \arctan \frac{2\alpha x + \beta}{\sqrt{4\alpha\gamma - \beta^2}} \quad f \frac{dx}{(\alpha x + \beta)(x + \beta)} = \frac{1}{\beta - \alpha} \ln \left| \frac{\alpha + x}{\beta + x} \right|$$

Roots

$$f \sqrt{x^2 + \alpha^2} = \frac{1}{2} [x \sqrt{x^2 + \alpha^2} + \alpha^2 \operatorname{arsinh} \frac{x}{|\alpha|}] \quad f \sqrt{x^2 - \alpha^2} = \frac{1}{2} [x \sqrt{x^2 - \alpha^2} - \alpha^2 \ln |\sqrt{x^2 - \alpha^2} + x|]$$
$$f \frac{dx}{\sqrt{x^2 + \alpha^2}} = \operatorname{arsinh} \frac{x}{|\alpha|} \quad f \frac{dx}{\sqrt{(-x^2 + \alpha^2)}} = \operatorname{arcsin} \frac{x}{|\alpha|} \quad f \frac{dx}{\sqrt{(x^2 - \alpha^2)}} = \ln |\sqrt{x^2 - \alpha^2} + x|$$
$$f \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + \alpha^2}} = -\frac{1}{\alpha} \operatorname{arsinh} \frac{\alpha}{|x|} \quad f \frac{dx}{x \sqrt{(-x^2 + \alpha^2)}} = -\frac{1}{\alpha} \ln \frac{|\sqrt{(-x^2 + \alpha^2)} + \alpha|}{|x|} \quad f \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - \alpha^2}} = \frac{1}{\alpha} \arctan \frac{\sqrt{x^2 - \alpha^2}}{\alpha}$$
$$f \frac{x}{\sqrt{(x^2 \pm \alpha^2)}} dx = \sqrt{x^2 \pm \alpha^2} \quad f \frac{x}{\sqrt{(-x^2 + \alpha^2)}} dx = -\sqrt{(-x^2 + \alpha^2)}$$
$$f \frac{dx}{(x^2 \pm \alpha^2)^{3/2}} = \frac{\pm x}{\alpha^2 \sqrt{x^2 \pm \alpha^2}} \quad f \frac{dx}{(-x^2 + \alpha^2)^{3/2}} = \frac{x}{\alpha \sqrt{(-x^2 + \alpha^2)}}$$
$$f \frac{x}{(x^2 \pm \alpha^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 \pm \alpha^2}} \quad f \frac{x}{(x^2 \pm \alpha^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 \pm \alpha^2}}$$

Trigonometric ($\mu, \nu > 0$, $\chi \equiv \alpha\alpha$, $\gamma \equiv \alpha + \beta$, $\delta \equiv \alpha - \beta$)

$$f \sin x \, dx = -\cos x \quad f \cos x \, dx = \sin x \quad f \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x \quad f \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \quad f \frac{dx}{\tan^2 x} = -\cot x - x$$
$$f \sinh x \, dx = \cosh x \quad f \cosh x \, dx = \sinh x \quad f \frac{dx}{\sinh^2 x} = -\coth x \quad f \frac{dx}{\cosh^2 x} = \tanh x \quad f \frac{dx}{\tanh^2 x} = -\coth x + x$$
$$f \tan x \, dx = -\ln |\cos x| \quad f \tan^2 x \, dx = \tan x - x \quad f \tanh x \, dx = \ln \cosh x \quad f \tanh^2 x \, dx = -\tanh x + x$$
$$f \frac{dx}{\sin x} = -\ln \left| \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\tan x} \right| \quad f \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \frac{1}{\cos x} + \tan x \right| \quad f \frac{dx}{\tan x} = \ln |\sin x|$$
$$f \sin^n \alpha x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} \chi \cos \chi}{n} + \frac{n-1}{n} f \sin^{n-2} \alpha x \, dx \quad f \cos^n \alpha x \, dx = +\frac{\cos^{n-1} \chi \sin \chi}{n} + \frac{n-1}{n} f \cos^{n-2} \alpha x \, dx$$
$$f \sin \alpha x \sin \beta x \, dx = -\frac{\sin \gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin \delta x}{2\delta} \quad f \cos \alpha x \cos \beta x \, dx = +\frac{\sin \gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin \delta x}{2\delta} \quad f \sin \alpha x \cos \beta x \, dx = -\frac{\cos \gamma x}{2\gamma} - \frac{\cos \delta x}{2\delta}$$

$$f x \sin \alpha x \, dx = \frac{\sin \chi}{\alpha^2} - \frac{x \cos \chi}{\alpha} \quad f x \cos \alpha x \, dx = \frac{\cos \chi}{\alpha^2} + \frac{x \sin \chi}{\alpha} \quad f x \sin^2 \alpha x \, dx = \mp \frac{2\chi \sin 2\chi + \cos 2\chi \mp 2\chi^2}{8\alpha^2}$$
$$f x \sin \alpha x \sin \beta x \, dx = \mp \frac{x \sin \gamma x}{2\gamma} \mp \frac{\cos \gamma x}{2\gamma^2} + \frac{x \sin \delta x}{2\delta} + \frac{\cos \delta x}{2\delta^2} \quad f x \sin \alpha x \cos \beta x \, dx = -\frac{x \cos \gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin \delta x}{2\delta^2} - \frac{x \cos \delta x}{2\delta} + \frac{\sin \gamma x}{2\gamma^2}$$

Definite integrals ($m!! = m(m-2)(m-4)\dots$, $-1!! = 0!! = 1!! = 1$)

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{\mu} x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^{\mu} x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\mu+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{if } \mu = n \text{ even} \\ 1 & \text{if } \mu = n \text{ odd} \end{cases} \quad \int_{-1}^1 \frac{\sin(m\pi x) \sin(\tilde{m}\pi x)}{\cos(m\pi x) \cos(\tilde{m}\pi x)} \, dx = \delta_{m,\tilde{m}}$$
$$\int_0^{\alpha} \frac{\sin(\frac{m\pi x}{\alpha}) \sin(\frac{\tilde{m}\pi x}{\alpha})}{\cos(\frac{m\pi x}{\alpha}) \cos(\frac{\tilde{m}\pi x}{\alpha})} \, dx = \frac{\alpha}{2} \delta_{m,\tilde{m}} \quad \int_0^{\alpha} \sin(\frac{m\pi x}{\alpha}) \cos(\frac{\tilde{m}\pi x}{\alpha}) \, dx = \begin{cases} 0 & \text{if } m+\tilde{m} \text{ even} \\ \frac{2m\alpha}{m^2-\tilde{m}^2} \frac{1}{\pi} & \text{if } m+\tilde{m} \text{ odd} \end{cases} \quad \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 2$$

also valid $m = 1/2$

$$\int_0^{\pi} \sin^n x \cos^n x \, dx = 0 \quad \forall \, n \text{ odd} \quad \int_0^{\pi\mu} \frac{\sin^2 \alpha x}{\cos^2 \alpha x} \, dx = \frac{1}{\alpha} [2\pi\alpha\mu \mp \sin(2\pi\alpha\mu)] \quad \text{if } \mu = n \frac{\pi}{\alpha} \quad \int_0^{\pi} \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} \, dx = \frac{4}{3}$$
$$\int_0^2 \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = 0 \quad \int_0^{\pi} \pi \sin x \cos x \, dx = 0 \quad \int_0^{2\pi} \pi \sin^n x \cos^n x \, dx = 0 \text{ if } n, \tilde{n} \text{ not both even} \quad \int_0^2 \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} \, dx = 0$$
$$\int_0^{2\pi} (1 - \cos x)^n \sin n x \, dx = 0 \quad \int_0^{2\pi} (1 - \cos x)^n \cos n x \, dx = (-1)^n \frac{\pi}{2^{n-1}}$$

Parity *Even* $: f_e(-x) = f_e(x)$ $\int_{-1}^{+1} f_e(x) \, dx = 2 \int_0^1 f_e(x) \, dx$ *Odd* $: f_o(-x) = -f_o(x)$ $\int_{-1}^{+1} f_o(x) \, dx = 0$

$$f_e : \cos x, \cosh x, x^{2n}, e^{-x^2}, |x|, \delta_{ij}, \delta(x), \mathbb{R}, 1/f_e, f'_e, f_e \pm f_e, f_e \cdot f_e, f_o \cdot f_o, \mathcal{F}\{f_e(x)\}(\xi), \dots$$
$$f_o : \sin x, \sinh x, x^{2n+1}, \tan x, \operatorname{erf} x, \operatorname{sign} x, \ln\left(\frac{1+\pm x}{1-x}\right), 1/f_o, f'_e, f_o \pm f_o, f_e \cdot f_o, \mathcal{F}\{f_o(x)\}(\xi), \dots$$

Log/Exp ($r \neq -1$)

$$f x^r \ln x \, dx = x^{r+1} \left(\frac{\ln x}{r+1} - \frac{1}{(r+1)^2} \right) \quad f (\ln x)^n \, dx = (-1)^n n! x \sum_{k=0}^n \frac{(-\ln x)^k}{k!} \quad f \frac{dx}{e^{-x}/\alpha + 1} = \alpha \ln(e^x/\alpha + 1)$$
$$f x e^{\alpha x^2} \, dx = \frac{e^{\alpha x^2}}{2\alpha} \quad f x^n e^{\alpha x} \, dx = e^{\alpha x} \sum_{k=0}^n \frac{n! (-1)^k x^{n-k}}{(n-k)! \alpha^{k+1}} \quad f \frac{e^{\alpha x}}{x^n} \, dx = \frac{1}{n-1} \left(-\frac{e^{\alpha x}}{x^{n-1}} + \alpha \int \frac{e^{\alpha x}}{x^{n-1}} \, dx \right)$$

Definite integrals ($r-1, \alpha > 0$ $\gamma \equiv$ Euler-Mascheroni constant)

$$\int_0^{\infty} x^r e^{-\alpha x^2} \, dx = \frac{\Gamma(\frac{r+1}{2})}{2\alpha^{\frac{r+1}{2}}} = \begin{cases} \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}\alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} & \text{if } r = 2n \\ \frac{n!}{2\alpha^{n+1}} & \text{if } r = 2n+1 \end{cases} \quad \int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad \int_0^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} \, dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}$$
$$\int_0^{\infty} x^r e^{-ax} \, dx = \frac{\Gamma(r+1)}{a^{r+1}} \text{ if } r = n \frac{n!}{a^{n+1}} \quad (r > -1, \Re(a) > 0) \quad \int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x - 1} \, dx = \frac{\pi^2}{6}$$
$$\int_0^{\infty} e^{-ax^b} \, dx = a^{-1/b} \Gamma\left(\frac{1}{b} + 1\right) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2 + \beta x} \, dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \quad \int_0^{\infty} e^{i(m-\tilde{m})\phi} d\phi = 2\pi \delta_{m,\tilde{m}}$$
$$\int_0^{\infty} e^{-\alpha x} \sin(\beta x) \, dx = \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \quad \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} \cos(\beta x) \, dx = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \quad \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{e^x} \, dx = \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\lfloor x \rfloor} \right) \, dx = -\gamma$$
$$\int_0^{\infty} x e^{-\alpha x} \sin(\beta x) \, dx = \frac{2\alpha\beta}{(\alpha^2 + \beta^2)^2} \quad \int_0^{\infty} x e^{-\alpha x} \cos(\beta x) \, dx = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{(\alpha^2 + \beta^2)^2} \quad \int_{\Omega} e^{iqr} \cos \theta \, d\Omega = 4\pi \frac{\sin(qr)}{qr}$$

Error function integrals ($\varphi = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $\mu \equiv$ mean, $\sigma^2 \equiv$ variance) $\operatorname{erf}(\pm\infty) = \pm 1$ $\operatorname{erfi}(z) = \operatorname{erf}(iz)$

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt = \operatorname{erf}(z) \quad f \varphi \, dx = \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) \quad f \sqrt{x} e^{ax} \, dx = \frac{\sqrt{x} e^{ax}}{a} - \frac{\sqrt{\pi} \operatorname{erfi}(\sqrt{a} \sqrt{x})}{2a^{3/2}}$$

Miscellaneous

$$\frac{d|x|}{dx} = \operatorname{sgn}(x) \quad \frac{d^2|x|}{d^2x} = \delta(x) \quad \langle \sin x \rangle = \langle \cos x \rangle = \sqrt{2}/2 \quad \langle \sin^2 x \rangle = \langle \cos^2 x \rangle = 1/2$$

Integrales típicas en QED

$$\int_{-1}^1 \left(1 + \cos^2 \theta\right) d(\cos \theta) = \frac{8}{3} \quad \int_{-1}^1 \frac{d(\cos \theta)}{(1 - \beta \cos \theta)^2} = \frac{2}{1 - \beta^2}$$
$$\int \frac{A + B \cos \theta + C \cos^2 \theta}{(1 + \cos \theta)^2} d(\cos \theta) = [x = \cos \theta, u = 1 + x] = \int \left(C + \frac{B - 2C}{u} + \frac{A - B + C}{u^2} \right) du$$
$$= Cu + (B - 2C) \log |u| - \frac{A - B + C}{u} + K \Rightarrow C(1+x) + (B - 2C) \log |1+x| - \frac{A - B + C}{1+x} + K$$
$$[K' = K + C] \Rightarrow I = C \cos \theta + (B - 2C) \log |1 + \cos \theta| - \frac{A - B + C}{1 + \cos \theta} + K'$$

Para salvar la divergencia en $\cos \theta = -1$, se integra de $-1 + \epsilon$ a $1 - \epsilon$. La retrodivergencia indica que la partícula rebota exactamente en la dirección opuesta a su trayectoria incidente en el sistema centro de masas. Señala una resonancia cinemática: la probabilidad del proceso se dispara porque la partícula virtual intercambiada se acerca a su capa de masas ($p^2 \rightarrow 0$), volviéndose “casi real”.

$$\int \frac{A + B \cos \theta + C \cos^2 \theta}{(1 - \cos \theta)^2} d(\cos \theta) = [x = \cos \theta, u = x - 1] = \int \left(C + \frac{B + 2C}{u} + \frac{A + B + C}{u^2} \right) du$$
$$= Cu + (B + 2C) \log |u| - \frac{A + B + C}{u} + K \Rightarrow C(x-1) + (B + 2C) \log |x-1| - \frac{A + B + C}{x-1} + K$$
$$[K' = K - C] \Rightarrow I = C \cos \theta + (B + 2C) \log |1 - \cos \theta| + \frac{A + B + C}{1 - \cos \theta} + K'$$

Para salvar la divergencia en $\cos \theta = 1$, se integra de $-1 + \epsilon$ a $1 - \epsilon$. La dispersión hacia adelante (forward scattering) indica que la partícula apenas se desvía de su trayectoria incidente en el sistema centro de masas. Señala una resonancia cinemática en el canal t : la probabilidad del proceso se dispara porque la partícula virtual intercambiada se acerca a su capa de masas ($t \rightarrow 0$), volviéndose “casi real”. Se puede entender, desde el punto de vista clásico, como que las partículas interactúan a una distancia infinita sin desviarse de su trayectoria original. Ocurre aún cuando $m \neq 0$.

¡Estás integrando con $d(\cos \theta) \Rightarrow$ variable a sustituir según lims integración es $\cos \theta$, no θ !

$$\int \frac{f(\cos \theta)}{1 - \cos \theta} d(\cos \theta)$$

Coordinate Systems


Spherical ($\theta \in [0, \pi]$, $\phi \in [0, 2\pi)$)

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{\mathbf{x}} = \sin \theta \cos \phi \, \hat{\mathbf{r}} + \cos \theta \cos \phi \, \hat{\boldsymbol{\theta}} - \sin \phi \, \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{y}} = \sin \theta \sin \phi \, \hat{\mathbf{r}} + \cos \theta \sin \phi \, \hat{\boldsymbol{\theta}} + \cos \phi \, \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{z}} = \cos \theta \, \hat{\mathbf{r}} - \sin \theta \, \hat{\boldsymbol{\theta}} \end{cases}$$
$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arctan(\sqrt{x^2 + y^2}/z) \\ \phi = \arctan(y/x) \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{\mathbf{r}} = \sin \theta \cos \phi \, \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \sin \phi \, \hat{\mathbf{y}} + \cos \theta \, \hat{\mathbf{z}} \\ \hat{\boldsymbol{\theta}} = \cos \theta \cos \phi \, \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta \sin \phi \, \hat{\mathbf{y}} - \sin \theta \, \hat{\mathbf{z}} \\ \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin \phi \, \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \, \hat{\mathbf{y}} \end{cases}$$

Cylindrical ($\rho \in [0, \infty)$, $\phi \in [0, 2\pi)$)

$$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{\mathbf{x}} = \cos \phi \, \hat{\boldsymbol{\rho}} - \sin \phi \, \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{y}} = \sin \phi \, \hat{\boldsymbol{\rho}} + \cos \phi \, \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \end{cases}$$
$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \arctan(y/x) \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{\boldsymbol{\rho}} = \cos \phi \, \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \, \hat{\mathbf{y}} \\ \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin \phi \, \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \, \hat{\mathbf{y}} \\ \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \end{cases}$$

	Mesón (Masa en MeV)	I ^G (J ^{PC})
Ligeros sin sabor neto (<i>u, d, s</i>)		
$\pi(140)$		1 [−] (0 [−] +)
$\eta(548)$, $\eta'(958)$		0 ⁺ (0 [−] +)
$\rho(770)$		1 ⁺ (1 [−] −)
$\omega(782)$, $\phi(1020)$		0 [−] (1 [−] −)
$a_0(980)$		1 [−] (0 ⁺ +)
$f_0(980)$		0 ⁺ (0 ⁺ +)
$a_1(1260)$		1 [−] (1 ⁺ +)
$f_1(1285)$		0 ⁺ (1 ⁺ +)
$b_1(1235)$		1 ⁺ (1 ⁺ −)
$h_1(1170)$		0 [−] (1 ⁺ −)
$a_2(1320)$		1 [−] (2 ⁺ +)
$f_2(1270)$, $f_2'(1525)$		0 ⁺ (2 ⁺ +)
$\pi_2(1670)$		1 [−] (2 [−] +)
$\eta_2(1645)$		0 ⁺ (2 [−] +)
$\rho_3(1690)$		1 ⁺ (3 [−] −)
$\omega_3(1670)$, $\phi_3(1850)$		0 [−] (3 [−] −)
$a_4(2040)$		1 [−] (4 ⁺ +)
$f_4(2050)$		0 ⁺ (4 ⁺ +)
Charmonium (<i>c$\bar{c}$</i>)		
$\eta_c(2984)$		0 ⁺ (0 [−] +)
$J/\psi(3097)$, $\psi(3686)$		0 [−] (1 [−] −)
$\chi_{c0}(3415)$		0 ⁺ (0 ⁺ +)
$\chi_{c1}(3510)$		0 ⁺ (1 ⁺ +)
$h_c(3525)$		0 [−] (1 ⁺ −)
$\chi_{c2}(3556)$		0 ⁺ (2 ⁺ +)
Bottomonium (<i>b$\bar{b}$</i>)		
$\eta_b(9399)$		0 ⁺ (0 [−] +)
$\Upsilon(9460)$		0 [−] (1 [−] −)
$\chi_{b0}(9859)$		0 ⁺ (0 ⁺ +)
$\chi_{b1}(9893)$		0 ⁺ (1 ⁺ +)
$h_b(9899)$		0 [−] (1 ⁺ −)
$\chi_{b2}(9912)$		0 ⁺ (2 ⁺ +)
Sabor abierto (<i>K, D, B</i>) – Solo I(J ^P)		
$K(494)$, $D(1865)$, $B(5279)$		1/2(0 [−])
$K^*(892)$, $D^*(2010)$, $B^*(5325)$		1/2(1 [−] −)
$D_s(1968)$, $B_s(5367)$		0(0 [−])
$D_s^*(2112)$, $B_s^*(5415)$		0(1 [−])



PROPIEDADES DE MESONES (ESTADOS LIGADOS)

Mesón	I	S	J^π	I_3	m (MeV)	τ (s)	Decays
π^+	1	0	0^-	+1	139.57039	$2.6033 \cdot 10^{-8}$	$\mu^+ \nu_\mu$
π^0	1	0	0^-	0	134.9768	$8.43 \cdot 10^{-17}$	2γ
π^-	1	0	0^-	-1	139.57039	$2.6033 \cdot 10^{-8}$	$\mu^- \bar{\nu}_\mu$
η	0	0	0^-	0	547.862	$\Gamma = 1.31$ keV	2γ
K^+	1/2	1	0^-	1/2	493.677	$1.2380 \cdot 10^{-8}$	$\pi^+ \pi^0, \mu^+ \nu_\mu$
K^0	1/2	1	0^-	-1/2	497.611	$0.8954 \cdot 10^{-10}$	$2\pi, 3\pi$
$\bar{K}^0$	1/2	-1	0^-	1/2	497.611	$5.116 \cdot 10^{-8}$	$2\pi, 3\pi$
K^-	1/2	-1	0^-	-1/2	493.677	$1.2380 \cdot 10^{-8}$	$\pi^- \pi^0, \mu^- \bar{\nu}_\mu$

RESONANCIAS MESÓNICAS

Mesón	I	S	J^π	I_3	Masa (MeV)	Γ (MeV)	Deca.
$\rho^+(770)$	1	0	1^-	1	775.26(23)	149.1(8)	2π
$\rho^0(770)$	1	0	1^-	0	775.26(23)	149.1(8)	2π
$\rho^-(770)$	1	0	1^-	-1	775.26(23)	149.1(8)	2π
$\omega(783)$	0	0	1^-	0	782.66(13)5	8.68(13)	3π
$\eta'(958)$	0	0	0^-	0	957.78(6)	0.188(6)	$\eta 2\pi$
$\phi(1020)$	0	0	1^-	0	1019.461(16)	4.249(13)	$K \bar{K}$
$K^*(892)$	1/2	1	1^-	1/2	891.67(26)	51.4(8)	$K \pi$
$\bar{K}^*(892)$	1/2	-1	1^-	-1/2	895.55(20)	47.3(5)	$K \pi$
$\bar{K}^0(892)$	1/2	-1	1^-	1/2	895.55(20)	47.3(5)	$K \pi$
$K^-(892)$	1/2	-1	1^-	-1/2	891.67(26)	51.4(8)	$K \pi$

PROPIEDADES DE BARIONES (ESTADOS FUNDAMENTALES)

Barión	I	S	J^π	I_3	m (MeV)	τ (s)	Decays
p	1/2	0	$1/2^+$	1/2	938.27208816	$> 9 \cdot 10^{29}$ y	-
n	1/2	0	$1/2^+$	-1/2	939.5654205	878.4	$pe \bar{\nu}_e$
Λ	0	-1	$1/2^+$	0	1115.683	$2.632 \cdot 10^{-10}$	$N \pi$
Σ^+	1	-1	$1/2^+$	1	1189.37	$0.8018 \cdot 10^{-10}$	$N \pi$
Σ^0	1	-1	$1/2^+$	0	1192.642	$7.4 \cdot 10^{-20}$	$\Lambda \gamma$
Σ^-	1	-1	$1/2^+$	-1	1197.449	$1.479 \cdot 10^{-10}$	$N \pi$
Ξ^0	1/2	-2	$1/2^+$	1/2	1314.86(20)	$2.90 \cdot 10^{-10}$	$\Lambda \pi$
Ξ^-	1/2	-2	$1/2^+$	-1/2	1321.71	$1.639 \cdot 10^{-10}$	$\Lambda \pi$
Ω^-	0	-3	$3/2^+$	0	1672.45	$0.821 \cdot 10^{-10}$	ΛK

RESONANCIAS BARIÓNICAS

Barión	I	S	J^π	I_3	m (MeV)	Γ (MeV)	Decays
$\Delta^{++}(1232)$	3/2	0	$3/2^+$	+3/2	1232	117	$N \pi$
$\Delta^+(1232)$	3/2	0	$3/2^+$	+1/2	1232	117	$N \pi$
$\Delta^0(1232)$	3/2	0	$3/2^+$	-1/2	1232	117	$N \pi$
$\Delta^-(1232)$	3/2	0	$3/2^+$	-3/2	1232	117	$N \pi$
$N^+(1440)$	1/2	0	$1/2^+$	+1/2	1440	350	$N \pi$
$N^0(1440)$	1/2	0	$1/2^+$	-1/2	1440	350	$N \pi$
$\Lambda(1405)$	0	-1	$1/2^-$	0	1405.1	50.5	$\Sigma \pi$
$\Sigma^+(1385)$	1	-1	$3/2^+$	1	1382.83	36.2	$\Lambda \pi$
$\Sigma^0(1385)$	1	-1	$3/2^+$	0	1383.7	36	$\Lambda \pi$
$\Sigma^-(1385)$	1	-1	$3/2^+$	-1	1387.2	39.4	$\Lambda \pi$
$\Xi^0(1530)$	1/2	-2	$3/2^+$	1/2	1531.80	9.1	$\Xi \pi$
$\Xi^-(1530)$	1/2	-2	$3/2^+$	-1/2	1535.0	9.9	$\Xi \pi$

HADRONES PESADOS: ESPECTROSCOPIA DE QUARKS c Y b

ENCANTO (c)			BELEZA (b)		
Hadrón	Masa	Comp.	Hadrón	Masa	Comp.
J/Ψ	3096.900	$c\bar{c}$	Υ	9460.40	$b\bar{b}$
D^+	1869.66	$c\bar{d}$	B^+	5279.34	$u\bar{b}$
D^-	1869.66	$d\bar{c}$	B^-	5279.34	$b\bar{u}$
D^0	1864.84	$c\bar{u}$	B^0	5279.66	$d\bar{b}$
$\bar{D}^0$	1864.84	$u\bar{c}$	$\bar{B}^0$	5279.66	$b\bar{d}$
Λ_c^+	2286.46	cdu	Λ_b^0	5619.69	bdu


ESTRUCTURA DE VALENCIA DE HADRONES (QUARKS)

Mesón	qq	Mesón	qq	Barión	qqq	Barión	qqq
π^+	$u\bar{d}$	K^+	$u\bar{s}$	p	uud	Σ^-	dds
π^0	$u\bar{u}, d\bar{d}$	K^0	$d\bar{s}$	n	udd	Λ	uds
π^-	$d\bar{u}$	$\bar{K}^0$	$s\bar{d}$	Σ^+	uus	Ξ^0	uss
η	$u\bar{u}, d\bar{d}, s\bar{s}$	K^-	$s\bar{u}$	Σ^0	uds	Ξ^-	dss
Reson.	qq	Reson.	qq	Reson.	qqq	Reson.	qqq
ρ^+	$u\bar{d}$	ϕ	$s\bar{s}$	Δ^{++}	uuu	Δ^-	ddd
ρ^0	$u\bar{u}, d\bar{d}$	K^{*+}	$u\bar{s}$	Δ^+	uud	Ω^-	sss
ω	$u\bar{u}, d\bar{d}$			Δ^0	udd		


TABLA DE CONFIGURACIONES DE COLOR

Sistema	Estado de color	Interacción
$q - q$	$(rv\rangle - vr\rangle)/\sqrt{2}$	Atractiva
$q - q$	$(rv\rangle + vr\rangle)/\sqrt{2}$	Repulsiva
$q - \bar{q}$	$(r\bar{r}\rangle + v\bar{v}\rangle + a\bar{a}\rangle)/\sqrt{3}$	Atractiva
$q - \bar{q}$	$ r\bar{v}\rangle$	Repulsiva
$q - q - q$	$A_{123} rva\rangle$	Atractiva
$q - q - q$	$(rva\rangle + rav\rangle)/\sqrt{2}$	Repulsiva


Octete de Mesones ($J^P = 0^-$)




Octete de Mesones ($J^P = 1^-$)



Octete de Bariones ($J^P = 1/2^+$)



Decuplete de Bariones ($J^P = 3/2^+$)



Octuplete de Gluones

