

Entrando en un agujero negro

Surface Gravity (κ):

Aceleración que debe tener un observador estático en el horizonte de eventos para no caer, vista por un observador en el infinito.

En agujero negro de Schwarzschild: $\kappa = -\frac{1}{2} \frac{\text{S.I.}}{\kappa} \rightarrow \kappa = \frac{c^4}{4GM}$

Distancia propia:

Distancia física que se mediría en un cierto espacio-tiempo:

- 1. Parametrizamos la curva que queremos medir.
- 2. Diferencia con respecto al parámetro escogido.
- 3. Sustituye en ds^2 e iguala a $d\rho^2$.
- 4. Integra a ambos lados para obtener $\rho \equiv$ distancia propia.

Métrica en las cercanías del horizonte de eventos de Schwarzschild:

$ds^2 \approx -\rho^2 d\varrho^2 + d\rho^2 + d\Omega^2 \quad d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \quad \rho \approx \sqrt{\frac{2}{\kappa}} \sqrt{r-1} \quad \varrho \equiv \kappa t$

La métrica se comporta como la métrica de Rindler $\Rightarrow \Gamma_{\rho\varrho}^\varrho = \frac{1}{\rho} \quad \Gamma_{\varrho\varrho}^\rho = \rho$

Para un observador estático: $\underline{u} = u^0 e_0 = \frac{1}{\rho} e_\varrho \quad \underline{a} = \frac{1}{\rho} e_\rho = \kappa e_1$

Para observadores en caída libre, sus trayectorias espacio-temporales serán líneas verticales (oblicuas si tienen velocidad inicial) que intersecarán con la línea $x = ct$, correspondiente al horizonte de eventos.

Métrica dentro del agujero negro de Schwarzschild, cerca del horizonte de eventos:

$ds^2 \approx -\frac{1}{1-r} dr^2 + (1-r) dt^2 + d\Omega^2 \quad 0 < r < 1 \Rightarrow$ Cambia el signo de las


dos primeras coordenadas: t se comporta como coordenada tipo “espacio”, y r se comporta como coordenada tipo “tiempo”. Ocurrirá también para $0 < r < 1$.

Cambio de coordenadas: $ds^2 \approx -du^2 + u^2 dv^2 + d\Omega^2 \quad u \equiv 2\sqrt{1-r} \quad v \equiv t/2$

Cambio de coordenadas: $ds^2 \approx -dT^2 + dX^2 + d\Omega^2 \quad T \equiv u \cosh v \quad X \equiv u \sinh v$

Un observador estático tendrá t cte $\Rightarrow$ será visto como observador inercial según el observador en caída libre (será representado con líneas rectas oblicuas).


Los instantes de tiempo vienen dados por r cte (serán representados por hipérbolas).



Métrica dentro del agujero negro de Schwarzschild:

– Métrica de Kruskal-Szekeres: $ds^2 = \frac{4}{r} e^{-r} (-dT^2 + dX^2) + r^2 d\Omega^2 \quad 0 < r < 1$.

$T \equiv \sqrt{1-r} e^{r/2} \cosh \frac{t}{2} \quad X \equiv \sqrt{1-r} e^{r/2} \sinh \frac{t}{2} \quad T^2 - X^2 = (1-r) e^r$




Generalización de las coordenadas de Kruskal-Szekeres en las 4 zonas del espacio-tiempo:

Podemos generalizar las coordenadas obtenidas previamente para la zona II (dentro del horizonte de eventos) a la zona I (fuera del horizonte de eventos) y a las zonas III y IV (artificios matemáticos). La métrica es la de Kruskal-Szekeres en toda zona.

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
$T = \sqrt{r-1} e^{r/2} \sinh \frac{t}{2}$	$T = \sqrt{1-r} e^{r/2} \cosh \frac{t}{2}$	$T = -\sqrt{r-1} e^{r/2} \sinh \frac{t}{2}$	$T = -\sqrt{1-r} e^{r/2} \cosh \frac{t}{2}$
$X = \sqrt{r-1} e^{r/2} \cosh \frac{t}{2}$	$X = \sqrt{1-r} e^{r/2} \sinh \frac{t}{2}$	$X = -\sqrt{r-1} e^{r/2} \cosh \frac{t}{2}$	$X = -\sqrt{1-r} e^{r/2} \sinh \frac{t}{2}$

Diagrama de las 4 zonas del espacio-tiempo:



La relación $T^2 - X^2 = (1-r) e^r$ es válida en las 4 zonas, permitiendo determinar la coordenada r correspondiente al par (T, X) . Sin embargo, para un mismo valor de r pueden corresponder puntos con $X > 0$ o $X < 0$. Para conseguir una relación inequívoca, se toma el tiempo coordenado $t < 0$ en la zona III, de acuerdo con las flechas del diagrama.

No obstante, hay que recordar que el tiempo coordenado t es una etiqueta para describir el espacio-tiempo. Lo físicamente relevante es el tiempo propio medido por un observador, que siempre avanza hacia el futuro y nunca puede decrecer a lo a lo largo de su trayectoria.

Métrica de Einstein-Rose

– $ds^2 = -\frac{u^2}{4+u^2} dt^2 + \frac{4+u^2}{4} du^2 + \left(1 + \frac{u^2}{4}\right)^2 d\Omega^2 \quad r = 1 + \frac{u^2}{4} \in [1, \infty)$

Cambio de coordenadas (tipo Kruskal): $ds^2 = \frac{4}{1 + \frac{u^2}{4}} e^{-(1 + \frac{u^2}{4})} (-dT^2 + dX^2)$

$T = \frac{u}{2} e^{\frac{1}{2} + \frac{u^2}{8}} \sinh \frac{t}{2} \quad X = \frac{u}{2} e^{\frac{1}{2} + \frac{u^2}{8}} \cosh \frac{t}{2} \quad d\Omega \equiv \text{cte} \quad X^2 - T^2 = \frac{u^2}{4} e^{1 + \frac{u^2}{4}}$

$u = 0 \rightarrow$ horizonte de eventos $u > 0 \rightarrow$ zona I $u < 0 \rightarrow$ zona III

No existe ningún posible valor de u que nos sitúe en la zona II o zona IV.

$\frac{dt}{d\tau} = \frac{4+u^2}{u^2} \quad \frac{du}{d\tau} = \frac{-4}{u\sqrt{4+u^2}} \quad v_{\text{obs lejano}} = \frac{du}{dt} = -\frac{4u}{(4+u^2)^{3/2}}$

Para un observador estático: $(dt)_{\text{est}} = \sqrt{\frac{u^2}{4+u^2}} dt \quad (du)_{\text{est}} = \sqrt{\frac{4+u^2}{4}} du$

$v_{\text{obs est}} = \frac{(du)_{\text{est}}}{(dt)_{\text{est}}} = \frac{2}{\sqrt{4+u^2}} \xrightarrow{u \rightarrow 0} 1 \xrightarrow{\text{S.I.}} c$ (imposible pasar de zona I a III)

Diagramas de Penrose

Métrica de Minkowski (adimensional, esféricas, $d\theta = 0$):

Cuadrimomento de la luz: $\underline{k} = A e_0 + \sqrt{A^2 - \frac{B^2}{r^2}} e_1 + \frac{B}{r^2} e_3$

$\frac{dt}{d\lambda} = A \quad \frac{dr}{d\lambda} = \sqrt{A^2 - \frac{B^2}{r^2}} \quad \frac{d\phi}{d\lambda} = \frac{B}{r^2} \Rightarrow$ Geodésica: $t - t_0 = \pm \sqrt{r^2 - \frac{B^2}{A^2}}$


Aunque al graficar las geodésicas obtengamos curvas, debemos recordar que es un efecto causado por la elección de las coordenadas, pues la luz se mueve en línea recta en el espacio-tiempo de Minkowski.

– Métrica en las coordenadas del Diagrama de Penrose:

$ds^2 = \frac{-dT^2 + dX^2}{[1 - (T+X)^2][1 - (T-X)^2]} \quad \left| \begin{array}{l} u = T+X \\ v = T-X \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} u = \tanh q \\ v = \tanh p \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} p = t-r \\ q = t+r \end{array} \right|$

Restringido a: $X \geq 0 \quad -1 < T+X < 1 \quad -1 < T-X < 1$

• Diagrama de Penrose para el espacio-tiempo de Minkowski




Métrica de Kruskal (esféricas, $d\Omega = 0$):

– Métrica en las coordenadas del Diagrama de Penrose:

$ds^2 = \frac{1}{r} e^{-r} (1+q^2)(1+p^2)[-dT^2 + d\mathcal{R}^2] \quad \left| \begin{array}{l} T = u+v \\ \mathcal{R} = u-v \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} u = \arctan q \\ v = \arctan p \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} p = T-X \\ q = T+X \end{array} \right|$

• Diagrama de Penrose para el espacio-tiempo de Kruskal



Tensor Energía-Momento

Densidad de corriente: $\underline{J} = \rho c e_0 + \rho v^i e_i \xrightarrow{\text{observador en reposo}} \rho_0 c e_{0'}$

$\rho \equiv$ densidad de carga $\vec{v} \equiv$ velocidad cargas $\rho = \gamma \rho_0$

Divergencia de un cuadvivector: $\text{div} \underline{A} = \text{tr}(\nabla_\alpha A^\beta) = \nabla_\alpha A^\alpha$

Ecuación de continuidad (de manera general): $\nabla_\mu J^\mu = 0$

Ec. de continuidad en cartesianas: $\partial_\mu J^\mu = \frac{\partial J^\mu}{\partial x^\mu} = 0$

Ec. de continuidad en cilíndricas: $\partial_0(\rho c) + \partial_r(\rho v^r) + \partial_\phi(\rho v^\phi) + \frac{1}{r} \rho v^r + \partial_z(\rho v^z) = 0$

S.R. reposo: densidad de partículas: $n_0 = \frac{N}{V_0}$ densidad de masa: $\rho_0 = n_0 m$

densidad de energía: $\varepsilon_0 = \rho_0 c^2$ densidad de momento: $\pi_0 = n_0 p_0 = \varepsilon_0 \frac{v}{c^2} = 0$

Según S.R. inercial: $n = n_0 \gamma \quad \rho = \rho_0 \gamma = n m \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \gamma^2 = \rho \gamma c^2 \quad \pi = n p = \varepsilon \frac{v}{c^2}$

Tensor energía-momento: $T = \rho_0 \underline{u} \otimes \underline{u}$ Conservación energía-momento: $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$

Gram Schmidt orthonormalization (V inner product space, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ L.I. vectors)

$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 \quad \mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|}$
 $\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 \quad \mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|}$
 $\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2 \quad \mathbf{e}_3 = \frac{\mathbf{u}_3}{\|\mathbf{u}_3\|}$
 $\dots$
 $\mathbf{u}_k = \mathbf{v}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{v}_k, \mathbf{u}_j \rangle}{\langle \mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j \rangle} \mathbf{u}_j \quad \mathbf{e}_k = \frac{\mathbf{u}_k}{\|\mathbf{u}_k\|}$

Acción de Hilbert-Einstein (métrica espacio-temporal, $g \equiv \det g$, $\delta \equiv$ variación)

$$\delta(\sqrt{-g}) = \frac{\sqrt{-g}}{2} g^{\alpha\beta} \delta g_{\alpha\beta} = -\frac{\sqrt{-g}}{2} g_{\alpha\beta} \delta g^{\alpha\beta} \quad \Gamma^\mu_{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu \sqrt{-g}$$

$$\delta R_{\alpha\beta} = \nabla_\lambda (\delta \Gamma^\lambda_{\alpha\beta}) - \nabla_\beta (\delta \Gamma^\lambda_{\lambda\alpha}) \quad \delta R = R_{\alpha\beta} \delta g^{\alpha\beta} + \nabla_\alpha (g^{\alpha\lambda} \delta \Gamma^\alpha_{\lambda\beta} - g^{a\alpha} \delta \Gamma^\lambda_{\lambda\alpha})$$

$$J^a \equiv g^{\alpha\lambda} \delta \Gamma^\alpha_{\lambda\beta} - g^{a\alpha} \delta \Gamma^\lambda_{\lambda\alpha} \quad S[g] = \int d^4x \sqrt{-g} R \equiv \text{Acción Hilbert-Einstein}$$

$$\delta S = \int d^4x \left\{ \sqrt{-g} \left[R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} R \right] \delta g^{\alpha\beta} + \partial_\lambda (\sqrt{-g} J^\lambda) \right\}$$

Espacio-tiempo sin frontera (variedad cerrada): $\int d^4x \partial_\lambda (\sqrt{-g} J^\lambda) = 0$

Imponiendo $\delta S = 0$ cuando $\nexists$ frontera $\Rightarrow R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} R = 0$ (ec. de campo en vacío)

Hipersuperficie n -dimensional: $f(x^0, x^1, \dots, x^n) = \text{cte}$

Vector normal a la hipersuperficie, normalizado: $\underline{n} = \frac{\partial_\mu f}{\sqrt{\partial_\alpha f \partial_\beta f g^{\alpha\beta}}} e^\mu$

Base asociada a parametrización (p^a) de la hipersuperficie: $e_a = \frac{\partial x^\mu}{\partial p^a} e_\mu$

Métrica inducida: $h_{ab} = \frac{\partial x^\mu}{\partial p^a} \frac{\partial x^\nu}{\partial p^b} g_{\mu\nu}$ Proyector: obtiene vector $\perp$ a $\underline{n}$

Métrica transversa (o proyector): $h_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} - n_\alpha n_\beta \quad h^\alpha_\beta = \delta^\alpha_\beta - n^\alpha n_\beta$

$$\delta g_{\alpha\beta} = 0 \Leftrightarrow h_{\alpha\beta} \equiv \text{cte} \quad \text{Proyección ortogonal: } e^\perp_\mu = h_\mu{}^\beta e_\beta$$

Tensor ortogonal: $T^\perp_{\mu\nu} = h^\mu{}_\alpha h^\nu{}_\beta T^{\alpha\beta}_\perp \quad T^\perp_{\mu\nu} = h_\mu{}^\alpha h_\nu{}^\beta T_{\alpha\beta}$

Tensor de curvatura extrínseco: $K_{\mu\nu} = h_\mu{}^\alpha h_\nu{}^\beta \nabla_\alpha n^\beta = \nabla_\mu n_\nu - n_\mu n^\alpha \nabla_\alpha n_\nu$

Curvatura extrínseca: $K = \text{tr}(K_{\mu\nu}) = \nabla_\mu n^\mu$

Acción de Hilbert-Einstein-Gibbons-Hawking-York

$$S[g] = S_{HE} + S_{GHY} = \int_M d^4x \sqrt{g} R + 2 \int_{\partial M} d^3p \sqrt{|h|} K \quad \begin{array}{l} \text{curvatura extrínseca } K \\ \text{métrica inducida } h \end{array}$$

$$\delta S[g] = \int_M d^4x \sqrt{-g} (R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} R) \delta g^{\alpha\beta}$$

Hipervolumen

Val. absoluto Jacobiano: $|J| = \det \left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x^\nu} \right) = \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{-g}} \quad \begin{array}{l} \text{Geometrías Riemannianas} \\ \text{Geometrías Lorentzianas} \end{array}$

Ecuaciones de Campo de Einstein y Constante Cosmológica

Métrica de campo gravitatorio uniforme y débil ($V/c \ll 1$):

$$g_{00} = -1 - \frac{2V}{c^2}, \quad g_{11} = g_{22} = g_{33} = 1, \quad \text{resto} = 0$$

Símbolos de Christoffel: $\Gamma^\alpha_{00} = \frac{1}{c^2} g^{\alpha\mu} \partial_\mu V \quad \Gamma^0_{\beta 0} = \frac{1}{c^2} \frac{1}{1 + \frac{2V}{c^2}} \partial_\beta V, \quad \text{resto} = 0.$

Ecuación de Campo de Einstein: $R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$

Acción: $S[g] = -\frac{c^4}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} R - \frac{c^4}{8\pi G} \int d^3p \sqrt{|h|} K + \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_m$

Ecuación de Campo de Einstein con la constante cosmológica:

$$R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} R + g_{\alpha\beta} \Gamma = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

Acción: $S[g] = -\frac{c^4}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} (R - 2\Gamma) - \frac{c^4}{8\pi G} \int d^3p \sqrt{|h|} K + \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_m$