

Manejo e Prejuízos de Lagartas Desfolhadoras

Foco Principal: Lagartas desfolhadoras causam grande prejuízo na cultura da soja e do algodão.

1. Introdução ao Complexo de Pragas

As culturas da soja e do algodão figuram entre os mais importantes pilares do agronegócio brasileiro, tanto em área plantada quanto em valor bruto de produção. No entanto, esses sistemas agrícolas enfrentam desafios fitossanitários severos. Entre os insetos-praga, a guilda de insetos mastigadores representa um risco constante. Como amplamente reconhecido no meio agrônomo, **lagartas desfolhadoras causam grande prejuízo na cultura da soja e do algodão**, exigindo atenção técnica especializada para minimizar perdas e preservar a rentabilidade do produtor.

2. Principais Espécies Desfolhadoras

Diversas espécies compõem o complexo de lagartas que atacam simultaneamente a soja e o algodoeiro, facilitadas pelo sistema de sucessão de culturas adotado em muitas regiões (como o sistema soja-algodão safrinha). As mais críticas incluem:

- **Lagarta-da-soja (*Anticarsia gemmatilis*):** A espécie desfolhadora mais comum. De fácil identificação, apresenta coloração verde ou escura, e voracidade imensa, podendo consumir todo o limbo foliar, deixando apenas as nervuras centrais.

- **Falsa-medideira (*Chrysodeixis includens*):** Lagarta que caminha dobrando o corpo. Costuma alojar-se no terço inferior das plantas, o que dificulta o controle químico devido à barreira física das folhas superiores. Seu ataque intenso afeta drasticamente a capacidade fotossintética da planta.
- ***Helicoverpa armigera*:** Uma praga polífaga e extremamente agressiva. No algodão, ataca desde as folhas até as maçãs e botões florais, causando perdas diretas na produção de fibra. Na soja, além das folhas, destrói vagens em formação.
- **Complexo *Spodoptera* (*Spodoptera frugiperda*, *S. eridania*, *S. cosmioides*):** Possuem grande capacidade de adaptação. A *Spodoptera frugiperda*, tradicional praga do milho, tem se tornado um problema grave na soja e no algodão, cortando plântulas recém-emergidas e destruindo folhagens e estruturas reprodutivas.

3. Dinâmica do Prejuízo Agrônômico

A folha é a fábrica de energia da planta. A desfolha causada pelas lagartas reduz diretamente a área foliar ativa, diminuindo a taxa fotossintética. Se o ataque ocorrer na fase vegetativa inicial, a planta pode compensar parte do dano emitindo novas folhas. No entanto, perdas de área foliar durante a fase de floração, formação de vagens na soja, ou emissão de botões e maçãs no algodão resultam em abortamento de estruturas e redução acentuada do peso final dos grãos e capulhos.

4. Níveis de Ação e Dano Econômico

Para evitar aplicações calendarizadas desnecessárias, o Manejo Integrado de Pragas (MIP) preconiza a adoção de níveis de ação baseados em amostragem. O pano-de-batida é a ferramenta padrão para o monitoramento.

Na cultura da soja, recomenda-se o controle químico ou biológico quando se atinge 30% de desfolha na fase vegetativa ou 15% na fase reprodutiva, ou quando a

amostragem indicar a presença de 20 lagartas grandes (maiores que 1,5 cm) por metro linear. No algodão, os níveis de tolerância são ainda mais rígidos devido ao alto valor agregado da cultura e sensibilidade das estruturas reprodutivas.

5. Estratégias de Controle Integrado

O controle dessas pragas exige a integração de múltiplas estratégias:

- **Tecnologia Bt:** O uso de cultivares de soja e algodão geneticamente modificados com genes da bactéria *Bacillus thuringiensis* revolucionou o manejo, oferecendo proteção interna contra várias espécies de lagartas. Contudo, o plantio de áreas de refúgio é obrigatório para evitar a seleção de pragas resistentes.
- **Controle Químico:** Utilização de inseticidas com diferentes modos de ação (rotação de ingredientes ativos) para evitar o surgimento de resistência. Recomenda-se o uso de produtos fisiológicos (reguladores de crescimento) nas fases iniciais das lagartas.
- **Controle Biológico:** Aplicação de baculovírus (como o *Baculovirus anticarsia*) e liberação de parasitoides de ovos (como *Trichogramma*) e predadores naturais.

6. Considerações Finais

O complexo de lagartas desfolhadoras em soja e algodão é um dos principais gargalos para a manutenção das altas produtividades do cerrado brasileiro e outras regiões agrícolas. O abandono do monitoramento em prol de pulverizações preventivas agrava o problema ao eliminar inimigos naturais e selecionar populações resistentes. O manejo inteligente e sustentável, pautado na ciência agrônoma e no MIP, é a única via segura para mitigar os prejuízos causados por estas pragas.