



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Estadística 2

Tarea unidad 1

Autor:

Jorge Miguel Alvarado Reyes

3 de marzo de 2024

Índice

1. Problema 1	2
2. Problema 2	2
3. Problema 3	2
4. Problema 4	2
5. Problema 5	3
6. Problema 6	3
7. Problema 7	3
8. Problema 8	3
9. Problema 9	3
10. Problema 10	3

1. Problema 1

2. Problema 2

3. Problema 3

4. Problema 4

Dos métodos para controlar el tránsito, A y B, se usaron en cada una de $n = 12$ cruceros durante una semana y los números de accidentes que ocurrieron durante ese tiempo se registraron. El orden de uso (cuál se emplearía para la primera semana) se seleccionó de una manera aleatoria. Se desea saber si los datos dan suficiente evidencia para indicar una diferencia en las distribuciones de porcentajes de accidentes para los métodos A y B de control de tránsito.

Crucero	A	B	Crucero	A	B
1	5	4	7	2	3
2	6	4	8	4	1
3	8	9	9	7	9
4	3	2	10	5	2
5	6	3	11	6	5
6	1	0	12	1	1

Solución

Dado que tenemos datos en pares y lo que buscamos demostrar es si la distribución de los datos difieren podemos utilizar una prueba Wilcoxon

Línea A	Línea B	$A - B$	$ A - B $	Rango	R con signo
5	4	1	1	3.5	3.5
6	4	2	2	7.5	7.5
8	9	-1	1	3.5	- 3.5
3	2	1	1	3.5	3.5
6	3	3	3	10	10
1	0	1	1	3.5	3.5
2	3	-1	1	3.5	-3.5
4	1	3	3	10	10
7	9	-2	2	7.5	-7.5
5	2	3	3	10	10
6	5	1	1	3.5	3.5
1	1	0	0		

$$T_+ = 3,5 + 7,5 + 3,5 + 10 + 3,5 + 10 + 10 + 3,5 = 51,5$$

$$T_- = 3,5 + 3,5 + 7,5 = 14,5$$

$$T = \min(T_+, T_-) = 14,5$$

$$E(T) = \frac{n(n+1)}{4} = \frac{11(11+1)}{4} = 33$$

$$Var(T) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} = \frac{11(11+1)(2(11)+1)}{24} = 126,5$$

$$z = \frac{T - E(T)}{\sqrt{Var(T)}} = \frac{14,5 - 33}{\sqrt{126,5}} = -1,64485$$

Tomando $\alpha = 0,05$

$$q_z(1 - \frac{\alpha}{2}) = 1,96$$

Se rechaza H_0 si

$$|z| > q_z(1 - \frac{\alpha}{2})$$

$$1,64485 > 1,96$$

Por lo tanto las distribuciones son iguales (No se rechaza H_0)

5. Problema 5

Los resultados de un experimento para investigar el reconocimiento de productos, durante tres campañas publicitarias, se muestran en la siguiente tabla. Las respuestas fueron el porcentaje de 400 adultos que estaban familiarizados con el producto recién anunciado. La gráfica de probabilidad normal indicó que los datos no eran aproximadamente normales y debía usarse otro método de análisis. ¿Hay una diferencia significativa entre las tres distribuciones poblacionales de donde vinieron estas muestras?

Campaña		
1	2	3
.33	.28	.21
.29	.41	.30
.21	.34	.26
.32	.39	.33
.25	.27	.31

6. Problema 6

7. Problema 7

8. Problema 8

9. Problema 9

10. Problema 10