



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Estadística 2

Tarea unidad 1

Autor:

Jorge Miguel Alvarado Reyes

6 de marzo de 2024

Índice

1. Problema 1	2
2. Problema 2	2
3. Problema 3	2
4. Problema 4	3
5. Problema 5	4
6. Problema 6	4
7. Problema 7	5
8. Problema 8	5
9. Problema 9	5
10. Problema 10	5

1. Problema 1

En algunas pruebas de salud en ancianos, un nuevo medicamento ha restaurado su memoria casi como la de jóvenes. Pronto se probará en pacientes con enfermedad de Alzheimer, esa fatal enfermedad del cerebro que destruye la mente. Según el Dr. Gary Lynch, de la Universidad de California en Irvine, el medicamento, llamado ampakina CX-516, acelera señales entre células cerebrales que parecen agudizar significativamente la memoria. 2En una prueba preliminar en estudiantes de poco más de 20 años y en hombres de entre 65 y 70 años de edad, los resultados fueron particularmente sorprendentes. Después de recibir dosis moderadas de este medicamento, las personas de entre 65 y 70 años de edad calificaron casi tan alto como los jóvenes. Los datos siguientes son los números de sílabas sin sentido recordadas después de 5 minutos, para 10 hombres de poco más de 20 años de edad y 10 señores de entre 65 y 70 años. Determina si las distribuciones para el número de sílabas sin sentido recordadas son iguales para estos dos grupos.

20s	3 6 4 8 7 1 1 2 7 8
65-70s	1 0 4 1 2 5 0 2 2 3

2. Problema 2

El tratamiento de cáncer por medios químicos, llamado quimioterapia, mata células cancerosas y células normales. En algunos casos, la toxicidad del medicamento para el cáncer, es decir, su efecto sobre células normales, puede reducirse con la inyección simultánea de un segundo medicamento. Se realizó un estudio para determinar si la inyección de un medicamento en particular reducía los efectos dañinos de un tratamiento de quimioterapia en el tiempo de sobrevivencia de ratas. Dos grupos de 12 ratas seleccionados al azar se emplearon en un experimento en el que ambos grupos, llamémoslos A y B, recibieron la droga tóxica en una dosis lo suficientemente grande para causarles la muerte, pero, además, el grupo B recibió la antitoxina que iba a reducir el efecto tóxico de la quimioterapia en células normales. La prueba finalizó al término de 20 días, o sea, 480 horas. Los tiempos de sobrevivencia para los dos grupos de ratas, a las 4 horas más cercanas, se muestran en la tabla siguiente. ¿Los datos dan suficiente evidencia para indicar que las ratas que recibieron la antitoxina tienden a sobrevivir más después de la quimioterapia que las que no recibieron la antitoxina?

Sólo quimioterapia	Quimioterapia más droga
84	140
128	184
168	368
92	96
184	480
92	188
76	480
104	244
72	440
180	380
144	480
120	196

3. Problema 3

Dos chefs, A y B, calificaron 22 comidas en una escala del 1 al 10. Los datos se muestran en la tabla. ¿Los datos dan suficiente evidencia para indicar que uno de los chefs tiende a dar calificaciones más altas que el otro?

Comida	A	B	Comida	A	B
1	6	8	12	8	5
2	4	5	13	4	2
3	7	4	14	3	3
4	8	7	15	6	8
5	2	3	16	9	10
6	7	4	17	9	8
7	9	9	18	4	6
8	7	8	19	4	3
9	2	5	20	5	4
10	4	3	21	3	2
11	6	9	22	5	3

4. Problema 4

Dos métodos para controlar el tránsito, A y B, se usaron en cada una de $n = 12$ cruceros durante una semana y los números de accidentes que ocurrieron durante ese tiempo se registraron. El orden de uso (cuál se emplearía para la primera semana) se seleccionó de una manera aleatoria. Se desea saber si los datos dan suficiente evidencia para indicar una diferencia en las distribuciones de porcentajes de accidentes para los métodos A y B de control de tránsito.

Crucero	A	B	Crucero	A	B
1	5	4	7	2	3
2	6	4	8	4	1
3	8	9	9	7	9
4	3	2	10	5	2
5	6	3	11	6	5
6	1	0	12	1	1

Solución

Dado que tenemos datos en pares y lo que buscamos demostrar es si la distribución de los datos difieren podemos utilizar una prueba Wilcoxon

Línea A	Línea B	$A - B$	$ A - B $	Rango	R con signo
5	4	1	1	4.5	4.5
6	4	2	2	8.5	8.5
8	9	-1	1	4.5	-4.5
3	2	1	1	4.5	4.5
6	3	3	3	11	11
1	0	1	1	4.5	4.5
2	3	-1	1	4.5	-4.5
4	1	3	3	11	11
7	9	-2	2	8.5	-8.5
5	2	3	3	11	11
6	5	1	1	4.5	4.5
1	1	0	0	1	1

$$T_+ = 4,5 + 8,5 + 4,5 + 11 + 4,5 + 11 + 11 + 4,5 = 59,5$$

$$T_- = 4,5 + 4,5 + 8,5 = 17,5$$

$$T = \min(T_+, T_-) = 17,5$$

$$E(T) = \frac{n(n+1)}{4} = \frac{12(12+1)}{4} = 39$$

$$Var(T) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} = \frac{12(12+1)(2(12)+1)}{24} = 169$$

$$z = \frac{T - E(T)}{\sqrt{Var(T)}} = \frac{17,5 - 39}{\sqrt{169}} = -1,65385$$

Tomando $\alpha = 0,05$

$$q_z(1 - \frac{\alpha}{2}) = 1,96$$

Se rechaza H_0 si

$$|z| > q_z(1 - \frac{\alpha}{2})$$

$$1,65385 > 1,96$$

Por lo tanto las distribuciones son iguales (No se rechaza H_0), se acepta H_0 lo que indica que la línea A y la línea B no son diferentes

5. Problema 5

Los resultados de un experimento para investigar el reconocimiento de productos, durante tres campañas publicitarias, se muestran en la siguiente tabla. Las respuestas fueron el porcentaje de 400 adultos que estaban familiarizados con el producto recién anunciado. La gráfica de probabilidad normal indicó que los datos no eran aproximadamente normales y debía usarse otro método de análisis. ¿Hay una diferencia significativa entre las tres distribuciones poblacionales de donde vinieron estas muestras?

Campaña		
1	2	3
.33	.28	.21
.29	.41	.30
.21	.34	.26
.32	.39	.33
.25	.27	.31

6. Problema 6

En un estudio reciente que involucró una muestra aleatoria de 300 accidentes automovilísticos, se clasificó la información de acuerdo con el tamaño del automóvil.

	Pequeño	Mediano	Grande
Por lo menos un muerto	42	35	20
Ningún muerto	78	65	60

Con estos datos, ¿puedes afirmar que la frecuencia de accidentes depende del tamaño del automóvil?

7. Problema 7

Verifica si los siguientes datos provienen de una distribución normal.

1.0672029	2.3103976	0.8193199	-0.8588287	0.8003015
-0.8404432	0.2049356	-0.9665391	1.7639849	-0.7825124
-2.9712801	-0.8181979	-2.0191393	-1.6289196	2.4613544
-2.6406738	-2.6125324	-1.1968322	-0.1210923	-2.1779296
2.5898699	-2.6133718	-1.6105999	1.0137149	-2.3441204

8. Problema 8

Demuestra que el coeficiente de la τ de Kendall es:

$$\tau = 1 - \frac{4Q}{n(n-1)}$$

Hint: $P+Q=\frac{n(n-1)}{2}$

9. Problema 9

Investiga la prueba de Friedman y resuelve un problema práctico.

10. Problema 10

Investiga la prueba de independencia basada en el coeficiente de Pearson y resuelve un problema práctico.