Actividad-17

Saúl Francisco Vázquez del Río

2024-10-15

Repasa los procesos Poisson en el tema 1 del Contenido 3. Distingue la diferencia entre el uso de las distribuciones Poisson, Exponencial y Gamma en los Procesos Poisson. Resuelve los dos problemas que vienen al final de la presentación.

##Drive Thru El tiempo de llegada a una ventanilla de toma de órdenes desde un automóvil de un cierto comercio de hamburguesas sigue un proceso de Poisson con un promedio de 12 llegadas por hora.

¿Cuál será la probabilidad de que el tiempo de espera de tres personas sea a lo más de 20 minutos?

```
k <- 3
lambda <- 12
time <- 20

prob <- pgamma(1/3,k,lambda)
prob

## [1] 0.7618967</pre>
```

¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera de una persona esté entre 5 y 10 segundos?

```
t1 <- 5 / 3600
t2 <- 10 / 3600
prob <- pexp(t2, 12) - pexp(t1, 12)
prob
## [1] 0.01625535
```

¿Cuál será la probabilidad de que en 15 minutos lleguen a lo más tres personas?

```
lambda <- 3
x <- 3
prob <- ppois(x, lambda)
prob
## [1] 0.6472319</pre>
```

¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera de tres personas esté entre 5 y 10 segundos?

```
k <- 3
lambda <- 12
t1 <- 5 / 3600
t2 <- 10 / 3600

prob <- pgamma(t2, k, lambda) - pgamma(t1, k, lambda)
prob
## [1] 5.258533e-06</pre>
```

Determine la media y varianza del tiempo de espera de tres personas.

```
k <- 3
lambda <- 12

media <- k / lambda
varianza <- k / (lambda^2)

media
## [1] 0.25

varianza
## [1] 0.02083333</pre>
```

¿Cuál será la probabilidad de que el tiempo de espera de tres personas exceda una desviación estándar arriba de la media?

```
k <- 3
lambda <- 12

media <- k / lambda
desviacion <- sqrt(k) / lambda

prob <- 1 - pgamma(media + desviacion, k, lambda)
prob

## [1] 0.1491102</pre>
```

Entre partículas

Una masa radioactiva emite partículas de acuerdo con un proceso de Poisson con una razón promedio de 15 partículas por minuto. En algún punto inicia el reloj.

¿Cuál es la probabilidad de que en los siguientes 3 minutos la masa radioactiva emita 30 partículas?

```
lambda <- 15
t <- 3
x <- 30
```

```
prob <- dpois(x, lambda * t)
prob
## [1] 0.00426053</pre>
```

¿Cuál es la probabilidad de que transcurran cinco segundos a lo más antes de la siguiente emisión?

```
lambda <- 15
t <- 5

prob <- pexp(t/60, lambda)
prob

## [1] 0.7134952</pre>
```

¿Cuánto es la mediana del tiempo de espera de la siguiente emisión?

```
lambda <- 15

mediana <- log(2) / lambda
mediana
## [1] 0.04620981</pre>
```

¿Cuál es la probabilidad de que transcurran a lo más cinco segundos antes de la segunda emisión?

```
k <- 2
lambda <- 15
t <- 5

prob <- pgamma(t/60, k,lambda)
prob

## [1] 0.3553642</pre>
```

¿En que rango se encuentra el 50% del tiempo central que transcurre antes de la segunda emisión?

```
k <- 2
lambda <- 15

q1 <- qgamma(0.25, k, lambda)
q3 <- qgamma(0.75, k, lambda)

q1

## [1] 0.06408525
q3

## [1] 0.179509</pre>
```