

(Tarea 5:) Dependencias y Normalización

Naranjo Robledo Carlos
López García José Gilberto

7 de mayo de 2018

Tarea 5

(1) Preguntas de repaso.

- (a) ¿Qué es una dependencia funcional y cómo se define? Se trata de una relación unidireccional entre 2 atributos de tal forma que en un momento dado, para cada valor único de A , sólo un valor de B se asocia con él a través de la relación.
- (b) ¿Para qué sirve el concepto de dependencia en la normalización?
 - 1) Ayudan a especificar formalmente cuando un diseño es correcto.
 - 2) Especificar restricciones sobre el conjunto de relaciones.
 - 3) Examinar las relaciones y determinar si son legales bajo un conjunto de dependencias funcionales dado.
- (c) Sea A la llave de $R(A, B, C)$. indica todas las dependencias funcionales que implica A .

$$A \rightarrow A$$

$$A \rightarrow B$$

$$A \rightarrow C$$

$$A+ = \{A, B, C\}$$

- (d) ¿Qué es una forma normal? ¿Cuál es el objetivo de normalizar un modelo de datos?
 - 1) Técnica desarrollada inicialmente por E.F.Codd en 1972, para diseñar la estructura lógica de una BD en el modelo relacional.
 - 2) Proceso por el cual se va comprobando el cumplimiento de una serie de reglas (restricciones) por parte de un esquema de relación.
 - 3) Cada regla que se cumple, aumenta el grado de normalización del esquema.
 - 4) Cuando una regla no cumple, el esquema de relación se debe descomponer en varios esquemas que sí la cumplan por separado.

- (e) En qué casos es preferible lograr 3NF en vez de BCNF
 La forma normal de Boyce-Codd requiere que no existan dependencias funcionales no triviales de los atributos que no sean un conjunto de la clave candidata.
- (2) Proporciona algunos ejemplos que demuestren que las siguientes reglas no son válidas.
- (a) $A \rightarrow B$, entonces $B \rightarrow A$
 Tenemos que a cada valor de A se le asigna un unico valor de B, suponiendo que A es una persona y B el nombre de la persona, sabemos que una persona solo puede tener un nombre, pero si elegimos un nombre este puede estar asociado a mas de una persona.
- (b) Si $AB \rightarrow C$, entonces $A \rightarrow C$ y $B \rightarrow C$
 En este caso recordemos que una dependencia funcional a cada atributo se le asigna un valor unico, pensando en A como los días y B como los meses podemos decir que estos 2 atributos determinan una fecha, pero A no determina funcionalmente a C por que A puede tener varias fechas C asociadas.
- (C) Si $A \rightarrow C$, entonces $A \rightarrow C$
 No necesariamente porque a un atributo en a A se le puede asociar mas de un valor de C.
- (3) Para cada uno de los esuemmas que se muestran a continuación:
- (a) $R(A, B, C, D, E)$ con $F = \{AB \rightarrow CD, E \rightarrow C, D \rightarrow B\}$
- (b) $R(A, B, C, D, E)$ con $F = \{AB \rightarrow C, DE \rightarrow C, B \rightarrow D\}$
- (4) Para cada una de las siguientes relaciones con su respectivo conjunto de dependencias funcionales:
- (a) $R(A, B, C, D, E, F)$ con $F = \{B \rightarrow D, B \rightarrow E, D \rightarrow F, AB \rightarrow C\}$
- (b) $R(A, B, C, D, E)$ con $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow D, CD \rightarrow E, E \rightarrow A\}$

Indica todas las violaciones a la 3NF

Normaliza de acuerdo a la 3NF

- (a) $R(A, B, C, D, E, F)$ con $F = \{B \rightarrow D, B \rightarrow E, D \rightarrow F, AB \rightarrow C\}$

$$F = \{B \rightarrow DE, D \rightarrow F, AB \rightarrow C\}$$

Superfluo Izquierdos:

Es evidente en este caso que no existe variables superfluos del lado izquierdo, solo la dependencia funcional $AB \rightarrow C$ cumple tener mas de dos variables del lado izquierdo y B solo llega a D y E entonces no hay forma posible de llegar a C sin A.

Superfluo Derecho:

$$B \rightarrow DE$$

¿D superfluo?

$$F' \{B \rightarrow E, D \rightarrow F, AB \rightarrow C\}$$

$$\{B\}^+ = \{B, E\}$$

∴ D no es superfluo.

¿E es superfluo?

$$F' \{B \rightarrow D, D \rightarrow F, AB \rightarrow C\}$$

$$\{B\}^+ = \{B, D, F\}$$

∴ E no es superfluo

F tenía desde el principio el mínimo conjunto de dependencias funcionales.

(b) $R(A, B, C, D, E)$ con $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow D, CD \rightarrow E, E \rightarrow A\}$

Superfluo Izquierdo:

$$CD \rightarrow E$$

∴ C superfluo.

$$D \rightarrow E$$

$$\{D\}^+ = \{D, E, A, B, C\}$$

∴ C es superfluo.

$$F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow A\}$$

Superfluo Derecho:

$$A \rightarrow BC$$

¿B superfluo?

$$F' = \{A \rightarrow C, B \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow A\}$$

$$\{A\}^+ = \{A, C\}$$

∴ B no es superfluo, C superfluo.

$$F' = \{A \rightarrow B, B \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow A\}$$

$$\{A\}^+ = \{A, B, D, E\} \therefore C \text{ no es superfluo}$$

F ya tiene el mínimo conjunto de dependencias funcionales al terminar de ver los superfluos izquierdos.

(5) Sea el esquema:

$$R(A, B, C, D, E, F) \text{ con } F = \{BD \rightarrow E, CD \rightarrow A, E \rightarrow C, B \rightarrow D\}$$

¿Qué puedes decir de $\{A\}^+$ y $\{F\}^+$?

Calcula $\{B\}^+$, ¿qué puedes decir de esta cerradura?

Obtén todas las llaves candidatas.

¿R cumple con BCNF? ¿Cumple con 3NF? (en caso contrario normaliza)

Se ha decidido dividir R en las siguientes relaciones S(A,B,C,D,F) y T(C,E),
¿se puede recuperar la información de R?

$$\{A\}^+ = \{A\}$$

$$\{F\}^+ = \{F\}$$

$$\{B\}^+ = \{B, D, E, C, A\}$$

Llave candidata: B

3ra Forma Normal

Superfluo Izquierdo:

$$BD \rightarrow E$$

¿B superfluo?

$$D \rightarrow E$$

$$\{D\}^+ = \{D, E, C, A\}$$

∴ B no es superfluo ¿D superfluo?

$$B \rightarrow E$$

$$\{B\}^+ = \{B, D, E, C, A\}$$

∴ D es superfluo

$$F = \{B \rightarrow E, CD \rightarrow A, E \rightarrow C, B \rightarrow D\}$$

$$F = \{B \rightarrow DE, CD \rightarrow A, E \rightarrow C\}$$

¿C superfluo?

$$D \rightarrow A$$

$$\{D\}^+ = \{D, A\} \therefore C \text{ no es superfluo}$$

¿D superfluo?

$$C \rightarrow A$$

$$\{C\}^+ = \{C, A\}$$

∴ D no es superfluo

Superfluo Derecho:

$$B \rightarrow DE$$

¿D superfluo?

$$F' = \{B \rightarrow E, CD \rightarrow A, E \rightarrow C\}$$

$$\{B\}^+ = \{B, E, C\}$$

∴ D no es superfluo

¿E superfluo?

$$F' = \{B \rightarrow D, CD \rightarrow A, E \rightarrow C\}$$

$$\{B\}^+ = \{B, D\}$$

\therefore E no es superfluo. F ya tenia el conjunto de dependencias funcionales al terminar los superfluo izquierdo

$$F = \{B \rightarrow DE, CD \rightarrow A, E \rightarrow C\}$$

La llave de R es: B

Dividimos en particiones

S(B,D,E) *con* $B \rightarrow DE$

T(C,D,A) *con* $CD \rightarrow A$

U(E,C) *con* $E \rightarrow C$

La llave de R esta contenido en S entonces ya esta normalizado

- (6) Para cada uno de los esquemas, con su respectivo conjunto de dependencias multivaluadas, resuelve los siguientes puntos:

(a) R(A,B,C,D) con DMV = $\{AB \twoheadrightarrow C, B \rightarrow D\}$

(b) R(A,B,C,D,E) con DMV = $\{A \twoheadrightarrow B, AB \rightarrow C, A \rightarrow D, AB \rightarrow E\}$

Encuentra todas las violaciones a la 4NF

Normaliza de acuerdo a la 4NF

a. Llave para R: ABC $AB \twoheadrightarrow C$

$B \rightarrow D$ violacion

S(B,D) con $B \rightarrow D$ Llave B para S normalizado

T(B,A,C) con $AB \twoheadrightarrow C$ La llave es AB no puede haber violacion

b. Llave para R: ABE

DMV = $\{A \twoheadrightarrow B, AB \rightarrow CE, A \rightarrow D\}$

$AB \rightarrow CE$ Violacion $A \rightarrow D$ Violacion S(A,B,C) *con* $AB \rightarrow C$ La llave de S es AB no hay violacion normalizado

T(A,D,E) con $A \twoheadrightarrow D$ llave es Violacion

U(A,D) con $A \twoheadrightarrow D$ La llave es A no hay violacion V(A,E) con $AE \twoheadrightarrow AE$ trivial normalizado.

V(A,B) con $A \twoheadrightarrow B$ Trivial Normalizado.

- (7) Se tiene la siguiente relación:

R(idEnfermo, idCirujano, fechaCiruga, nombreEnfermo, direccinEnfermo, nombreCirujano, nombreCiruga, medicinaSuministrada, efectosSecundarios)

Digamos que:

$idEnfermo := IDE$	$idCirujano := IDC$
$nombreEnfermo := NE$	$nombreCirujano := NC$
$direccionEnfermo := DE$	$medicinaSuministrada := M$
$fechaCiruga := FC$	$efectosSecundarios := E$
$nombreCiruga := NC$	

- a) Expresa las siguientes restricciones en forma de dependencias funcionales: A un enfermo sólo se le da una medicina suministrada. Sólo puede existir un efecto secundario por medicamento.

$$IDE \rightarrow M \qquad M \rightarrow E$$

- b) Especifica otras dependencias funcionales o multivaluadas que deban satisfacerse en la relación R. Por cada una que definas, deberá aparecer un enunciado en español como en el inciso anterior.

$IDE \rightarrow NE$ Un enfermo sólo tiene un nombre.

$IDE \rightarrow DE$ Un enfermo sólo tiene una dirección.

$IDC \rightarrow NC$ Un cirujano sólo tiene un nombre.

$NC \rightarrow FC$ Una cirugía sólo tiene una fecha.

$FC \twoheadrightarrow NC$ Una fecha puede tener varias cirugías.

$E \twoheadrightarrow M$ Un efecto Secundario puede ser provocado por varios medicamentos.

- c) Normaliza utilizando el conjunto de dependencias establecido en los puntos anteriores.