Colangitis biliar primaria (PBC)



Imagen tomada de: https://drnidoni.com/primary-biliary-cholangitis/

Descripción

- Enfermedad autoinmune del hígado (no hay cura)
- Los ductos biliares se ven afectados y gradualmente destruidos
- Factores de riesgo:
  - Sexo (afecta más a mujeres)
  - Edad (30-60)
  - Genética
- Complicaciones
  - Colangitis y cirrosis
  - Hipertensión portal
  - Cáncer de hígado

Imagen tomada de: https://drmarcoloera.com/cirrosis-hepatica/

Mayo Clinic PBC Data

- Ensayo clínico de Mayo Clinic entre 1974 y 1984
- 418 pacientes
  - 312 participaron en el ensayo de la D-Penicilamina
  - 106 individuos sólo se les tomaron ciertas mediciones de interés
- 20 variables entre las que se encuentran:
  - **time**: Número de días para la muerte, transplante de hígado o fin de estudio
  - **status**: Censura (0), transplante (1), muerte (2)
  - **age**: Edad en años
  - **sex**: Hombre (m), mujer (f)
  - **bili**: Bilirrubina en suero
  - **albumin**: Albúmina en suero
  - **edema**: Sin edema (0), sin tratamiento o tratado con éxito (0.5), con edema a pesar de terapia diurética (1)

Estimadores no paramétricos de la supervivencia

Kaplan-Meier



Nelson-Aalen



Comparar poblaciones

Supervivencia por sexo

Sexo	Media	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	SD
M	1894.023	140	1060.75	1507	2715.75	4459	1213.034
F	1920.578	41	1095.50	1773	2606.25	4795	1092.953



Supervivencia por sexo



Prueba de log-rangos

$p = 0.08$

Prueba Peto-Peto

$p = 0.1$

Supervivencia por etapa

- Etapa histológica de la enfermedad (requiere biopsia)



Supervivencia por etapa

Etapa	Media	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	SD
1	2654.810	489	1702.00	2644.0	3388.00	4459	1092.8129
2	2389.837	130	1440.50	2409.5	3110.75	4795	1069.0888
3	1997.452	140	1314.50	1810.0	2532.00	4500	973.8381
4	1420.250	41	706.75	1207.0	1943.75	4523	1040.3693



Supervivencia por etapa



Prueba de log-rangos

$p = 4e - 15$

Prueba Peto-Peto

$p = 2e - 16$

Supervivencia por etapa

- Juntando etapa 1 y 2 en una etapa inicial.



Prueba de log-rangos

$$p = 1e - 15$$

Prueba Peto-Peto

$$p < 2e - 16$$

Modelo de Cox

Modelo de Cox

- Se tienen 418 observaciones con 161 muertes registradas (38.52%)

Variable	Coef.	Exp(Coef.)	Intervalo (0.95)	p-valor
Mujer	-0.385472	0.680130	(0.4332 , 1.0677)	0.0939
Edema 0.5	0.285343	1.330218	(0.8434 , 2.0980)	0.2197
Edema 1	1.252311	3.498417	(1.9651 , 6.2282)	2.09E-05
Edad	0.037227	1.037928	(1.0211 , 1.0550)	7.91E-06
Bilirrubina	0.122470	1.130285	(1.1017, 1.1596)	< 2e-16
Albúmina	-0.984622	0.373580	(0.2501 , 0.5581)	1.52E-06

- Prueba del cociente, prueba de Wald y prueba score todas significativas

- Concordancia de 0.811

Residuales Cox-Snell

- El ajuste no parece ser totalmente adecuado



Residuales martingala

- Contra la edad



Residuales martingala

- Contra la albúmina



Residuales martingala

- Contra la bilirrubina



- No es lineal la relación