# Tahák

Matematická analýza · IES FSV UK · Josef Hlahulek

## Binomická věta

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

$$\begin{aligned}
(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\
(a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\
(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\
(a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3
\end{aligned}$$

## Rozdíl $n$-tých mocnin

$$a^n - b^n = (a-b)\left(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}\right)$$

$$a - b = \frac{a^n - b^n}{a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}}$$

$$\begin{aligned}
n = 2 \quad & a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\
n = 3 \quad & a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)
\end{aligned}$$

## Elementární limity funkcí

pro $x \to 0$:

$$\frac{\sin x}{x} \to 1 \qquad \frac{\operatorname{tg} x}{x} \to 1$$

$$\frac{\arcsin x}{x} \to 1 \qquad \frac{\operatorname{arctg} x}{x} \to 1$$

$$\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2} \qquad \frac{e^x - 1}{x} \to 1$$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1 \qquad \frac{(1+x)^a - 1}{x} \to a$$

jinde:

$$x \operatorname{arccotg} x \to 1 \ (x \to \infty) \qquad \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \to e \ (x \to \infty)$$

$$\frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}} \to \sqrt{2} \quad (x \to 1^-)$$

Je-li $g(x) \to 0$ a $g(x) \neq 0$ na prstencovém okolí, platí totéž s $g(x)$ místo $x$ (věta o limitě složené funkce).