

1 麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组是经典电磁学的核心，它用四个偏微分方程统一描述了电场、磁场与电荷、电流之间的相互关系，并预言了电磁波的存在¹⁶。

来历

19 世纪之前，电学与磁学被视为互不相关的两门学科。1820 年，丹麦物理学家奥斯特（H. C. Ørsted）发现通电导线能使附近的磁针偏转，第一次揭示了电与磁之间的内在联系；此后安培定量研究了电流之间的磁相互作用，法拉第（M. Faraday）于 1831 年发现电磁感应现象，并提出以“力线”描述场的直观思想，为场的观念奠定了基础。

真正将电磁学统一起来的，是英国物理学家麦克斯韦（J. C. Maxwell）。1861–1862 年，他在《论物理力线》（*On Physical Lines of Force*）中引入“位移电流”的概念，修正了安培定律在非恒定电流情形下的矛盾；1864 年，他在《电磁场的动力学理论》（*A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field*）中系统给出了以他名字命名的方程组¹⁶，把电场、磁场、电荷与电流纳入一个自洽的数学框架，并由此预言了电磁波的存在。1873 年问世的《电磁通论》（*A Treatise on Electricity and Magnetism*）对这套理论作了完整而严密的阐述。

1888 年，赫兹（H. Hertz）通过实验证实了电磁波的存在，麦克斯韦的预言得到验证。此后，电磁理论催生了无线电报、雷达与现代通信技术，还促使爱因斯坦从电磁定律在惯性系间的对称性出发创立了狭义相对论，深刻改变了整个物理学与现代文明。

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.\end{aligned}\tag{1}$$

方程组解释

- **高斯定律（式一）：** $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ 。电场的有源性质——电荷是电场的源，穿过闭合曲面的电通量正比于曲面内所含的自由电荷量¹⁴。

- **高斯磁定律（式二）：** $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。磁场的无源性质——不存在磁单极子，磁力线总是闭合的，穿过任意闭合曲面的磁通量恒为零。
- **法拉第电磁感应定律（式三）：** $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 。变化的磁场产生涡旋电场——这是发电机、变压器工作的基本原理。
- **安培-麦克斯韦定律（式四）：** $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 。电流和变化的电场都能产生磁场；其中位移电流项是麦克斯韦的关键贡献¹⁶，它使得电磁波的存在成为可能。位移电流定义为

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (2)$$

即变化的电场同样能激发磁场。

主要应用

1. **电磁波与通信：**麦克斯韦预言了电磁波的存在，后被赫兹实验证实。无线电、微波、光通信（光纤）、雷达均基于此。
2. **电力系统：**发电机（法拉第定律）与变压器将机械能转化为电能并实现电压变换，构成现代电网的基础。
3. **电磁兼容（EMC）：**电子设备设计中需控制电磁辐射与抗干扰能力，确保各设备在共用电磁环境中正常工作。
4. **医用成像：**MRI（磁共振成像）利用强磁场与射频脉冲，基于核磁共振原理获取人体内部结构图像。
5. **天线设计：**从手机天线到射电望远镜，天线辐射方向图与阻抗匹配均由麦克斯韦方程组导出。
6. **光学与光电子：**可见光本质上是特定频段的电磁波，反射、折射、衍射、偏振等现象均可由麦克斯韦方程组统一描述。

重要推导与推论

从麦克斯韦方程组出发，可以推导出一系列具有深远影响的结论：

1. **电磁波方程**。在无源区域 ($\rho = 0, \mathbf{J} = 0$) 中, 对法拉第定律取旋度并代入安培-麦克斯韦定律, 得到波动方程:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad (3)$$

其传播速度 $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$, 在真空中为光速

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}, \quad (4)$$

从而揭示光就是电磁波, 实现了电学、磁学与光学的统一^{16;14}。

2. **电荷守恒定律 (连续性方程)**。对安培-麦克斯韦定律取散度, 利用矢量恒等式和电荷守恒, 得到:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (5)$$

这一方程表明电荷既不能创生也不能消灭, 仅能从一处流向另一处。

3. **坡印廷定理 (能量守恒)**。将法拉第定律与安培-麦克斯韦定律联立, 可以导出电磁场的能量守恒关系:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}, \quad (6)$$

其中能量密度 $u = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H})$, 坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 表示电磁能的流动方向和通量密度¹⁴。

4. **库仑定律的等价性**。在静电场条件下 ($\partial/\partial t = 0$), 高斯定律 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ 通过散度定理等价于库仑定律:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (7)$$

5. **边界条件**。在两种不同介质的交界面处, 麦克斯韦方程组的积分形式导出以下边界条件:

$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_f, \quad B_{1n} - B_{2n} = 0, \quad (8)$$

$$E_{1t} - E_{2t} = 0, \quad H_{1t} - H_{2t} = K_f. \quad (9)$$

这些条件在电磁波反射与折射、波导和谐振腔分析中至关重要¹⁴。

6. **电磁势与规范不变性。**由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 引入矢量势 $\mathbf{A}$ 使得 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, 代入法拉第定律得 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ 。规范变换:

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \quad \varphi \rightarrow \varphi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}, \quad (10)$$

保持电磁场不变, 这一对称性在量子电动力学 (QED) 中起着基石作用。

2 爱因斯坦的相对论和量子力学

阿尔伯特·爱因斯坦 (A. Einstein, 1879–1955) 是 20 世纪最伟大的物理学家之一。他在量子力学诞生之初便奠定了其基石, 又独自创立了狭义相对论与广义相对论, 深刻重塑了人类对微观世界与宏观时空的认识。下面分领域介绍其主要贡献, 并罗列具体成果。

量子力学方面的主要贡献

1. **光量子假说 (1905):** 在论文《关于光的产生和转化的一个启发性观点》⁷ 中提出光由一个个“光量子”(光子)组成, 其能量与动量分别为 $E = h\nu$ 、 $p = h/\lambda$, 据此圆满解释了光电效应, 给出方程

$$h\nu = W_0 + E_k, \quad (11)$$

其中 W_0 为金属逸出功, E_k 为光电子最大动能; 1921 年因此获诺贝尔物理学奖。

2. **固体比热容理论 (1907):** 将量子化思想应用于固体中原子的振动, 解释了低温下固体比热容随温度下降而减小的实验事实, 是量子论早期最重要的应用之一。
3. **受激辐射理论 (1916–1917):** 在《关于辐射的量子理论》中引入受激辐射与自发辐射的概念, 预言受激辐射的存在, 为 20 世纪 60 年代激光 (LASER) 的发明奠定了理论基础。
4. **玻色–爱因斯坦统计 (1924–1925):** 接受玻色 (S. N. Bose) 的光子统计思想³ 并将其推广到全同粒子¹², 提出平均占据数满足

$$n_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/k_B T} - 1}, \quad (12)$$

的统计分布，预言低温下大量玻色子会凝聚到同一量子态——玻色-爱因斯坦凝聚（BEC），该现象于 1995 年在实验室中实现。

5. **EPR 悖论（1935）**：与波多尔斯基（B. Podolsky）、罗森（N. Rosen）合著论文《物理实在的量子力学描述能否被认为是完备的？》¹³，质疑量子力学的完备性，揭示了“量子纠缠”现象，直接催生了贝尔不等式与量子纠缠的实验研究，成为量子信息科学的理论源头。

相对论方面的主要贡献

1. **狭义相对论（1905）**：在《论动体的电动力学》⁸ 中提出相对性原理与光速不变原理两条基本假设，导出洛伦兹变换，得出时间膨胀与长度收缩

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0, \quad L = L_0/\gamma, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \quad (13)$$

以及同时性的相对性等一系列结论，将力学与电磁学统一于同一时空框架。

2. **质能等价关系（1905）**：在《物体的惯性同它所含的能量有关吗？》⁵ 中给出质能方程

$$E = mc^2, \quad (14)$$

更一般地有 $E = \gamma mc^2$ 与能量-动量关系 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ ，统一了质量与能量，为核裂变、核聚变等核能利用提供了理论基础。

3. **等效原理与广义相对论（1907–1915）**：1907 年提出等效原理，1915 年完成引力场方程^{9;11}

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}, \quad (15)$$

将引力解释为时空弯曲的几何效应；1916 年系统发表《广义相对论的基础》。

4. **水星近日点进动**：广义相对论给出轨道近日点每周期进动角

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}, \quad (16)$$

其中 a 为半长轴、 e 为偏心率，精确解释了水星每世纪约 43 角秒的剩余进动¹⁰，这是广义相对论的三大经典验证之一。

5. 光线偏折预言（1911–1915）：预言光线经过太阳附近时会偏转

$$\delta = \frac{4GM}{c^2 b}, \quad (17)$$

其中 b 为光线到太阳中心的最近距离；1919 年 5 月 29 日日全食期间，爱丁顿（A. S. Eddington）等观测队证实了这一预言⁴，爱因斯坦因此举世闻名。

6. 引力红移预言：预言在引力势差 $\Delta\Phi$ 作用下光频率改变

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\Delta\Phi}{c^2}, \quad (18)$$

1960 年庞德（R. Pound）与雷布卡（G. Rebka）实验予以证实¹⁷；其推论“引力时间膨胀”如今用于 GPS 卫星的授时修正。

7. 引力波预言（1916）：预言时空度规微扰满足波动方程

$$\square h_{\mu\nu} = 0, \quad (19)$$

即引力波以光速 c 传播；2015 年 9 月，LIGO 首次直接探测到双黑洞并合产生的引力波¹，2017 年因此获诺贝尔物理学奖。

1905 年”奇迹年”四篇奠基论文

1905 年爱因斯坦在一年内发表四篇划时代论文，彻底改变了物理学：

1. 光量子假说——《关于光的产生和转化的一个启发性观点》⁷，解释光电效应。
2. 布朗运动理论——《热的分子运动论所要求的静液体中悬浮粒子的运动》⁶，为分子的真实存在提供定量依据。
3. 狭义相对论——《论动体的电动力学》⁸，建立新的时空观。
4. 质能等价——《物体的惯性同它所含的能量有关吗？》⁵，给出 $E = mc^2$ 。

具体成果一览

成果	年份	要点与意义
光量子假说（光电效应）	1905	提出光由光子组成，能量 $E = h\nu$ ； 1921 年获诺贝尔物理学奖
布朗运动理论	1905	为原子、分子的真实存在提供定量证据
狭义相对论	1905	统一时空观，导出时间膨胀、长度收缩
质能等价关系	1905	$E = mc^2$ ，为核能利用奠定基础
固体比热容理论	1907	量子论在凝聚态领域的早期应用
广义相对论	1915	引力即时空弯曲，解释水星近日点进动
受激辐射理论	1916–1917	预言受激辐射，奠定激光理论基础
引力波预言	1916	2015 年 LIGO 首次直接探测到
玻色-爱因斯坦统计	1924–1925	预言 BEC，1995 年实验实现
EPR 悖论	1935	揭示量子纠缠，催生量子信息科学

核心物理公式

以下集中列出与上述成果对应的代表性公式。
量子论方面：

$$E = h\nu, \tag{20}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}, \tag{21}$$

$$h\nu = W_0 + E_k, \tag{22}$$

$$n_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/k_B T} - 1}. \tag{23}$$

狭义相对论方面：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad (24)$$

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0, \quad L = L_0/\gamma, \quad (25)$$

$$E = \gamma mc^2, \quad (26)$$

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2. \quad (27)$$

广义相对论方面：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}, \quad (28)$$

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1 - e^2)}, \quad (29)$$

$$\delta = \frac{4GM}{c^2 b}, \quad (30)$$

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\Delta\Phi}{c^2}, \quad (31)$$

$$\square h_{\mu\nu} = 0. \quad (32)$$

其中：式 (20)–(23) 依次为光子能量、光子动量、光电效应方程与玻色–爱因斯坦分布；式 (24)–(27) 为洛伦兹因子、时间膨胀与长度收缩、相对论总能量及能量–动量关系；式 (28)–(32) 依次为爱因斯坦场方程、水星近日点进动、光线偏折角、引力红移与引力波波动方程（ $\square$ 为达朗贝尔算符， $h_{\mu\nu}$ 为度规微扰）。

3 薛定谔在量子力学领域的贡献

埃尔温·薛定谔 (E. Schrödinger, 1887–1961) 是奥地利理论物理学家、波动力学的创立者。1926 年，他在《作为本征值问题的量子化》(*Quantisierung als Eigenwertproblem*) 系列论文中建立了以他命名的波动方程，把原子能级的量子化问题转化为微分方程的本征值问题，成功解释了氢原子光谱，并证明了该形式与海森堡的矩阵力学数学等价，奠定了现代量子力学的基础。1933 年，他与狄拉克 (P. A. M. Dirac) 共同获得诺贝尔物理学奖。

波动力学的创立与薛定谔方程

1924 年，德布罗意 (L. de Broglie) 提出物质波假说，认为一切实物粒子都具有波动性，满足 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ 、 $E = \hbar\omega$ 。薛定谔受此启发，将经典波动方

程推广到微观粒子，在系列论文中建立如下基本方程¹⁸：描述非相对论性量子系统状态随时间演化的含时薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \hat{H} \Psi(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t), \quad (33)$$

其中 $\hat{H}$ 为哈密顿算符， $\Psi(\mathbf{r}, t)$ 为波函数， $V(\mathbf{r}, t)$ 为势能。它是量子力学的基本公设之一，地位相当于经典力学中的牛顿第二定律：一旦给定初始波函数，系统此后任意时刻的状态便由式 (33) 唯一确定。该方程对时间只含一阶导数、对空间含二阶导数，因而要求 $i\hbar \partial/\partial t$ 与 $-\hbar^2 \nabla^2/2m$ 分别对应能量与动能，体现了量子化规则的算符化表述¹⁵。

主要方程及其物理意义

1. 定态薛定谔方程。当势能 V 与时间无关时，可分离变量 $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}$ ，代入式 (33) 得能量本征值方程

$$\hat{H}\psi_n(\mathbf{r}) = E_n\psi_n(\mathbf{r}), \quad (34)$$

其平方可积解给出束缚态的本征能谱 E_n 与本征函数 ψ_n ，量子化不再是人为假设，而是方程在边界条件下的自然结果；相应的定态 $\Psi_n(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r})e^{-iE_nt/\hbar}$ 的概率密度 $|\Psi_n|^2$ 不随时间改变¹⁵。

2. 波函数的概率诠释（玻恩规则）。薛定谔方程建立后，其波函数的物理意义一度悬而未决；薛定谔本人倾向于“波即电子电荷云”的实在论解释。1926 年，玻恩（M. Born）在散射问题的研究中提出 $|\Psi|^2$ 表示粒子在该处出现的概率密度²，即

$$\rho(\mathbf{r}, t) = |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2, \quad \int_{\mathbb{R}^3} |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d^3\mathbf{r} = 1, \quad (35)$$

其中归一化条件保证粒子在空间某处必然出现。玻恩规则与薛定谔方程一起构成了量子力学哥本哈根诠释的核心。

3. 概率流守恒（连续性方程）。由式 (33) 及其复共轭可以导出概率密度的连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0, \quad \mathbf{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*), \quad (36)$$

其中 $\mathbf{j}$ 为概率流密度。它表明粒子既不能创生也不能湮灭，概率从一处流向另一处，与经典电动力学中的电荷守恒在形式上完全类似¹⁵。

4. **一维无限深方势阱。**对宽度为 a 的势阱，式 (34) 给出本征波函数与能级

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (37)$$

这是量子化源于边界条件的最简单范例：能级与 n^2 成正比，且存在非零的基态能量 $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / (2ma^2)$ ，与经典情形截然不同。

5. **量子谐振子。**对频率为 ω 的一维谐振子，其能级为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (38)$$

式中零点能 $E_0 = \hbar \omega / 2$ 在经典理论中不存在；该结果对固体中声子、晶格振动乃至电磁场的量子化普遍适用，是量子场论中“二次量子化”的出发点。

6. **氢原子能级。**薛定谔方程最重大的早期胜利，是严格求解氢原子并导出能级公式

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (39)$$

结果与玻尔模型一致，却无需人为引入角动量量子化假设；它还自然给出轨道角动量本征值 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 与能级简并度 n^2 ，为后来的电子自旋与精细结构研究开辟了道路^{18;15}。

波动力学与矩阵力学的统一

1925 年，海森堡（W. Heisenberg）从可观测的跃迁频率与强度出发创立了矩阵力学；1926 年，薛定谔证明了波动力学与矩阵力学在数学上完全等价^{18;15}——两者只是量子力学同一公理化体系的两种表示：前者基于波函数与微分方程，后者基于态矢量与矩阵代数。这一等价性表明量子力学是一个自洽而完备的理论框架，也确立了薛定谔方程作为其最便于计算与直觉理解的表述形式，至今仍是原子物理、固体物理与化学中求解量子问题的主要工具。

量子纠缠与“薛定谔的猫”

1935 年，爱因斯坦等人发表 EPR 悖论文献¹³，质疑量子力学的完备性。薛定谔在同年的《量子力学的当前状况》¹⁹ 中系统回应了这场争论，并

首次引入”纠缠”(Verschränkung, entanglement)一词，指出两个曾相互作用的子系统即使分开很远，其状态也不能被分别描述；在《分离系统间的概率关系》²⁰中他又给出了纠缠态的定量判据。为了凸显叠加原理在宏观尺度下推论的反直觉性，他提出著名的”薛定谔的猫”思想实验：将猫与一个受放射性衰变控制的毒气瓶置于密闭箱中，则按量子力学，在未被观测前猫处于”死”与”活”的叠加态

$$|\text{cat}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\text{alive}\rangle + |\text{dead}\rangle).$$

(40)

这一悖论深刻揭示了测量问题与宏观与微观世界的界线，催生了退相干理论的研究，并已成为量子信息科学的核心概念之一。

具体成果一览

成果	年份	要点与意义
建立薛定谔方程	1926	确立量子力学波动表述，量子化成为本征值问题
求解氢原子能级	1926	严格导出 $E_n = -13.6/n^2$ eV，解释光谱
证明与矩阵力学等价	1926	统一波动力学与海森堡矩阵力学
获诺贝尔物理学奖	1933	与狄拉克分享，表彰其原子理论新形式
提出”薛定谔的猫”	1935	揭示宏观叠加与量子测量问题
引入”量子纠缠”概念	1935	为量子信息科学奠定概念基础

参考文献

- [1] Benjamin P. Abbott et al. Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Physical Review Letters*, 116(6):061102, 2016.
- [2] Max Born. Zur quantenmechanik der stoßvorgänge. *Zeitschrift für Physik*, 37(12):863–867, 1926.
- [3] Satyendra Nath Bose. Plancks gesetz und lichtquantenhypothese. *Zeitschrift für Physik*, 26(1):178–181, 1924.
- [4] Frank W. Dyson, Arthur S. Eddington, and Charles Davidson. A determination of the deflection of light by the sun’s gravitational field, from observations made at the total eclipse of may 29, 1919. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 220:291–333, 1920.
- [5] Albert Einstein. Ist die trägheit eines körpers von seinem energieinhalt abhängig? *Annalen der Physik*, 323(13):639–641, 1905.
- [6] Albert Einstein. Über die von der molekularkinetischen theorie der wärme geforderte bewegung von in ruhenden flüssigkeiten suspendierten teilchen. *Annalen der Physik*, 322(8):549–560, 1905.
- [7] Albert Einstein. Über einen die erzeugung und verwandlung des lichtes betreffenden heuristischen gesichtspunkt. *Annalen der Physik*, 322(6):132–148, 1905.
- [8] Albert Einstein. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der Physik*, 322(10):891–921, 1905.
- [9] Albert Einstein. Die feldgleichungen der gravitation. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 844–847, 1915.
- [10] Albert Einstein. Erklärung der perihelbewegung des merkur aus der allgemeinen relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 831–839, 1915.

- [11] Albert Einstein. Die grundlage der allgemeinen relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 354(7):769–822, 1916.
- [12] Albert Einstein. Quantentheorie des einatomigen idealen gases. zweite abhandlung. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 3–14, 1925.
- [13] Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical Review*, 47(10):777–780, 1935.
- [14] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Cambridge University Press, 4th edition, 2017.
- [15] David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter. *Introduction to Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 3rd edition, 2018.
- [16] James Clerk Maxwell. A dynamical theory of the electromagnetic field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 155:459–512, 1865.
- [17] Robert V. Pound and Glen A. Rebka. Apparent weight of photons. *Physical Review Letters*, 4(7):337–341, 1960.
- [18] Erwin Schrödinger. Quantisierung als eigenwertproblem (erste mitteilung). *Annalen der Physik*, 384(4):361–376, 1926.
- [19] Erwin Schrödinger. Die gegenwärtige situation in der quantenmechanik. *Naturwissenschaften*, 23(48):807–812, 1935.
- [20] Erwin Schrödinger. Discussion of probability relations between separated systems. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 31(4):555–563, 1935.