
A
Lineage adjustment attenuates global associations
Oxaliplatin
Cisplatin
Irinotecan
SN-38
Paclitaxel
Gemcitabine
Topotecan
Vinorelbine
Docetaxel
Temozolomide
Cyclophosphamide
5-Fluorouracil
Epirubicin
Methotrexate
Unadjusted
Lineage-adjusted
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Change in ln(IC50) per 1-SD ITGB1
B
Cross-lineage replication
Oxaliplatin
Cisplatin
Irinotecan
SN-38
Paclitaxel
Gemcitabine
Topotecan
Vinorelbine
Docetaxel
Temozolomide
Cyclophosphamide
5-Fluorouracil
Epirubicin
Methotrexate
−0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Random-effects within-lineage Spearman ρ
C
Magnitude attributable to lineage structure
Oxaliplatin
Cisplatin
Irinotecan
SN-38
Paclitaxel
Gemcitabine
Topotecan
Vinorelbine
Docetaxel
Temozolomide
Cyclophosphamide
5-Fluorouracil
Epirubicin
Methotrexate
0
20
40
60
80
100
Effect attenuation after lineage adjustment (%)