

Variable Compleja I

Tema 11: Comportamiento local de una función holomorfa

1 Principio del módulo máximo

2 Teorema de la aplicación abierta

3 Comportamiento local

- Teorema de la función inversa
- Comportamiento local en un cero de la derivada

Propiedad de la media

Motivación

Fórmula de Cauchy: $\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, $\overline{D}(a, r) \subset \Omega$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(a, r)} \frac{f(w)}{w - z} dw \quad \forall z \in D(a, r)$$

Conociendo f en $C(a, r)^*$ la conocemos en $D(a, r)$

Usaremos el caso más sencillo: $z = a$

Propiedad de la media

$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, $\overline{D}(a, r) \subset \Omega$

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(a + re^{it}) dt$$

Por tanto,

$$|f(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(a + re^{it})| dt$$

$$z = a + re^{it}$$

$$dz = ire^{it} dt$$

$$\frac{f(a + re^{it})}{re^{it}} \cdot ire^{it}$$

Principio del módulo máximo

Teorema

$$\Omega \text{ dominio} \quad y \quad f \in \mathcal{H}(\Omega)$$

Supongamos que $|f|$ tiene un máximo relativo en un punto $a \in \Omega$, es decir:

$$\exists \delta > 0 : D(a, \delta) \subset \Omega \quad y \quad |f(z)| \leq |f(a)| \quad \forall z \in D(a, \delta)$$

Entonces f es constante

Corolario 1

Ω dominio acotado, $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ continua en $\overline{\Omega}$ y holomorfa en Ω ,
es decir $f \in C(\overline{\Omega}) \cap \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces:

$$\max \{ |f(z)| : z \in \overline{\Omega} \} = \max \{ |f(z)| : z \in \text{Fr}(\Omega) \}$$

En particular:

$$f(z) = 0 \quad \forall z \in \text{Fr}(\Omega) \quad \implies \quad f(z) = 0 \quad \forall z \in \overline{\Omega}$$

Principio del módulo mínimo

Corolario 2

Ω dominio acotado, $f_n \in C(\overline{\Omega}) \cap \mathcal{H}(\Omega) \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Supongamos que $\{f_n\}$ converge uniformemente en $\text{Fr}(\Omega)$

Entonces $\{f_n\}$ converge uniformemente en $\overline{\Omega}$

a una función $f \in C(\overline{\Omega}) \cap \mathcal{H}(\Omega)$

Principio del módulo mínimo

Ω dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$

Supongamos que $|f|$ tiene un mínimo relativo en un punto $a \in \Omega$:

$\exists \delta > 0 : D(a, \delta) \subset \Omega \quad \text{y} \quad |f(z)| \geq |f(a)| \quad \forall z \in D(a, \delta)$

Entonces, o bien $f(a) = 0$, o bien f es constante

Corolario

Ω dominio acotado, $f \in C(\overline{\Omega}) \cap \mathcal{H}(\Omega)$, no constante

Si $|f|$ es constante en $\text{Fr}(\Omega)$, entonces existe $a \in \Omega$ tal que $f(a) = 0$.

Teorema de la aplicación abierta

Teorema

Ω dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante

conexo y abierto

Entonces f es una aplicación abierta, es decir:

$$U = U^\circ \subset \Omega \implies f(U) = f(U)^\circ$$

lleva abiertos en abiertos

Teorema de la función inversa local

Lema

$$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}, \quad f \in \mathcal{H}(\Omega)$$

La función $\Phi: \Omega \times \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\Phi(w, z) = \begin{cases} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} & \text{si } w \neq z \\ f'(w) = f'(z) & \text{si } w = z \end{cases}$$

es continua

Teorema de la función inversa local

$$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}, \quad f \in \mathcal{H}(\Omega), \quad a \in \Omega \text{ con } f'(a) \neq 0$$

Entonces existe un abierto U , con $a \in U \subset \Omega$ tal que:

- f es inyectiva en U y $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in U$
- El conjunto $V = f(U)$ es abierto
- Si $\varphi = f|_U$, entonces $\varphi^{-1} \in \mathcal{H}(V)$ con $(\varphi^{-1})'(f(z)) = \frac{1}{f'(z)} \quad \forall z \in U$

En \mathbb{R}^n , había que exigir que φ^{-1} fuese abierta, pero aquí ya lo tenemos gratis por el Tma de la aplicación abierta.

Logaritmos holomorfos

Dado un punto en el que se anula la derivada, no existe un entorno de dicho punto donde f sea inyectiva. Existe un entorno de ese cero en el que f se comporta como una función potencia

Ejemplo

$$m \in \mathbb{N}, \quad m \geq 2, \quad f(z) = z^m \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad f'(0) = 0$$

Fijado $\delta \in \mathbb{R}^+$, para cada $w \in D(0, \delta^m) \setminus \{0\}$

la ecuación $f(z) = w$ tiene exactamente m soluciones en $D(0, \delta)$

Logaritmos holomorfos

Ω dominio estrellado, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $f(z) \neq 0 \quad \forall z \in \Omega$. Entonces:

- f admite un logaritmo holomorfo en Ω , es decir,

$$\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : f(z) = e^{g(z)} \quad \forall z \in \Omega$$

- Para cada $m \in \mathbb{N}$, f admite una raíz m -ésima holomorfa en Ω , es decir,

$$\exists h \in \mathcal{H}(\Omega) : f(z) = (h(z))^m \quad \forall z \in \Omega$$

Comportamiento local en un cero de la derivada

Teorema

Ω dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante, $a \in \Omega$ tal que $f'(a) = 0$ y $b = f(a)$

Sea $m \in \mathbb{N}$ el orden del cero de la función $z \mapsto f(z) - b$ en el punto a

Entonces existen un abierto U con $a \in U \subset \Omega$ y un $\varepsilon > 0$ tales que:

- $f(U) = D(b, \varepsilon)$
- $z \in U, f(z) = b \implies z = a$
- Para cada $w \in \mathbb{C}$ con $0 < |w - b| < \varepsilon$ la ecuación $f(z) = w$ tiene exactamente m soluciones distintas en U , es decir, el conjunto $\{z \in U : f(z) = w\}$ tiene exactamente m elementos.

Caracterización de la inyectividad local

$$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}, \quad f \in \mathcal{H}(\Omega), \quad a \in \Omega$$

$$f \text{ inyectiva en un entorno de } a \iff f'(a) \neq 0$$

Teorema de la función inversa global

Teorema

U dominio, $f \in \mathcal{H}(U)$ inyectiva. Entonces:

- $V = f(U)$ es un dominio 1) Por el T. de la aplicación abierta
- $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in U$ 2) Por el T. anterior
- $f^{-1} \in \mathcal{H}(V)$ con: $(f^{-1})'(f(z)) = \frac{1}{f'(z)} \quad \forall z \in U$

Reglas de derivación de la función inversa

f una función inyectiva definida en $A \neq \emptyset$ $a \in A$, $b = f(a)$

Funciones reales de variable real

$A \subset \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en $a \in A'$. Entonces $b \in f(A)'$ y:

f^{-1} derivable en $b \iff f^{-1}$ continua en b y $f'(a) \neq 0$
en cuyo caso $(f^{-1})'(b) = 1/f'(a)$

Funciones de \mathbb{R}^N en \mathbb{R}^N

$A \subset \mathbb{R}^N$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}^N$ diferenciable en $a \in A^\circ$, con $b \in f(A)^\circ$. Entonces:

f^{-1} diferenciable en $b \iff f^{-1}$ continua en b y $|Jf(a)| \neq 0$
en cuyo caso $Df^{-1}(b) = Df(a)^{-1}$

Funciones complejas de variable compleja

$A \subset \mathbb{C}$, $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ derivable en $a \in A'$. Entonces $b \in f(A)'$ y:

f^{-1} derivable en $b \iff f^{-1}$ continua en b y $f'(a) \neq 0$
en cuyo caso $(f^{-1})'(b) = 1/f'(a)$

Teoremas locales de la función inversa

Funciones reales de variable real

$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{R}$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en Ω , con f' continua en $a \in \Omega$.

$f'(a) \neq 0 \implies \exists U$ con $a \in U = U^\circ \subset \Omega$ tal que f es inyectiva en U

Funciones de \mathbb{R}^N en \mathbb{R}^N

$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{R}^N$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$ diferenciable en Ω , con Df continua en $a \in \Omega$.

$|Jf(a)| \neq 0 \implies \exists U$ con $a \in U = U^\circ \subset \Omega$ tal que f es inyectiva en U

Funciones complejas de variable compleja

$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, $a \in \Omega$.

$f'(a) \neq 0 \iff \exists U$ con $a \in U = U^\circ \subset \Omega$ tal que f es inyectiva en U

Teoremas globales de la función inversa

Funciones reales de variable real

$\Omega \subset \mathbb{R}$, Ω intervalo abierto, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en Ω .

Suponemos que $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Omega$. Entonces:

f es inyectiva, $f(\Omega)$ es un intervalo abierto y f^{-1} es derivable en $f(\Omega)$

Funciones de \mathbb{R}^N en \mathbb{R}^N

$\Omega \subset \mathbb{R}^N$, Ω dominio, $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$.

Suponemos que $|Jf(x)| \neq 0 \quad \forall x \in \Omega$ y que f es inyectiva. Entonces:

$f(\Omega)$ es un dominio y f^{-1} es diferenciable en $f(\Omega)$

Funciones complejas de variable compleja

$\Omega \subset \mathbb{C}$, Ω dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$.

Suponemos que f es inyectiva. Entonces:

Entonces $f'(z) \neq 0$ para todo $z \in \Omega$, $f(\Omega)$ es un dominio y $f^{-1} \in \mathcal{H}(\Omega)$