

Integración numérica

Alfredo Villagrán Olguín

Junio, 2020

En ciencia e ingeniería se presenta constantemente la necesidad de integrar funciones difíciles o imposibles de integrar analíticamente. Para esto se emplean los métodos numéricos de integración. Los métodos más comunes son los basados en las fórmulas de integración de Newton-Cotes que utilizan la estrategia de reemplazar una función por un polinomio aproximado que sea fácil de integrar. Es decir:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b f_n(x)$$

donde $f_n(x)$ es un polinomio de la forma

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

Regla del trapecio

La regla del trapecio es uno de los métodos basados en las fórmulas de Newton-Cotes que son fáciles de comprender e implementar.

El primer polinomio aproximado es de primer grado, una recta:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b f_1(x)dx$$

Representar la recta que pasa por a y b , en la Figura 1, consistiría en el siguiente polinomio de primer grado

$$f_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$




Figura 1

Por lo tanto, calcular la integral definida¹ entre a y b del polinomio anterior

$$I = \int_a^b \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right] dx$$

¹Queda como ejercicio personal calcularla analíticamente.


Resulta

$$I = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$


que es exactamente lo mismo que calcular el área del trapecio sombreado, cuyo ancho está sobre el eje de las x y su altura es el promedio de $f(a)$ y $f(b)$. Es de esta última observación que a la fórmula anterior se le conoce como *la regla del trapecio*.

Regla del trapecio de aplicación múltiple


Como puede observarse de la misma Figura 1, existe un error significativamente grande, debido a que no se está contemplando el área entre $f(x)$ y la recta. Una de las maneras en que la regla del trapecio mejora su precisión consiste en dividir el intervalo de integración de a a b en una mayor cantidad de subsegmentos, y aplicar el método a cada uno de ellos. Esta mejoría se muestra en las figuras siguientes:




(a) Dos segmentos



(b) Tres segmentos



(c) Cuatro segmentos



(d) Cinco segmentos

Para $n + 1$ puntos igualmente espaciados $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$, existen n segmentos del mismo ancho, entre a y b :

$$h = \frac{b - a}{n}$$

Si a y b se consideran respectivamente como x_0 y x_n , la integral completa sería:

$$I = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx$$

Sustituyendo la regla del trapecio en cada uno, se obtiene

$$I = h \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + h \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \dots + h \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2}$$

que, agrupando términos, se ve

$$I = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

que puede comprenderse, nuevamente, como ancho del trapecio por el promedio de su altura:

$$I = (b - a) \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right] \frac{1}{2n}$$

Ejemplos numéricos

Regla del trapecio

Para $f(x) = (5x^4 - 8x^3 + 6)$, utilice la regla del trapecio para calcular, con un sólo segmento, la siguiente integral definida:

$$\int_{-1}^4 f(x)dx$$

La integral definida calculada analíticamente² es 545. Al final, calcule el error en el cálculo con un sólo segmento, con la fórmula:

$$\epsilon = \left| \frac{Valor_{real} - Valor_{aproximado}}{Valor_{real}} \right| \%$$

Solución

Recordando que la regla del trapecio es

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

²Se queda como ejercicio aparte.

con $a = -1$ y $b = 4$

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x)dx &\approx (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2} \\
 &\approx (b-a) \left[\frac{(5(a)^4 - 8(a)^3 + 6) + (5(b)^4 - 8(b)^3 + 6)}{2} \right] \\
 &\approx (4 - (-1)) \left[\frac{(5(-1)^4 - 8(-1)^3 + 6) + (5(4)^4 - 8(4)^3 + 6)}{2} \right] \\
 &\approx (5) \left[\frac{(19) + (774)}{2} \right] \\
 &\approx \mathbf{1982.5}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el error es

$$\epsilon = \left| \frac{545 - 1982.5}{545} \right| \% = 264.43\%$$

Regla del trapecio de aplicación múltiple

Calcule la integral definida

$$\int_{-1}^4 (5x^4 - 8x^3 + 6)dx$$

utilizando la regla del trapecio para diferentes cantidades de segmentos: desde 2, 5 y 10 segmentos. Genere una tabla donde se muestren los valores de la cantidad de segmentos utilizados (n), el valor del ancho (h) en cada cálculo, el valor resultante (I) y el valor del error para cada cálculo (ϵ).

Solución

Recordando que la regla del trapecio de aplicación múltiple es

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

donde

$$h = \frac{b-a}{n}$$

Para 2 segmentos

$$a = -1$$

$$b = 4$$

$$h = \frac{4 - (-1)}{2} = 2.5$$

$$x_0 = a = -1$$

$$f(x_0) = 19$$

$$x_1 = x_0 + h = (-1 + 2.5) = 1.5$$

$$f(x_1) = 4.3125$$

$$x_2 = x_1 + h = (1.5 + 2.5) = b = 4$$

$$f(x_2) = 774$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2)]$$

$$\approx \frac{2.5}{2} [19 + 2(4.3125) + 774]$$

$$\approx 1.25 [19 + 8.6250 + 774]$$

$$\approx 1.25 [801.62]$$

$$\approx 1002$$

Por lo tanto, el error es

$$\epsilon = \left| \frac{545 - 1002}{545} \right| \% = 84.197\%$$

Para 5 segmentos

$$a = -1$$

$$b = 4$$

$$h = \frac{4 - (-1)}{5} = 1$$

$$x_0 = a = -1$$

$$f(x_0) = 19$$

$$x_1 = x_0 + h = (-1 + 1) = 0$$

$$f(x_1) = 6$$

$$x_2 = x_1 + h = (0 + 1) = 1$$

$$f(x_2) = 3$$

$$x_3 = x_2 + h = (1 + 1) = 2$$

$$f(x_3) = 22$$

$$x_4 = x_3 + h = (2 + 1) = 3$$

$$f(x_4) = 195$$

$$x_5 = x_4 + h = (3 + 1) = b = 4$$

$$f(x_5) = 774$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &\approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right] \\ &\approx \frac{h}{2} [f(x_0) + 2(f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4)) + f(x_5)] \\ &\approx \frac{1}{2} [19 + 2(6 + 3 + 22 + 195) + 774] \\ &\approx \frac{1}{2} [19 + 2(226) + 774] \\ &\approx 0.5 [19 + 452 + 774] \\ &\approx 0.5 [1245] \\ &\approx \mathbf{622.5} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el error es

$$\epsilon = \left| \frac{544 - 622.5}{545} \right| \% = 14.43\%$$

Para 10 segmentos

$$a = -1$$

$$b = 4$$

$$h = \frac{4 - (-1)}{10} = 0.5$$

$$x_0 = a = -1, f(x_0) = 19$$

$$x_1 = x_0 + h = -0.5, f(x_1) = 7.3125$$

$$x_2 = x_1 + h = 0, f(x_2) = 6$$

$$x_3 = x_2 + h = 0.5, f(x_3) = 5.3125$$

$$x_4 = x_3 + h = 1, f(x_4) = 3$$

$$x_5 = x_4 + h = 1.5, f(x_5) = 4.3125$$

$$x_6 = x_5 + h = 2, f(x_6) = 22$$

$$x_7 = x_6 + h = 2.5, f(x_7) = 76.312$$

$$x_8 = x_7 + h = 3, f(x_8) = 195$$

$$x_9 = x_8 + h = 3.5, f(x_9) = 413.31$$

$$x_{10} = x_9 + h = b = 4, f(x_{10}) = 774$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &\approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right] \\ &\approx \frac{h}{2} [f(x_0) + 2(f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_9)) + f(x_{10})] \\ &\approx \frac{0.5}{2} [19 \\ &\quad + 2(7.3125 + 6 + 5.3125 + 3 + 4.3125 + 22 + 76.312 + 195 + 413.31) \\ &\quad + 774] \\ &\approx 0.25 [19 + 2(732.56) + 774] \\ &\approx 0.25 [19 + 1465.1 + 774] \\ &\approx 0.25 [2258.1] \\ &\approx \mathbf{564.53} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el error es

$$\epsilon = \left| \frac{545 - 564.53}{545} \right| \% = 3.7741\%$$

Conclusión

Como puede observarse en la siguiente tabla, entre mayor cantidad de segmentos se utilicen, menor será el error del cálculo por *la regla del trapecio*.

n	h	I	ϵ
1	5	1982.5	264.43%
2	2.5	1002	84.197%
5	1	622.5	14.43%
10	0.5	564.53	3.7741%