

8.1

(i): Lösungskurven  $x(t), y(t)$ 

$$\begin{aligned}\frac{dH}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \stackrel{!}{=} 0 \\ &= \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial H}{\partial y} - \frac{\partial H}{\partial y} \frac{\partial H}{\partial x} = 0 \quad \checkmark\end{aligned}$$

(ii):  $P_0 = (x_0, y_0)$  Fixpunkt, d.h.  $\frac{\partial H}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 = \frac{\partial H}{\partial x}(x_0, y_0)$ 

Linearisiertes System:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = f(x_0, y_0) + \nabla f \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial x \partial y} \big|_{(x_0, y_0)} & \frac{\partial^2 H}{\partial y^2} \big|_{(x_0, y_0)} \\ -\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} \big|_{(x_0, y_0)} & -\frac{\partial^2 H}{\partial y \partial x} \big|_{(x_0, y_0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 H}{\partial x \partial y} \big|_{(x_0, y_0)} & \frac{\partial^2 H}{\partial y^2} \big|_{(x_0, y_0)} \\ -\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} \big|_{(x_0, y_0)} & -\frac{\partial^2 H}{\partial y \partial x} \big|_{(x_0, y_0)} \end{pmatrix}$$

Eigenwerte:

$$\Rightarrow \left| \begin{pmatrix} \lambda - \frac{\partial^2 H}{\partial x \partial y} \big|_{(x_0, y_0)} & -\frac{\partial^2 H}{\partial y^2} \big|_{(x_0, y_0)} \\ +\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} \big|_{(x_0, y_0)} & \lambda + \frac{\partial^2 H}{\partial y \partial x} \big|_{(x_0, y_0)} \end{pmatrix} \right| = \left( \lambda - \underbrace{\frac{\partial^2 H}{\partial x \partial y}}_a \right) \left( \lambda + \underbrace{\frac{\partial^2 H}{\partial y \partial x}}_a \right) + \underbrace{\frac{\partial^2 H}{\partial y^2} \frac{\partial^2 H}{\partial x^2}}_b = 0$$

$$\Rightarrow \text{passt} \quad \lambda^2 - a^2 + b = 0$$

$$\lambda^2 = -b + a^2$$

$$\Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{-b + a^2} \text{ oder } \pm i \sqrt{b + a^2}$$

(iii): Wie man durch partielles Ableiten von  $H$  sehen kann, sind die Differentialgleichungen für die folgenden $H$  gegeben.


(a)  $H = xy + \frac{1}{3}y^3$

(b)  $H = xy - x^4$

8.2

(i)

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x - y - \frac{1}{2}(x^3 + y^4x) \\ x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}y^3 - \frac{1}{2}x^2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x^2 & -1 + yx \\ 1 - xy & \frac{1}{2} - \frac{3}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 \end{pmatrix} \bigg|_{(0,0)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



(ii)

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x - y \\ x + \frac{1}{2}y \end{pmatrix}$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{dr}{dt} &= \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dr}{dx} + \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dr}{dy} = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{x}{r} + \frac{dy}{dt} \cdot \frac{y}{r} = \left( \frac{1}{2}x - y - \frac{1}{2}(x^3 + y^4x) \right) \frac{x}{r} + \left( x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}y^3 - \frac{1}{2}x^2y \right) \frac{y}{r} \\ &= \frac{\frac{1}{2}x^2}{r} - \frac{xy}{r} - \frac{\frac{1}{2}x^4}{r} - \frac{\frac{1}{2}y^5x^2}{r} + \frac{xy}{r} + \frac{\frac{1}{2}y^2}{r} - \frac{\frac{1}{2}y^4}{r} - \frac{\frac{1}{2}x^2y^2}{r} \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{r} (x^2 + y^2) - \frac{\frac{1}{2}}{r} (x^4 + y^4) - \frac{x^2y^2}{r} \\ &= \frac{1}{2}r - \frac{1}{2} \frac{1}{r} (x^2 + y^2)^2 = \frac{1}{2}r - \frac{1}{2}r^3 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{d\theta}{dt} &= \frac{d\theta}{dx} \dot{x} + \frac{d\theta}{dy} \dot{y} = -\frac{y}{r^2} \dot{x} + \frac{x}{r^2} \dot{y} = \frac{1}{r^2} \left( -y \left( \frac{1}{2}x - y - \frac{1}{2}(x^3 + y^4x) \right) + x \left( x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}y^3 - \frac{1}{2}x^2y \right) \right) \\ &= \frac{1}{r^2} \left( -\frac{1}{2}xy + y^2 + \frac{1}{2}x^4y + \frac{1}{2}y^5x + x^2 + \frac{1}{2}xy - \frac{1}{2}y^3x - \frac{1}{2}x^3y \right) \\ &= 1 \end{aligned}$$

(iii)  $\theta(t) = t + C$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{2}r - \frac{1}{2}r^3$$

$$\frac{dr}{r - r^3} = \frac{1}{2}dt$$

Partiellbruchzerlegung:

$$\frac{1}{r(1-r^2)} = \frac{A}{r} + \frac{B}{1-r^2} = \frac{A}{r} + \frac{1}{1-r^2} \quad B=A, A=1$$

$$\int \frac{1}{r - r^3} dr = \int \frac{1}{r} dr + \int \frac{r}{1-r^2} dr$$

$$u=r^2 \quad = \ln r + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-u} du$$

$$= \ln r - \frac{1}{2} \ln(1-u)$$

$$= \ln r - \frac{1}{2} \ln(1-r^2) = \ln\left(\frac{r}{\sqrt{1-r^2}}\right)$$

$$\Rightarrow \int \frac{dr}{r-r^3} = \int \frac{1}{2} dt \Rightarrow \ln\left(\frac{r}{\sqrt{1-r^2}}\right) = \frac{1}{2}t + D$$

$$\frac{r}{\sqrt{1-r^2}} = D e^{\frac{t}{2}}$$

$$r^2 = D e^t (1-r^2)$$

$$r^2 (1 + D e^t) = D e^t$$

$$r = \sqrt{\frac{D e^t}{1 + D e^t}}$$

Anfangswert:  $\theta(0) = \theta_0 \Rightarrow C = \theta_0$

$$r(0) = r_0 = \sqrt{\frac{D}{1+D}}$$

$$r_0^2 = \frac{D}{1+D} \quad r_0^2 + D r_0^2 = D$$

$$D = \frac{r_0^2}{1-r_0^2}$$

$$\Rightarrow \Phi_t(r_0, \theta_0) = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{r_0^2 e^t}{1-r_0^2 + r_0^2 e^t}} \\ t + \theta_0 \end{pmatrix}$$

(iv)

$$\sqrt{\frac{r_0^2 e^t}{1-r_0^2 + r_0^2 e^t}} \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{r_0^2 e^t}{1-r_0^2 + r_0^2 e^t} = \frac{1}{4}$$

$$r_0^2 e^t = \frac{1}{4} - \frac{r_0^2}{4} + \frac{r_0^2}{4} e^t$$

$$\frac{3}{4} r_0^2 e^t = \frac{1}{4} - \frac{r_0^2}{4}$$

$$e^t = \frac{\frac{1}{3} - \frac{r_0^2}{3}}{r_0^2} > 0 \quad \text{für } r_0 \in (0,1)$$

$\Rightarrow$  eindeutig nach  $t$  auflösbar

Stetigkeit:  $r_0 \mapsto \ln\left(\frac{\frac{1}{3} - \frac{r_0^2}{3}}{r_0^2}\right)$  stetig

Für das linearisierte System gilt

$$\begin{cases} r' &= \frac{1}{2}r \\ \theta' &= 1 \end{cases}$$

Beide Differentialgleichungen besitzen offensichtlich eine eindeutige Lösung, wir erhalten

$$\psi_t \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cdot e^{\frac{1}{2}t} \\ \theta + t \end{pmatrix}.$$

Da hier stets  $r \in (0, 1)$  liegt, ist  $\tau(r, \theta)$  wohldefiniert. Wir führen eine kurze Nebenrechnung durch:

$$\begin{aligned} \tau(\phi_t(r, \theta)) &= \log \left( \frac{1 - \frac{r^2 e^t}{1-r^2+r^2 e^t}}{3 \frac{r^2 e^t}{1-r^2+r^2 e^t}} \right) \\ &= \log \left( \frac{1 - r^2 + r^2 e^t - r^2 e^t}{3r^2 e^t} \right) \\ &= \log \left( \frac{1 - r^2}{3r^2} \right) - \log(e^t) \\ &= \tau(r, \theta) - t \end{aligned}$$

Insbesondere ist auch  $\tau(\phi_t(r, \theta))$  ein sinnvoller Wert. Es gilt nun

$$h \circ \phi_t = \psi_{-\tau(\phi_t(r, \theta))} \circ \phi_{\tau(\phi_t(r, \theta))} (\phi_t(r, \theta))$$

Nach Teilaufgabe (iv) und (iii) folgt

$$\begin{aligned} &= \psi_{-\tau(\phi_t(r, \theta))} \left( \tau(\phi_t(r, \theta)) + t + \theta \right) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}\tau(\phi_t(r, \theta))} \\ -\tau(\phi_t(r, \theta)) + \tau(\phi_t(r, \theta)) + t + \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Unter Benutzung der Nebenrechnung erhalten wir

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}\tau(r, \theta) + \frac{1}{2}t} \\ t + \theta \end{pmatrix} \\ &= \psi_t \begin{pmatrix} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}\tau(r, \theta)} \\ \theta \end{pmatrix} \\ &= \psi_t \circ \psi_{-\tau(r, \theta)} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \tau(r, \theta) + \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Wieder nutzen wir Teilaufgabe 4

$$\begin{aligned} &= \psi_t \circ \psi_{-\tau(r, \theta)} \circ \phi_{\tau(r, \theta)}(r, \theta) \\ &= \psi_t \circ h \end{aligned}$$

Folglich sind  $\psi_t$  und  $\phi_t$  auf der Einheitskreisscheibe konjugiert.