

1 Aufgabe 1

2 Aufgabe 2

3 Aufgabe 3

Sei (V, h) ein unitärer Raum. Für $f \in \text{End}(V)$ bezeichne wie in der Vorlesung $f^* \in \text{End}(V)$ die zu f adjungierte Abbildung.

(a) **Z.Z.:** Für alle $f, g \in \text{End}(V)$ gilt: $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$.

Beweis. Es gilt für $x, y \in V$:

$$h((f \circ g)^*(x), y) = h(x, f(g(y))) = h(f^*(x), g(y)) = h(g^*(f^*(x)), y) = h((g^* \circ f^*)(x), y)$$

□

(b) **Z.Z.:** Für alle $f \in \text{End}(V), \lambda \in \mathbb{C}$ gilt: $(\lambda f)^* = \bar{\lambda} f^*$.

Beweis. Es gilt für $x, y \in V$:

$$h((\lambda f)^*(x), y) = h(x, (\lambda f(y))) \stackrel{\text{h semilinear}}{=} \bar{\lambda} h(x, f(y)) = \bar{\lambda} = h(f^*(x), y)$$

□

(c) **Z.Z.:** Für alle $f \in \text{End}(V)$ gilt: $f \circ f^*$ und $f^* \circ f$ sind selbstadjungiert.

Beweis. Es gilt für $x, y \in V$:

$$\begin{aligned} h((f \circ f^*)^*(x), y) &= h((f(f^*(x)))^*, y) = h(x, f(f^*(y))) = h(f^*(x), f^*(y)) \\ &= h(f(f^*(x)), y) = h((f \circ f^*)(x), y) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} h((f^* \circ f)^*(x), y) &= h((f^*(f(x)))^*, y) = h(x, f^*(f(y))) = h(f(x), f(y)) \\ &= h(f^*(f(x)), y) = h((f^* \circ f)(x), y) \end{aligned}$$

□