

a) Sei $f: H \rightarrow \mathbb{C}$ Modulform bzgl. $SL_2(\mathbb{Z})$ von Gewicht k ohne Nst in H

$$\exists \exists d \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{C} \text{ sodass } f = c \cdot \Delta^d$$

Bew f muss Valenzformel genügen.

$$\text{ord}(f, z) \geq 0 \text{ für } z \in H$$

$$\Rightarrow \frac{k}{12} = \text{ord}(f, \infty) \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \exists d \in \mathbb{N}: k = d \cdot 12$$

$$\Rightarrow f \in M_{d \cdot 12}$$

$$\text{und es gilt: } \Delta^d \in M_{d \cdot 12}$$

$$\text{Def } g := \frac{f}{\Delta^d}$$

$\Rightarrow g$ hat keine Nst in H und da f gleiche Ordnung in $z = \infty$ wie Δ hat g keinen Pol in ∞

$$\Rightarrow g \in M_0 \Rightarrow g \equiv c$$

$$\Rightarrow f = c \cdot \Delta^d$$

b) zz: $\forall a \in H \quad \exists f \in M_{12}$ mit $f(a) = 0, f \neq 0$

Bew $\Delta: H \rightarrow \mathbb{C}$ ist ganze Modulform von Gewicht 12

Def $g := \Delta(z) - \Delta(a)$ mit $a \in H$

Es gilt $g \in M_{12}$, da $\Delta \in M_{12}$

ord(g, a) ≥ 1 und wegen der Valenzformel gilt ord(g, z) = 0 mit $z \neq a$

c) zz: $\forall h \in V_k$ gilt $h = \frac{f}{g}$ mit $g \in M_k, f \in M_k$

Bew Nach Strukturatz wissen wir

$$V_k = \mathbb{C}(j) \cdot \frac{E_4^k}{E_6^{k/2}}$$

wobei $\mathbb{C}(j) = \left\{ \frac{P(j)}{Q(j)} \mid P, Q \text{ Polynome} \right\}$ und $j(z) = \frac{E_4^3(z)}{\Delta(z)}$

Für h gilt also:

$$h = \frac{\tilde{P}(j)}{\tilde{Q}(j)} \cdot \frac{E_4^k}{E_6^{k/2}}$$

Sei $n := \max(\deg \tilde{P}, \deg \tilde{Q}) \Rightarrow \frac{\tilde{P}(j) \cdot \Delta^n}{\tilde{Q}(j)} \mid \Delta^n$ holom. Modulform

$$\Rightarrow h = \frac{\tilde{P}(j) \cdot \Delta^n \cdot E_4^k}{\tilde{Q}(j) \cdot E_6^{k/2}} \Big/ \Delta^n$$

□

A4 $\Delta \in S_{12}$ mit $\Delta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$

zz $\forall n \in \mathbb{N}$: $\tau(n) = 0 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} p_{n,12} = 0 \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} g_n(n,12) = 0$

Bew:

- $\langle \Delta, p_{n,12} \rangle = d_n(\Delta)$, $\dim(S_{12}) = 1$, $S_{12} = \langle p_{n,12} \rangle$
- $p_{n,12} \in S_{12} \stackrel{A1}{\Rightarrow} p_{n,12} = c_n \cdot \Delta$ $\forall n \in \mathbb{N}$

(1)

\bullet $0 = \tau(n) = d_n(\Delta) = \langle \Delta, p_{n,12} \rangle = \langle \Delta, c_n \Delta \rangle = c_n \cdot \underbrace{\langle \Delta, \Delta \rangle}_{\neq 0, \text{ da } \Delta \neq 0}$

$\Rightarrow c_n = 0 \Rightarrow p_{n,12} = 0$

\bullet $p_{n,12} = 0 \Rightarrow \langle \Delta, 0 \rangle = 0 = \tau(n)$

(2)

$g_n(n,12) = d_n(p_{n,12})$ da g_n Fourierkoeff. von $p_{n,12}$
und $p_{n,12} \in S_{12}$

$\Rightarrow g_n(n,12) = d_n(p_{n,12}) = \langle p_{n,12}, p_{n,12} \rangle$

\bullet $g_n(n,12) = 0 \stackrel{\text{pos. def}}{\Rightarrow} p_{n,12} = 0$

\bullet $p_{n,12} = 0 \Rightarrow g_n(n,12) = 0$

Aufgabe 3

Angenommen $\{P_{1,h}, P_{2,h}, \dots, P_{d,h}\}$ mit $d = \dim S_h$ ist kein Erzeugendensystem von S_h . Analog wie in Korollar 3.17

Schlussfolgern wir, dass eine Spitzenform $g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(g) q^n \in S_h \setminus \{0\}$ existieren muss mit $\langle g | P_{n,h} \rangle = 0 \quad \forall 1 \leq n \leq d$.

$\Rightarrow a_n(g) = 0 \quad \forall 1 \leq n \leq d$ und $a_0(g) = 0$ wegen $g \in S_h$.

Es gilt demnach $\text{ord}(g, \infty) \geq d+1 = \dim S_h + 1 = \dim M_h$.

Fallunterscheidung:

$k \not\equiv 2 \pmod{12}$: $\text{ord}(g, \infty) \geq \dim M_h = \lfloor \frac{h}{12} \rfloor + 1 > \frac{k}{12}$.

~~Also~~ Für $g \neq 0$ gilt aber die Valenzformel, d.h. $\text{ord}(g, \infty) \leq \frac{k}{12} \quad \downarrow$

$k \equiv 2 \pmod{12}$:

Fallunterscheidung:

$\text{ord}(g, \infty) = \dim M_h \Rightarrow \text{ord}(g, \infty) = \lfloor \frac{k}{12} \rfloor = \frac{k-2}{12}$

$g \neq 0 \xrightarrow[\text{Formel}]{\text{Valenz-}}$ $\text{ord}(g, \infty) + \frac{1}{3} \text{ord}(g, \rho) + \frac{1}{2} \text{ord}(g, i) + \sum_{z \neq \rho, i} \text{ord}(g, z) = \frac{k}{12}$

$\Rightarrow \frac{1}{3} \text{ord}(g, \rho) + \frac{1}{2} \text{ord}(g, i) + \sum_{z \neq \rho, i} \text{ord}(g, z) = \frac{k}{12} - \left(\frac{k-2}{12}\right) = \frac{1}{6}$

Das ist unmöglich, da g holomorph und daher $\text{ord}(g, z) \geq 0 \quad \forall z$ ist.

$\text{ord}(g, \infty) > \dim M_h \Rightarrow \text{ord}(g, \infty) \geq \lfloor \frac{k}{12} \rfloor + 1 > \frac{k}{12}$

$g \neq 0 \xrightarrow[\text{Valenzformel}]{\text{Valenzformel}} \frac{k}{12} \geq \text{ord}(g, \infty) > \frac{k}{12} \quad \downarrow$

Alle Fälle führen zum Widerspruch \Rightarrow Annahme ist falsch \square